

CATÁLOGO TAXONÓMICO¹

Versión abril 2019

¹ Citar como:

Rodríguez, R., C. Marticorena, D. Alarcón, C. Baeza, L. Cavieres, V.L. Finot, N. Fuentes, A. Kiessling, M. Mihoc, A. Pauchard, E. Ruiz, P. Sanchez & A. Marticorena. 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. *Gayana Botánica* 75(1): 1-430.

PTERIDOPHYTA

ASPLENIACEAE

Asplenium

***Asplenium dareoides* Desv.**

Sinónimos: *Asplenium magellanicum* Kaulf., *Asplenium concisum* Desv., *Asplenium philippi* Gand., *Asplenium dareoides* Desv. var. *dentatum* G. Kunkel

Hierba epífita o terrestre. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.

Rango altitudinal: 5-2000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Filu-lahuén.

***Asplenium gilliesii* Hook.**

Sinónimos: *Asplenium gilliesianum* Hook. & Grev.

Hierba saxícola. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP.

Rango altitudinal: 4000-4000 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Asplenium macrosorum* Bertero ex Colla**

Hierba epífita o terrestre. Perenne. Endémica.

Distribución: JFE.

Rango altitudinal: 30-500 m.

Asplenium obtusatum* G. Forst. var. *obtusatum

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: IPA, IDE.

Rango altitudinal: 2-190 m.

***Asplenium obtusatum* G. Forst. var. *sphenoides* (Kunze) C. Chr. ex Skottsb.**

Sinónimos: *Asplenium sphenoides* Kunze, *Asplenium chondrophyllum* Bertero ex Colla, *Asplenium consimile* J. Remy, *Asplenium obliquum* G. Forst. var. *sphenoides* (Kunze) Mett., *Asplenium obliquum* G. Forst. var. *chondrophyllum* (Bertero ex Colla) Mett.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.

Rango altitudinal: 2-500 m.

***Asplenium patagonicum* R.A. Rodr. & R. Guzmán**

Sinónimos: *Asplenium longifolium* Phil. ex Gotschl., nom. nud., *Asplenium monanthes* auct. non L.

Hierba terrestre o saxícola. Perenne. Endémica.

Distribución: ARA, LRI, LLA, MAG.

Rango altitudinal: 10-320 m.

***Asplenium peruvianum* Desv.**

Sinónimos: *Asplenium fragile* C. Presl var. *lomense* Weath., *Asplenium fragile* C. Presl

Hierba saxícola. Perenne. Nativa.

Distribución: ANT.

Rango altitudinal: 200-200 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Asplenium polyodon* G. Foster var. *squamulosum* (C. Chr.) R.A. Rodr.**

Sinónimos: *Asplenium adiantoides* (L.) C. Chr. var. *squamulosum* C. Chr.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: IPA.

Rango altitudinal: 2-120 m.

Nombre vulgar: Nehe nehe.

***Asplenium stellatum* Colla**

Sinónimos: *Asplenium fernandezianum* Kunze, *Asplenium lunulatum* Sw. var. *stellatum* (Colla) C. Chr.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: JFE.

Rango altitudinal: 90-1800 m.

***Asplenium trilobum* Cav.**

Sinónimos: *Asplenium trapezoides* Sw., *Asplenium parvulum* Hook., *Asplenium trilobum* Cav. var. *trapezoides* (Sw.) G. Kunkel

Hierba epífita o terrestre. Perenne. Nativa.

Distribución: BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 5-600 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Asplenium triphyllum* C. Presl**

Sinónimos: *Asplenium imbricatum* Hook. & Grev.

Hierba saxícola. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT, COQ.
Rango altitudinal: 4300-4500 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Pleurosorus

Pleurosorus papaverifolius (Kunze) Fée
Sinónimos: *Gymnogramme papaverifolia* Kunze,
Pleurosorus inmersus Fée, *Gymnogramma chilensis* Brack., *Pleurosorus papaverifolius* (Kunze) Fée var. *nana* Villagrán, *Pleurosorus papaverifolius* (Kunze) Fée var. *hirsuta* Villagrán, *Asplenium ciliatum* C. Presl ex Bertero, *Asplenium subglandulosum* (Hook. & Grev.) Salvo, Prada & Díaz subsp. *papaverifolium* (Kunze) Salvo, Prada & Díaz
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 100-1800 m.
Países limítrofes: Argentina.

ATHYRIACEAE

Diplazium

Diplazium fuenzalidæ Espinosa
Sinónimos: *Athyrium fuenzalidæ* (Espinosa) Gunckel, comb. illeg.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: IPA.
Rango altitudinal: 200-400 m.
Nombre vulgar: Nehe nehe.

BLECHNACEAE

Blechnum

Blechnum arcuatum J. Remy
Sinónimos: *Blechnum bibrae* Mett.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 5-1300 m.
Países limítrofes: Argentina.

Blechnum asperum (Klotzsch) J.W. Sturm
Sinónimos: *Lomaria aspera* Klotzsch, *Austroblechnum asperum* (Klotzsch) Gasper & V.A.O. Dittrich
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.
Rango altitudinal: 15-415 m.

Blechnum blechnoides Keyserl.
Sinónimos: *Lomaria leyboldiana* Phil., *Blechnum valdiviense* C. Chr., *Blechnum leyboldianum* (Phil.) C. Chr., *Lomaria blechnoides* auct. non Bory, *Spicanta leyboldiana* (Phil.) Kuntze
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 1-1100 m.
Nombre vulgar: Iquide.

Blechnum chilense (Kaulf.) Mett.
Sinónimos: *Lomaria chilensis* Kaulf., *Lomaria gilliesii* Hook. & Grev., *Lomaria reedii* Phil., *Blechnum gilliesii* (Hook. & Grev.) Mett., *Blechnum reedii* (Phil.) Espinosa, *Blechnum chilense* (Kaulf.) Mett. var. *reedii* (Phil.) Looser, *Blechnum chilense* (Kaulf.) Mett. fma. *imbricatum* Kunkel, *Blechnum cordatum* auct. non (Desv.) Hieron., *Parablechnum chilense* (Kaulf.) Gasper & V.A.O. Dittrich
Subarbusto. Nativo.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.
Rango altitudinal: 5-1500 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Costilla de vaca, palmilla, quilquil, iquide.

Blechnum corralense Espinosa
Sinónimos: *Austroblechnum corralense* (Espinosa) Gasper & V.A.O. Dittrich
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: LRI, LLA.
Rango altitudinal: 15-1200 m.

Blechnum cycadifolium (Colla) J.W. Sturm
Sinónimos: *Lomaria cycadifolia* Colla, *Lomaria lanuginosa* Kunze, *Blechnum lanuginosum* (Kunze) J.W. Sturm, *Blechnum magellanicum* (Desv.) Mett. var.

cycadifolium (Colla) C. Chr., *Struthiopteris cycadifolia* (Colla) Ching.

Arbusto. Endémico.

Distribución: JFE.

Rango altitudinal: 180-1200 m.

***Blechnum hastatum* Kaulf.**

Sinónimos: *Blechnum trilobum* C. Presl, *Blechnum ciliatum* C. Presl, *Lomaria hastata* (Kaulf.) Kunze, *Blechnum remotum* C. Presl, *Lomaria pubescens* (Hook.) Kunze, *Lomaria triloba* (C. Presl) Fée, *Blechnum hastatum* Kaulf. var. *minor* Hook., *Blechnum parvulum* Phil., *Blechnum australe* L. var. *triloba* (C. Presl) Hieron., *Blechnum australe* L. var. *hastata* (Kaulf.) Hieron., *Blechnum australe* L. fma. *trilobum* (C. Presl) Rosenst., *Blechnum auriculatum* Cav. fma. *remotum* (C. Presl) C. Chr. & Skottsb., *Blechnum auriculatum* Cav. fma. *parvula* (Phil.) C. Chr. & Skottsb., *Blechnum auriculatum* Cav. var. *trilobum* (C. Presl) Osten & Herter, *Blechnum auriculatum* Cav. var. *hastatum* (Kaulf.) Looser, *Blechnum auriculatum* Cav. var. *parvulum* (Phil.) Looser, *Blechnum hastatum* Kaulf. fma. *alternatum* G. Kunkel, *Blechnum hastatum* Kaulf. fma. *punctatum* (Looser) G. Kunkel, *Blechnum hastatum* Kaulf. var. *trilobum* (C. Presl) G. Kunkel, *Blechnum brevifolium* G. Kunkel, *Blechnum brevifolium* G. Kunkel subsp. *parvulum* (Phil.) Kunkel fma. *imbricatum* G. Kunkel, *Blechnum brevifolium* G. Kunkel var. *valdiviense* G. Kunkel, *Blechnum brevifolium* G. Kunkel subsp. *parvulum* (Phil.) G. Kunkel, *Blechnum brevifolium* G. Kunkel var. *brevifolium* fma. *nervosum* G. Kunkel, *Blechnum brevifolium* G. Kunkel var. *brevifolium* fma. *semidecurrentes* G. Kunkel, *Blechnum brevifolium* G. Kunkel var. *brevifolium* fma. *acuminatum* G. Kunkel, *Taenitis sagittaefera* Bory, *Mesothema remotum* (C. Presl) C. Presl, *Mesothema trilobum* (C. Presl) C. Presl, *Parablechnum ciliatum* (C. Presl) C. Presl, *Blechnopteris hastata* (Kaulf.) Trevis., *Struthiopteris hastata* (Kaulf.) Trevis., *Struthiopteris remota* (C. Presl) Trevis., *Struthiopteris triloba* (C. Presl) Trevis., *Spicanta hastata* (Kaulf.) Kuntze, *Blechnum auriculatum* auct. non Cav., *Mesothema hastatum* (Kaulf.) C. Presl
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE.
Rango altitudinal: 5-2500 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Palmilla, quilquil, arriquilquil.

***Blechnum longicauda* C. Chr.**

Sinónimos: *Cranfilia longicauda* (C. Chr.) V.A.O.

Dittrich

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: JFE.

Rango altitudinal: 5-500 m.

***Blechnum magellanicum* (Desv.) Mett.**

Sinónimos: *Lomaria magellanica* Desv., *Lomaria setigera* Gaudich., *Blechnum magellanicum* (Desv.)

Mett. var. *setigerum* (Gaudich.) C. Chr., *Blechnum magellanicum* (Desv.) Mett. var. *bipinnatifidum* G.

Kunkel, *Lomariocycas magellanica* (Desv.) Gasper & V.A.O. Dittrich

Arbusto. Nativo.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 5-2200 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Katalapi.

***Blechnum microphyllum* (Goldm.) C.V. Morton**

Sinónimos: *Lomaria microphylla* Goldm., *Lomaria australis* Kunze, *Lomaria gayana* J. Remy, *Blechnum gayanum* (J. Remy) J.W. Sturm, *Blechnum gayanum* (J.

Remy) J.W. Sturm fma. *germainii* (Hook.) Looser,

Lomaria germainii Hook., *Lomaria andicola* Phil.,

Lomaria araucana Phil., *Blechnum germanii* (Hook.) H.

Christ, *Blechnum andicola* (Phil.) C. Chr., *Blechnum araucanum* (Phil.) C. Chr., *Blechnum poeppigianum*

J.W. Sturm, *Austrolechnum microphyllum* (Goldm.)

Gasper & V.A.O. Dittrich

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 5-2600 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Blechnum mochaenum* G. Kunkel var.**

***fernandezianum* (Looser) de la Sota**

Sinónimos: *Blechnum blechnoides* (Bory) Keyserl. var.

fernandezianum Looser, *Austrolechnum*

fernandezianum (Looser) Gasper & V.A.O. Dittrich

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: JFE.

Rango altitudinal: 100-1100 m.

***Blechnum mochaenum* G. Kunkel var.**

mochaenum

Sinónimos: *Lomaria lechleri* T. Moore, *Austroblechnum lechleri* (T. Moore) Gasper & V.A.O. Dittrich

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 5-1350 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Blechnum penna-marina* (Poir.) Kuhn**

Sinónimos: *Polypodium penna-marina* Poir., *Blechnum alpinum* Mett., *Blechnum alpinum* Mett. var. *elongatum* Mett., *Blechnum uliginosum* (Phil.) C. Chr., *Blechnum penna-marina* (Poir.) Kuhn var. *uliginosa* (Phil.) C. Chr., *Blechnum penna-marina* (Poir.) Kuhn fma., *polypodioides* (Desv. ex Gaudich.) C. Chr., *Blechnum penna-marina* (Poir.) Kuhn var. *polypodioides* (Desv. ex Gaudich.) Looser, *Lomaria polypodioides* Desv. ex Gaudich., *Lomaria uliginosa* Phil., *Lomaria uliginosa* Phil. var. *magellanica* Phil., *Polypodium penna-marina* Poir., *Lomaria penna-marina* (Poir.) Mett., *Austroblechnum penna-marina* (Poir.) Gasper & V.A.O. Dittrich

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 3-1500 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Nombre vulgar: Pinque.

***Blechnum schottii* (Colla) C. Chr.**

Sinónimos: *Lomaria schottii* Colla, *Lomaria bella* Phil., *Lomaria fernandeziana* Phil., *Lomaridium schottii* (Colla) Gasper & V.A.O. Dittrich

Hierba trepadora. Perenne. Endémica.

Distribución: JFE.

Rango altitudinal: 50-820 m.

***Blechnum x rodriguezii* Aguiar, Quintanilla & Amigo**

Sinónimos: *Austroblechnum xrodriguezii* (Aguiar, Quintanilla & Amigo) Gasper & V.A.O. Dittrich

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: LRI, LLA.

Rango altitudinal: 150-585 m.

Nota: Híbrido natural entre Blechnum corralense y Blechnum mochaenum.

Doodia

***Doodia paschalis* C. Chr.**

Sinónimos: *Blechnum paschale* (C. Chr.) Christenh.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: IPA.

Rango altitudinal: 100-100 m.

Nombre vulgar: Nehe nehe.

CYSTOPTERIDACEAE

Cystopteris

***Cystopteris apiiformis* Gand.**

Sinónimos: *Cystopteris fragilis* (L.) Bernh. var. *apiiformis* (Gand.) C. Chr.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, COQ, VAL, RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.

Rango altitudinal: 0-3500 m.

Países limítrofes: Argentina.

DAVALLIACEAE

Davallia

***Davallia solida* (G. Forster) Sw.**

Hierba. Perenne. Nativa.

Nota: La expedición Franco-Belga de 1934 (Tardieu-Blot 1936), reporta la presencia de esta especie para Rapa Nui (Isla de Pascua). Sin embargo, esta especie nunca más ha sido encontrada.

DENNSTAEDTIACEAE

Dennstaedtia

***Dennstaedtia glauca* (Cav.) C. Chr. ex Looser**

Sinónimos: *Dicksonia lambertiana* J. Remy, *Davallia glauca* Cav., *Dennstaedtia lambertiana* (J. Remy) H. Christ

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 300-2360 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Histiopteris

Histiopteris incisa (Thunb.) J. Sm.

Sinónimos: *Pteris incisa* Thunb., *Litobrochia incisa* (Thunb.) C. Presl, *Pteris flavescentia* Colla, *Pteris patens* Kunze, *Pteris vespertilionis* Labill. var. *flavescentia* (Colla) J. Agardh, *Litobrochia appendiculata* (Kaulf.) J. Remy, *Litobrochia patens* (Kunze) J. Remy, *Histiopteris incisa* (Thunb.) J. Sm. var. *flavescentia* (Colla) C. Chr., *Pteris vespertilionis* auct. non Labill. Hierba. Perenne. Nativa. Distribución: LLA, AIS, MAG, JFE. Rango altitudinal: 5-580 m. Países limítrofes: Perú.

Hypolepis

Hypolepis poeppigii (Kunze) R.A. Rodr.

Sinónimos: *Polypodium poeppigii* Kunze, *Phegopteris poeppigii* (Kunze) Fée ex J. Remy, *Phegopteris sturmii* Phil., *Hypolepis rugosula* (Labill.) J. Sm. var. *poeppigii* (Kunze) C. Chr. & Skottsb., *Cystopteris fragilis* (L.) Bernh. var. *pubescens* Phil., *Hypolepis poeppigiana* Mett., *Hypolepis chilensis* Fée, *Phegopteris poeppigii* (Kunze) Fée var. *hirsuta* Phil. Hierba. Perenne. Nativa. Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE. Rango altitudinal: 25-650 m. Países limítrofes: Argentina. Nombre vulgar: Wilel-lawen, pesebre.

Microlepia

Microlepia strigosa (Thunb. ex Murray) C. Presl

Sinónimos: *Trichomanes strigosus* Thunb. ex Murray
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: IPA.
Rango altitudinal: 100-300 m.

DICKSONIACEAE

Dicksonia

Dicksonia berteroana (Colla) Hook.

Sinónimos: *Davallia berteroana* Colla, *Balantium berteroanum* Kunze
Arbusto o árbol pequeño. Endémico.
Distribución: JFE.
Rango altitudinal: 200-700 m.

Dicksonia externa C. Chr. & Skottsb.

Sinónimos: *Dicksonia berteriana* (Colla) Hook. var. *virgata* C. Chr. & Skottsb.
Arbusto o árbol pequeño. Endémico.
Distribución: JFE.
Rango altitudinal: 200-700 m.

Lophosoria

Lophosoria quadripinnata (J.F. Gmel.) C. Chr.

Sinónimos: *Polypodium quadripinnatum* J.F. Gmel., *Polypodium pruinatum* Sw., *Polypodium cinereum* Cav., *Cyathea discolor* Bory, *Alsophila pruinata* (Sw.) Kaulf. ex Kunze, *Lophosoria pruinata* (Sw.) C. Presl, *Lophosoria quadripinnata* (J.F. Gmel.) C. Chr. fma. *viridifolia* G. Kunkel
Subarbusto. Nativo.
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, JFE.
Rango altitudinal: 5-2000 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.
Nombre vulgar: Palmita, palmilla, helecho o palmita de Valdivia, ampe.

Thyrsopteris

Thyrsopteris elegans Kunze

Sinónimos: *Dicksonia elegans* (Kunze) Mett., *Panicularia berteri* Colla
Subarbusto. Endémico.
Distribución: JFE.
Rango altitudinal: 700-1000 m.

DRYOPTERIDACEAE

Dryopteris

***Dryopteris filix-mas* (L.) Schott**

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: LLA.

***Dryopteris karwinskyana* (Mett.) Kuntze**

Sinónimos: *Aspidium karwinskyanum* Mett., *Dryopteris espinosai* Hicken, *Thelypteris espinosae* (Hicken) R.A. Rodr.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: IPA.

Rango altitudinal: 420 m.

Nota: Considerado extinto en Rapa Nui (Isla de Pascua) por Jean-Yves Meyer (2013) porque no ha sido observado o recolectado desde hace más de 75 años.

Elaphoglossum

***Elaphoglossum fonkii* (Phil.) T. Moore**

Sinónimos: *Elaphoglossum mathewsii* auct. non (Fée) T. Moore, *Acrostichum fonkii* Phil.

Hierba saxícola. Perenne. Endémica.

Distribución: LRI, LLA.

Rango altitudinal: 0-800 m.

***Elaphoglossum gayanum* (Fée) T. Moore**

Sinónimos: *Acrostichum gayanum* Fée

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ARA, LRI, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 0-3000 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

***Elaphoglossum lindenii* (Bory ex Fée) T. Moore**

Sinónimos: *Elaphoglossum squamatum* auct. non. (Sw.) T. Moore, *Acrostichum squamosum* Cav., *Acrostichum lindenii* Bory ex Fée

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: JFE.

Rango altitudinal: 400 m.

Países limítrofes: Bolivia y Perú.

***Elaphoglossum porteri* Hicken**

Sinónimos: *Elaphoglossum rudolphii* Espinosa

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: LLA.

Rango altitudinal: 600-900 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Elaphoglossum skottsbergii* Krajina**

Sinónimos: *Elaphoglossum gayanum* auct. non (Fée) T. Moore, *Elaphoglossum tahitense* auct. non Brack.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: IPA.

Rango altitudinal: 400-500 m.

Megalastrum

***Megalastrum glabrius* (C. Chr. & Skottsb.)**

Sundue, Rouhan & R.C. Moran

Sinónimos: *Dryopteris inaequalifolia* (Colla) C. Chr. var. *glabrior* C. Chr. & Skottsb., *Ctenitis inaequalifolia* (Colla) Ching var. *glabrior* (C. Chr. & Skottsb.) G. Kunkel, *Megalastrum inaequalifolium* (Colla) A.R. Sm. & R.C. Moran var. *glabrius* (C. Chr. & Skottsb.) R.A. Rodr.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: JFE.

Rango altitudinal: 200-600 m.

***Megalastrum inaequalifolium* (Colla) A.R. Sm. & R.C. Moran**

Sinónimos: *Polypodium inaequalifolium* Colla, *Dryopteris villosa* (L.) Kuntze var. *berteroana* (Hook.) C. Chr., *Dryopteris skottsbergii* C. Chr., *Dryopteris inaequalifolia* (Colla) C. Chr., *Ctenitis inaequalifolia* (Colla) Ching

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: JFE.

Rango altitudinal: 200-600 m.

***Megalastrum masafuerae* Sundue, Rouhan & R.C.**

Moran

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: JFE.

Rango altitudinal: 100 m.

***Megalastrum spectabile* (Kaulf.) A.R. Sm. & R.C. Moran**

Sinónimos: *Megalastrum spectabile* (Kaulf.) A.R. Sm. & R.C. Moran var. *philippianum* (C. Chr.) A.R. Sm. & R.C. Moran, *Polypodium spectabile* Kaulf., *Dryopteris spectabilis* (Kaulf.) C. Chr., *Ctenitis spectabilis* (Kaulf.) G. Kunkel, *Dryopteris spectabilis* (Kaulf.) C. Chr. var. *philippiana* C. Chr., *Ctenitis spectabilis* (Kaulf.) G. Kunkel var. *philippiana* (C. Chr.) R.A. Rodr., *Polypodium contractum* Desv.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 0-900 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Pesebre.

Polystichum

***Polystichum andinum* Phil.**

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-4000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Polystichum chilense* (Christ) Diels var. *chilense

Sinónimos: *Polystichum bridgesii* Schott, *Aspidium aculeatum* (L.) Sw. var. *chilensis* C. Chr., *Aspidium bridgesii* (Schott) J.W. Sturm, *Aspidium paucicuspis* J.W. Sturm, *Polystichum aculeatum* (L.) Schott var. *chilense* (H. Christ) C. Chr.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-1300 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Pelomén-lahuén.

***Polystichum chilense* (Christ) Diels var. *dusenii* (C. Chr.) Looser ex R.A. Rodr.**

Sinónimos: *Polystichum multifidum* (Mett.) T. Moore var. *dusenii* C. Chr.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-800 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Polystichum fuentesii* Espinosa**

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: IPA.

Nota: Considerado extinto en Rapa Nui (Isla de Pascua) por Jean-Yves Meyer (2013) porque no ha sido observado o recolectado desde hace más de 75 años.

***Polystichum multifidum* (Mett.) T. Moore**

Sinónimos: *Polystichum multifidum* (Mett.) T. Moore

var. *autranii* Hicken, *Aspidium multifidum* Mett.,

Dryopteris metteniana Kuntze, *Dicksonia andina* Phil.,

Polystichum pearcei Phil., *Polystichum nahuelhuapiense* Diem, *Aspidium pearcei* (Phil.) F. Phil., *Polystichum multifidum* (Mett.) T. Moore var. *pearcei* (Phil.) R.A. Rodr.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Polystichum plicatum* (Poepp. ex Kunze) Hicken**

Sinónimos: *Polystichum elegans* J. Remy, *Polystichum mohrioides* (Bory) C. Presl fma. *genuina* Hicken,

Polystichum mohrioides (Bory) C. Presl fma. *latifolia* Hicken, *Polystichum mohrioides* (Bory) C. Presl var.

elegans (J. Remy) C. Chr., *Polystichum mohrioides* (Bory) C. Presl var. *plicatum* (Poepp.) C. Chr., *Aspidium plicatum* Poepp. ex Kunze, *Aspidium plicatum* Poepp. ex Kunze var. *laxum* Kunze, *Aspidium plicatum* Poepp. ex Kunze var. *rigidum* Kunze, *Aspidium elegans* (J. Remy) J.W. Sturm

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-3500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Polystichum subintegerrimum* (Hook. & Arn.)**

R.A. Rodr.

Sinónimos: *Polystichum brongniartianum* J. Remy,

Polystichum aculeatum (L.) Schott var. *brongniartianum* (J. Remy) C. Chr., *Polystichum aculeatum* (L.) Schott var.

subintegerrimum (Hook. & Arn.) C. Chr., *Aspidium subintegerrimum* Hook. & Arn., *Aspidium brongniartianum* (J. Remy) J.W. Sturm

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-1100 m.

***Polystichum tetragonum* Féé**

Sinónimos: *Polystichum vestitum* auct. non (G. Forst.) C. Presl

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: JFE.

Rango altitudinal: 200 m.

Rumohra

Rumohra adiantiformis (G. Forst.) Ching
 Sinónimos: *Polypodium adiantiforme* G. Forst.,
Aspidium coriaceum Sw., *Polystichum coriaceum*
 Schott, *Nephrodium duriusculum* C. Presl, *Polystichum*
adiantiforme (G. Forst.) J. Sm.
 Hierba. Perenne. Nativa.
 Distribución: COQ, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.
 Rango altitudinal: 0-1000 m.
 Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.
 Nombre vulgar: Perek, calahuala, yerba del lagarto.

Rumohra berteroana (Colla) R.A. Rodr.
 Sinónimos: *Aspidium berterianum* Colla, *Aspidium flexum* Kunze, *Polystichum berterianum* (Colla) C. Chr., *Aspidium capense* auct. non Willd.
 Hierba. Perenne. Endémica.
 Distribución: JFE.
 Rango altitudinal: 200-1200 m.

EQUISETACEAE

Equisetum

Equisetum bogotense Kunth
 Sinónimos: *Equisetum flagelliforme* Kunze, *Equisetum flagelliferum* Kunze ex Milde, *Equisetum chilense* C. Presl ex Milde, *Equisetum rinihuense* G. Kunkel
 Hierba. Perenne. Nativa.
 Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.
 Rango altitudinal: 10-3200 m.
 Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.
 Nombre vulgar: Limpia plata, yerba, yerba de la plata.

Equisetum giganteum L.
 Sinónimos: *Equisetum poeppigianum* Mett., *Equisetum lechleri* Milde, *Equisetum tarapacanum* Phil., *Hippochaete gigantea* (L.) Holub, *Equisetum xylochaetum* Mett.
 Hierba. Perenne. Nativa.
 Distribución: AYP, TAR.
 Rango altitudinal: 20-2800 m.
 Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.
 Nombre vulgar: Cola de caballo, sojosojo.

Equisetum pyramidale Goldm.
 Sinónimos: *Equisetum ramosissimum* Desf. var. *scaberium* Milde, *Equisetum philippi* Gand., *Equisetum scandens* J. Remy, *Equisetum giganteum* L. var. *chilense* Milde, *Equisetum ramosissimum* Desf. var. *affine* Milde, *Equisetum araucanum* Phil.
 Hierba. Perenne. Endémica.
 Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.
 Rango altitudinal: 10-2600 m.
 Nombre vulgar: Cola de caballo.

GLEICHENIACEAE

Sticherus

Sticherus cryptocarpus (Hook.) Ching
 Sinónimos: *Dicranopteris cryptocarpa* (Hook.) Looser, *Gleichenia cryptocarpa* Hook., *Mertensia cryptocarpa* (Hook.) J. Remy, *Sticherus cryptocarpus* (Hook.) Ching var. *loosermanus* G. Kunkel
 Hierba. Perenne. Nativa.
 Distribución: BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.
 Rango altitudinal: 20-2200 m.
 Países limítrofes: Argentina.
 Nombre vulgar: Hierba loza, cola de gallo, ampe.

Sticherus lepidotus (R.A. Rodr.) R.A. Rodr. & Ponce
 Sinónimos: *Gleichenia lepidota* R.A. Rodr.
 Hierba. Perenne. Endémica.
 Distribución: JFE.
 Rango altitudinal: 500-1100 m.

Sticherus litoralis (Phil.) Nakai
 Sinónimos: *Mertensia litoralis* Phil., *Gleichenia litoralis* (Phil.) C. Chr., *Dicranopteris pedalidis* (Kaulf.) Looser var. *litoralis* (Phil.) Looser, *Gleichenia pedalidis* (Kaulf.) Sprengel var. *litoralis* (Phil.) Looser, *Dicranopteris litoralis* (Phil.) Looser
 Hierba. Perenne. Endémica.
 Distribución: LRI, LLA, AIS, MAG.
 Rango altitudinal: 3-1040 m.

Sticherus quadripartitus (Poir.) Ching

Sinónimos: *Polypodium quadripartitum* Poir., *Gleichenia acutifolia* Hook., *Mertensia acutifolia* (Hook.) J. Remy, *Gleichenia bibraeae* Mett. ex Kuhn, *Dicranopteris quadripartita* (Poir.) Looser, *Gleichenia quadripartita* (Poir.) T. Moore, *Mertensia magellanica* Desv., *Mertensia quadripartita* (Poir.) Poir., *Sticherus quadripartitus* (Poir.) Ching fma. *bipartitus* G. Kunkel, *Sticherus quadripartitus* (Poir.) Ching fma. *simplex* G. Kunkel

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.

Rango altitudinal: 0-1800 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Yerba loza, palmita, pata de cuchillo.

Sticherus squamulosus (Desv.) Nakai var. *gunckelianus* (Looser) R.A. Rodr. & Ponce
Sinónimos: *Gleichenia squamulosa* (Desv.) T. Moore var. *gunckeliana* (Looser) Duek, *Dicranopteris squamulosa* (Desv.) Looser var. *gunckeliana* Looser
Hierba trepadora. Perenne. Endémica.
Distribución: LRI, LLA.
Rango altitudinal: 0-100 m.

Sticherus squamulosus (Desv.) Nakai var. *squamulosus*
Sinónimos: *Gleichenia pedalis* (Kaulf.) Spreng., *Dicranopteris pedalis* (Kaulf.) Looser, *Sticherus pedalis* (Kaulf.) Ching, *Gleichenia squamulosa* (Desv.) T. Moore, *Mertensia squamulosa* Desv., *Mertensia pedalis* Kaulf., *Mertensia oligocarpa* Phil., *Gleichenia oligocarpa* (Phil.) C. Chr., *Dicranopteris oligocarpa* (Phil.) Looser, *Sticherus oligocarpus* (Phil.) Nakai, *Sticherus squamulosus* (Desv.) Nakai var. *glaber* (T. Moore) Nakai, *Dicranopteris squamulosa* (Desv.) Looser
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, JFE.
Rango altitudinal: 3-1500 m.
Nombre vulgar: Yerba loza, palmita, huedahue.

HYMENOPHYLLACEAE

Hymenoglossum

Hymenoglossum cruentum (Cav.) C. Presl

Sinónimos: *Hymenophyllum cruentum* Cav.

Hierba epífita. Perenne. Nativa.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.

Rango altitudinal: 0-900 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Helecho película, sanguinaria, seda de la luma.

Hymenophyllum

Hymenophyllum caudiculatum Mart. var. *productum* (C. Presl) C. Chr.

Sinónimos: *Hymenophyllum caudatum* Bosch, *Hymenophyllum patagonicum* Gand., *Sphaerocionium productum* C. Presl, *Mecodium caudiculatum* (Mart.) Copel. fma. *productum* (C. Presl) G. Kunkel, *Mecodium caudiculatum* (Mart.) Copel. fma. *nanum* G. Kunkel
Hierba epífita. Perenne. Nativa.

Distribución: BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.

Rango altitudinal: 0-1500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Pallante chilote.

Hymenophyllum cuneatum Kunze var. *cuneatum*

Sinónimos: *Hymenophyllum cumingii* C. Presl, *Mecodium cuneatum* (Kunze) Copel., *Hymenophyllum polyanthos* auct. non (Sw.) Sw.

Hierba epífita. Perenne. Endémica.

Distribución: ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.

Rango altitudinal: 400-1000 m.

Hymenophyllum cuneatum Kunze var. *rariforme* C. Chr. & Skottsb.

Sinónimos: *Hymenophyllum terminale* Phil., *Hymenophyllum cuneatum* Kunze fma. *imbricata* C. Chr. & Skottsb., *Mecodium cuneatum* (Kunze) Copel. var. *rariforme* (C. Chr. & Skottsb.) G. Kunkel
Hierba epífita. Perenne. Endémica.

Distribución: JFE.

Rango altitudinal: 300-500 m.

Hymenophyllum darwinii Hook.f. ex Bosch

Sinónimos: *Hymenophyllum abruptum* Hook. var. *brevifrons* (Kunze) Franch., *Hymenophyllum skottsbergii* C. Chr., *Hymenophyllum rarum* R. Br. var. *darwinii* (Bosch) Neger
Hierba epífita o saxícola. Perenne. Nativa.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-1200 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Hymenophyllum dentatum* Cav.**

Sinónimos: *Hymenophyllum bridgesii* Hook.,

Hymenophyllum trichocaulum Phil., *Sphaerocionium bridgesii* (Hook.) Klotzsch, *Leptocionium dentatum* (Cav.) Bosch, *Meringium dentatum* (Cav.) Copel.

Hierba epífita. Perenne. Nativa.

Distribución: BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 0-1600 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Shushu-lahuén.

***Hymenophyllum dicranotrichum* (C. Presl) Hook. ex Sadeb.**

Sinónimos: *Hymenophyllum chiloense* Hook.,

Leptocionium dicranotrichum C. Presl, *Trichomanes spinulosum* Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 0-600 m.

***Hymenophyllum falklandicum* Baker**

Sinónimos: *Hymenophyllum falklandicum* Baker var. *elongatum* Diem & J.S. Licht., *Hymenophyllum glebarium* H. Christ ex C. Chr., *Hymenophyllum caespitosum* auct. non Gaudich., *Hymenophyllum falklandicum* Baker var. *falklandicum* fma. *andinum* Diem & J.S. Licht.

Hierba epífita. Perenne. Nativa.

Distribución: BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.

Rango altitudinal: 0-1700 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Hymenophyllum ferrugineum* Colla**

Sinónimos: *Hymenophyllum frankliniae* Colenso, *Hymenophyllum berteroii* Hook., *Sphaerocionium ferrugineum* (Colla) Copel., *Hymenophyllum ferrugineum* Colla var. *donatii* Looser, *Hymenophyllum subtilissimum* Kunze

Hierba epífita o terrestre. Perenne. Nativa.

Distribución: ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.

Rango altitudinal: 0-1400 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Hymenophyllum fuciforme* Sw.**

Sinónimos: *Hymenophyllum semiteres* Colla, *Leptocionium fuciforme* (Sw.) C. Presl, *Mecodium fuciforme* (Sw.) Copel.

Hierba epífita o terrestre. Perenne. Nativa.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.

Rango altitudinal: 0-1200 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Hymenophyllum krauseanum* Phil.**

Sinónimos: *Hymenophyllum magellanicum* Willd. ex Kunze var. *krauseanum* (Phil.) C. Chr., *Hymenophyllum dichotomum* Cav. var. *krauseanum* (Phil.) C. Chr., *Hymenophyllum plicatum* Kaulf. var. *krauseanum* (Phil.) Looser, *Meringium krauseanum* (Phil.) G. Kunkel

Hierba epífita o saxícola. Perenne. Nativa.

Distribución: BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-1300 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Hymenophyllum nahuelhuapiense* Diem & J.S.**

Licht.

Hierba terrestre o saxícola. Perenne. Nativa.

Distribución: LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 200-800 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Hymenophyllum pectinatum* Cav.**

Hierba epífita o terrestre. Perenne. Nativa.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.

Rango altitudinal: 0-3600 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Hymenophyllum peltatum* (Poir.) Desv.**

Sinónimos: *Trichomanes peltatum* Poir.,

Hymenophyllum menziesii C. Presl, *Hymenophyllum meyeri* C. Presl, *Hymenophyllum megachilum* C. Presl, *Hymenophyllum peltatum* (Poir.) Desv. var. *elongatum* Diem & J.S. Licht., *Hymenophyllum mettenii* Bosch, *Hymenophyllum peltatum* (Poir.) Desv. var. *minor* Diem & J.S. Licht., *Hymenophyllum peltatum* (Poir.) Desv. var. *patagonicum* Diem & J.S. Licht., *Hymenophyllum unilaterale* Bory, *Hymenophyllum tunbrigense* (L.) Sm. var. *wilsonii* (Hook.) Sadeb., *Hymenophyllum wilsonii* Hook.

Hierba epífita o saxícola. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-1400 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Hymenophyllum plicatum* Kaulf.**

Sinónimos: *Ptychophyllum plicatum* (Kaulf.) C. Presl, *Hymenophyllum quadrifidum* Phil., *Hymenophyllum plicatum* Kaulf. var. *quadrifidum* (Phil.) Looser, *Meringium plicatum* (Kaulf.) Copel., *Hymenophyllum dichotomum* auct. non Cav., *Hymenophyllum nigricans* Colla

Hierba epífita o terrestre. Perenne. Nativa.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.

Rango altitudinal: 0-800 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Hymenophyllum rugosum* C. Chr. & Skottsb.**

Sinónimos: *Hymenophyllum rugosum* C. Chr. & Skottsb. fma. *lanceolatum* C. Chr. & Skottsb., *Hymenophyllum tunbrigense* auct. non (L.) Sm.

Hierba epífita o terrestre. Perenne. Endémica.

Distribución: JFE.

Rango altitudinal: 400-700 m.

***Hymenophyllum secundum* Hook. & Grev.**

Sinónimos: *Hymenophyllum serra* C. Presl, *Meringium secundum* (Hook. & Grev.) Copel.

Hierba epífita o terrestre. Perenne. Nativa.

Distribución: LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.

Rango altitudinal: 0-1200 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Hymenophyllum seselifolium* C. Presl**

Sinónimos: *Didymoglossum magellanicum* Desv., *Hymenophyllum attenuatum* Hook., *Ptychophyllum magellanicum* Klotzsch, *Hymenophyllum bobraianum* J.W. Sturm, *Leptocionium attenuatum* (Hook.) Bosch, *Leptocionium magellanicum* (Desv.) Bosch, *Leptocionium seselifolium* (C. Presl) Bosch, *Meringium magellanicum* (Desv.) Copel., *Hymenophyllum magellanicum* (Desv.) Willd. ex Kunze

Hierba epífita o terrestre. Perenne. Nativa.

Distribución: BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-1800 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Hymenophyllum tortuosum* Hook. & Grev.**

Sinónimos: *Myrmecostylum tortuosum* (Hook. & Grev.) C. Presl, *Leptocionium tortuosum* (Hook. & Grev.) Bosch, *Trichomanes beckeri* E.H.L. Krause ex Phil., *Hymenophyllum tortuosum* Hook. & Grev. var. *beckeri* (E.H.L. Krause ex Phil.) Espinosa, *Hymenophyllum tortuosum* Hook. & Grev. var. *bustillosii* Espinosa, *Meringium tortuosum* (Hook. & Grev.) Copel., *Hymenophyllum tortuosum* Hook. & Grev. var. *glomeratum* Diem & J.S. Licht.

Hierba epífita o terrestre. Perenne. Nativa.

Distribución: ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.

Rango altitudinal: 0-1500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Hymenophyllum tunbrigense* (L.) Sm.**

Sinónimos: *Trichomanes tunbrigense* L., *Hymenophyllum antarcticum* C. Presl, *Hymenophyllum tunbrigense* (L.) Sm. var. *asperulum* (Kunze) Diem & J.S. Licht.

Hierba epífita o terrestre. Perenne. Nativa.

Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Hymenophyllum umbratile* Diem & J.S. Licht.**

Hierba epífita. Perenne. Nativa.

Distribución: LRI, LLA.

Rango altitudinal: 0-600 m.

Países limítrofes: Argentina.

Serpillopsis

Serpillopsis caespitosa* (Gaudich.) C. Chr. var. *caespitosa

Sinónimos: *Serpillopsis caespitosa* (Gaudich.) C. Chr. var. *dusenii* (H. Christ) C. Chr., *Serpillopsis caespitosa* (Gaudich.) C. Chr. var. *densifolia* (Phil.) C. Chr., *Serpillopsis caespitosa* (Gaudich.) C. Chr. var. *elongata* (Hook.) C. Chr., *Hymenophyllum caespitosum* Gaudich., *Trichomanes caespitosum* (Gaudich.) Hook.f., *Leptocionium caespitosum* C. Presl, *Hymenophyllum dusenii* H. Christ

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-1700 m.

Países limítrofes: Argentina.

Serpyllopsis caespitosa (Gaudich.) C. Chr. var.
fernandeziana C. Chr. & Skottsb.

Hierba terrestre o saxícola. Perenne. Endémica.
Distribución: JFE.
Rango altitudinal: 400-1400 m.

Trichomanes

Trichomanes exsectum Kunze

Sinónimos: *Vandenboschia exsecta* (Kunze) Copel.,
Polyphlebium exsectum (Kunze) Ebihara & Dubuisson
Hierba epífita o saxícola. Perenne. Endémica.
Distribución: MAU, LRI, LLA, JFE.
Rango altitudinal: 0-600 m.

Trichomanes ingae C. Chr. & Skottsb.

Sinónimos: *Vandenboschia ingae* (C. Chr. & Skottsb.)
Copel., *Polyphlebium ingae* (C. Chr. & Skottsb.) Ebihara
& Dubuisson
Hierba epífita o saxícola. Perenne. Endémica.
Distribución: JFE.
Rango altitudinal: 100-400 m.

Trichomanes philippianum J.W. Sturm

Sinónimos: *Vandenboschia philippiana* (J.W. Sturm)
Copel., *Polyphlebium philippianum* (J.W. Sturm)
Ebihara & Dubuisson, *Trichomanes dichotomum* Phil.
Hierba epífita o saxícola. Perenne. Endémica.
Distribución: JFE.
Rango altitudinal: 500-700 m.

ISOETACEAE

Isoetes

Isoetes araucaniana Macluf & Hickey

Hierba acuática. Perenne. Endémica.
Distribución: BIO, ARA.
Rango altitudinal: 800-1500 m.

Isoetes chubutiana Hickey, Macluf & W.C. Taylor

Sinónimos: *Isoetes valdiviensis* H.P. Fuchs, nom. nud.,
Isoetes meyeri H.P. Fuchs, nom. nud.
Hierba acuática. Perenne. Nativa.

Distribución: BIO, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 700-1300 m.

Países limítrofes: Argentina.

Isoetes hieronymi U. Weber

Sinónimos: *Isoetes argentina* A.A. Eaton ex Palmer,
nom. nud., *Isoetes lechleri* auct. non Mett.
Hierba acuática. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ.
Rango altitudinal: 1000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Isoetes savatieri Franchet

Sinónimos: *Calamaria savatieri* (Franchet) Kuntze,
Isoetes lechleri Mett. var. *savatieri* (Franchet) L.D. Gómez
Hierba acuática. Perenne. Nativa.
Distribución: VAL, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-200 m.
Países limítrofes: Argentina.

LYCOPIDIACEAE

Austrolycopodium

Austrolycopodium alboffii (Rolleri) Holub

Sinónimos: *Lycopodium alboffii* Roller, *Lycopodium magellanicum* (P. Beauv.) Sw. var. *nanum* (Albov) Looser
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: LRI, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 100-300 m.
Países limítrofes: Argentina.

Austrolycopodium confertum (Willd.) Holub

Sinónimos: *Lycopodium confertum* Willd., *Lycopodium chonoticum* Phil., *Lycopodium confertum* Willd. var. *barrosii* Looser, *Lycopodium barrosii* (Looser) Herter
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: LRI, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 500-1500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Austrolycopodium erectum (Phil.) Holub

Sinónimos: *Lycopodium erectum* Phil., *Lycopodium magellanicum* (P. Beauv.) Sw. var. *erectum* (Phil.) Looser, *Lycopodium looseri* Herter
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ARA, LRI, LLA, MAG.
Rango altitudinal: 1200-2800 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

***Austrolycopodium magellanicum* (P. Beauv.)**

Holub
Sinónimos: *Lepidotis magellanica* P. Beauv.,
Lycopodium magellanicum (P. Beauv.) Sw.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.
Rango altitudinal: 300-1600 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.
Nombre vulgar: Pinpinela.

***Austrolycopodium paniculatum* (Desv. ex Poir.)**

Holub
Sinónimos: *Lycopodium paniculatum* Desv. ex Poir.,
Lycopodium dendromorphum Kunze
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.
Rango altitudinal: 700-900 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Palmita, pinpinela, licopodio, musgo, llanka-lawen.

Diphasium

***Diphasium gayanum* (J. Rémy)** Holub
Sinónimos: *Lycopodium gayanum* J. Rémy, *Lycopodium skottsbergii* (Herter ex Nessel) Herter, *Lycopodium scariosum* G. Forst. var. *gayanum* (J. Rémy) Nessel, *Lycopodium scariosum* auct. non G. Forst., *Lycopodium jussiaei* (jussieui) auct. non Desv.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, JFE.
Rango altitudinal: 300-1300 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Palmita, pinpinela.

Huperzia

***Huperzia fuegiana* (Rov.) Holub**

Sinónimos: *Urostachys fuegianus* (Rov.) Herter, *Lycopodium fuegianum* Rov., *Urostachys selago* (L.) Herter var. *hessei* Herter ex Nessel, *Huperzia selago* auct. non (L.) Schrank & Mart., *Lycopodium selago* auct. non L.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-500 m.
Países limítrofes: Argentina.

MARSILEACEAE

Marsilea

***Marsilea mollis* B.L. Rob. & Fernald**
Sinónimos: *Marsilea punae* de la Sota
Hierba acuática. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ, VAL.
Rango altitudinal: 0-3500 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Pilularia

***Pilularia americana* A. Braun**
Sinónimos: *Pilularia valdiviana* Phil. ex Baker, nom. nud.
Hierba acuática. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.
Rango altitudinal: 0-100 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

OLEANDRACEAE

Arthropteris

***Arthropteris altescandens* (Colla) J. Sm.**
Sinónimos: *Polypodium altescandens* Colla, *Polypodium procurrens* Kunze, *Nephrolepis altescandens* (Colla) Baker
Hierba trepadora. Perenne. Endémica.
Distribución: JFE.
Rango altitudinal: 0-700 m.

OPHIOGLOSSACEAE

Botrychium

Botrychium dusenii (H. Christ) Alston

Sinónimos: *Botrychium ramosum* Asch. var. *patagonicum* H. Christ, *Botrychium lunaria* (L.) Sw. var. *dusenii* H. Christ, *Botrychium matricariaefolium* A. Braun subsp. *patagonicum* (C. Chr.) R.T. Clausen
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: RME, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-900 m.
Países limítrofes: Argentina.

Ophioglossum

Ophioglossum crotalophoroides Walter

Sinónimos: *Ophioglossum tuberosum* Hook. & Arn., *Ophioglossum stipatum* Miers ex Colla, *Ophioglossum vulgatum* L. var. *crotalophoroides* (Walter) D.C. Eaton
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: VAL, RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.
Rango altitudinal: 0-1500 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Ophioglossum fernandezianum C. Chr.

Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: JFE.
Rango altitudinal: 0-300 m.

Ophioglossum melipillense J. Remy

Sinónimos: *Ophioglossum lusitanicum* L. subsp. *coriaceum* (A.Cunn.) R.T. Clausen
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU.
Rango altitudinal: 0-1600 m.
Países limítrofes: Argentina.

Ophioglossum reticulatum L.

Sinónimos: *Ophioglossum peruvianum* C. Presl, *Ophioglossum vulgatum* L. var. *reticulatum* (L.) Luerss.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: IPA.
Rango altitudinal: 10-45 m.
Nombre vulgar: Tiapito.

Ophioglossum vulgatum L.

Sinónimos: *Ophioglossum nudicaule* L. var. *robustum* J.S. Licht., *Ophioglossum valdivianum* Phil., *Ophioglossum vulgatum* L. var. *valdivianum* (Phil.) J.S. Licht.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: LRI, LLA, AIS.
Rango altitudinal: 0-300 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Huentru-lahuén.

POLYPODIACEAE

Grammitis

Grammitis magellanica Desv.

Sinónimos: *Polypodium magellanicum* (Desv.) J.W. Sturm, *Polypodium magellanicum* (Desv.) Copel., comb. illeg., *Grammitis billardieri* Willd. var. *magellanica* (Desv.) de la Sota, *Polypodium gramineum* auct. non Sw., *Polypodium billardieri* (Willd.) C. Chr. var. *magellanicum* (Desv.) C. Chr.
Hierba epífita. Perenne. Nativa.
Distribución: BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.
Rango altitudinal: 30-1600 m.
Países limítrofes: Argentina.

Grammitis patagonica (C. Chr.) Parris

Sinónimos: *Grammitis repanda* Kunze ex Mett., *Polypodium patagonicum* C. Chr., *Grammitis ciliata* auct. non Colenso, *Polypodium jungermannioides* auct. non Klotzsch
Hierba epífita. Perenne. Nativa.
Distribución: LRI, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-700 m.
Países limítrofes: Argentina.

Grammitis poeppigiana (Mett.) Pic.Serm.

Sinónimos: *Polypodium poeppigianum* Mett., *Grammitis australis* R. Br. var. *nana* (Brack.) Franch., *Polypodium australe* Mett. var. *nanum* Brack. ex Macloskie, *Polypodium billardieri* (Willd.) C. Chr. var. *magellanicum* (Desv.) C. Chr. fma. *nanum* (Brack.) Franch. ex Skottsb., *Grammitis billardieri* Willd. var. *magellanica* (Desv.) de la Sota fma. *nana* (Brack.) de la Sota, *Grammitis magellanica* Desv. fma. *nana* (Brack.)

de la Sota ex T.R. Dudley, *Grammitis nana* auct. non Féé
Hierba epífita. Perenne. Nativa.
Distribución: ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-2000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Microsorum

***Microsorum scolopendria* (Burm.f.) Copel.**

Sinónimos: *Polypodium scolopendria* Burm.f.,
Polypodium phymatodes L., *Polypodium fuentesii* Hicken, *Phymatodes scolopendria* (Burm.f.) Ching, *Phymatosorus scolopendria* (Burm.f.) Pic.-Ser.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: IPA.
Rango altitudinal: 140-300 m.

Pleopeltis

***Pleopeltis macrocarpa* (Bory ex Willd.) Kaulf.**
Sinónimos: *Polypodium macrocarpum* Bory ex Willd., *Polypodium lanceolatum* L., *Grammitis robusta* Phil., *Polypodium lanceolatum* L. var. *araucanum* (Phil.) Looser, *Phlebodium lanceolatum* (L.) J. Sm., *Drynaria lanceolata* (L.) Féée, *Drynaria macrocarpa* (Bory ex Willd.) Féée, *Lepicystis lanceolata* (L.) Diels, *Grammitis araucana* Phil., *Drynaria elongata* auct. non Féée
Hierba epífita o terrestre. Perenne. Nativa.
Distribución: ANT, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE.
Rango altitudinal: 0-2000 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

***Pleopeltis x cerro-altoensis* Danton & Boudrie**
Hierba epífita. Perenne. Endémica.
Distribución: JFE.
Rango altitudinal: 300 m.

Polypodium

***Polypodium masafuerae* Phil.**
Sinónimos: *Pleopeltis masafuerae* (Phil.) de la Sota, *Polypodium macrocarpum* auct. non Presl
Hierba terrestre o saxícola. Perenne. Endémica.
Distribución: JFE.
Rango altitudinal: 0-600 m.

***Polypodium pycnocarpum* C. Chr.**

Sinónimos: *Polypodium squatum* Phil., *Polypodium atacamense* Baker ex Ball, *Polypodium mollendense* Maxon
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ANT.
Rango altitudinal: 20-700 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Synammia

***Synammia espinosae* (Weath.) G. Kunkel**
Sinónimos: *Polypodium espinosae* Weath.
Hierba epífita o terrestre. Perenne. Endémica.
Distribución: ANT, ATA.
Rango altitudinal: 200-1000 m.

***Synammia feuillei* (Bertero) Copel.**

Sinónimos: *Grammitis triloba* (Cav.) Desv., *Polypodium glaucescens* Bory, *Synammia triloba* (Cav.) C. Presl, *Synammia skottsbergii* G. Kunkel, *Polypodium synammia* (Fée ex J. Remy) C. Chr., *Polypodium feuillei* Bertero, *Polypodium feuillei* Bertero fma. *trilobum* (Cav.) Looser, *Polypodium feuillei* Bertero fma. *simplex* Looser, *Polypodium feuillei* Bertero fma. *basiscopicum* Looser, *Polypodium feuillei* Bertero var. *feuillei* fma. *unilaterale* G. Kunkel, *Polypodium feuillei* Bertero var. *feuillei*, *Polypodium feuillei* Bertero var. *minor* G. Kunkel, *Synammia feuillei* (Bertero) Copel. var. *feuillei*, *Synammia feuillei* (Bertero) Copel. var. *feuillei* fma. *simplex* (Looser) G. Kunkel, *Synammia feuillei* (Bertero) Copel. var. *feuillei* fma. *basiscopica* (Looser) G. Kunkel, *Synammia feuillei* (Bertero) Copel. var. *feuillei* fma. *unilaterale* (G. Kunkel) G. Kunkel, *Synammia feuillei* (Bertero) Copel. var. *feuillei* fma. *hastifolia* (G. Kunkel) G. Kunkel, *Synammia feuillei* (Bertero) Copel. var. *minor* (G. Kunkel) G. Kunkel, *Mecosorus trilobus* (Cav.) Klotzsch, *Goniophlebium synammia* Fée ex J. Remy, *Goniophlebium trilobum* (Cav.) T. Moore, *Polypodium trilobum* auct. non Houtt., *Goniophlebium californicum* auct. non Féée, *Polypodium feuillei* Bertero var. *ibañezii* Looser, *Synamia feuillei* (Bertero) Copel. var. *ibañezii* (Looser) G. Kunkel, nom. illeg.
Hierba epífita o saxícola. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ, VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-1200 m.
Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Calahuala, hierba del lagarto, pillavilcún.

Synammia intermedia* (Colla) G. Kunkel subsp. *intermedia

Sinónimos: *Polypodium transluscens* Kunze, *Polypodium intermedium* Colla, *Polypodium intermedium* Colla var. *basicompositum* C. Chr. & Skottsb., *Polypodium intermedium* Colla var. *fernandezianum* Espinosa, *Synammia intermedia* (Colla) G. Kunkel subsp. *masatierrae* (C. Chr. & Skottsb.) G. Kunkel, *Goniophlebium translucens* (Kunze) Fée. Hierba epífita. Perenne. Endémica. Distribución: JFE. Rango altitudinal: 0-500 m.

***Synammia intermedia* (Colla) G. Kunkel subsp. *masafuerana* (C. Chr. & Skottsb.) G. Kunkel**

Sinónimos: *Polypodium intermedium* Colla subsp.

masafueranum C. Chr. & Skottsb.

Hierba epífita. Perenne. Endémica.

Distribución: JFE.

Rango altitudinal: 200 m.

PSILOTACEAE

Psilotum

***Psilotum nudum* (L.) P. Beauv.**

Hierba. Perenne. Nativa.

Nota: La expedición Franco-Belga de 1934 (Tardieu-Blot 1936), reporta la presencia de esta especie para Rapa Nui (Isla de Pascua). Sin embargo, esta especie nunca más ha sido encontrada.

PTERIDACEAE

Adiantum

***Adiantum capillus-veneris* L.**

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: TAR, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU.

Adiantum chilense* Kaulf. var. *chilense

Sinónimos: *Adiantum aethiopicum* L. var. *glabrum* Kuntze, *Adiantum mochaenum* G. Kunkel

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: TAR, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.

Rango altitudinal: 0-1700 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Doradilla, helecho de palo negro, palito negro, culantrillo.

***Adiantum chilense* Kaulf. var. *hirsutum* Hook. & Grev.**

Sinónimos: *Adiantum pubescens* C. Presl, *Adiantum glanduliferum* Link, *Adiantum pilosum* Fée, *Adiantum aethiopicum* L. var. *hirsutum* (Hook. & Grev.) Kuntze, *Adiantum poiretii* Wikstr. fma. *hirsutum* (Hook. & Grev.) Hicken, *Adiantum weatherbyanum* Espinosa, *Adiantum poiretii* Wikstr. var. *hirsutum* (Hook. & Grev.) R.M. Tryon, *Adiantum thalictroides* Willd. ex Schltld. var. *hirsutum* (Hook. & Grev.) De la Sota

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO.

Rango altitudinal: 1700-3400 m.

Países limítrofes: Argentina y Perú.

***Adiantum chilense* Kaulf. var. *scabrum* (Kaulf.)**

Hicken

Sinónimos: *Adiantum scabrum* Kaulf. var. *scabrum*, *Adiantum aethiopicum* L. var. *scabrum* (Kaulf.) Kuntze, *Adiantum philippianum* Espinosa, *Adiantum scabrum* Kaulf. var. *philippianum* (Espinosa) Looser, *Adiantum glanduliferum* auct. non Link

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.

Rango altitudinal: 0-2000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Adiantum excisum* Kunze**

Sinónimos: *Adiantum tenerum* auct. non Sw.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.

Rango altitudinal: 0-1700 m.

***Adiantum gertrudis* Espinosa**

Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ, VAL, RME.
Rango altitudinal: 0-1500 m.

***Adiantum pearcei* Phil.**

Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ, VAL, RME.
Rango altitudinal: 0-900 m.

***Adiantum sulphureum* Kaulf. var. *majus* Hook.**
Sinónimos: *Adiantum sulphureum* Kaulf. var. *cuneifolium* Meigen, *Adiantum sulphureum* auct. non Kaulf.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 500-1000 m.

Adiantum sulphureum* Kaulf. var. *sulphureum
Sinónimos: *Adiantum sulphureum* Kaulf. var. *minus* Hook., *Adiantum subsulphureum* J. Remy, *Adiantum aethiopicum* L. var. *sulphureum* (Kaulf.) Kuntze, *Adiantum sulphureum* Kaulf. var. *subsulphureum* (J. Remy) Looser, *Adiantum poiretii* Wikstr. var. *sulphureum* (Kaulf.) R.M. Tryon, *Adiantum chilense* Kaulf. var. *sulphureum* (Hook.) Giúdice
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.
Rango altitudinal: 0-1700 m.
Países limítrofes: Argentina.

Argyrochosma

***Argyrochosma chilensis* (J. Remy) Windham**
Sinónimos: *Pellaea chilensis* (J. Remy) C. Chr., *Notholaena chilensis* (J. Remy) J.W. Sturm, *Cincinalis chilensis* J. Remy, *Pellaea chilensis* Féée, nom. nud.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: JFE.
Rango altitudinal: 0-500 m.

***Argyrochosma nivea* (Poir.) Windham**
Sinónimos: *Notholaena nivea* (Poir.) Desv., *Pellaea nivea* (Poir.) Prantl, *Pteris nivea* Poir., *Acrostichum albidulum* Sw., *Cincinalis nivea* (Poir.) Desv., *Gymnogramma nivea* (Poir.) Mett., *Cincinalis tarapacana* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT.
Rango altitudinal: 200-4000 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.
Nombre vulgar: Chujchu, qusupe.

Astrolepis

***Astrolepis sinuata* (Lag. ex Sw.) D.M. Benham & Windham**
Sinónimos: *Cheilanthes sinuata* (Lag. ex Sw.) Domin, *Notholaena sinuata* (Lag. ex Sw.) Kaulf., *Acrostichum sinuatum* Lag. ex Sw., *Gymnogramma sinuata* (Lag. ex Sw.) C. Presl
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: TAR.
Rango altitudinal: 500-3000 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Cheilanthes

***Cheilanthes arequipensis* (Maxon) R.M. Tryon & A. F. Tryon**
Sinónimos: *Notholaena arequipensis* Maxon
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR.
Rango altitudinal: 2300-4000 m.
Países limítrofes: Argentina y Perú.

***Cheilanthes glauca* (Cav.) Mett.**

Sinónimos: *Cheilanthes chilensis* Féée, *Allosorus hirsutus* C. Presl, *Acrostichum glaucum* Cav., *Pteris glauca* (Cav.) Cav., *Pteris microphylla* Colla, *Pellaea hirsuta* (C. Presl) Hook., *Pellaea glauca* (Cav.) J. Sm.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS.
Rango altitudinal: 0-1700 m.
Países limítrofes: Argentina.

***Cheilanthes hypoleuca* (Kunze) Mett.**

Sinónimos: *Notholaena tomentosa* (Desv.) Desv., *Cincinalis tomentosa* Desv., *Notholaena hypoleuca* Kunze
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 0-1500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Doradilla.

***Cheilanthes mollis* (Kunze) C. Presl**

Sinónimos: *Cheilanthes doradilla* (Colla) Domin, *Notholaena mollis* Kunze, *Notholaena doradilla* Colla
Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, LLA.

Rango altitudinal: 0-1300 m.

Países limítrofes: Perú.

Nombre vulgar: Doradilla.

***Cheilanthes myriophylla* Desv.**

Sinónimos: *Cheilanthes elegans* Desv., *Cheilanthes myriophylla* Desv. var. *elegans* (Desv.) Hicken, *Notholaena myriophylla* J. Sm.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP.

Rango altitudinal: 200-4000 m.

Países limítrofes: Argentina y Perú.

***Cheilanthes pilosa* Goldm.**

Sinónimos: *Cheilanthes macleanii* Hook., *Cheilanthes andina* Hook.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: TAR.

Rango altitudinal: 800-4000 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Cheilanthes pruinata* Kaulf.**

Sinónimos: *Cheilanthes mathewsii* Kunze, *Cheilanthes fasciculata* Goldm., *Cheilanthes micropteris* auct. non Sw.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT.

Rango altitudinal: 2000-4800 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Chujchu, qusupe.

Cryptogramma

***Cryptogramma fumariifolia* (Phil. ex Baker) H. Christ**

Sinónimos: *Cryptogramma crispa* (L.) R. Br. var. *chilensis* (C. Chr.) Looser, *Allosorus crispus* Bernh. var.

chilensis C. Chr., *Pellaea fumariaefolia* Phil. ex Baker, *Allosorus fumariaefolius* (Phil. ex Baker) Kuntze, *Pellaea fumariifolia* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO.

Rango altitudinal: 900-1400 m.

Países limítrofes: Argentina.

Myriopteris

***Myriopteris aurea* (Poir.) Grusz & Windham**

Sinónimos: *Notholaena rufa* C. Presl, *Notholaena bonariensis* (Willd.) C. Chr., *Notholaena aurea* (Poir.) Desv., *Acrostichum bonariense* Willd., *Pteris aurea* Poir., *Cheilanthes bonariensis* (Willd.) Proctor

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ANT.

Rango altitudinal: 600-4000 m.

Países limítrofes: Argentina y Perú.

Notholaena

***Notholaena sulphurea* (Cav.) J. Sm.**

Sinónimos: *Notholaena lepida* (Phil.) Looser, *Pteris sulphurea* Cav., *Chrysochosma sulphurea* (Cav.) Kümmerle, *Cheilanthes lepida* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ATA.

Rango altitudinal: 200-2500 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Pellaea

***Pellaea myrtillifolia* Mett. ex Kuhn**

Sinónimos: *Allosorus andromedaefolius* auct. non (Kaulf.) Kunze, *Pellaea andromedaefolia* auct. non (Kaulf.) Fée

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO.

Rango altitudinal: 100-2000 m.

Nombre vulgar: Coca, hierba coca, lendo del cerro.

***Pellaea ternifolia* (Cav.) Link**

Sinónimos: *Allosorus ternifolius* Kunze ex Klotzsch, *Pteris ternifolia* Cav., *Cheilanthes ternifolia* (Cav.) T. Moore, *Pteris tryphylla* Bertero ex Colla, nom. nud.

Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT, VAL, LBO, BIO, ARA, LRI.
Rango altitudinal: 200-4500 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.
Nombre vulgar: Qusupi, qusupe, yuquelahuén.

Pteris

Pteris berteroana J. Agardh

Sinónimos: *Litobrochia berteroana* (J. Agardh) Fée, *Pteris comans* G. Forst. var. *berteroana*, *Pteris tenera* auct. non Kaulf., *Litobrochia decurrens* auct. non C. Presl, *Pteris comans* auct. non G. Forst., *Pteris incisa* auct. non Thunb.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: JFE.
Rango altitudinal: 0-500 m.

Pteris chilensis Desv.

Sinónimos: *Pteris tenera* Kaulf., *Pteris fernandeziana* Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, JFE.
Rango altitudinal: 0-1400 m.

Pteris semiadnata Phil.

Sinónimos: *Pteris marattiaeefolia* Hook., *Pteris flexuosa* auct. non Kaulf.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.
Rango altitudinal: 600-800 m.
Países limítrofes: Argentina.

Trismeria

Trismeria trifoliata (L.) Diels

Sinónimos: *Pityrogramma trifoliata* (L.) R.M. Tryon, *Acrostichum trifoliatum* L.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR.
Rango altitudinal: 20-200 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Vittaria

Vittaria ensiformis Sw.

Sinónimos: *Vittaria incurvata* Cav., *Vittaria elongata* auct., non Sw., *Vittaria costata* auct. non Kunze
Hierba saxícola. Perenne. Nativa.
Distribución: IPA.
Rango altitudinal: 300-420 m.

SALVINIACEAE

Azolla

Azolla filiculoides Lam.

Sinónimos: *Azolla magellanica* Willd., *Azolla squamosa* Molina, *Azolla arbuscula* Desv.
Hierba acuática. Anual. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.
Rango altitudinal: 5-3800 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.
Nombre vulgar: Flor del pato, tembladerilla, luchecillo, jupajupa.

Salvinia

Salvinia auriculata Aubl.

Hierba acuática. Perenne. Introducida.
Distribución: VAL.

SCHIZAEACEAE

Schizaea

Schizaea fistulosa Labill.

Sinónimos: *Schizaea australis* Gaudich., *Schizaea palmata* Hombr. & Jacq., *Schizaea chilensis* Phil., *Schizaea fistulosa* Labill. var. *australis* (Gaudich.) Hook.f., *Microschizaea fistulosa* (Labill.) C.F. Reed, *Schizaea valdiviana* Phil. ex Hook. & Baker
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: LRI, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-1100 m.
Países limítrofes: Argentina.

SELAGINELLACEAE

Selaginella

***Selaginella apoda* (L.) Spring**

Hierba. Anual o perenne. Introducida.

Distribución: BIO, LRI.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP.

Rango altitudinal: 3200-4800 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

THELYPTERIDACEAE

Thelypteris

***Thelypteris argentina* (Hieron.) Abbiatti**

Sinónimos: *Aspidium argentinum* Hieron., *Dryopteris argentina* (Hieron.) C. Chr., *Lastrea argentina* (Hieron.)

Copel., *Aspidium rivulorum* auct. non Link

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, BIO.

Rango altitudinal: 0-3300 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Nombre vulgar: Regalis.

***Thelypteris dentata* (Forssk.) E.P. St. John**

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: IPA.

***Thelypteris interrupta* (Willd.) K. Iwats.**

Sinónimos: *Aspidium gongyloides* Schkuhr, *Dryopteris gongyloides* (Schkuhr) Kuntze, *Polypodium tottum* Thunb., *Pteris interrupta* Willd., *Thelypteris totta* (Thunb.) Schelpe

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: IPA.

Rango altitudinal: 0-900 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

WOODSIACEAE

Woodsia

***Woodsia montevidensis* (Sprengel) Hieron.**

Sinónimos: *Dicksonia montevidensis* Sprengel, *Woodsia crenata* (Kunze) Hieron.

PINOPHYTA

ARAUCARIACEAE

Araucaria

Araucaria araucana (Molina) K. Koch

Sinónimos: *Araucaria imbricata* Pav., *Columbea quadrifarria* Salisb., *Pinus araucana* Molina, *Dombeya chilensis* Lam., *Araucaria chilensis* Mirb., *Araucaria dombeyi* Rich.

Árbol. Nativo.

Distribución: BIO, ARA, LRI.

Rango altitudinal: 600-1700 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Araucaria, piñonero, pehuén.

Pilgerodendron

Pilgerodendron uviferum (D. Don) Florin

Sinónimos: *Juniperus uvifera* D. Don, *Libocedrus tetragona* (Hook.) Endl., *Thuja tetragona* Hook., *Libocedrus uvifera* (D. Don) Pilg.

Árbol. Nativo.

Distribución: LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 5-1300 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Ciprés de las Guaitecas.

CUPRESSACEAE

Austrocedrus

Austrocedrus chilensis (D. Don) Pic.Serm. & Bizzarri

Sinónimos: *Austrocedrus chilensis* (D. Don) Florin & Boutelje, comb. illeg., *Libocedrus chilensis* (D. Don) Endl., *Thuja andina* Poepp., *Thuja chilensis* D. Don

Árbol. Nativo.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 250-1800 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Ciprés de la cordillera, ciprés, len.

Fitzroya

Fitzroya cupressoides (Molina) I.M. Johnst.

Sinónimos: *Fitzroya patagonica* Hook.f. ex Lindl., *Libocedrus cupressoides* (Molina) Kuntze, *Pinus cupressoides* Molina

Árbol. Nativo.

Distribución: LRI, LLA.

Rango altitudinal: 100-1400 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Alerce, lahuén, lahual.

EPHEDRACEAE

Ephedra

Ephedra americana Humb. & Bonpl. ex Willd.

Sinónimos: *Ephedra breana* Phil., *Ephedra wraithiana* I.M. Johnst., *Ephedra americana* Humb. & Bonpl. ex Willd. var. *humboldtii* Stapf

Arbusto. Nativo.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 500-4300 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Pingo-pingo.

Ephedra chilensis C. Presl

Sinónimos: *Ephedra rupestris* Benth., *Ephedra frustillata* Miers, *Ephedra americana* Humb. & Bonpl. ex Willd. var. *andina* (Poepp. ex C.A. Mey.) Stapf, *Ephedra andina* Poepp. ex C.A. Mey., *Ephedra andina* Poepp. ex C.A. Mey. fma. *abbreviata* Stapf ex Skottsb., *Ephedra araucana* Phil., *Ephedra bracteata* Miers, *Ephedra dumosa* Miers, *Ephedra monticola* Miers, *Ephedra nana* Dusén, *Ephedra patagonica* Phil. ex Stapf, *Ephedra americana* Humb. & Bonpl. ex Willd. var. *rupestris* (Benth.) Ball, *Ephedra humilis* Wedd., *Ephedra andina* Poepp. ex C.A. Mey. var. *humilis* Parlat.

Arbusto. Nativo.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 100-3000 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.
Nombre vulgar: Pingo-pingo, solupe, sulupe, transmontana.

Ephedra gracilis Phil. ex Stapf
Arbusto. Endémico.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME.
Rango altitudinal: 10-1200 m.

Ephedra multiflora Phil. ex Stapf
Arbusto. Nativo.
Distribución: AYP, ANT, ATA.
Rango altitudinal: 2300-4000 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Pingo-pingo.

Ephedra ochreata Miers
Sinónimos: *Ephedra ochreata* Miers var. *striata* Gillies ex Miers
Arbusto. Nativo.
Distribución: AIS.
Rango altitudinal: 389-389 m.
Países limítrofes: Argentina.

Ephedra trifurcata Zoellner
Arbusto. Endémico.
Distribución: VAL.
Rango altitudinal: 200-300 m.

PINACEAE

Pinus

Pinus contorta Douglas ex Loudon
Árbol. Introducido.
Distribución: ARA, AIS.

Pinus pinaster Aiton
Árbol. Introducido.
Distribución: NUB, BIO.
Nombre vulgar: Pino marítimo.

Pinus radiata D. Don
Árbol. Introducido.

Distribución: VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE.
Nombre vulgar: Pino insigne.

PODOCARPACEAE

Lepidothamnus

Lepidothamnus fonkii Phil.
Sinónimos: *Dacrydium fonckii* (Phil.) Ball
Arbusto. Nativo.
Distribución: LRI, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 3-1300 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Ciprés enano.

Podocarpus

Podocarpus nubigena Lindl.
Árbol. Nativo.
Distribución: ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 10-600 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Mañío, mañío de hojas punzantes, pino amarillo.

Podocarpus saligna D. Don
Sinónimos: *Podocarpus chilinus* Rich.
Árbol. Endémico.
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.
Rango altitudinal: 10-900 m.
Nombre vulgar: Mañío de hojas largas, mañío.

Prumnopitys

Prumnopitys andina (Poepp. ex Endl.) de Laub.
Sinónimos: *Prumnopitys spicata* (Poepp. ex Endl.)
Molloy & Muñoz-Schick, comb. illeg., *Podocarpus andina* Poepp. ex Endl., *Prumnopitys elegans* Phil.,
Podocarpus spicatus Poepp., *Podocarpus valdiviana* J. Nelson, *Stachycarpus andina* (Poepp. ex Endl.) Tiegh.,
Nageia andina (Poepp. ex Endl.) F. Muell.
Árbol. Nativo.
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 500-1300 m.
Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Lleque, uva de la cordillera.

Saxegothaea

Saxegothaea conspicua Lindl.

Sinónimos: *Squamataxus albertiana* J. Nelson

Árbol. Nativo.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 100-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Mañío hembra, mañío.

MAGNOLIOPHYTA

LILIOPSIDA

ALISMATACEAE

Alisma

Alisma lanceolatum With.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.

Alisma plantago-aquatica L.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Sagittaria

Sagittaria montevidensis Cham. & Schltdl. subsp. *chilensis* (Cham. & Schltdl.) Bogin

Sinónimos: *Sagittaria chilensis* Cham. & Schltdl., *Sagittaria andina* Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: VAL, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 0-1500 m.

Nombre vulgar: Lengua de vaca.

Sagittaria montevidensis Cham. & Schltdl. subsp. *montevidensis*

Hierba acuática. Perenne. Nativa.

Distribución: BIO, LRI.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Sagittaria rhombifolia Cham.

Hierba acuática. Perenne. Nativa.

Distribución: LRI.

Rango altitudinal: 130-220 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

ALSTROEMERIACEAE

Alstroemeria

Alstroemeria achirae Muñoz-Schick & Brinck

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: MAU.

Rango altitudinal: 1500-1900 m.

Alstroemeria andina Phil. var. *andina*

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ATA, COQ.

Rango altitudinal: 2900-3700 m.

Alstroemeria andina Phil. var. *venustula* (Phil.)

Muñoz-Schick

Sinónimos: *Alstroemeria venustula* Phil., *Alstroemeria andina* Phil. subsp. *venustula* (Phil.) Ehr. Bayer

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ATA, COQ.

Rango altitudinal: 2300-3700 m.

Países limítrofes: Argentina.

Alstroemeria angustifolia Herb. var. *angustifolia*

Sinónimos: *Alstroemeria angustifolia* Herb. var. *conferta* Herb., *Alstroemeria angustifolia* Herb. var. *intermedia* Herb., *Alstroemeria angustifolia* Herb. var. *solliana* Herb., *Alstroemeria angustifolia* Herb. var. *acuminata* Herb.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO.

Rango altitudinal: 0-1700 m.

Alstroemeria angustifolia Herb. var. *velutina* (Ehr. Bayer) Muñoz-Schick

Sinónimos: *Alstroemeria angustifolia* Herb. subsp. *velutina* Ehr. Bayer

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, RME.

Rango altitudinal: 500-2000 m.

Alstroemeria aurea Graham

Sinónimos: *Alstroemeria aurantiaca* D. Don,
Alstroemeria mutabilis Kunze, *Alstroemeria chiloensis* Phil., *Alstroemeria araucana* Phil., *Alstroemeria ligtu* auct. non L., *Alstroemeria stenopetala* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG.
Rango altitudinal: 200-1900 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Liuto amarillo.
Nota: Introducida en Magallanes según E. Domínguez.

Alstroemeria citrina Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ, VAL.
Rango altitudinal: 1500-1720 m.

Alstroemeria crispata Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ATA, COQ.
Rango altitudinal: 1100-3000 m.

Alstroemeria cummingiana Herb.

Sinónimos: *Alstroemeria hookeri* Lodd. subsp. *cummingiana* (Herb.) Ehr. Bayer
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ, VAL.
Rango altitudinal: 0-500 m.

Alstroemeria diluta Ehr. Bayer subsp. *chrysanthia*

Ehr. Bayer
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ATA, COQ, VAL.
Rango altitudinal: 0-400 m.

Alstroemeria diluta Ehr. Bayer subsp. *diluta*

Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: LBO, MAU.
Rango altitudinal: 300 m.

Alstroemeria exerens Meyen

Sinónimos: *Alstroemeria diazii* Phil., *Alstroemeria pallens* Phil., *Alstroemeria exserens* Meyen
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: RME, LBO, MAU.
Rango altitudinal: 1500-2100 m.

Alstroemeria garaventae Ehr. Bayer

Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: VAL, RME.
Rango altitudinal: 1200-2000 m.

Alstroemeria graminea Phil.

Sinónimos: *Taltalia graminea* (Phil.) Ehr. Bayer
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: ANT, ATA.
Rango altitudinal: 0-500 m.

Alstroemeria hookeri Lodd. subsp. *hookeri*

Sinónimos: *Alstroemeria rosea* Hook., *Alstroemeria hookeriana* Schult.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: VAL, MAU, NUB, BIO.
Rango altitudinal: 0-300 m.

Alstroemeria hookeri Lodd. subsp. *maculata* Ehr.

Bayer
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ.
Rango altitudinal: 0-100 m.

Alstroemeria hookeri Lodd. subsp. *recumbens*

(Herb.) Ehr. Bayer
Sinónimos: *Alstroemeria recumbens* Herb.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ, VAL.
Rango altitudinal: 0-100 m.

Alstroemeria hookeri Lodd. subsp. *sansebastiana*

C.M. Baeza & E. Ruiz
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: NUB, BIO.
Rango altitudinal: 0-100 m.

Alstroemeria kingii Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ATA.
Rango altitudinal: 0-800 m.

Alstroemeria leporina Ehr. Bayer & Grau

Sinónimos: *Alstroemeria hirtella* Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ATA, COQ.

Rango altitudinal: 900-2000 m.

Alstroemeria ligtu* L. subsp. *ligtu

Sinónimos: *Alstroemeria flava* Phil., *Alstroemeria lothiana* Utinet, *Alstroemeria chilensis* Lem., *Alstroemeria haemantha* Ruiz & Pav.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 0-800 m.

Nombre vulgar: Liuto.

***Alstroemeria ligtu* L. subsp. *simsii* (Spreng.) Ehr. Bayer**

Sinónimos: *Alstroemeria haemantha* auct. non Ruiz & Pav., *Alstroemeria simsii* Spreng., *Alstroemeria ciliata* Poepp., *Alstroemeria pulchella* auct. non L.f., *Alstroemeria pulchella* L. f. var. *pilosa* Lindl., *Alstroemeria haemantha* Ruiz & Pav. var. *pilosa* (Lindl.) Herb., *Alstroemeria haemantha* Ruiz & Pav. var. *simsiana* Herb., *Alstroemeria quillotensis* Herb., *Alstroemeria macraeana* Herb., *Alstroemeria aurea* Graham var. *valparadisiaca* Herb., *Alstroemeria aurea* Meyen, hom. illeg., *Alstroemeria dentata* Klotzsch Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, BIO.

Rango altitudinal: 0-1800 m.

***Alstroemeria ligtu* L. subsp. *splendens* Muñoz-Schick**

Sinónimos: *Alstroemeria ligtu* L. subsp. *incarnata* Ehr. Bayer, nom. illeg.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: RME, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 1100-1400 m.

***Alstroemeria lutea* Muñoz-Schick**

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: TAR.

Rango altitudinal: 300-800 m.

***Alstroemeria magnifica* Herb. var. *magenta* (Ehr. Bayer) Muñoz-Schick**

Sinónimos: *Alstroemeria magenta* Ehr. Bayer

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL.

Rango altitudinal: 0-700 m.

Alstroemeria magnifica* Herb. var. *magnifica

Sinónimos: *Alstroemeria gayana* Phil., *Alstroemeria magnifica* Herb. subsp. *gayana* (Phil.) Ehr. Bayer Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME.

Rango altitudinal: 0-600 m.

Nombre vulgar: Lirio morado.

Alstroemeria magnifica* Herb. var. *sierrae

(Muñoz) Muñoz-Schick

Sinónimos: *Alstroemeria sierrae* Muñoz

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ.

Rango altitudinal: 150-175 m.

Alstroemeria magnifica* Herb. var. *tofoensis

Muñoz-Schick

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ.

Rango altitudinal: 600-700 m.

***Alstroemeria marticorenae* Negritto & C.M. Baeza**

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: VAL.

Rango altitudinal: 270-300 m.

***Alstroemeria mollensis* Muñoz-Schick & Brinck**

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ.

Rango altitudinal: 2000-2200 m.

***Alstroemeria pallida* Graham**

Sinónimos: *Alstroemeria albiflora* C. Presl, *Alstroemeria rosea* Phil., *Alstroemeria ligtu* L. var. *andina* Phil., *Alstroemeria nivalis* Phil., hom. illeg., *Alstroemeria nubigena* Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, RME.

Rango altitudinal: 1100-2800 m.

***Alstroemeria parvula* Phil.**

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: VAL, RME.

Rango altitudinal: 2200-2600 m.

***Alstroemeria patagonica* Phil.**

Sinónimos: *Alstroemeria nana* Rendle, *Alstroemeria patagonica* Phil. fma. *biflora* Ravenna, *Alstroemeria pygmaea* auct. non Herb.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-1300 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Alstroemeria pelegrina* L.**

Sinónimos: *Alstroemeria amoena* Salisb., *Alstroemeria pelegrina* L. var. *albescens* Herb., *Alstroemeria gayana* Phil. var. *humilis* Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL.

Rango altitudinal: 0-100 m.

***Alstroemeria philippii* Baker var. *albicans* Muñoz-Schick**

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ATA.

Rango altitudinal: 300-400 m.

Alstroemeria philippii* Baker var. *philippii

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ATA, COQ.

Rango altitudinal: 5-900 m.

***Alstroemeria piperata* A.R. Flores & J.M. Watson**

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: VAL.

Rango altitudinal: 1200-1500 m.

***Alstroemeria polypylla* Phil.**

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ATA.

Rango altitudinal: 800-900 m.

***Alstroemeria presliana* Herb. subsp. *australis* Ehr. Bayer**

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 200-1500 m.

Alstroemeria presliana* Herb. subsp. *presliana

Sinónimos: *Alstroemeria chillanensis* Grau & Ehr.

Bayer, *Alstroemeria diazii* auct. non Phil., *Alstroemeria epulauquensis* Ravenna

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 1300-2300 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Alstroemeria pseudospathulata* Ehr. Bayer**

Sinónimos: *Alstroemeria crocea* Phil., *Alstroemeria lacrima-solis* Ravenna, *Alstroemeria spathulata* auct. non C. Presl, *Alstroemeria oxyphylla* Ravenna, nom. illeg.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: LBO, MAU.

Rango altitudinal: 500-1500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Alstroemeria pulchra* Sims subsp. *lavandulacea

Ehr. Bayer

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: BIO, ARA.

Rango altitudinal: 200-300 m.

***Alstroemeria pulchra* Sims subsp. *pulchra* var. *maxima* Phil.**

Sinónimos: *Alstroemeria magnifica* Herb. subsp. *maxima* (Phil.) Ehr. Bayer, *Alstroemeria spectabilis* Ravenna

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, RME.

Rango altitudinal: 0-400 m.

Alstroemeria pulchra* Sims subsp. *pulchra* var. *pulchra

Sinónimos: *Alstroemeria ligtu* L. var. *pulchra* (Sims) Baker, *Alstroemeria tricolor* Hook., *Alstroemeria flos-martinii* Ker Gawl., *Alstroemeria bicolor* Hook.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Nombre vulgar: Flor del águila, flor del traro.

***Alstroemeria revoluta* Ruiz & Pav.**

Sinónimos: *Alstroemeria herbertiana* Roem.,

Alstroemeria reflexa Roem., *Alstroemeria inconspicua* Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 0-2500 m.

Alstroemeria schizanthoides* Grau var. *alba

Muñoz-Schick

Sinónimos: *Alstroemeria modesta* Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ.

***Alstroemeria schizanthoides* Grau var.**

schizanthoides

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ATA, COQ.

Rango altitudinal: 800-1900 m.

***Alstroemeria spathulata* C. Presl**

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO.

Rango altitudinal: 2000-3500 m.

***Alstroemeria traudiae* J.M. Watson & A.R. Flores**

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ.

Rango altitudinal: 300-350 m.

***Alstroemeria umbellata* Meyen**

Sinónimos: *Alstroemeria sericantha* Schauer

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: RME, LBO.

Rango altitudinal: 2000-3000 m.

***Alstroemeria versicolor* Ruiz & Pav.**

Sinónimos: *Alstroemeria meyeniana* Schauer,

Alstroemeria tigrina Phil., *Alstroemeria sotoana* Phil.,

Alstroemeria xanthina Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 200-2000 m.

***Alstroemeria violacea* Phil.**

Sinónimos: *Alstroemeria paupercula* Phil., *Alstroemeria violacea* Knight & Perry, nom. nud.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ, VAL.

Rango altitudinal: 0-800 m.

Países limítrofes: Perú.

Nombre vulgar: Lirio del campo.

***Alstroemeria werdermannii* Ehr. Bayer var. *flavicans* Muñoz-Schick**

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-100 m.

Alstroemeria werdermannii* Ehr. Bayer var. *werdermannii

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-100 m.

***Alstroemeria zoellneri* Ehr. Bayer**

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: VAL, RME.

Rango altitudinal: 1100-1800 m.

Bomarea

***Bomarea dulcis* (Hook.) Beauverd**

Sinónimos: *Bomarea engleriana* auct. non Kraenzl., *Alstroemeria dulcis* Hook.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP.

Rango altitudinal: 2500-5200 m.

Países limítrofes: Bolivia y Perú.

***Bomarea involucrosa* (Herb.) Baker**

Sinónimos: *Collania involucrosa* Herb.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP.

Rango altitudinal: 3500-3700 m.

Países limítrofes: Bolivia y Perú.

***Bomarea salsilla* (L.) Mirb.**

Sinónimos: *Alstroemeria salsilla* L., *Alstroemeria oculata* Lodd., *Bomarea oculata* (Lodd.) M. Roem.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 0-300 m.

Países limítrofes: Bolivia.

Nombre vulgar: Salsilla, zalcilla.

Leontochir

Leontochir ovallei Phil. var. ***luteus*** Muñoz-Schick
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ATA.

Leontochir ovallei Phil. var. ***ovallei***
Sinónimos: *Bomarea ovallei* (Phil.) Ravenna,
Alstroemeria ovallei (Phil.) Hunz.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ATA.
Rango altitudinal: 0-100 m.
Nombre vulgar: Garra de león.

AMARYLLIDACEAE

Allium

Allium vineale L. var. ***compactum*** (Thuill.) Coss.
& Germ.
Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: ARA.

Allium vineale L. var. ***vineale***
Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: ARA.

Amaryllis

Amaryllis belladonna L.
Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, JFE.

Clinanthus

Clinanthus humilis (Herb.) Meerow
Sinónimos: *Stenomesson humile* (Herb.) Baker,
Clitanthes humilis Herb., *Stenomesson chilense* Ravenna
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: TAR.
Rango altitudinal: 3000-4200 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Famatina

Famatina andina (Phil.) Ravenna

Sinónimos: *Rhodophiala andina* Phil., *Hippeastrum andinum* (Phil.) Phil., *Bathya andina* (Phil.) Ravenna
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU.
Rango altitudinal: 880-2100 m.
Países limítrofes: Argentina.

Famatina cisandina Ravenna

Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: RME, MAU.
Rango altitudinal: 1800-2200 m.

Famatina maulensis Ravenna

Sinónimos: *Miltinea maulensis* (Ravenna) Ravenna
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: MAU.
Rango altitudinal: 1500 m.

Gethyum

Gethyum atropurpureum Phil.
Sinónimos: *Solaria atropurpurea* (Phil.) Ravenna,
Solaria major Reiche
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU.
Rango altitudinal: 300-1500 m.

Gethyum cuspidatum (Harv. ex Baker) Muñoz-Schick

Sinónimos: *Solaria cuspidata* (Harv. ex Baker) Ravenna,
Ancrumia cuspidata Harv. ex Baker
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ, VAL.
Rango altitudinal: 100-200 m.

Gilliesia

Gilliesia dimera Ravenna
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: MAU.
Rango altitudinal: 1800 m.

Gilliesia graminea Lindl.

Sinónimos: *Gilliesia curicana* Ravenna, *Gilliesia gaudichaudiana* Kunth

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 0-900 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Gilliesia isopetala* Ravenna**

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: LBO.

Rango altitudinal: 1000-1700 m.

***Gilliesia montana* Poepp. & Endl.**

Sinónimos: *Gilliesia monophylla* Reiche, *Miersia scalae*

Gunckel, *Gilliesia nahuelbutae* Ravenna

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Ipheion

***Ipheion sessile* (Phil.) Traub**

Sinónimos: *Brodiaea sessiliflora* (Baker) Baker,
Brodiaea sessilis (Phil.) F. Meigen, *Milla sessiliflora*
Baker, *Triteleia sessilis* Phil., *Tristagma sessile* (Phil.)
Traub, *Tristagma leichtlinii* (Baker) Ravenna, *Milla*
leichtlinii Baker, *Brodiaea leichtlinii* (Baker) Baker,
Tristagma leichtlinii (Baker) Traub, *Triteleia leichtlinii*
(Baker) G. Nicholson

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: RME, MAU.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Latace

Latace andina* (Poepp.) Sassone fma. *andina

Sinónimos: *Zoellnerallium andinum* (Poepp.) Crosa,
Nothoscordum andinum (Poepp.) Fuentes,
Nothoscordum bivalve auct. non (L.) Britton,
Nothoscordum brevispathum Phil., *Nothoscordum*
sellowianum Kunth var. *brevispathum* (Phil.) Fuentes,
Nothoscordum strictum Gay, *Ornithogalum andinum*
Poepp., *Nothoscordum poeppigii* Fuentes, *Latace*
volkmanni Phil., *Leucocoryne volkmanni* (Phil.) Engl.
Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL, RME, LBO, LLA.

Rango altitudinal: 1500-3500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Latace andina* (Poepp.) Sassone fma. *lutea

(Ravenna) Sassone

Sinónimos: *Nothoscordum andinum* (Poepp.) Fuentes
fma. *luteum* Ravenna

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL, RME.

Rango altitudinal: 1500-3000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Latace serenense* (Ravenna) Sassone**

Sinónimos: *Nothoscordum serenense* Ravenna

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ATA, COQ.

Rango altitudinal: 300-500 m.

Leucocoryne

***Leucocoryne alliacea* Miers ex Lindl.**

Sinónimos: *Leucocoryne angustipetala* Gay,

Leucocoryne reflexa Grau

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB,
BIO, ARA, LLA.

Rango altitudinal: 900-2200 m.

***Leucocoryne angosturae* Ravenna**

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: RME.

Rango altitudinal: 440 m.

***Leucocoryne appendiculata* Phil.**

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA.

Rango altitudinal: 400-800 m.

***Leucocoryne arrayanensis* Ravenna**

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: RME.

Rango altitudinal: 1700-2500 m.

***Leucocoryne candida* Ravenna**

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: LBO.

Rango altitudinal: 700-800 m.

Leucocoryne codehuensis Ravenna

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: LBO.

Rango altitudinal: 2500 m.

Leucocoryne conconensis Ravenna

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: VAL.

Rango altitudinal: 0-100 m.

Leucocoryne conferta Zoellner

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, LBO.

Rango altitudinal: 200-1200 m.

Leucocoryne connivens Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: MAU.

Leucocoryne conostyla Ravenna

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ.

Rango altitudinal: 800-1200 m.

Leucocoryne coquimbensis F. Phil. var. *alba*

Zoellner

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ.

Rango altitudinal: 15-450 m.

Leucocoryne coquimbensis F. Phil. var.

coquimbensis

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL.

Rango altitudinal: 5-1100 m.

Leucocoryne coronata Ravenna

Sinónimos: *Leucocoryne narcissoides* Phil., *Pabellonia incrassata* (Phil.) Quezada & Martic., *Stemmatium narcissoides* Phil., *Leucocoryne incrassata* Phil., *Chrysocoryne incrassata* (Phil.) Zoellner

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ANT, ATA.

Rango altitudinal: 350 m.

Leucocoryne curacavina Ravenna

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: RME.

Rango altitudinal: 200 m.

Leucocoryne dimorphopetala (Gay) Ravenna

Sinónimos: *Tristagma dimorphopetala* Gay,

Leucocoryne gayii Baker

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ATA, COQ.

Rango altitudinal: 25-1200 m.

Leucocoryne editiana Ravenna

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ.

Rango altitudinal: 2200 m.

Leucocoryne foetida Phil.

Sinónimos: *Leucocoryne odorata* Lindl.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: VAL, MAU.

Rango altitudinal: 50-400 m.

Leucocoryne fragrantissima Ravenna

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: RME.

Rango altitudinal: 1500 m.

Leucocoryne fuscostriata Ravenna

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ.

Rango altitudinal: 1100-1500 m.

Leucocoryne gilliesioides (Phil.) Ravenna

Sinónimos: *Erinna gilliesioides* Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: RME.

Rango altitudinal: 1400-1600 m.

Leucocoryne inclinata Ravenna

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ.

Rango altitudinal: 800-1000 m.

Leucocoryne ixiooides (Hook.) Lindl.

Sinónimos: *Leucocoryne pauciflora* Phil., *Brodiaea ixoides* Hook.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 800-1100 m.

***Leucocoryne leucogyna* Ravenna**

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: VAL.

Rango altitudinal: 1600-1900 m.

***Leucocoryne lilacea* Ravenna**

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL.

***Leucocoryne lurida* Ravenna**

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ.

***Leucocoryne macropetala* Phil.**

Sinónimos: *Pabellonia oxypetala* (Phil.) Quezada & Martic., *Leucocoryne oxypetala* Phil., *Chrysocoryne oxypetala* (Phil.) Zoellner

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ATA, COQ.

Rango altitudinal: 800 m.

***Leucocoryne maulensis* Ravenna**

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: MAU.

***Leucocoryne modesta* Ravenna**

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: VAL.

Rango altitudinal: 1300 m.

***Leucocoryne mollensis* Ravenna**

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL.

Rango altitudinal: 0-500 m.

***Leucocoryne montana* Phil.**

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: VAL.

Rango altitudinal: 1000-1500 m.

***Leucocoryne pachystyla* Ravenna**

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: VAL.

Rango altitudinal: 500-560 m.

***Leucocoryne porphyrea* Ravenna**

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ.

Rango altitudinal: 800-1500 m.

***Leucocoryne praealta* Ravenna**

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: VAL.

Rango altitudinal: 1000-1200 m.

***Leucocoryne purpurea* Gay**

Sinónimos: *Leucocoryne ixoides* (Hook.) Lindl. var. *purpurea* (Gay) Baker

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ATA, COQ, VAL.

***Leucocoryne quilimaria* Ravenna**

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ.

Rango altitudinal: 0-100 m.

***Leucocoryne rungensis* Ravenna**

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: RME.

Rango altitudinal: 900-1100 m.

***Leucocoryne simulans* Ravenna**

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ.

Rango altitudinal: 1800-2000 m.

***Leucocoryne subulata* Ravenna**

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: RME.

Rango altitudinal: 2000 m.

***Leucocoryne taguataguensis* Ravenna**

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: LBO.

Rango altitudinal: 210 m.

Leucocoryne talinensis L. Mansur & M. Cisternas
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ.
Rango altitudinal: 200-300 m.

Leucocoryne tricornis Ravenna
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: RME.
Rango altitudinal: 2000 m.

Leucocoryne ungulifera Ravenna
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: LBO.
Rango altitudinal: 360 m.

Leucocoryne valparadisea Ravenna
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: VAL.
Rango altitudinal: 20-40 m.

Leucocoryne violaceascens Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ, VAL, RME.
Rango altitudinal: 300-980 m.

Leucocoryne vittata Ravenna
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ, VAL.
Rango altitudinal: 20 m.

Leucojum

Leucojum vernum L.
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: JFE.

Miersia

Miersia chilensis Lindl.
Sinónimos: *Miersia major* Kunth, *Miersia rusbyi* Britton, *Miersia chilensis* Lindl. var. *bicolor* Muñoz-Schick
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, ARA.
Rango altitudinal: 0-200 m.

Miersia cornuta Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ, VAL.
Rango altitudinal: 700-900 m.

Miersia leporina Ravenna
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ, VAL, RME.
Rango altitudinal: 800 m.

Miersia minor Kunth
Sinónimos: *Miersia myodes* Bertero
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: RME, LBO, NUB, BIO, ARA.

Miersia tenuiseta Ravenna
Sinónimos: *Miersia tenuiseta* Ravenna fma. *castanea* Ravenna
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: VAL, RME.
Rango altitudinal: 0-1000 m.

Myostemma

Myostemma advena (Ker Gawl.) Ravenna
Sinónimos: *Amaryllis advena* Ker Gawl., *Hippeastrum hesperidius* Herb. var. *pallidum* Herb., *Hippeastrum pallidum* (Herb.) Pax, *Hippeastrum advenum* (Ker Gawl.) Herb., *Habranthus pallidus* Lodd., *Habenaria miniatus* D. Don ex Sweet, *Habranthus hesperius* Herb., *Amaryllis valparadisiaca* Steud., *Chlidanthus cumingii* C. Presl, *Rhodophiala advena* (Ker Gawl.) Traub
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ, VAL, RME, NUB.
Rango altitudinal: 1400 m.
Nombre vulgar: Añaña.

Myostemma ananuca (Phil.) J.M. Watson & A.R. Flores
Sinónimos: *Hippeastrum ananuca* Phil., *Amaryllis ananuca* (Phil.) Traub & Moldenke, *Rhodophiala ananuca* (Phil.) Traub
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ANT, ATA, COQ.
Rango altitudinal: 0-500 m.
Nombre vulgar: Añaña.

***Myostemma araucana* (Phil.) Ravenna**

Sinónimos: *Amaryllis araucana* (Phil.) Traub & Uphof, *Hippeastrum araucanum* Phil., *Rhodophiala araucana* (Phil.) Traub

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 900-1500 m.

Nombre vulgar: Añañuca.

***Myostemma bagnoldii* (Herb.) J.M. Watson & A.R.**

Flores

Sinónimos: *Habranthus bagnoldii* Herb., *Hippeastrum bagnoldii* (Herb.) Baker, *Hippeastrum bagnoldii* (Herb.) Baker var. *minor* Speg., *Amaryllis bagnoldi* (Herb.) D. Dietr., *Rhodophiala bagnoldii* (Herb.) Traub

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-600 m.

Nombre vulgar: Añañuca.

***Myostemma berteroana* (Phil.) Ravenna**

Sinónimos: *Hippeastrum berteroanum* (Phil.) Baker, *Amaryllis berteroana* (Phil.) Traub & Moldenke, *Habranthus berteroanus* Phil., *Rhodophiala berteroana* (Phil.) Traub

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: LBO.

Nombre vulgar: Añañuca.

***Myostemma maculata* (L'Hér.) Ravenna**

Sinónimos: *Amaryllis maculata* L'Hér., *Rhodophiala maculata* (L'Hér.) Ravenna

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ARA.

Rango altitudinal: 0-300 m.

Nombre vulgar: Añañuca.

***Myostemma monantha* Ravenna**

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: LBO, MAU.

***Myostemma montana* (Phil.) Ravenna**

Sinónimos: *Hippeastrum montanum* (Phil.) Baker, *Amaryllis montana* (Phil.) Traub & Uphof, *Habranthus montanus* Phil., *Rhodophiala montana* (Phil.) Traub

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: MAU, ARA.

Rango altitudinal: 1750-2000 m.

Nombre vulgar: Añañuca.

***Myostemma phycelloides* (Herb.) Ravenna**

Sinónimos: *Amaryllis phycelloides* (Herb.) Steud., *Habranthus phycelloides* Herb., *Hippeastrum phycelloides* (Herb.) Baker, *Phycella phycelloides* (Herb.) Traub, *Rhodophiala phycelloides* (Herb.) Hunz.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ATA, COQ, RME, MAU.

Rango altitudinal: 0-2200 m.

Nombre vulgar: Añañuca.

***Myostemma tiltilensis* (Traub & Moldenke)**

Ravenna

Sinónimos: *Hippeastrum laetum* Phil., *Amaryllis tiltilensis* Traub & Moldenke, *Amaryllis laeta* (Phil.) Traub & Uphof, *Rhodophiala tiltilensis* (Traub & Moldenke) Traub

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: VAL, RME.

Rango altitudinal: 250-1200 m.

Nombre vulgar: Añañuca.

Nothoscordum

***Nothoscordum flavescens* Kunth**

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: VAL.

***Nothoscordum gracile* (Dryand. ex Aiton) Stearn**

Sinónimos: *Allium gracile* Aiton, *Maligia gracilis* (Aiton) Raf.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, BIO, LLA.

Rango altitudinal: 10-2050 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

***Nothoscordum gramineum* (Sims) Beauverd**

Sinónimos: *Nothoscordum striatellum* (Lindl.) Kunth, *Ornithogalum gramineum* Sims, *Allium striatellum* Lindl.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL, RME, LBO, NUB, BIO, ARA, LRI.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nothoscordum mahui Traub

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: RME.

Rango altitudinal: 300-400 m.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, RME.

Rango altitudinal: 2000 m.

Nothoscordum nidulans Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: RME.

Placea

Placea amoena Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, RME.

Rango altitudinal: 800-2000 m.

Nothoscordum nublense Ravenna

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.

Rango altitudinal: 20-90 m.

Placea arzae Phil.

Sinónimos: *Placea germainii* Phil. subsp. *arzae* (Phil.)

Ravenna

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: VAL, RME, LBO.

Rango altitudinal: 300-2000 m.

Nombre vulgar: Macaya.

Phycella

Phycella angustifolia Phil.

Sinónimos: *Hippeastrum angustifolium* (Phil.) Phil., comb. illeg., *Amaryllis philippiana* Traub & Uphof

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: VAL, RME.

Rango altitudinal: 350-1700 m.

Placea davidi Ravenna

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: RME.

Rango altitudinal: 890-1500 m.

Phycella australis Ravenna

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Nombre vulgar: Amancay.

Placea lutea Phil.

Sinónimos: *Placea germainii* Phil. subsp. *lutea* (Phil.)

Ravenna

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: VAL.

Rango altitudinal: 330-1360 m.

Phycella cyrtanthoides (Sims) Lindl.

Sinónimos: *Hippeastrum igneum* (Lindl.) Muñoz, *Phycella magnifica* Herb., *Amaryllis ignea* Lindl., *Amaryllis cyrtanthoides* Sims, *Amaryllis demissa* Steud.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 1000-1500 m.

Placea ornata Miers ex Lindl.

Sinónimos: *Placea germainii* Phil., *Placea grandiflora* Lem.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: VAL, RME.

Rango altitudinal: 900-1700 m.

Nombre vulgar: Lagañosa.

Phycella gayana (Kuntze) Traub

Sinónimos: *Hippeastrum gayanum* Kuntze, *Amaryllis gayana* (Kuntze) Traub & Uphof

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: RME.

Pyrolirion

Pyrolirion tubiflorum (L'Hér.) M. Roem.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: TAR.

Phycella scarlatina Ravenna

Rhodolirium andicola (Poepp.) Ravenna

Sinónimos: *Amaryllis andicola* Poepp., *Amaryllis purpurata* (Phil.) Traub & Uphof, *Habranthus andicola* (Poepp.) Herb., *Hippeastrum andicola* (Poepp.) Baker, *Hippeastrum purpuratum* Phil., *Rhodophiala purpurata* (Phil.) Traub, *Zephyranthes andicola* (Poepp.) Baker, *Rhodophiala andicola* (Poepp.) Traub

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.

Rango altitudinal: 1200-1800 m.

Países limítrofes: Argentina.

Países limítrofes: Argentina.

Rhodophiala

Rhodophiala bakeri (Phil.) Traub

Sinónimos: *Amaryllis backeri* (Phil.) Traub & Moldenke, *Habranthus bakeri* Phil., *Hippeastrum bakeri* (Phil.) Traub & Uphof, *Amaryllis bakeri* (Phil.) Traub & Uphof

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: MAU, ARA.

Rango altitudinal: 190-2200 m.

Rhodophiala flava (Phil.) Traub

Sinónimos: *Hippeastrum solisii* Phil., *Amaryllis solisii* (Phil.) Traub & Uphof, *Habranthus flavus* Phil., *Amaryllis flava* (Phil.) Traub & Uphof

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: MAU, NUB.

Rango altitudinal: 2000 m.

Rhodophiala lineata (Phil.) Traub

Sinónimos: *Hippeastrum lineatum* (Phil.) Baker, *Amaryllis lineata* (Phil.) Traub & Uphof, hom. illeg., *Habranthus lineatus* Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: RME.

Rhodophiala moelleri (Phil.) Traub

Sinónimos: *Hippeastrum moelleri* Phil., *Amaryllis moelleri* (Phil.) Traub & Moldenke, *Myostemma caudinensis* Ravenna

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ARA.

Rango altitudinal: 900-1000 m.

Rhodophiala pratensis (Poepp.) Traub

Sinónimos: *Amaryllis pratensis* Poepp., *Hippeastrum pratense* (Poepp.) Baker, *Rhodophiala speciosa* (Herb.) Baker, *Amaryllis atacamensis* Traub & Uphof, *Habranthus speciosus* Herb., *Habranthus pratensis* (Poepp.) Herb., *Rhodophiala volckmannii* Phil., *Placea pratensis* F. Phil., nom. nud., *Rhodolirium speciosum* (Herb.) Ravenna, *Myostemma pratensis* (Poepp.) Ravenna

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ANT, ATA, COQ, MAU, NUB, BIO, LLA.

Rhodolirium fulgens (Hook. f.) Ravenna

Sinónimos: *Hippeastrum fulgens* (Hook. f.) Phil., *Amaryllis fulgens* (Hook. f.) Traub & Uphof, *Habranthus fulgens* Hook. f., *Rhodophiala fulgens* (Hook. f.) Traub

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: LLA.

Rhodolirium laetum (Phil.) Ravenna

Sinónimos: *Rhodophiala laeta* Phil., *Rhodophiala uniflora* Phil., *Hippeastrum uniflorum* (Phil.) Baker, *Amaryllis uniflora* (Phil.) Traub & Uphof

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ANT, ATA.

Rango altitudinal: 1000 m.

Rhodolirium montanum Phil.

Sinónimos: *Amaryllis rhodolirion* (Baker) Traub & Uphof, *Hippeastrum rhodolirion* (Phil.) Baker, *Rhodolirium andinum* Phil., *Rhodophiala rhodolirion* (Baker) Traub, *Amaryllis popetana* (Phil.) Traub & Uphof, *Hippeastrum popetanum* Phil., *Rhodophiala popetana* (Phil.) Traub

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: RME, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 2000-2700 m.

Rango altitudinal: 0-200 m.

***Rhodophiala rosea* (Sweet) Traub**

Sinónimos: *Hippeastrum roseum* (Sweet) Baker, *Amaryllis barlowii* Traub & Moldenke, *Habranthus roseus* Sweet, *Amaryllis rosea* (Sweet) Traub & Uphof, *Zephyranthes purpurea* Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 220-1800 m.

***Rhodophiala splendens* (Renjifo) Traub**

Sinónimos: *Hippeastrum splendens* (Renjifo) Renjifo ex Phil., *Amaryllis splendens* (Renjifo) Traub & Moldenke, *Habranthus splendens* Renjifo

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: MAU.

Rango altitudinal: 850-1050 m.

Solaria

***Solaria miersioides* Phil.**

Sinónimos: *Solaria brevicoalita* Ravenna

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, RME, MAU, NUB.

Rango altitudinal: 900-2300 m.

Países limítrofes: Argentina.

Speea

***Speea humilis* (Phil.) Loes. ex E.H.L. Krause**

Sinónimos: *Speea triloba* Ravenna

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: VAL, RME, LBO.

Rango altitudinal: 600-1800 m.

Traubia

***Traubia modesta* (Phil.) Ravenna**

Sinónimos: *Hippeastrum modestum* (Phil.) Baker, *Lapiédra chilensis* F. Phil., *Amaryllis modesta* (Phil.) Traub & Uphof, *Traubia chilensis* (F. Phil.) Moldenke, *Rhodophiala modesta* Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, LBO.

Rango altitudinal: 0-100 m.

Tristagma

***Tristagma ameghinoi* (Speg.) Speg.**

Sinónimos: *Brodiaeae ameghinoi* Speg.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAU, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 500-1500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Tristagma berteroii* (Kunth) S. Arroyo & Sassone**

Sinónimos: *Brodiaeae berterii* (Kunth) Fuentes

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: VAL.

Rango altitudinal: 400 m.

***Tristagma bivalve* (Hook. ex Lindl.) Traub**

Sinónimos: *Triteleia bivalvis* Hook. ex Lindley, *Milla bivalvis* (Lindl.) Baker, *Hookera bivalvis* (Hook. ex Lindl.) Kuntze, *Brodiaeae bivalvis* (Hook. ex Lindl.) Meigen, *Ipheion bivalve* (Hook. ex Lindl.) Traub, *Tristagma brevipes* (Kuntze) Traub, *Triteleia brevipes* Kuntze, *Milla brevipes* (Kuntze) Baker, *Brodiaeae brevipes* (Kuntze) Baker, *Hookera brevipes* (Kuntze) Kuntze, *Ipheion brevipes* (Kuntze) Traub

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 0-200 m.

***Tristagma circinatum* (Sandw.) Traub**

Sinónimos: *Brodiaeae circinata* Sandwith

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: LBO.

Rango altitudinal: 2000-2440 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Tristagma gracile* (Phil.) Traub**

Sinónimos: *Triteleia gracilis* Phil., *Brodiaeae philippiana* Baker, *Ipheion gracile* (Phil.) Traub

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ARA.

***Tristagma graminifolium* (Phil.) Ravenna**

Sinónimos: *Garaventia graminifolia* (Phil.) Looser, *Nothoscordum graminifolium* (Phil.) Traub, *Steinmannia graminifolia* F. Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: VAL, RME.
Rango altitudinal: 600-700 m.

Tristagma nivale Poepp. fma. ***australe*** (Neger ex Dusén) Ravenna
Sinónimos: *Tristagma australe* Neger ex Dusén
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAG.
Rango altitudinal: 0-1000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Tristagma nivale Poepp. fma. ***nivale***
Sinónimos: *Milla nivalis* (Poepp.) Baker, *Tristagma philippii* Gandoger, *Tristagma fragrans* Ravenna
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, NUB, BIO, ARA, MAG.
Rango altitudinal: 300-3200 m.
Países limítrofes: Argentina.

Tristagma patagonicum (Baker) Traub
Sinónimos: *Brodiaea patagonica* (Baker) Baker, *Milla patagonica* Baker
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AIS.
Rango altitudinal: 0-2000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Tristagma poeppigianum (Gay) Traub
Sinónimos: *Triteleia poeppigiana* Gay
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: RME.
Rango altitudinal: 2400 m.

Tristagma porrifolium (Poepp.) Traub
Sinónimos: *Triteleia porrifolia* Poeppig, *Milla porrifolia* (Poepp.) Baker, *Brodiaea porrifolia* (Poepp.) Meigen, *Hookera porrifolia* (Poepp.) Kuntze, *Ipheion porrifolium* (Poepp.) Traub
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: VAL.
Rango altitudinal: 15-30 m.

Tristagma violaceum (Kunth) Traub
Sinónimos: *Triteleia violacea* Kunth, *Brodiaea violacea* (Kunth) Baker, *Ipheion violaceum* (Kunth) Traub
Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: NUB.
Rango altitudinal: 520 m.

APONOGETONACEAE

Aponogeton

Aponogeton distachyos L.f.
Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: LLA.

ARACEAE

Colocasia

Colocasia esculenta (L.) Schott
Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: IPA.
Nombre vulgar: Taro (Rapa Nui).

Landoltia

Landoltia punctata (G. Mey.) Les & D.J. Crawford
Hierba acuática. Perenne. Introducida.
Distribución: MAG.

Lemna

Lemna gibba L.
Sinónimos: *Lemna parodiana* Giardelli
Hierba acuática. Perenne. Nativa.
Distribución: TAR, ANT, COQ, VAL, RME, LBO, BIO, LLA.
Rango altitudinal: 10-4450 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Lemna minuta Kunth

Sinónimos: *Lemna minima* Kunth, nom. nud., *Lemna minima* Phil. ex Hegelm., hom. illeg., *Lemna minuscula* Herter, nom. illeg., *Lemna valdiviana* Phil. var. *abbreviata* Hegelm., *Lemna valdiviana* Phil. var. *minima* Hegelm.
Hierba acuática. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.

Rango altitudinal: 10-4450 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Nombre vulgar: Lenteja de agua.

***Lemna valdiviana* Phil.**

Sinónimos: *Lemna valdiviana* Phil. var. *platyclados* Hegelm., *Lemna valdiviana* Phil. var. *pellucida* Hegelm., *Lemna valdiviana* Phil. var. *robusta* Hegelm.

Hierba acuática. Perenne. Nativa.

Distribución: TAR, VAL, RME, MAU, ARA, LLA.

Rango altitudinal: 400-3700 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Lenteja de agua.

Pistia

***Pistia stratiotes* L.**

Hierba acuática. Perenne. Introducida.

Distribución: VAL.

Spirodela

***Spirodela intermedia* W. Koch**

Hierba acuática. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Wolffia

***Wolffia brasiliensis* Wedd.**

Sinónimos: *Wolffia papulifera* C.H. Thomps., *Wolffia punctata* Griseb.

Hierba acuática. Perenne. Nativa.

Distribución: NUB.

Rango altitudinal: 50 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Nombre vulgar: Lenteja de agua.

Wolfiella

***Wolfiella oblonga* (Phil.) Hegelm.**

Sinónimos: *Lemna oblonga* Phil., *Wolffia oblonga* (Phil.)

Hegelm., *Wolffia lingulata* Hegelm. var. *minor* Hegelm.

Hierba acuática. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL, RME, MAU.

Rango altitudinal: 260-550 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Lenteja de agua.

Zantedeschia

***Zantedeschia aethiopica* (L.) Spreng.**

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: VAL, RME, LLA, JFE.

ARECACEAE

Juania

***Juania australis* (Mart.) Drude ex Hook. f.**

Sinónimos: *Ceroxylon australe* Mart., *Nunnezharia chonta* (Phil.) Kuntze, *Morenia chonta* Phil.

Árbol. Endémico.

Distribución: JFE.

Rango altitudinal: 200-800 m.

Nombre vulgar: Chonta, palma chonta.

Jubaea

***Jubaea chilensis* (Molina) Baill.**

Sinónimos: *Palma chilensis* Molina, *Cocos chilensis* (Molina) Kunth, *Micrococos chilensis* (Molina) Phil., *Jubaea spectabilis* Kunth, *Molinaea micrococos* Bertero

Árbol. Endémico.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 300 m.

Nombre vulgar: Palma Chilena.

ASPARAGACEAE

Cordyline

***Cordyline terminalis* (L.) Kunth**

Arbusto. Introducido.

Distribución: IPA.

Nombre vulgar: Ti (Rapa Nui).

Herreria

Herreria stellata Ruiz & Pav.

Sinónimos: *Herreria verticillata* Molina
Hierba trepadora. Perenne. Endémica.
Distribución: MAU, BIO, LLA.
Rango altitudinal: 0-700 m.
Nombre vulgar: Zarza.

Oziroë

Oziroë acaulis (Baker) Speta

Sinónimos: *Scilla acualis* Baker
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP.
Rango altitudinal: 3000-4000 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Oziroë arida (Poepp.) Speta

Sinónimos: *Fortunatia arida* (Poepp.) Ravenna, *Oziroë arida* (Poepp.) Ravenna, *Ornithogalum aridum* Poepp., *Ornithogalum chloroleucum* Lindl., *Scilla chloroleuca* (Lindl.) Kunth, *Ornithogalum chilense* Phil., *Ornithogalum biflorum* (Ruiz & Pav.) D. Don var. *chloroleucum* (Lindl.) Baker, *Oziroë chloroleuca* (Poepp.) Speta
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 0-200 m.

Oziroë biflora (Ruiz & Pav.) Speta

Sinónimos: *Fortunatia biflora* (Ruiz & Pav.) J.F. Macbr., *Camassia biflora* (Ruiz & Pav.) Cocucci, *Scilla biflora* Ruiz & Pav., *Scilla triflora* Phil., *Ornithogalum biflorum* (Ruiz & Pav.) D. Don
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO.
Rango altitudinal: 0-900 m.
Países limítrofes: Bolivia.
Nombre vulgar: Lágrima de la virgen.

Oziroë pomensis Ravenna

Sinónimos: *Oziroë totorensis* Ravenna
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: TAR.

Rango altitudinal: 1800-3600 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Trichopetalum

Trichopetalum plumosum (Ruiz & Pav.) J.F.

Macbr.
Sinónimos: *Trichopetalum stellatum* Lindl., *Trichopetalum gracile* Lindl., *Anthericum plumosum* Ruiz & Pav., *Bottionea thysanotoides* Colla, *Endocoma peruviana* Raf., *Endocoma parviflora* Raf.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 0-1500 m.
Nombre vulgar: Flor de la plumilla.

ASPHODELACEAE

Asphodelus

Asphodelus fistulosus L.
Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: AYP, ATA.

Pasithea

Pasithea caerulea (Ruiz & Pav.) D. Don

Sinónimos: *Pasithea caerulea* (Ruiz & Pav.) D. Don var. *grandiflora* I.M. Johnst., *Anthericum caeruleum* Ruiz & Pav.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.
Rango altitudinal: 0-1000 m.
Países limítrofes: Perú.
Nombre vulgar: Flor del queltehue, azulillo.

ASTELIACEAE

Astelia

Astelia pumila (G. Forst.) Gaudich.

Sinónimos: *Astelia pumila* (G. Forst.) R. Br., comb. illeg., *Melanthium pumilum* G. Forst.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-600 m.

Países limítrofes: Argentina.

BROMELIACEAE

Deuterocohnia

Deuterocohnia chrysantha (Phil.) Mez

Sinónimos: *Pitcairnia chrysantha* Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ANT, ATA.

Rango altitudinal: 0-800 m.

Nombre vulgar: Chagual del jote.

Fascicularia

Fascicularia bicolor (Ruiz & Pav.) Mez subsp. *bicolor*

Sinónimos: *Fascicularia micrantha* (Phil.) Mez, *Fascicularia parviflora* Mez, *Bromelia bicolor* Ruiz & Pav., *Billbergia bicolor* (Ruiz & Pav.) Schult. f., *Rhodostachys bicolor* (Ruiz & Pav.) Benth. ex Hook. f. ex Baker, *Rhodostachys micrantha* Phil., *Bromelia joinvillei* E. Morren

Hierba epífita o terrestre. Perenne. Endémica.

Distribución: VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 600 m.

Nombre vulgar: Chupalla.

Fascicularia bicolor (Ruiz & Pav.) Mez subsp. *canaliculata* E.C. Nelson & Zizka

Sinónimos: *Fascicularia kirchhoffiana* (Wittm.) Mez, *Bromelia albobracteata* Steud. ex Lechl., nom. nud., *Rhodostachys albo-bracteata* (Steud. ex Baker) Baker, *Rhodostachys pitcairnifolia* (B. Verl.) Benth. var. *kirchhoffiana* Wittm.

Hierba epífita o terrestre. Perenne. Endémica.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 0-100 m.

Nombre vulgar: Puñeñe.

Greigia

Greigia berteroii Skottsb.

Sinónimos: *Hesperogreigia berteroii* (Skottsb.) Skottsb.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: JFE.

Rango altitudinal: 600-700 m.

Greigia landbeckii (Lechl. ex Phil.) Phil. ex F.

Phil.

Sinónimos: *Bromelia landbeckii* Lechl. ex Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: BIO, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 0-600 m.

Nombre vulgar: Ñocha.

Greigia pearcei Mez

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: BIO, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 100-400 m.

Greigia sphacelata (Ruiz & Pav.) Regel

Sinónimos: *Billbergia sphacelata* (Ruiz & Pav.) Schult. f., *Bromelia discolor* Lindl., *Bromelia crassa* Steud., nom. nud., *Bromelia clandestina* Carrière, nom. nud., *Bromelia sphacelata* Ruiz & Pav.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Nombre vulgar: Chupón.

Ochagavia

Ochagavia andina (Phil.) Zizka, Trumper & Zoellner

Sinónimos: *Rhodostachys andina* Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: LBO, MAU, NUB.

Rango altitudinal: 700-2500 m.

Ochagavia carnea (Beer) L.B. Sm. & Loosser

Sinónimos: *Ochagavia chamissonis* (Mez) L.B. Sm. & Loosser, *Rhodostachys chamissonis* Mez, *Bromelia longifolia* auct. non Rudge, *Bromelia lindleyana* Lem., nom. illeg., *Bromelia carnea* Beer, *Rhodostachys grandiflora* Phil., *Ruckia ellementi* Regel, *Pourretia*

argentea Wittm., nom. nud., *Rhodostachys carnea* (Beer) Mez, *Ochagavia grandiflora* (Phil.) Mez
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 0-1100 m.
Nombre vulgar: Cardoncillo.

***Ochagavia elegans* Phil.**
Sinónimos: *Rhodostachys elegans* (Phil.) Mez
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: JFE.
Rango altitudinal: 0-600 m.
Nombre vulgar: Chupón.

***Ochagavia litoralis* (Phil.) Zizka, Trumpler & Zoellner**
Sinónimos: *Fascicularia litoralis* (Phil.) Mez, *Ochagavia lindleyana* Mez, *Placseptalia rebecca* Espinosa, *Fascicularia pitcairniifolia* (B. Verl.) Mez, *Hechtia pitcairniifolia* B. Verl., *Bromelia pitcairniifolia* (B. Verl.) K. Koch, *Rhodostachys pitcairniifolia* (B. Verl.) Benth., *Hechtia carnea* Wittm., nom. nud., *Rhodostachys litoralis* Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ, VAL, LBO.
Rango altitudinal: 0-300 m.

Puya

Puya alpestris* (Poepp.) Gay subsp. *alpestris
Sinónimos: *Pourretia alpestris* Poepp., *Puya whytei* Hook. f., *Puya pumila* Ravenna, *Pitcairnia coerulea* auct. non Benth.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 1500-2000 m.

***Puya alpestris* (Poepp.) Gay subsp. *zoellneri* Zizka**
Sinónimos: *Puya coerulea* auct. non Lindl., *Puya whytei* auct. non Hook.f., *Pitcairnia alpestris* L.H. Bailey, *Puya berteroniana* auct. non Mez
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU.
Rango altitudinal: 1090 m.

***Puya berteroniana* Mez**
Sinónimos: *Pitcairnia alpestris* L.H. Bailey, nom. nud.

Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO.
Rango altitudinal: 0-2000 m.
Nombre vulgar: Chagual.
Nota: Según Zizka et al. (2013) esta especie sería un híbrido (*Puya x berteroniana* Mez).

***Puya boliviensis* Baker**
Sinónimos: *Puya copiapina* Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ANT, ATA.
Rango altitudinal: 1500-2500 m.

***Puya chilensis* Molina**
Sinónimos: *Puya quillotana* W. Weber, *Pourretia coarctata* Ruiz & Pav., *Pitcairnia chilensis* Lodd., *Puya suberosa* Molina, *Puya gigantea* Phil., *Puya chilensis* Molina var. *gigantea* Baker ex Mez
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, BIO.
Rango altitudinal: 1000-2500 m.
Nombre vulgar: Puya.

Puya coerulea* Lindl. var. *coerulea
Sinónimos: *Pourretia caerulea* Miers, nom. nud., *Pitcairnia coerulea* (Lindl) Benth., *Pitcairnia coerulea* auct. non Benth., *Puya violacea* auct. non Mez
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO.
Rango altitudinal: 500-2000 m.
Nombre vulgar: Chagualillo.

***Puya coerulea* Lindl. var. *intermedia* (L.B. Sm. & Looser) L.B. Sm. & Looser**
Sinónimos: *Puya paniculata* Phil., *Puya glabrata* Phil. ex Baker
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU.
Rango altitudinal: 400-700 m.

***Puya coerulea* Lindl. var. *monteroana* (L.B. Sm. & Looser) L.B. Sm. & Looser**
Sinónimos: *Puya violacea* (Brongn.) Mez var. *monteroana* L.B. Sm. & Looser
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: LBO.
Rango altitudinal: 1500-2500 m.

***Puya coerulea* Lindl. var. *violacea* (Brongn.) L.B.**

Sm. & Looser

Sinónimos: *Puya rubricaulis* Steud., *Pourretia rubricaulis* Miers, *Pitcairnia violacea* Brongn., *Pourretia violacea* Linden, *Puya violacea* (Brongn.) Mez

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: VAL, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 400-1200 m.

Nombre vulgar: Chagual chico.

***Puya gilmartiniae* G.S. Varad. & A.R. Flores**

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ.

Rango altitudinal: 1500-2500 m.

***Puya pumila* Ravenna**

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: BIO.

Rango altitudinal: 50-500 m.

***Puya venusta* Phil.**

Sinónimos: *Pitcairnia venusta* (Phil.) Baker, *Pitcairnia sphaerocephala* Baker, *Puya coquimbensis* Mez, *Puya gaudichaudii* Mez

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL.

Rango altitudinal: 1000-1500 m.

Nombre vulgar: Chagual.

Tillandsia

***Tillandsia geissei* Phil.**

Hierba epífita. Perenne. Endémica.

Distribución: ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 200-600 m.

***Tillandsia landbeckii* Phil.**

Hierba epífita. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 300-1500 m.

Países limítrofes: Perú.

Nombre vulgar: Calachunca.

***Tillandsia marconae* W. Till & Vitek**

Hierba epífita. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR.

Rango altitudinal: 600-800 m.

Países limítrofes: Perú.

***Tillandsia tragophoba* M.O. Dillon**

Hierba epífita. Perenne. Endémica.

Distribución: ANT.

Rango altitudinal: 200-500 m.

***Tillandsia usneoides* (L.) L.**

Sinónimos: *Renealmia usneoides* L., *Tillandsia usneoides* (L.) L. var. *ferruginea* (André) Mez, *Tillandsia usneoides* (L.) L. fma. *cretacea* Mez, *Tillandsia usneoides* (L.) L. fma. *ferruginea* André Hierba epífita. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.

Rango altitudinal: 0-3300 m.

Países limítrofes: Argentina y Perú.

Nombre vulgar: Barbón, barbas de viejo.

***Tillandsia virescens* Ruiz & Pav.**

Sinónimos: *Tillandsia capillaris* Ruiz & Pav. fma. *virescens* (Ruiz & Pav.) L.B. Sm., *Tillandsia propinquia* Gay, *Diaphoranthema virescens* (Ruiz & Pav.) Beer, *Tillandsia stolpi* Phil.

Hierba epífita. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ATA, COQ, VAL, LBO.

Rango altitudinal: 450-4000 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Calachunca.

BUTOMACEAE

Hydrocleys

***Hydrocleys nymphoides* (Willd.) Buchenau**

Hierba acuática. Perenne. Introducida.

Distribución: VAL.

COMMELINACEAE

Commelina

***Commelina diffusa* Burm. f.**

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: IPA.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: LLA.

***Commelina erecta* L.**

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: ANT, COQ, RME.

Carex

***Carex acaulis* d'Urv.**

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Tradescantia

***Tradescantia fluminensis* Vell.**

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: LRI, JFE.

***Carex acutata* Boott**

Sinónimos: *Carex anwandteri* Phil., *Carex foeminea* Steud.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ATA, VAL, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-1100 m.

CORSIACEAE

Arachnitis

***Arachnitis uniflora* Phil.**

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-1500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Flor de la araña, rayen llallin.

***Carex aematorrhyncha* E. Desv. var.**

aematorrhyncha

Sinónimos: *Carex filiformis* L. subsp. *aematorrhyncha* (E. Desv.) Kük.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-1200 m.

Países limítrofes: Argentina.

CYPERACEAE

Amphiscirpus

***Amphiscirpus nevadensis* (S. Watson) Oteng-Yeb.**

Sinónimos: *Schoenoplectus nevadensis* (S. Watson)

Soják, *Scirpus nevadensis* S. Watson, *Scirpus nevadensis*

S. Watson var. *remireoides* (Griseb.) Beetle, *Scirpus remireoides* Griseb., *Isolepis oreophila* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 0-4000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Carex aematorrhyncha* E. Desv. var. *corralensis

(Phil.) Kük.

Sinónimos: *Carex corralensis* Phil., *Carex filiforme* auct. non Gooden.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-900 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Carex andersonii* Boott**

Sinónimos: *Carex eleopsammodes* Steud.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ARA, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-900 m.

Países limítrofes: Argentina.

Bolboschoenus

***Bolboschoenus maritimus* (L.) Palla**

***Carex andina* Phil.**

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 1200-3300 m.
Países limítrofes: Argentina.

Carex aphylla Kunth
Sinónimos: *Carex ebracteata* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.
Rango altitudinal: 700-2700 m.
Países limítrofes: Argentina.

Carex araucana Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS.
Rango altitudinal: 800 m.

Carex argentina Barros
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: RME, MAU.
Rango altitudinal: 1000-2600 m.
Países limítrofes: Argentina.

Carex atropicta Steud.
Sinónimos: *Carex lechleri* Phil., hom. illeg., *Carex leporina* auct. non L., p.p., *Carex pampae* Kalela, p.p., *Carex peraltae* Phil., *Carex fuegina* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-2500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Carex austroamericana G.A. Wheeler
Sinónimos: *Carex andina* Phil. var. *subabscondita* Kük., p.p., *Carex andina* Phil. var. *subabscondita* auct. non Kük.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAG.
Rango altitudinal: 0-800 m.
Países limítrofes: Argentina.

Carex banksii Boott var. *banksii*
Sinónimos: *Carex germana* Boott, *Carex trifida* Franch., hom. illeg., *Carex trifida* Cav. var. *franchetii* Kurtz
Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-1900 m.
Países limítrofes: Argentina.

Carex banksii Boott var. *fonkii* (Phil.) Kük.
Sinónimos: *Carex fonkii* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAG.
Rango altitudinal: 0-1000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Carex banksii Boott var. *gilliesii* (Phil.) Kük.
Sinónimos: *Carex dessaueri* Phil., *Carex gilliesii* Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: RME.
Rango altitudinal: 2000-3000 m.

Carex berteroana E. Desv.
Sinónimos: *Carex setifolia* Kunze ex Kunth var. *pungens* (Boeck.) Kük., *Carex setifolia* Kunze ex Kunth var. *berteroana* (E. Desv.) Gunckel, *Carex pungens* Boeck., *Carex setifolia* Kunze ex Kunth var. *colchaguensis* (Phil.) Kük., *Carex colchaguensis* Phil., *Carex moelleri* Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 0-1500 m.

Carex berteroniana Steud.
Sinónimos: *Carex paleata* Boott
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: JFE.
Rango altitudinal: 0-700 m.

Carex bonariensis Desf. ex Poir.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: VAL, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 0-200 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Carex bracteosa Kunze ex Kunth
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: VAL, RME, LBO, NUB, BIO, ARA, LRI.
Rango altitudinal: 0-800 m.

Carex brongniartii Kunth

Sinónimos: *Carex hypoxanthus* Steud.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.

Rango altitudinal: 0-700 m.

Países limítrofes: Argentina.

Carex caduca Boott

Sinónimos: *Carex ortegae* Phil., *Carex caduca* Boott

var. *ortegae* (Phil.) Kük.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-1500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Carex campylochlin V.I. Krecz.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Carex canescens L.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 10-1200 m.

Carex capitata L.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Carex catamarcensis C.B. Clarke ex Kük.

Sinónimos: *Carex latibracteolata* Kük.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ.

Rango altitudinal: 500-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Carex chilensis Brongn. ex Duperrey

Sinónimos: *Carex riparia* Curtis var. *chilensis* (Brongn. ex Duperrey) Kük., *Carex riparia* Curtis subsp. *chilensis* (Brongn. ex Duperrey) Kük., *Carex vacillans* Steud.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Carex chillanensis Phil.

Sinónimos: *Carex melanolepis* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL, RME, MAU, NUB, BIO, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-3500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Carex darwinii Boott var. *darwinii*

Sinónimos: *Carex incompta* Franch.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-1500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Carex darwinii Boott var. *serranoi* (Phil.) Kük.

Sinónimos: *Carex darwinii* Boott var. *robustior* Kük., *Carex serranoi* Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-1500 m.

Carex darwinii Boott var. *urolepis* (Franch.) Kük.

Sinónimos: *Carex darwinii* Boott var. *aristata* C.B. Clarke ex Kük., *Carex urolepis* Franch.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-200 m.

Países limítrofes: Argentina.

Carex decidua Boott

Sinónimos: *Carex decidua* Boott var. *minor* Kük., *Carex pedicellata* Phil., *Carex rahmeri* Phil., *Carex vulgaris* R.E. Fr. var. *antucensis* Kük.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-2400 m.

Países limítrofes: Argentina.

Carex distenta Kunze ex Kunth

Sinónimos: *Carex fuscula* d'Urv. var. *distenta* (Kuntze ex Kunth) Kük., *Carex huitensis* Steud., *Carex indecora* auct. non Kunth, *Carex pseudopunctata* Boeck.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL, LBO, MAU, BIO, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-700 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Carex excelsa* Poepp. ex Kunth**

Sinónimos: *Carex lechleri* Steud., *Carex pseudocyperus* L. subsp. *haenkeana* auct. non (J. Presl & C. Presl) Kük., *Carex pseudocyperus* L. var. *haenkeana* (J. Presl & C. Presl) Kük., *Carex pseudocyperus* L. var. *lechleri* Boott, *Carex psilostachys* Steud.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Cortadera.

***Carex fernandezensis* Mack. ex G.A. Wheeler**

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: JFE.

Rango altitudinal: 300-600 m.

***Carex firmicaulis* Kalela**

Sinónimos: *Carex andicola* G.A. Wheeler, *Carex nebulosum* Phil. fma. *major* (Kük.) Kük., *Carex pycnostachya* Kar. & Kir. var. *major* Kük.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, LBO.

Rango altitudinal: 100-1300 m.

Países limítrofes: Argentina.

Carex fuscula* d'Urv. var. *fuscula* fma. *fuscula

Sinónimos: *Carex hieronymi* Boeck., *Carex calbucana* Phil., *Carex fuscula* d'Urv. var. *hieronymi* (Boeck.) Kük., *Carex inconspicua* Steud. var. *fuscula* (d'Urv.) Kük., *Carex indecora* Kunth var. *humilis* Kunth, *Carex riparia* auct. non Curtis, *Carex valdiviana* Phil., *Carex fuscula* d'Urv. f. *elatior* Kurtz

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, RME, LBO, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-1500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Carex fuscula* d'Urv. var. *fuscula* fma. *indecora

(Kunth) Kük.

Sinónimos: *Carex indecora* Kunth

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: LLA.

Rango altitudinal: 10-1800 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Carex fuscula* d'Urv. var. *pseudextensa* Kük.**

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: LLA.

Rango altitudinal: 800-1000 m.

***Carex gayana* E. Desv. var. *densa* Kük.**

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ATA, LBO, MAU, MAG.

Rango altitudinal: 0-3500 m.

Países limítrofes: Argentina y Perú.

Carex gayana* E. Desv. var. *gayana

Sinónimos: *Carex nitens* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-3500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Carex gayana* E. Desv. var. *rufa* Kük.**

Sinónimos: *Carex gayana* E. Desv. var. *taurina* (Phil.) Kük., *Carex taurina* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME.

Rango altitudinal: 500-2300 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Carex gayana* E. Desv. var. *schedonautos* (Steud.)**

Kük.

Sinónimos: *Carex schedonautos* Steud.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAG.

Países limítrofes: Argentina.

***Carex hookeri* Kunth**

Sinónimos: *Carex beecheiana* Boott ex E. Desv.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: VAL, RME, LBO, LLA.

***Carex hypoleucus* E. Desv.**

Sinónimos: *Carex nebulosum* Phil. var. *kurtziana* (Kük.) Kük., *Carex kurtziana* Kük.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: RME, MAU, NUB, BIO, ARA, MAG.

Rango altitudinal: 1500-2300 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Carex inconspicua* Steud.**

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 0-2800 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Carex kingii* (Boott) Reznicek**

Sinónimos: *Uncinia kingii* Boott

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AIS, MAG.

Rango altitudinal: 700-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Carex lamprocarpa* Phil.**

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: BIO, ARA, LLA.

Rango altitudinal: 500-1000 m.

***Carex lateriflora* Phil.**

Sinónimos: *Carex involucrata* Steud. ex Lechl., nom. nud., *Carex trichodes* Steud. ex Boott var. *lateriflora* (Phil.) Kük., *Carex trichodes* Steud. ex Boott var. *major* Kük., *Carex reicheana* Boeck.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.

Rango altitudinal: 1000-1500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Carex macloviana* d'Urv. var. *macloviana

Sinónimos: *Carex festiva* Dewey, *Carex inciso-dentata* Steud., *Carex ovalis* auct. non Gooden., *Carex propinqua* Nees & Meyen, *Carex allomacros* Steud., *Carex macloviana* d'Urv. fma. *bracteata* Kük., *Carex pratensis* Phil., hom. illeg.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-3800 m.

Países limítrofes: Argentina.

Carex macloviana* d'Urv. var. *pseudoleporina

Kük.

Sinónimos: *Carex leporina* auct. non L., p.p., *Carex leporina* L. var. *elatior* Boeck., *Carex leucocarpa* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Carex macloviana* d'Urv. var. *thermarum* (Phil.)**

Kük.

Sinónimos: *Carex macloviana* d'Urv. var. *incrassata* Kük., *Carex thermarum* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL, RME, MAU, NUB, BIO.

Rango altitudinal: 1000-2000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Carex macrorrhiza* Boeck.**

Sinónimos: *Carex macrorrhiza* Boeck. var. *simplex* Kük., *Carex bonplandii* auct. non Kunth, *Carex curvifolia* Boeck., *Carex hypoleucus* auct. non E. Desv.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: TAR, RME.

Rango altitudinal: 2000-4200 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

***Carex macrosolen* Steud.**

Sinónimos: *Carex macrocarpa* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 0-900 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Carex magellanica* Lam.**

Sinónimos: *Carex atrata* L. var. *magellanica* (Lam.) Wahlenb., *Carex cernua* Phil., hom. illeg.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-2200 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Carex malmei* Kalela**

Sinónimos: *Carex atropicta* Steud. var. *platycarpa* Phil. ex Kük.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ATA, COQ, RME.

Rango altitudinal: 2600-4000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Carex maritima Gunnerus

Sinónimos: *Carex incurva* Lightf. var. *misera* (Phil.) Kük., *Carex melanocystis* E. Desv., *Carex melanocystis* E. Desv. var. *misera* (Phil.) Kük., *Carex misera* Phil. Hierba. Perenne. Nativa. Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, MAG. Rango altitudinal: 200-4200 m. Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Carex microglochin Wahlenb.

Hierba. Perenne. Nativa. Distribución: ATA, COQ, AIS, MAG. Rango altitudinal: 200-4100 m. Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Carex minutissima Barros

Hierba. Perenne. Nativa. Distribución: AIS, MAG. Rango altitudinal: 500-1700 m. Países limítrofes: Argentina.

Carex molinae Phil.

Hierba. Perenne. Endémica. Distribución: MAU. Rango altitudinal: 2200-2400 m.

Carex moorei G.A. Wheeler

Hierba. Perenne. Nativa. Distribución: MAG. Rango altitudinal: 600-800 m. Países limítrofes: Argentina.

Carex multispicata Kunze ex Kunth

Sinónimos: *Carex acutata* Boott var. *multispicata* (Kunze ex Kunth) Kük. Hierba. Perenne. Endémica. Distribución: BIO.

Carex nebularum Phil.

Sinónimos: *Carex propinqua* auct. non Nees & Meyen, *Carex pycnostachya* auct. non Kar. & Kir. Hierba. Perenne. Nativa. Distribución: RME, MAU, NUB, AIS. Rango altitudinal: 1000-2200 m. Países limítrofes: Argentina.

Carex ochrostachya Phil.

Hierba. Perenne. Endémica. Distribución: MAU.

Carex odontolepis Phil.

Sinónimos: *Carex banksii* Boott var. *odontolepis* (Phil.) Kük., *Carex promaucana* Phil. Hierba. Perenne. Nativa. Distribución: VAL, RME, LBO, NUB, ARA. Rango altitudinal: 100-2300 m. Países limítrofes: Argentina.

Carex phalaroides Kunth

Sinónimos: *Carex chlorolepis* Steud., *Carex schenkiana* Boeck., *Uncinia phalaroides* (Kunth) Nees Hierba. Perenne. Nativa. Distribución: VAL, BIO, ARA, LLA, JFE. Rango altitudinal: 0-300 m. Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Carex pisanoi G.A. Wheeler

Hierba. Perenne. Endémica. Distribución: MAG. Rango altitudinal: 0-500 m.

Carex pleioneura G.A. Wheeler

Hierba. Perenne. Nativa. Distribución: AYP, TAR, COQ, RME. Rango altitudinal: 1900-3400 m. Países limítrofes: Argentina.

Carex poeppigii C.B. Clarke ex G.A. Wheeler

Sinónimos: *Carex lamprocarpa* Phil. var. *rotundata* Kük. Hierba. Perenne. Endémica. Distribución: BIO.

Carex pumila Thunb.

Hierba. Perenne. Introducida. Distribución: LBO, MAU, BIO, LLA, AIS, MAG. Rango altitudinal: 2-350 m.

Carex reichei Kük.

Sinónimos: *Carex aueri* Kalela Hierba. Perenne. Nativa. Distribución: MAU, MAG. Rango altitudinal: 0-2500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Carex sagei* Phil.**

Sinónimos: *Carex barrosii* Nelmes, *Carex flava* L.
subsp. *brevirostrata* Kük.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ARA, LLA, MAG.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Carex setifolia* Kunze ex Kunth**

Sinónimos: *Carex pissisii* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 5-2000 m.

Países limítrofes: Perú.

***Carex sorianoi* Barros**

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 100-800 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Carex stuessyi* G.A. Wheeler**

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: JFE.

Rango altitudinal: 900-1400 m.

***Carex subantarctica* Speg.**

Sinónimos: *Carex chubutensis* C.B. Clarke

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-800 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Carex toroensis* G.A. Wheeler**

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 0-100 m.

***Carex trachycystis* Griseb.**

Sinónimos: *Carex sororia* auct. non Kunth

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: BIO.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Carex transandina* G.A. Wheeler**

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 300-600 m.

***Carex trichodes* Steud. ex Boott**

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: LLA.

***Carex trifida* Cav.**

Sinónimos: *Carex aristata* auct. non R. Br.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Carex vallis-pulchrae* Phil. var. *barrosiana* G.A. Wheeler**

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 0-300 m.

Países limítrofes: Argentina.

Carex vallis-pulchrae* Phil. var. *vallis-pulchrae

Sinónimos: *Carex castellanosii* Barros

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ATA, COQ, RME, LBO, MAG.

Rango altitudinal: 2000-3800 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Carex werdermannii* Gross**

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: LRI.

Rango altitudinal: 1000 m.

Carpha

***Carpha schoenoides* Banks & Sol. ex Hook. f.**

Sinónimos: *Carpha alpina* R. Br. var. *schoenoides* (Banks & Sol. ex Hook. f.) Kük., *Carpha viridis* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-800 m.

Países limítrofes: Argentina.

Cyperus

***Cyperus aggregatus* (Willd.) Endl.**

Sinónimos: *Cyperus flavomariscus* Griseb., *Didymia cyperomorpha* Phil., *Mariscus aggregatus* Willd.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: BIO.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Cyperus articulatus* L.**

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP.

Rango altitudinal: 50-1300 m.

Países limítrofes: Bolivia y Perú.

***Cyperus brevifolius* (Rottb.) Endl. ex Hassk.**

Sinónimos: *Kyllinga brevifolia* Rottb.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: IPA.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Hikukio'e (Rapa Nui).

***Cyperus cyperoides* (L.) Kuntze**

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: IPA.

Rango altitudinal: 150 m.

Nombre vulgar: Hikukio'e (Rapa Nui).

***Cyperus difformis* L.**

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO.

Rango altitudinal: 50-170 m.

***Cyperus eragrostis* Lam. var. *compactus* (E. Desv.)**

Kük.

Sinónimos: *Cyperus lutescens* Phil., hom. illeg., *Cyperus vegetus* Willd. var. *compactus* E. Desv., *Cyperus vegetus* Willd. var. *trigonus* Kuntze

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE, IPA.

Rango altitudinal: 0-200 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Hikukio'e (Rapa Nui).

Cyperus eragrostis* Lam. var. *eragrostis

Sinónimos: *Cyperus declinatus* Moench, *Cyperus vegetus* Willd., *Cyperus eragrostis* Lam. fma. *latifrons* Kük.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, JFE.

Rango altitudinal: 0-2400 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Cyperus fraternus* Kunth**

Sinónimos: *Cyperus reflexus* Vahl var. *fraternus* (Kunth) Kuntze

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Países limítrofes: Argentina.

***Cyperus grammicus* Kunze ex Kunth**

Sinónimos: *Pycreus grammicus* (Kunze ex Kunth) C.B. Clarke, *Cyperus parvulus* Steud.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

***Cyperus involucratus* Rott.**

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: ANT, RME, MAU, LLA.

***Cyperus laevigatus* L.**

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: AYP, TAR, ANT, COQ, MAU.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

***Cyperus lanceolatus* Poir.**

Sinónimos: *Cyperus lepidus* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAU.

Rango altitudinal: 0-1200 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Cyperus megapotamicus* Kunth var. *jaeggii

(Boeck.) Kük. ex Barros

Sinónimos: *Pycreus megapotamicus* (Kunth) Nees var. *jaeggii* (Boeck.) Guagl., *Cyperus jaeggii* Boeck.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: NUB, BIO.

Rango altitudinal: 0-300 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

***Cyperus odoratus* L.**

Sinónimos: *Cyperus flexuosus* Vahl, *Torulinium odoratum* (L.) Hooper

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: LBO, MAU, LRI.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

***Cyperus poeppigii* Kunth**

Sinónimos: *Torulinium poeppigii* (Kunth) C.B. Clarke

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: RME, LBO.

Rango altitudinal: 0-100 m.

***Cyperus polystachyos* Rottb.**

Hierba. Anual o perenne. Introducida.

Distribución: IPA.

Rango altitudinal: 300 m.

Nombre vulgar: Hikukio'e (Rapa Nui).

***Cyperus reflexus* Vahl**

Sinónimos: *Cyperus haematochrysis* Steud.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE.

Rango altitudinal: 0-2200 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Morcacho, ñocha.

***Cyperus rigens* J. Presl & C. Presl**

Sinónimos: *Cyperus chilensis* Boeck., *Cyperus conceptionis* Steud., *Cyperus lacustris* Phil., *Cyperus laetus* auct. non J. Presl & C. Presl, *Cyperus laetus* J. Presl & C. Presl var. *conceptionis* (Steud.) Kük., *Mariscus conceptionis* (Steud.) C.B. Clarke, *Cyperus paposanus* Phil., *Cyperus nocha* Phil., *Cyperus rancoanus* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, ANT, RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.

Rango altitudinal: 0-1500 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Nombre vulgar: Ñocha, lleivún.

***Cyperus rotundus* L.**

Sinónimos: *Chlorocyperus rotundus* (L.) Palla

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, MAU, BIO.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Nombre vulgar: Coquillo.

***Cyperus squarrosus* L.**

Sinónimos: *Cyperus aristatus* Rottb., nom. illeg.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: COQ, RME, LBO, MAU, BIO, LRI.

Rango altitudinal: 0-2500 m.

***Cyperus tweediei* C.B. Clarke**

Hierba. Anual o perenne. Nativa.

Distribución: VAL.

Rango altitudinal: 200-2700 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Cyperus virens* Michx. var. *montanus* (Boeck.)**

Denton

Sinónimos: *Cyperus montanus* Boeck., *Cyperus uleanus* Boeck.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: NUB.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Cyperus virens* Michx. var. *virens

Sinónimos: *Cyperus acutangulus* Boeck., *Cyperus vegetus* Willd. var. *acutangulus* (Boeck.) Kuntze, *Cyperus virens* Michx. var. *acutangulus* (Boeck.) Kük.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAU, ARA.

Rango altitudinal: 0-2500 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Nombre vulgar: Cortadera, lleivún.

***Cyperus volckmannii* Phil.**

Sinónimos: *Cyperus araeus* Phil.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: COQ, MAU.

Rango altitudinal: 0-800 m.

***Cyperus xanthostachyus* Steud.**

Sinónimos: *Cyperus lechlerii* Steud.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 0-800 m.

Países limítrofes: Bolivia.
Nombre vulgar: Cortadera, ñocha.

Eleocharis

***Eleocharis atacamensis* Phil.**

Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ANT, ATA, COQ, NUB, LLA, MAG.
Rango altitudinal: 500-3600 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

***Eleocharis bonariensis* Nees**

Sinónimos: *Eleocharis striatula* E. Desv., *Scirpus striatus* (E. Desv.) Griseb.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.
Rango altitudinal: 0-3000 m.
Países limítrofes: Argentina.

***Eleocharis cordillerana* S. González, Guagl. & Ruthsatz**
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: LRI, LLA.
Rango altitudinal: 500-900 m.

***Eleocharis dombeyana* Kunth**
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ATA, RME.
Rango altitudinal: 0-2500 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Eleocharis flavescens* (Poir.) Urb.**
Sinónimos: *Scirpus flavescens* Poir.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: RME, MAU, BIO.
Rango altitudinal: 0-400 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

***Eleocharis fuscopurpurea* (Steud.) H. Pfeiff.**
Sinónimos: *Eleocharis melanocarpa* Phil., *Eleocharis vincentina* Phil., *Eleocharis vincentina* Phil. var. *arcuata* (Kuntze) C.B. Clarke, *Isolepis fuscopurpurea* Steud., *Scirpus desvauxii* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAU, BIO, LRI, JFE.
Rango altitudinal: 0-2300 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Eleocharis lechleri* Boeck.**

Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: LRI, LLA.
Rango altitudinal: 400-900 m.
Países limítrofes: Argentina.

***Eleocharis macrostachya* Britton**

Sinónimos: *Eleocharis palustris* auct. non (L.) R. Br., *Scirpus palustris* auct. non L.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-1700 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

***Eleocharis maculosa* (Vahl) Roem. & Schult.**

Sinónimos: *Scirpus maculosus* Vahl
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: VAL, MAU, NUB, LLA, JFE.
Rango altitudinal: 0-1200 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Eleocharis melanocephala* E. Desv.**

Sinónimos: *Scirpus melanocephalus* (E. Desv.) Griseb.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: VAL, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.
Rango altitudinal: 100-2240 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

***Eleocharis melanomphala* C.B. Clarke**

Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: RME.
Rango altitudinal: 1000-3500 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

***Eleocharis melanostachys* (d'Urv.) C.B. Clarke**

Sinónimos: *Eleocharis litoralis* Phil., *Eleocharis valdiviana* Phil., *Scirpus melanostachys* d'Urv.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ATA, RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-2200 m.
Países limítrofes: Argentina y Perú.

***Eleocharis montana* (Kunth) Roem. & Schult.**

Sinónimos: *Scirpus montanus* Kunth

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 100-1000 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Eleocharis pachycarpa* E. Desv.**

Sinónimos: *Eleocharis dubia* Phil., *Eleocharis fuscosanguinea* Boeck., *Eleocharis lepida* Phil., *Eleocharis leptocaulis* Steud., *Eleocharis liocarpa* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-2400 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Eleocharis pseudoalbibracteata* S. González & Guagl.**

Sinónimos: *Eleocharis albibracteata* auct. non Nees & Meyen ex Kunth

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, IPA.

Rango altitudinal: 400-4400 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

***Eleocharis quinqueflora* (Hartmann) O. Schwarz**

Sinónimos: *Scirpus quinqueflorus* Hartmann, *Isolepis andina* Phil., *Scirpus andinus* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ANT, ATA.

Rango altitudinal: 2200-4000 m.

Países limítrofes: Argentina y Perú.

***Eleocharis radicans* (Poir.) Kunth**

Sinónimos: *Eleocharis costulata* Nees & Meyen ex Kunth, *Eleocharis rivularis* Phil., *Scirpus radicans* Poir.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.

Rango altitudinal: 0-2000 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Eleocharis tucumanensis* Barros**

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: TAR, ANT, RME.

Rango altitudinal: 3900-4600 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

***Eleocharis uniflora* Seberg**

Sinónimos: *Chillania pusilla* Roiv.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: NUB.

Rango altitudinal: 2000-2500 m.

Ficinia

***Ficinia nodosa* (Rottb.) Goetgh., Muasya & D.A.**

Simpson

Sinónimos: *Scirpus molinianus* Beetle, *Isolepis nodosa* (Rottb.) R. Br., *Scirpus nodosus* Rottb., *Isolepis monocephala* Steud.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, JFE.

Rango altitudinal: 3-280 m.

Isolepis

***Isolepis cernua* (Vahl) Roem. & Schult.**

Sinónimos: *Cyperus pumilio* Steud., *Isolepis erubescens* Steud., *Isolepis heterophylla* Steud., *Isolepis modesta* Phil., *Isolepis monostachya* Phil., *Isolepis purpurascens* Steud., *Schoenoplectus cernuus* (Vahl) Hayek, *Scirpus cernuus* Vahl, *Scirpus chloroticus* Phil., *Scirpus modestus* (Phil.) F. Phil., *Scirpus terminalis* Phil., *Scirpus aegialitis* Phil.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, JFE.

Rango altitudinal: 0-2800 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Isolepis nigricans* Kunth**

Sinónimos: *Cyperus urvilleanus* Steud., *Isolepis albescens* E. Desv., *Isolepis angachillensis* Steud., *Isolepis phaecocarpa* Phil., hom. illeg., *Isolepis ramulosa* Steud., *Isolepis vivipara* Schrad. ex E. Desv., *Scirpus angachilensis* (Steud.) Boeck., *Scirpus bridgesii* Boeck., *Scirpus constitutionis* Phil., *Scirpus didymostachyus* Phil., *Scirpus phaecarpus* Phil., *Scirpus albescens* (E. Desv.) Phil., *Isolepis nana* Phil., *Isolepis tristachya* Phil., *Scirpus trichocaulos* Phil., *Scirpus philippii* C.B. Clarke

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB,

BIO, ARA, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 500-4000 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

***Isolepis ranko* (Steud.) Vegetti**

Sinónimos: *Cyperus ranko* Steud., *Isolepis perpusilla*

Phil., hom. illeg., *Scirpus philippii* auct. non C.B.

Clarke, *Scirpus ranko* (Steud.) Gunckel, *Scirpus ranko* (Steud.) Beetle, comb. illeg.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: LRI.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Isolepis varians* Steud.**

Sinónimos: *Isolepis valdiviae* Steud., *Scirpus varians*

(Steud.) Boeck., *Isolepis valdiviae* F. Phil. ex Boeck.,

nom. illeg.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: BIO, ARA, LLA.

Rango altitudinal: 700-1200 m.

Países limítrofes: Argentina.

Machaerina

***Machaerina scirpoidea* (Steud.) T. Koyama**

Sinónimos: *Terobera scirpoidea* Steud., *Vincentia*

scirpoidea (Steud.) Boeck., *Cladium scirpoideum*

(Steud.) Benth. & Hook. f. ex Hemsl., *Mariscus*

scirpoideus (Steud.) Kuntze, *Agylla ensifolia* Phil.,

Cladium ensifolium (F. Phil.) H. Pfeiff.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: JFE.

Rango altitudinal: 100-700 m.

Oreobolus

***Oreobolus obtusangulus* Gaudich.**

Sinónimos: *Gaimardia australis* auct. non Gaudich.,

Oreobolus clandestinus Phil., *Oreobolus obtusangulus*

Gaudich. fma. *borealis* Skottsb.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.

Rango altitudinal: 0-1600 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Phylloscirpus

***Phylloscirpus acaulis* (Phil.) Goetgh. & D.A.**

Simpson

Sinónimos: *Scirpus macrolepis* Phil., *Scirpus acaulis*

Phil., *Scirpus atacamensis* auct. non Phil., *Scirpus*

nubigenus Phil., *Scirpus sessiliflorus* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 2000-3500 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Phylloscirpus boliviensis* (Barros) Dhooge & Goetgh.**

Sinónimos: *Scirpus boliviensis* Barros

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: TAR.

Rango altitudinal: 4100-4800 m.

Países limítrofes: Bolivia.

***Phylloscirpus deserticola* (Phil.) Dhooge & Goetgh.**

Sinónimos: *Scirpus deserticola* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, RME.

Rango altitudinal: 2000-4800 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Rhodoscirpus

***Rhodoscirpus asper* (J. Presl & C. Presl) Léveillé-Bourret, Donadío & J.R. Starr**

Sinónimos: *Scirpus asper* J. Presl & C. Presl, *Scirpus*

brachycaulos Phil., *Scirpus trachycaulos* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 700-3200 m.

Países limítrofes: Argentina.

Rhynchospora

***Rhynchospora brownii* Roem. & Schult. subsp. *americana* Guagl.**

Sinónimos: *Rhynchospora rugosa* auct. non (Vahl) Gale
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ARA.
Rango altitudinal: 0-2700 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Schoenoplectiella

***Schoenoplectiella mucronata* (L.) J. Jung & H.K. Choi**
Sinónimos: *Schoenoplectus mucronatus* (L.) Palla, *Scirpus mucronatus* L.
Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: VAL, MAU, NUB, BIO.
Rango altitudinal: 5-170 m.

Schoenoplectus

***Schoenoplectus americanus* (Pers.) Volkart ex Schinz & R. Keller**
Sinónimos: *Scirpus chilensis* auct. non Nees & Meyen, *Scirpus americanus* Pers., *Scirpus olneyi* A. Gray
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, VAL, LBO, MAU, BIO, LLA.
Rango altitudinal: 0-2600 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Schoenoplectus californicus* (C.A. Mey.) Soják var. *californicus
Sinónimos: *Elytrospermum californicum* C.A. Mey., *Malacochaete chilense* Nees & Meyen ex Boeck., *Malacochaete oligostachya* Phil. ex Boeck., *Scirpus californicus* (C.A. Mey.) Steud., *Scirpus riparius* Presl var. *paschalis* Kük., *Scirpus californicus* (C.A. Mey.) Steud. subsp. *tatora* (Kunth) T. Koyama
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, IPA.
Rango altitudinal: 0-2000 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.
Nombre vulgar: Totora, ngaatu (Rapa Nui).

***Schoenoplectus californicus* (C.A. Mey.) Soják var. *spoliatus* (Barros) Vegetti**
Sinónimos: *Dichromena atrosanguinea* E. Desv.

Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: LLA, AIS.
Rango altitudinal: 500-1000 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Totora.

***Schoenoplectus californicus* (C.A. Mey.) Soják var. *tereticulmis* (Steud.) Vegetti**
Sinónimos: *Scirpus californicus* (C.A. Mey.) Steud. var. *tereticulmis* (Steud.) Beetle, *Scirpus pseudotriquetus* Steud., *Scirpus riparius* J. Presl & C. Presl var. *tereticulmis* (Steud.) C.B. Clarke, *Scirpus tereticulmis* Steud.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: LRI, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-500 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Totora.

***Schoenoplectus pungens* (Vahl) Palla var. *badius* (J. Presl & C. Presl) S.G. Sm.**
Sinónimos: *Scirpus badius* J. Presl & C. Presl
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL.
Rango altitudinal: 0-1000 m.
Países limítrofes: Argentina.

***Schoenoplectus pungens* (Vahl) Palla var. *longispicatus* (Britton) S.G. Sm.**
Sinónimos: *Schoenoplectus americanus* (Pers.) Volkart ex Schinz & R. Keller subsp. *longispicatus* (Britton) Soják
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ.
Rango altitudinal: 0-500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Schoenoplectus pungens* (Vahl) Palla var. *pungens
Sinónimos: *Scirpus americanus* Pers. var. *pungens* (Vahl) Barros & Osten, *Scirpus pungens* Vahl, *Scirpus americanus* Pers. var. *conglomeratus* (Kunth) T. Koyama
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, BIO, LLA.
Rango altitudinal: 0-1400 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Schoenus

***Schoenus andinus* (Phil.) H. Pfeiff.**

Sinónimos: *Carpha andina* Phil., *Schoenus sodalium* (Franch.) Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 200-1900 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Schoenus antarcticus* (Hook. f.) Dusén**

Sinónimos: *Carpha antarctica* (Hook. f.) C.B. Clarke, *Chaetospora antarctica* Hook. f., *Elynanthus antarcticus* (Hook. f.) Franch.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 100-500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Schoenus nitens* (R. Br.) Poir. subsp. *krausei

(Phil.) Kük.

Sinónimos: *Schoenus krausei* (Phil.) Gunckel, *Isolepis krausei* Phil., *Scirpus spadiceus* Phil., hom. illeg.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: BIO, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 0-300 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Schoenus rhynchosporoides* (Steud.) Kük.**

Sinónimos: *Carpha laxa* (Hook. f.) Macloskie, *Carpha paniculata* Phil., *Chaetospora laxa* Hook.f., *Elynanthus laxus* (Hook.f.) Macloskie

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAU, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 100-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Scirpus

***Scirpus angustisquamis* Beetle**

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ARA, LLA.

***Scirpus melanocaulos* Phil.**

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: LBO, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 0-100 m.

***Scirpus spagazzinianus* Barros**

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 0-600 m.

Países limítrofes: Argentina.

Uncinia

***Uncinia andina* G.A. Wheeler**

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: BIO, ARA.

Rango altitudinal: 700-1500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Uncinia araucana* G.A. Wheeler**

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ARA.

Rango altitudinal: 1400-1700 m.

***Uncinia aspericaulis* G.A. Wheeler**

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: JFE.

Rango altitudinal: 900 m.

***Uncinia austroamericana* G.A. Wheeler**

Sinónimos: *Uncinia lechleriana* auct. non Steud.,

Uncinia macrolepis auct. non Decne.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 0-600 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Uncinia chilensis* G.A. Wheeler**

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: BIO, ARA.

Rango altitudinal: 1000-1500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Uncinia costata* Kük.**

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: JFE.

Rango altitudinal: 0-300 m.

***Uncinia douglasii* Boott**

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: JFE.

Rango altitudinal: 200-600 m.

***Uncinia erinacea* (Cav.) Pers.**

Sinónimos: *Carex erinacea* Cav., *Uncinia longearistata* Steud., *Uncinia macrotricha* Franch., *Uncinia erinacea* (Cav.) Pers. var. *angustata* Kük., *Uncinia erinacea* (Cav.) Pers. var. *longifolia* (Kük.) C.B. Clarke, *Uncinia longifolia* Kunth, *Uncinia philippii* Steud.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

***Uncinia lechleriana* Steud.**

Sinónimos: *Uncinia brevicaulis* auct. non (Thouars) Kunth, *Uncinia macloviana* auct. non Gaudich.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 100-800 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Uncinia macloviana* Gaudich.**

Sinónimos: *Carex delacosta* Kunze, *Uncinia brevicaulis* (Thouars) Kunth var. *macloviana* (Gaudich.) C.B. Clarke, *Uncinia brevicaulis* (Thouars) Kunth fma. *montana* (Phil.) Kük., *Uncinia montana* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: RME, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.

Rango altitudinal: 0-900 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

***Uncinia macloviformis* G.A. Wheeler**

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: JFE.

Rango altitudinal: 1100-1400 m.

***Uncinia macrolepis* Decne.**

Sinónimos: *Uncinia sinclairii* auct. non Boott

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 0-200 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

***Uncinia macrophylla* Steud.**

Sinónimos: *Uncinia bella* Phil., *Uncinia bracteosa* Phil., *Uncinia phalaroides* auct. non (Kunth) Nees

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: BIO, LRI.

Rango altitudinal: 100-1100 m.

***Uncinia multifaria* Nees ex Boott**

Sinónimos: *Uncinia multifaria* Nees ex Boott var. *macrostachya* (E. Desv.) C.B. Clarke

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE.

Rango altitudinal: 0-700 m.

Nombre vulgar: Quinquina.

***Uncinia negeri* Kük.**

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ARA, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 500-2000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Uncinia phleoides* (Cav.) Pers.**

Sinónimos: *Carex phleoides* Cav., *Uncinia lasiocarpa* Steud. ex Boeck., *Uncinia longifolia* E. Desv., hom. illeg., *Uncinia montteana* Phil., *Uncinia phleoides* (Cav.) Pers. var. *krausei* Kük.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, JFE.

Rango altitudinal: 0-2700 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Quinquín.

***Uncinia scabriuscula* G.A. Wheeler**

Sinónimos: *Uncinia brevicaulis* (Thouars) Kunth var. *laticarpa* Kük.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ARA, LLA, AIS, JFE.

Rango altitudinal: 200-1500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Uncinia setifolia* Kunze**

Sinónimos: *Carex pissisii* Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 0-2400 m.

***Uncinia tenuis* Poepp. ex Kunth**

Sinónimos: *Uncinia gracillis* d'Urv., hom. illeg., *Uncinia tenuis* Poepp. ex Kunth fma. *firmula* Kük.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.
Rango altitudinal: 0-1500 m.
Países limítrofes: Argentina.

***Uncinia trichocarpa* C.A. Mey.**

Sinónimos: *Uncinia phleoides* (Cav.) Pers. var. *trichocarpa* (C.A. Mey.) C.B. Clarke, *Uncinia longispica* Boeck., *Uncinia urvillei* Steud., *Uncinia phleoides* (Cav.) Pers. var. *longispica* (Boeck.) C.B. Clarke, *Uncinia chlorostachya* Phil., *Uncinia loliacea* Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ, VAL, RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.
Rango altitudinal: 0-500 m.

***Uncinia triquetra* Kük.**

Sinónimos: *Uncinia lechleriana* Steud. var. *triquetra* (Kük.) Kük.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ARA, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 100-1300 m.
Países limítrofes: Argentina.

Zameioscirpus

***Zameioscirpus atacamensis* (Phil.) Dhooge & Goetgh.**
Sinónimos: *Scirpus atacamensis* (Phil.) Boeck., *Isolepis atacamensis* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: TAR, ATA, COQ.
Rango altitudinal: 3200-4800 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

***Zameioscirpus gaimardioides* (E. Desv.) Dhooge & Goetgh.**
Sinónimos: *Carex gaimardioides* E. Desv.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ATA, COQ, LBO.
Rango altitudinal: 3100-4000 m.
Países limítrofes: Argentina.

***Zameioscirpus muticus* Dhooge & Goetgh.**

Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: TAR, ANT.
Rango altitudinal: 4100-4500 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

DIOSCOREACEAE

Dioscorea

***Dioscorea acerifolia* Phil.**
Hierba trepadora. Perenne. Endémica.
Distribución: LLA.
Rango altitudinal: 50-90 m.

***Dioscorea andina* Phil.**
Hierba trepadora. Perenne. Nativa.
Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 0-1500 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Papa cimarrona.

***Dioscorea araucana* Phil.**
Hierba trepadora. Perenne. Endémica.
Distribución: BIO, ARA.
Rango altitudinal: 1500 m.

***Dioscorea aristolochiifolia* Poepp.**
Sinónimos: *Dioscorea trichoneura* Phil.
Hierba trepadora. Perenne. Endémica.
Distribución: VAL, RME.
Rango altitudinal: 0-500 m.

***Dioscorea auriculata* Poepp.**
Sinónimos: *Dioscorea acutifolia* Phil., *Dioscorea helicifolia* Kunth, *Dioscorea brachystachya* Phil., *Dioscorea valdiviensis* R. Knuth
Hierba trepadora. Perenne. Endémica.
Distribución: VAL, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.
Rango altitudinal: 0-700 m.
Nombre vulgar: Ñame.

***Dioscorea besseriana* Kunth var. *berteroii* Uline ex R. Knuth**
Hierba trepadora. Perenne. Endémica.
Distribución: RME.

Rango altitudinal: 10-1000 m.

Dioscorea besseriana* Kunth var. *besseriana

Hierba trepadora. Perenne. Endémica.

Distribución: ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, BIO.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Dioscorea biloba* (Phil.) Caddick & Wilkin subsp. *biloba

Sinónimos: *Epipetrum bilobum* Phil.

Hierba trepadora. Perenne. Endémica.

Distribución: ANT, COQ.

Rango altitudinal: 400-500 m.

***Dioscorea biloba* (Phil.) Caddick & Wilkin subsp. *coquimbana* Viruel, Segarra & L. Villar**

Hierba trepadora. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ.

Rango altitudinal: 220-640 m.

Dioscorea brachybotrya* Poepp. var. *brachybotrya

Sinónimos: *Dioscorea novemloba* Steud. ex F. Phil.,

Dioscorea scandens Kunze ex Kunth, *Dioscorea buchtienii* R. Knuth

Hierba trepadora. Perenne. Nativa.

Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 1500-1600 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Poñi.

Dioscorea brachybotrya* Poepp. var. *germainii

Uline ex R. Knuth

Hierba trepadora. Perenne. Endémica.

Distribución: LBO, MAU.

Rango altitudinal: 0-2000 m.

***Dioscorea bridgesii* Griseb. ex Kunth**

Hierba trepadora. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO.

Rango altitudinal: 0-900 m.

Nombre vulgar: Papa cimarrona.

***Dioscorea bryoniifolia* Poepp.**

Sinónimos: *Dioscorea hederacea* Miers ex Bertero

Hierba trepadora. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, RME.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Nombre vulgar: Camisilla.

***Dioscorea cissophylla* Phil.**

Hierba trepadora. Perenne. Endémica.

Distribución: LRI, LLA.

Rango altitudinal: 0-400 m.

***Dioscorea fastigiata* Gay**

Sinónimos: *Dioscorea cylindrostachya* I.M. Johnst.,

Dioscorea thinophila Phil., *Dioscorea axilliflora* Phil.,

Dioscorea arenaria auct. non Kunth, *Dioscorea gayi* Phil., *Dioscorea geissei* Phil.

Hierba trepadora. Perenne. Endémica.

Distribución: ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 10-500 m.

***Dioscorea humifusa* Poepp. var. *gracilis* (Hook. & Arn.) L.E. Navas**

Sinónimos: *Dioscorea modesta* Phil., *Dioscorea obtusifolia* Hook. & Arn. var. *obtusifolia*, *Dioscorea obtusifolia* Hook. & Arn. var. *philippiae* Uline ex R.

Knuth

Hierba trepadora. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, RME, MAU, NUB.

Rango altitudinal: 300 m.

Dioscorea humifusa* Poepp. var. *humifusa

Sinónimos: *Dioscorea nigrescens* Phil., *Dioscorea antucoana* Uline ex R. Knuth

Hierba trepadora. Perenne. Endémica.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 0-1500 m.

Nombre vulgar: Huanqui.

Dioscorea humilis* Bertero ex Colla subsp. *humilis

Sinónimos: *Dioscorea pusilla* Hook., *Epipetrum humile* (Bertero ex Colla) Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, BIO.

Rango altitudinal: 0-1500 m.

***Dioscorea humilis* Bertero ex Colla subsp.**

***polyanthes* (F. Phil.) Viruel, Segarra & L. Villar**

Sinónimos: *Epipetrum polyanthes* F. Phil., *Dioscorea polyanthes* (F. Phil.) Caddick & Wilkin

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: MAU.

Rango altitudinal: 25-370 m.

***Dioscorea litoralis* Phil.**

Hierba trepadora. Perenne. Endémica.

Distribución: VAL, BIO.

Rango altitudinal: 0-400 m.

***Dioscorea longipes* Phil.**

Hierba trepadora. Perenne. Endémica.

Distribución: MAU, ARA.

Rango altitudinal: 100-200 m.

***Dioscorea nana* Poepp.**

Sinónimos: *Dioscorea uliginosa* Phil.

Hierba trepadora. Perenne. Endémica.

Distribución: VAL, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.

Rango altitudinal: 100-1300 m.

***Dioscorea oligophylla* Phil.**

Hierba trepadora. Perenne. Endémica.

Distribución: VAL, RME.

Rango altitudinal: 1900 m.

***Dioscorea paupera* Phil.**

Hierba trepadora. Perenne. Endémica.

Distribución: ATA, COQ.

Rango altitudinal: 900 m.

***Dioscorea pedicellata* Phil.**

Sinónimos: *Dioscorea tenuis* R. Knuth

Hierba trepadora. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.

Rango altitudinal: 0-1300 m.

Nombre vulgar: Papa cimarrona.

***Dioscorea pencana* Phil.**

Hierba trepadora. Perenne. Endémica.

Distribución: BIO.

Rango altitudinal: 200-300 m.

***Dioscorea reticulata* Gay**

Sinónimos: *Dioscorea brachybotrya* Poepp. var. *reticulata* (Gay) Uline ex R. Knuth, *Dioscorea helicifolia* auct. non Kunth, *Dioscorea reticulata* Gay var. *nervosa* (Phil.) L.E. Navas & Erba, *Dioscorea thermarum* Phil., *Dioscorea nervosa* Phil., *Dioscorea pedatifida* Phil.

Hierba trepadora. Perenne. Nativa.

Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.

Rango altitudinal: 200-2300 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Jabón del monte.

***Dioscorea saxatilis* Poepp.**

Sinónimos: *Dioscorea heterophylla* Poepp., *Dioscorea parviflora* Phil., *Dioscorea longifolia* Phil., *Dioscorea heterophylla* Poepp. var. *longifolia* (Phil.) L.E. Navas & Erba, *Dioscorea linearis* Bertero ex Colla, *Dioscorea arenaria* Kunth

Hierba trepadora. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO.

Rango altitudinal: 0-1400 m.

Nombre vulgar: Papa cimarrona.

***Dioscorea stenocolpus* Phil.**

Hierba trepadora. Perenne. Endémica.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 120-930 m.

***Dioscorea tenella* Phil.**

Hierba trepadora. Perenne. Endémica.

Distribución: ANT, COQ.

Rango altitudinal: 400-700 m.

Nombre vulgar: Papa cimarrona.

***Dioscorea variifolia* Bertero ex Colla**

Sinónimos: *Dioscorea acuminata* Steud., *Dioscorea microphylla* Steud.

Hierba trepadora. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 0-700 m.

***Dioscorea volckmannii* Phil.**

Hierba trepadora. Perenne. Nativa.

Distribución: RME, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 2300-3000 m.

Países limítrofes: Argentina.

HYDROCHARITACEAE

Egeria

Egeria densa Planch.

Hierba acuática. Perenne. Introducida.

Distribución: VAL, RME, NUB, BIO, LRI, LLA.

Elodea

Elodea potamogeton (Bertero) Espinosa

Sinónimos: *Diplandra potamogeton* Bertero, *Anacharis potamogeton* (Bertero) Vict., *Anacharis chilensis* Planch., *Egeria chilensis* (Planch.) Benth. & Hook., *Elodea chilensis* (Planch.) Casp.

Hierba acuática. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, VAL, RME, MAU, NUB.

Rango altitudinal: 20-4450 m.

Países limítrofes: Bolivia y Perú.

Limnobium

Limnobium laevigatum (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Heine

Hierba acuática. Perenne. Introducida.

Distribución: VAL, RME, BIO.

IRIDACEAE

Calydorea

Calydorea xiphioides (Poepp.) Espinosa

Sinónimos: *Sisyrinchium xiphioides* Poepp., *Sisyrinchium grandiflorum* Poepp., *Sisyrinchium speciosum* Hook., *Calydorea speciosa* (Hook.) Herb.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, LBO, MAU, BIO.

Rango altitudinal: 0-400 m.

Nombre vulgar: Lahue.

Crocosmia

Crocosmia crocosmiiflora (Lemoine ex Burbidge & Dean) N.E. Br.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: VAL, ARA, LLA, JFE.

Herbertia

Herbertia lahue (Molina) Goldblatt

Sinónimos: *Trifurcia lahue* (Molina) Goldblatt subsp. *lahue*, *Alophia lahue* (Molina) Espinosa, *Ferraria lahue* Molina

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, JFE.

Rango altitudinal: 0-400 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Lahue.

Iris

Iris germanica L.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: JFE.

Iris pseudacorus L.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: LLA.

Libertia

Libertia chilensis (Molina) Gunckel

Sinónimos: *Libertia elegans* Poepp., *Libertia formosa* Graham, *Libertia ixiooides* auct. non (G. Forst.) Spreng., *Strumaria chilensis* Molina, *Libertia crassa* Graham, *Choeradodia chilensis* Herb., *Sisyrinchium fernandezianum* Steud. & Hochst., nom. nud., *Libertia grandiflora* Phil., *Libertia formosa* Graham var. *crassa* (Graham) Baker, *Roterbe elegans* Steud. ex Baker, nom. nud., *Libertia chilensis* Klotzsch ex Baker, nom. nud., *Libertia formosa* Graham var. *grandiflora* (Phil.) Johow, *Libertia insignis* Ravenna, *Libertia umbellata* Ravenna Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Calle-calle, tekel-tekel.

Libertia sessiliflora (Poepp.) Skottsb.

Sinónimos: *Sisyrinchium sessiliflorum* Poepp., *Libertia caerulescens* Kunth & Bouché, *Sisyrinchium huismo Dombe* ex Baker, nom. nud., *Sisyrinchium coeruleascens* F. Muell.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Nombre vulgar: Trique.

Libertia tricocca Phil.

Sinónimos: *Libertia falcata* Ravenna

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 0-1300 m.

Nombre vulgar: Trique.

Mastigostyla

Mastigostyla cyrtophylla I.M. Johnst.

Sinónimos: *Cypella cyrtoophylla* (I.M. Johnst.) Diels

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT.

Rango altitudinal: 2000-3800 m.

Países limítrofes: Perú.

Olsynium

Olsynium biflorum (Thunb.) Goldblatt

Sinónimos: *Galaxia narcissoides* (Cav.) Willd., *Phaiophleps biflora* (Thunb.) R.C. Foster, *Phaiophleps odoratissimum* (Lindl.) Raf., *Sisyrinchium odoratissimum* Lindl., *Solenomelus biflorus* (Thunb.) Baker, *Sympyostemon biflorus* (Thunb.) Dusén, *Sympyostemon narcissoides* (Cav.) Miers ex Klatt, *Sympyostemon odoratissimum* (Lindl.) Miers, *Sympyostemon patagonicum* Speg., *Gladiolus biflorus* Thunb., *Sisyrinchium narcissoides* Cav., *Phaiophleps patagonica* (Speg.) R.C. Foster

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Olsynium chrysochromum J.M. Watson & A.R.

Flores

Sinónimos: *Olsynium luteum* (Phil.) Goldblatt, comb. illeg., *Chamelum luteum* Phil., hom. illeg.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, RME.

Rango altitudinal: 2000-3500 m.

Olsynium frigidum (Poepp.) Goldblatt

Sinónimos: *Chamelum andinum* (Phil.) Benth. & Hook., *Chamelum frigidum* (Poepp.) Ravenna, *Sisyrinchium andinum* Phil., *Sisyrinchium frigidum* Poepp., *Solenomelus andinus* (Phil.) Baker, *Solenomelus frigidus* (Poepp.) Klatt, *Susarium andinum* (Phil.) Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 1100-2700 m.

Países limítrofes: Argentina.

Olsynium junceum (E. Mey. ex C. Presl) Goldblatt
subsp. ***colchaguense*** (Phil.) J.M. Watson & A.R.

Flores

Sinónimos: *Sisyrinchium junceum* E. Mey. ex C. Presl subsp. *colchaguense* (Phil.) R.A. Rodr., *Sisyrinchium junceum* E. Mey. ex C. Presl var. *colchaguense* (Phil.) Baker, *Sisyrinchium colchaguense* Phil., *Sisyrinchium eleutherostemon* Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: LBO, MAU.

Rango altitudinal: 1500-2600 m.

Olsynium junceum (E. Mey. ex C. Presl) Goldblatt
subsp. ***depauperatum*** (Phil.) R.A. Rodr. & Martic.

Sinónimos: *Sisyrinchium junceum* E. Mey. ex C. Presl subsp. *depauperatum* (Phil.) R.A. Rodr., *Sisyrinchium depauperatum* Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 500-1500 m.

Olsynium junceum (E. Mey. ex C. Presl) Goldblatt
subsp. ***junceum***

Sinónimos: *Sisyrinchium argentinense* Hauman, *Sisyrinchium junceum* E. Mey. ex J. Presl, *Sisyrinchium middletoni* Baker, *Sisyrinchium pauciflorum* Phil.,

Sisyrinchium junciforme Poepp., *Olsynium argentinense* (Hauman) Ravenna, *Sisyrinchium roseum* Herb.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, MAG.

Rango altitudinal: 200-3500 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Huilmo.

***Olsynium lyckholmi* (Dusén) Goldblatt**

Sinónimos: *Phaiophleps biflora* (Thunb.) R.C. Foster subsp. *lyckholmi* (Dusén) Goldblatt, *Sympyostemon lyckholmi* Dusén

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-1100 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Olsynium nigricans* (Phil.) R.A. Rodr. & Martic.**

Sinónimos: *Phaiophleps nigricans* (Phil.) R.C. Foster, *Susarium nigricans* Phil., *Sisyrinchium maulense* Ravenna, *Solenomelus nigricans* (Phil.) Baker,

Sympyostemon nigricans (Phil.) Benth. ex Baker

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 0-400 m.

***Olsynium obscurum* (Cav.) Goldblatt**

Sinónimos: *Galaxia obscura* Cav., *Ona obscura* (Cav.) Ravenna, *Tapeinia obscura* (Cav.) D.M. Moore

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AIS, MAG.

Rango altitudinal: 900 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Olsynium philippii* (Klatt) Goldblatt subsp.**

***illapelimum* (Phil.) J.M. Watson & A.R. Flores**

Sinónimos: *Sisyrinchium illapelimum* Phil., *Sisyrinchium roseum* Phil., hom. illeg., *Sisyrinchium philippii* Klatt subsp. *illapelimum* (Phil.) Rodr.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO.

Rango altitudinal: 1000-3200 m.

***Olsynium philippii* (Klatt) Goldblatt subsp.**

philippii

Sinónimos: *Sisyrinchium philippii* Klatt, *Sisyrinchium scabrum* Phil., hom. illeg.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO.

Rango altitudinal: 2000-3000 m.

***Olsynium scirpoideum* (Poepp.) Goldblatt subsp.**

***leucanthum* (Colla) R.A. Rodr. & Martic.**

Sinónimos: *Sisyrinchium leucanthum* Colla, *Sisyrinchium scirpoideum* Poepp. subsp. *leucanthum* (Colla) R.A. Rodr., *Sisyrinchium bifolium* Phil., *Sisyrinchium stenophyllum* Phil., *Sisyrinchium nuno* Colla var. *leucanthum* (Colla) Baker, *Sisyrinchium filiforme* Steud., nom. illeg.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: VAL, RME, LBO, BIO.

Rango altitudinal: 0-1300 m.

***Olsynium scirpoideum* (Poepp.) Goldblatt subsp.**

***luridum* (Ravenna) R.A. Rodr. & Martic.**

Sinónimos: *Sisyrinchium scirpoideum* Poepp. subsp. *luridum* (Ravenna) R.A. Rodr., *Sisyrinchium luridum* Ravenna

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: NUB, BIO.

Rango altitudinal: 0-1500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Olsynium scirpoideum* (Poepp.) Goldblatt subsp.**

***scirpeum* (Phil.) R.A. Rodr. & Martic.**

Sinónimos: *Sisyrinchium scirpoideum* Poepp. subsp. *scirpeum* (Phil.) R.A. Rodr., *Sisyrinchium scirpeum* Phil., *Sisyrinchium stenopetalum* Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: NUB.

Rango altitudinal: 500-1000 m.

***Olsynium scirpoideum* (Poepp.) Goldblatt subsp.**

scirpoideum

Sinónimos: *Sisyrinchium scripiforme* Poepp., *Sisyrinchium scirpoideum* Poepp., *Sisyrinchium asperulum* Phil., *Sisyrinchium berteroanum* Phil., *Sisyrinchium floribundum* Phil., *Sisyrinchium gracile* Phil., *Sisyrinchium junciforme* Poepp. var. *nivale* Phil., *Sisyrinchium strictum* Phil., nom. nud., *Sisyrinchium nivale* Phil., *Sisyrinchium junceum* E. Mey. ex C. Presl var. *scripiforme* (Poepp.) Baker, *Sisyrinchium nuno* Colla, *Sisyrinchium nunna* Steud., *Sisyrinchium junceum* E. Mey. ex C. Presl var. *gracile* (Phil.) Baker, *Sisyrinchium junceum* E. Mey. ex C. Presl var. *asperulum* (Phil.) Baker

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 0-2300 m.

Países limítrofes: Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Huilmo.

***Olsynium trinerve* (Baker) R.A. Rodr. & Martic.**

Sinónimos: *Sisyrinchium trinerve* Baker

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP.

Rango altitudinal: 2500-4100 m.

Países limítrofes: Perú.

Romulea

***Romulea rosea* (L.) Eckl.**

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: VAL, MAU, BIO.

Sisyrinchium

***Sisyrinchium arenarium* Poepp. subsp.**

***adenostemon* (Phil.) Ravenna**

Sinónimos: *Sisyrinchium adenostemon* Phil., *Sisyrinchium pauperculum* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 1000-3200 m.

Países limítrofes: Argentina.

Sisyrinchium arenarium* Poepp. subsp. *arenarium

Sinónimos: *Sisyrinchium adenostemon* Phil. subsp. *microspathum* (Phil.) Ravenna, *Sisyrinchium arenarium* Poepp. subsp. *microspathum* (Phil.) Ravenna,

Sisyrinchium flexuosum Lindl., *Sisyrinchium microspathum* Phil., *Sisyrinchium multiflorum* Phil., *Sisyrinchium nervosum* Phil., *Sisyrinchium oligostachyum* Phil., *Sisyrinchium striatum* Sm. var. *microspathum* (Phil.) Speg., *Sisyrinchium angustifolium* Phil., *Sisyrinchium antucense* Ravenna, *Sisyrinchium breviarmium* Ravenna, *Sisyrinchium limarinum* Ravenna Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-2500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Sisyrinchium azureum* Phil.**

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ANT, ATA.

Rango altitudinal: 2000 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Sisyrinchium chilense* Hook.**

Sinónimos: *Sisyrinchium iridifolium* auct. non Kunth, *Sisyrinchium iridifolium* Kunth subsp. *valdivianum* (Phil.) Ravenna, *Sisyrinchium scabrum* Cham. & Schleidl. var. *exaltatum* Klatt, *Sisyrinchium uniflorum* Gay ex Phil., *Sisyrinchium ramosum* Herb. var. *chilense* (Hook.) Herb., *Sisyrinchium graminifolium* auct. non Lindl., *Sisyrinchium graminifolium* Bertero ex Steud., *Sisyrinchium arrayanicum* Ravenna, *Sisyrinchium micranthum* Cav. subsp. *valdivianum* (Phil.) Ravenna, *Sisyrinchium valdivianum* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-3700 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Clavelillo.

***Sisyrinchium cuspidatum* Poepp.**

Sinónimos: *Sisyrinchium convallium* Ravenna, *Sisyrinchium longifolium* Phil., *Sisyrinchium adenocarpum* Steud., *Sisyrinchium flexuosum* Phil., p.p. Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 0-2000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Sisyrinchium graminifolium* Lindl.**

Sinónimos: *Sisyrinchium graminifolium* Lindl. var. *maculatum* (Hook.) Klatt, *Sisyrinchium maculatum* Hook., *Sisyrinchium graminifolium* Lindl. subsp. *luteum* (Bertero ex Steud.) R.A. Rodr., comb. illeg., *Sisyrinchium luteum* Bertero ex Steud., nom. nud., *Sisyrinchium dasycarpum* Phil., *Sisyrinchium piligerum* Phil., *Sisyrinchium volckmanni* Phil., *Echthronema graminifolium* (Lindl.) Herb., *Sisyrinchium graminifolium* Lindl. var. *pumilum* Lindl., *Echthronema pumilum* (Lindl.) Herb., *Sisyrinchium tenuifolium* Willd., *Echthronema maculatum* (Hook.) Herb., *Sisyrinchium ascendens* Poepp., *Sisyrinchium graminifolium* Lindl. var. *ascendens* (Poepp.) Baker, *Sisyrinchium guttatum*

Moris, *Sisyrinchium majale* Link, *Sisyrinchium pumaeum* Klotzsch ex Klatt, nom. nud., *Sisyrinchium tingens* Steud., *Sisyrinchium maipoanum* Ravenna, *Sisyrinchium orbiculatum* Ravenna, *Sisyrinchium valparadiseum* Ravenna, *Sisyrinchium gratissimum* Ravenna, *Sisyrinchium tofoense* Ravenna, *Sisyrinchium vestitum* Ravenna
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 0-1200 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Nuño.

Sisyrinchium micranthum Cav.
Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: IPA.

Sisyrinchium nanum Phil.
Sinónimos: *Sisyrinchium graminifolium* Lindl. subsp. *nanum* (Phil.) Ravenna
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: LBO, MAU, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 700-2300 m.
Países limítrofes: Argentina.

Sisyrinchium patagonicum Phil. ex Baker
Sinónimos: *Sisyrinchium lechleri* Phil., *Sisyrinchium nudicaule* Phil., *Sisyrinchium palenae* Phil., *Sisyrinchium rahmeri* Phil., *Sisyrinchium inclinatum* Ravenna
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ, VAL, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-2000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Sisyrinchium pearcei Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 500-2000 m.

Sisyrinchium striatum Sm.
Sinónimos: *Sisyrinchium bracteosum* Phil., *Bermudiana striata* (Sm.) Moench, *Marica striata* (Sm.) Ker Gawl., *Paneguia striata* (Sm.) Raf., *Spathirachis striata* (Sm.) Klotzsch ex Klatt, *Sisyrinchium spicatum* Cav., *Moraea sertata* Jacq., *Sisyrinchium lutescens* Lodd.,

Sisyrinchium libertoides Steud., *Sisyrinchium nigricans* Gay, *Sisyrinchium laevigatum* Ravenna
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 0-2500 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Maicillo.

Solenomelus

Solenomelus pedunculatus (Gillies ex Hook.) Hochr.
Sinónimos: *Sisyrinchium pedunculatum* Gillies ex Hook., *Sisyrinchium longistylum* Lem., *Sisyrinchium scabriusculum* Steud., *Solenomelus chilensis* Miers
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.
Rango altitudinal: 0-1900 m.
Nombre vulgar: Maicillo.

Solenomelus segethii (Phil.) Kuntze
Sinónimos: *Lechera sisyrinchium* Griseb. ex Lechl., nom. nud., *Susarium segethii* (Phil.) Phil., *Sympyostemon segethii* (Phil.) Macloskie, *Solenomelus sisyrinchium* (Griseb.) Pax ex Diels, nom. illeg., *Sisyrinchium segethi* Phil., *Solenomelus lechleri* Baker
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-2700 m.
Países limítrofes: Argentina.

Tapeinia

Tapeinia pumila (G. Forst.) Baill.
Sinónimos: *Ixia magellanica* Lam., *Ixia pumila* G. Forst., *Moraea magellanica* (Lam.) Willd., *Sisyrinchium pumilum* (G. Forst.) Hook., *Tapeinia magellanica* (Lam.) Ker Gawl., *Witsenia magellanica* (Lam.) Pers., *Witsenia pumila* (G. Forst.) Vahl
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-1800 m.
Países limítrofes: Argentina.

Tigridia

***Tigridia philippiana* I.M. Johnst.**

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: TAR, ANT, ATA.

Rango altitudinal: 0-900 m.

JUNCACEAE

Distichia

***Distichia filamentosa* Buchenau**

Sinónimos: *Agapatea filamentosa* Buchenau, nom. nud., *Distichia filamentosa* (Buchenau) Griseb., nom. illeg.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP.

Rango altitudinal: 3500-4700 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Distichia muscoides* Nees & Meyen**

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT.

Rango altitudinal: 3600-4600 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Juncus

***Juncus acuminatus* Michx. var. *multiceps* (Kunze ex Kunth) Barros**

Sinónimos: *Juncus multiceps* Kuntze ex Kunth

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.

Rango altitudinal: 300 m.

***Juncus acutus* L. subsp. *acutus* var. *decompositus* Guss.**

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ANT, COQ.

Rango altitudinal: 600 m.

***Juncus acutus* L. subsp. *leopoldii* (Parl.) Snogerup**

Sinónimos: *Juncus acutus* L. var. *leopoldii* (Parl.)

Buchenau, *Juncus leopoldii* Parl.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LLA.

Rango altitudinal: 900-2400 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Juncus balticus* Willd. subsp. *andicola* (Hook.)**

Snogerup

Sinónimos: *Juncus pictus* Phil., *Juncus andicola* Hook., *Juncus balticus* Willd. var. *pictus* (Phil.) Griseb., *Juncus conceptionis* Steud., *Juncus deserticola* Phil., *Juncus arcticus* Willd. var. *andicola* (Hook.) Balslev

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ANT, ATA, COQ, RME, MAU, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 0-4100 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Nombre vulgar: Hunquillo.

***Juncus balticus* Willd. subsp. *mexicanus* (Willd. ex Roem. & Schult.) Kirschner**

Sinónimos: *Juncus balticus* Willd. var. *crassiculmis* Buchenau ex Griseb., *Juncus balticus* Willd. var. *mexicanus* (Willd.) Kuntze, *Juncus mexicanus* Willd. ex Schult. & Schult. f., *Juncus crassiculmis* (Buchenau) Herter, *Juncus balticus* Willd. var. *columnaris* Buchenau, *Juncus arcticus* Willd. var. *mexicanus* (Willd. ex Roem. & Schult.) Balslev

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-3900 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

***Juncus bufonius* L.**

Sinónimos: *Juncus bufonius* L. var. *genuinus* Cout., nom. illeg., *Juncus bufonius* L. var. *pumilio* Griseb.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.

Rango altitudinal: 0-4100 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nota: Introducida en el Archipiélago de Juan Fernández.

***Juncus bulbosus* L.**

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: LLA.

***Juncus capillaceus* Lam.**

Sinónimos: *Juncus capillaceus* Lam. var. *montevidensis* Buchenau, *Juncus tenuifolius* Steud.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL, LBO, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE.

Rango altitudinal: 0-3500 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Juncus capitatus* Weigel**

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.

Rango altitudinal: 40-220 m.

***Juncus cyperoides* Laharpe**

Sinónimos: *Juncus graminifolius* E. Mey., *Juncus rivularis* Poepp. ex Steud.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-3600 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Juncus dichotomus* Elliot**

Sinónimos: *Juncus cognatus* Kunth, *Juncus tenuis* A. Gray, hom. illeg., *Juncus tenuis* Willd. var. *dichotomus* (Elliott) Wood

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 0-2500 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

***Juncus diemii* Barros**

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: LLA.

Países limítrofes: Argentina.

Juncus effusus* L. var. *effusus

Sinónimos: *Juncus bogotensis* Kunth, *Juncus leersii* auct. non T. Marsson

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 0-3700 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Juncus effusus* L. var. *subglomeratus* DC.**

Sinónimos: *Juncus effusus* L. var. *compactus* Lej. & Courtois

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: LLA, AIS.

Rango altitudinal: 0-100 m.

***Juncus ernesti-barrosii* Barros**

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: BIO.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Juncus filiformis* L.**

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: VAL, RME, MAU.

Rango altitudinal: 90-900 m.

***Juncus homalocaulis* F. Muell. ex Benth.**

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: IPA.

***Juncus imbricatus* Laharpe**

Sinónimos: *Juncus capillaceus* Lam. var. *chilensis* Buchenau, *Juncus chamissonis* Kunth, *Juncus imbricatus* Laharpe var. *chamissonis* (Kunth) Buchenau, *Juncus imbricatus* Laharpe var. *lechleri* (Steud.) Buchenau, *Juncus lechleri* Steud., *Juncus spanianthus* Steud., *Juncus collinus* Steud., *Juncus multiflorus* Bertero ex Steud., *Juncus urvillei* Steud., *Juncus chamissonis* Kunth fma. *pusillus* Buchenau Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE.

Rango altitudinal: 0-3800 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Juncus involucratus* Steud. ex Buchenau**

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAU, BIO, LLA, AIS.

Países limítrofes: Argentina.

Juncus kraussii* Hochst. subsp. *austerus

(Buchenau) Snogerup

Sinónimos: *Juncus austerus* Buchenau

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: LLA.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Juncus llanquihuensis* Barros**

Sinónimos: *Juncus mendocinus* Barros

Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: LLA.
Rango altitudinal: 0-1000 m.
Países limítrofes: Argentina.

***Juncus microcephalus* Kunth**

Sinónimos: *Juncus floribundus* Kunth, *Juncus luzuloxiphium* Griseb., *Juncus microcephalus* Kunth var. *floribundus* (Kunth) Kunth, *Juncus microcephalus* Kunth var. *intermedius* Kunth, *Juncus microcephalus* Kunth var. *typicus* Buchenau, nom. illeg., *Juncus microcephalus* Kunth var. *virens* Griseb., *Juncus sellowianus* Kunth, *Juncus microcephalus* Kunth fma. *conglobatus* Barros, *Juncus timotensis* Barros, *Juncus floribundus* Phil., nom. illeg., *Juncus rufus* Kunth Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-3000 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Juncus pallescens* Lam.**

Sinónimos: *Juncus dombeyanus* J. Gay ex Laharpe, *Juncus dombeyanus* J. Gay ex Laharpe var. *elatus* Buchenau, *Juncus dombeyanus* J. Gay ex Laharpe var. *pycnanthus* Buchenau, *Juncus dombeyanus* J. Gay ex Laharpe var. *typicus* Buchenau, nom. illeg., *Juncus commixtus* Steud., *Juncus proximus* Steud., *Juncus fernandezianus* Steud., *Juncus longifolius* Steud., *Juncus megakoleos* Steud.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, JFE.
Rango altitudinal: 0-2000 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.
Nombre vulgar: Hierba de la vaca.

***Juncus planifolius* R. Br.**

Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, JFE.
Rango altitudinal: 10-1300 m.

***Juncus procerus* E. Mey.**

Sinónimos: *Juncus valdiviae* Steud.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.
Rango altitudinal: 0-1100 m.

Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Junquillo.

***Juncus scheuchzerioides* Gaudich.**

Sinónimos: *Juncus capillaceus* Hook., hom. illeg., *Juncus exiguum* Gaudich. ex Hook. f., *Juncus inconspicuum* d'Urv., *Juncus pusillus* auct. non Buchenau, *Juncus scheuchzerioides* Gaudich. var. *inconspicuum* (d'Urv.) Hook.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, LRI, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-2100 m.
Países limítrofes: Argentina.

***Juncus stipulatus* Nees & Meyen**

Sinónimos: *Juncus chilensis* Gay, *Juncus corralensis* Phil., *Juncus depauperatus* Phil., *Juncus gayanus* Steud., *Juncus mandonii* Buchenau, *Juncus microcephalus* Kunth var. *pustulus* E. Mey., *Juncus oliganthus* Phil., *Juncus stipulatus* Nees & Meyen var. *corralensis* (Phil.) Buchenau, *Juncus biflorus* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 2000-4500 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Juncus tenuis* Willd. var. *congestus* Engelm. ex Buchenau**

Sinónimos: *Juncus occidentalis* Wiegand, *Juncus tenuis* Willd. var. *occidentalis* (Wiegand) Coville
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: RME, MAU.
Rango altitudinal: 2050 m.
Países limítrofes: Argentina.

Juncus tenuis* Willd. var. *tenuis

Sinónimos: *Juncus smithii* Kunth, *Juncus subtenuis* Herter, *Juncus tenuis* Willd. var. *multicornis* E. Mey., *Juncus tenuis* Willd. var. *williamsii* Fernald
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: VAL, MAU, BIO, LLA.
Rango altitudinal: 0-3000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Luzula

***Luzula alopecurus* Desv.**

Sinónimos: *Juncodes alopecurus* (Desv.) Kuntze, *Juncoides alopecurus* (Desv.) Macloskie, *Luzula villosa* Wikstr.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ARA, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-1600 m.
Países limítrofes: Argentina.

***Luzula antarctica* Hook. f.**

Sinónimos: *Juncodes antarcticus* (Hook. f.) Kuntze, *Juncoides antarcticum* (Hook. f.) Macloskie
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAG.
Rango altitudinal: 300-1000 m.
Países limítrofes: Argentina.

***Luzula brachyphylla* Phil.**

Sinónimos: *Luzula racemosa* Desv. fma. *brachyphylla* (Phil.) Fuentes, *Luzula correae* Barros
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AIS, MAG.
Rango altitudinal: 480-1400 m.
Países limítrofes: Argentina.

***Luzula campestris* (L.) DC.**

Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: MAU, BIO, LLA, MAG.
Rango altitudinal: 30-280 m.

***Luzula chilensis* Nees & Meyen ex Kunth**

Sinónimos: *Luzula rigida* Phil., *Juncodes chilense* (Nees & Meyen ex Kunth) Kuntze, *Luzula chilensis* Nees & Meyen ex Kunth fma. *rigida* (Phil.) Fuentes
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 400-3300 m.
Países limítrofes: Argentina.

***Luzula excelsa* Buchenau**

Sinónimos: *Juncodes excelsum* (Buchenau) Kuntze, *Luzula hieronymi* Buchenau & Griseb.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAU, ARA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 1000-3500 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Luzula leiboldii* Buchenau**

Sinónimos: *Juncodes leiboldii* (Buchenau) Kuntze
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: VAL, RME, MAU, BIO.
Rango altitudinal: 100-1200 m.
Países limítrofes: Argentina.

***Luzula masafuerana* Skottsb.**

Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: JFE.
Rango altitudinal: 900-1400 m.

***Luzula parvula* Barros**

Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: RME.
Rango altitudinal: 3300-3400 m.
Países limítrofes: Argentina.

***Luzula racemosa* Desv.**

Sinónimos: *Juncodes racemosum* (Desv.) Kuntze, *Luzula racemosa* Desv. var. *typica* Buchenau, *Luzula racemosa* Desv. var. *humilis* (Buchenau) Buchenau
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 1500-4700 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Luzula tristachya* Desv.**

Sinónimos: *Luzula campestris* (L.) DC. var. *tristachya* (Desv.) Buchenau, *Luzula pauciflora* Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ, VAL, BIO, ARA, LLA.
Rango altitudinal: 100-600 m.

Marsippospermum

***Marsippospermum grandiflorum* (L. f.) Hook. f.**

Sinónimos: *Juncus grandiflorus* L. f., *Marsippospermum calyculatum* Desv., hom. illeg., *Rostkovia grandiflora* (L. f.) Hook. f.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: NUB, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-1000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Marsippospermum philippii (Buchenau) Hauman
Sinónimos: *Marsippospermum grandiflorum* (L. f.) Hook. f. var. *philippii* Buchenau, *Rostkovia gracilis* Phil., hom. illeg., *Rostkovia grandiflora* (L. f.) Hook. f. var. *philippii* (Buchenau) Hosseus
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 1500-2500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Marsippospermum reichei Buchenau
Sinónimos: *Rostkovia reichei* (Buchenau) Hosseus
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 500-1100 m.
Países limítrofes: Argentina.

Oxychloë

Oxychloë andina Phil.
Sinónimos: *Distichia andina* (Phil.) Benth. & Hook.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, RME.
Rango altitudinal: 3200-4500 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Oxychloë bisexualis Kuntze
Sinónimos: *Andesia bisexualis* (Kuntze) Hauman
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ, VAL, RME.
Rango altitudinal: 2800-4400 m.
Países limítrofes: Argentina.

Oxychloë haumaniana (Barros) Barros
Sinónimos: *Andesia haumaniana* Barros
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ATA, COQ.
Rango altitudinal: 3500-4500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Patosia

Patosia clandestina (Phil.) Buchenau
Sinónimos: *Oxychloë clandestina* (Phil.) Hauman, *Rostkovia clandestina* Phil., *Rostkovia brevifolia* Phil., *Oxychloë brevifolia* (Phil.) Buchenau, *Distichia clandestina* (Phil.) Buchenau

Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, MAU, NUB, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 2700-4500 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Rostkovia

Rostkovia magellanica (Lam.) Hook. f.
Sinónimos: *Juncus magellanicus* Lam., *Rostkovia sphaerocarpa* Desv.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: LRI, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-1500 m.
Países limítrofes: Argentina.

JUNCAGINACEAE

Lilaea

Lilaea scilloides (Poir.) Hauman
Sinónimos: *Lilaea subulata* Humb. & Bonpl., *Phalangium scilloides* Poir.
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: RME, MAU, ARA, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-4100 m.
Países limítrofes: Argentina y Perú.

Tetroncium

Tetroncium magellanicum Willd.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ARA, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-1300 m.
Países limítrofes: Argentina.

Triglochin

Triglochin concinna Burtt Davy
Sinónimos: *Triglochin maritima* L. var. *altoandina* Cabrera, *Triglochin maritima* L. var. *deserticola* Phil., *Triglochin maritima* L., *Triglochin monanthos* Speg.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: TAR, ANT, ATA, VAL, MAG.
Rango altitudinal: 5-4200 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Triglochin palustris* L.**

Sinónimos: *Triglochin fonticola* Phil., *Triglochin andinum* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ANT, ATA, COQ, RME, MAU, LLA, MAG.

Rango altitudinal: 10-3900 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Triglochin striata* Ruiz & Pav.**

Sinónimos: *Triglochin montevidensis* Spreng, *Triglochin striata* Ruiz & Pav. var. *filifolia* Buchenau, *Triglochin striata* Ruiz & Pav. var. *montevidensis* (Spreng.) Buchenau, *Triglochin lechleri* Steud., *Triglochin litoreum* Phil., *Triglochin volckmanni* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 1-700 m.

Países limítrofes: Argentina.

LUZURIAGACEAE

Luzuriaga

***Luzuriaga marginata* (Gaertn.) Benth.**

Sinónimos: *Callixene marginata* (Gaertn.) Lam., *Enargea marginata* Gaertn., *Callixene magellanicum* Raeusch.

Subarbusto. Nativo.

Distribución: LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-400 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Luzuriaga polypylla* (Hook.) J.F. Macbr.**

Sinónimos: *Callixene polypylla* Hook., *Luzuriaga erecta* Kunth, *Enargea polypylla* (Hook.) F. Muell.

Subarbusto trepador. Endémico.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-800 m.

Nombre vulgar: Quilineja.

***Luzuriaga radicans* Ruiz & Pav.**

Sinónimos: *Callixene radicans* (Ruiz & Pav.) Macloskie, *Enargea radicans* (Ruiz & Pav.) F. Muell.

Subarbusto trepador. Nativo.

Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 0-1200 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Quilineja.

ORCHIDACEAE

Bipinnula

***Bipinnula fimbriata* (Poepp.) I.M. Johnst.**

Sinónimos: *Chloraea fimbriata* Poepp., *Bipinnula mystacina* Lindl., *Jouyella fimbriata* (Poepp.) Szlach. & Marg.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 5-500 m.

***Bipinnula gabriel* P.A. Bravo & G.M. Baeza**

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: MAU.

Rango altitudinal: 45 m.

***Bipinnula plumosa* Lindl.**

Sinónimos: *Bipinnula philipporum* Kraenzl., *Bipinnula plumosa* Lindl. var. *philipporum* (Krzl) Reiche, *Jouyella philipporum* (Kraenzl.) Szlach. & Marg., *Jouyella plumosa* (Lindl.) Szlach. & Marg.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO.

Rango altitudinal: 580-1900 m.

***Bipinnula taltalensis* I.M. Johnst.**

Sinónimos: *Jouyella taltalensis* (I.M.Johnst.) Szlach. & Marg.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ANT.

Rango altitudinal: 450-600 m.

***Bipinnula volkmannii* Kraenzl.**

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 800-1300 m.

Brachystele

***Brachystele unilateralis* (Poir.) Schltr.**

Sinónimos: *Ophrys unilateralis* Poir., *Gyrostachys chilensis* (A. Rich.) Kuntze, *Gyrostachys unilateralis* (Poir.) Kuntze, *Spiranthes chilensis* A. Rich., *Spiranthes diuretica* Lindl., *Neottia diuretica* Willd., *Sarcoglossa diuretica* (Willd.) W.H. Baxter, *Epipactis diuretica* (Willd.) Stokes, *Spiranthes nivalis* A. Rich., *Odontorrhynchus chilensis* (A. Rich.) Garay, *Odontorrhynchus domeykoanus* Szlach., *Odontorrhynchus erosus* Szlach., *Odontorrhynchus variabilis* Garay

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 5-1250 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Nuil.

Chloraea

***Chloraea alpina* Poepp.**

Sinónimos: *Asarca alpina* (Poepp.) Kuntze, *Chloraea hookeriana* Speg. & Kraenzl., *Chloraea ferruginea* Speg. & Kraenzl., *Chloraea xerophila* Kraenzl., *Chloraea perez-moreauae* Garay, *Chloraea cholilensis* Speg. & Kraenzl.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, AIS.

Rango altitudinal: 200-2600 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Tulipán del monte.

***Chloraea barbata* Lindl.**

Sinónimos: *Asarca barbata* (Lindl.) Kuntze, *Chloraea aurea* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL, RME, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 100-220 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Chloraea bidentata* (Poepp. & Endl.) M.N. Correa**

Sinónimos: *Asarca bidentata* Poepp. & Endl., *Chloraea bicallosa* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 1220-1250 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Chloraea bletioides* Lindl.**

Sinónimos: *Chloraea ulanthoides* Lindl., *Asarca bletioides* (Lindl.) Kuntze, *Chloraea grandis* Kraenzl., *Chloraea affinis* Lindl., *Asarca affinis* (Lindl.) Kuntze, *Chloraea ulanthoides* Lindl. var *affinis* (Lindl.) Reiche, *Chloraea ulanthoides* Lindl. var *grandis* (Kraenzl.) Reiche, *Chloraea lindleyi* Poepp.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB.

Rango altitudinal: 35-2000 m.

Nombre vulgar: Lengua de loro.

***Chloraea chrysanthia* Poepp.**

Sinónimos: *Asarca chrysanthia* (Poepp.) Kuntze, *Asarca aurantiaca* Lindl., *Chloraea crocata* Phil., *Chloraea aurantiaca* Lindl., *Asarca speciosa* Lindl.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 50-1500 m.

Nombre vulgar: Pico de loro.

***Chloraea chrysochlora* Phil.**

Sinónimos: *Asarca chrysochlora* (Phil.) Kuntze, *Chloraea collicensis* Kraenzl., *Chloraea hemichlora* Kraenzl., *Asarca lechleri* (Lindl. ex Kraenzl.) Kunze, *Chloraea lechleri* Lindl. ex Kraenzl.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: BIO, ARA, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 60-1460 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Chloraea crispa* Lindl.**

Sinónimos: *Asarca crispa* (Lindl.) Kuntze, *Chloraea cygnea* Phil., *Asarca cygnea* (Phil.) Kuntze, *Chloraea spectabilis* Phil., *Asarca conspicua* Kuntze

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.

Rango altitudinal: 10-1050 m.

Nombre vulgar: Gavilú, pico de loro.

***Chloraea cristata* Lindl.**

Sinónimos: *Chloraea pogonata* Phil., *Asarca pogonata* (Phil.) Kuntze

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL.

Rango altitudinal: 15-285 m.

***Chloraea cuneata* Lindl.**

Sinónimos: *Asarca cuneata* (Lindl.) Kuntze, *Asarca obovata* (Phil.) Kuntze, *Chloraea obovata* Phil., *Chloraea nervosa* Phil. ex Kraenzl.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: BIO, ARA, LRI.

Rango altitudinal: 50-800 m.

***Chloraea disoides* Lindl.**

Sinónimos: *Chileorchis disoides* (Lindl.) Szlach., *Asarca disoides* (Lindl.) Kuntze, *Chloraea picta* Phil. ex Kraenzl., *Chloraea disoides* Lindl. var. *picta* (Phil. ex Kraenzl.) M.N. Correa

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 35-2540 m.

***Chloraea galeata* Lindl.**

Sinónimos: *Asarca galeata* (Lindl.) Kuntze, *Asarca maculosa* Poepp., *Chloraea alaris* Lindl., *Chloraea secunda* Phil., *Chloraea suaveolens* Phil., *Asarca maculata* Steud., *Chloraea besseri* Rchb.f., *Chloraea berteroana* Kraenzl., *Asarca besseri* (Rchb.f.) Kuntze, *Chloraea rypaloglossa* A. Rich., *Asarca rhypaloglossa* (A. Rich.) Kuntze

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 20-1600 m.

***Chloraea gaudichaudii* Brongn.**

Sinónimos: *Asarca gaudichaudii* (Brongn.) Kuntze, *Arethusa lutea* Gaud., *Epipactis lutea* (Gaudich.) Steud., *Chloraea fonki* Phil. orth. mut., *Asarca fonckii* (Phil.) Kuntze orth. mut., *Chloraea inconspicua* Phil., *Asarca inconspicua* (Phil.) Kuntze, *Chloraea falklandica* Kraenzl., *Chloraea gymnoglossa* Phil., *Asarca gymnoglossa* (Phil.) Kuntze

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 10-1500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Chloraea gavilu* Lindl.**

Sinónimos: *Limodorum luteum* Lam., *Chloraea sceptrum* Rchb.f., *Epidendrum luteum* (Lam.) Poir.,

Chloraea lutea (Wild.) Schltr., nom. illeg., *Chloraea lindleyi* Poepp., *Chloraea semitensis* Phil. ex Kraenzl., *Chloraea lotensis* Rolfe, *Cymbidium luteum* (Lam.) Willd.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.

Rango altitudinal: 10-1350 m.

***Chloraea heteroglossa* Rchb.f.**

Sinónimos: *Asarca heteroglossa* (Rchb.f.) Kuntze

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: VAL.

Rango altitudinal: 2-280 m.

***Chloraea lamellata* Lindl.**

Sinónimos: *Asarca lamellata* (Lindl.) Kuntze, *Chloraea decipiens* Poepp., *Chloraea semibarbata* Lindl., *Asarca semibarbata* (Lindl.) Kuntze, *Chloraea semibarbata* Lindl. ssp. *pearcei* Kraenzl., *Chloraea pearcei* Phil., *Asarca pearcei* (Phil.) Kuntze

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: LBO, NUB, BIO, ARA, LRI.

Rango altitudinal: 50-400 m.

***Chloraea longipetala* Lindl.**

Sinónimos: *Asarca longipetala* (Lindl.) Kuntze, *Chloraea panduraformis* Phil., *Chloraea multilamellata* Phil. ex Kraenzl., *Chloraea liliaceae* Kraenzl., *Chloraea reicheana* Kraenzl.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.

Rango altitudinal: 20-1090 m.

***Chloraea magellanica* Hook. f.**

Sinónimos: *Asarca magellanica* (Hook.f.) Kuntze, *Chloraea bouganvilleana* Franch., *Chloraea spegazziniana* Kraenzl., *Chloraea hystrix* Speg. & Kraenzl., *Chloraea leontoglossa* Kraenzl. & Speg., *Chloraea kraenzliniana* Hoehne

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 10-1950 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Chloraea multiflora* Lindl.**

Sinónimos: *Asarca multiflora* (Lindl.) Kuntze, *Chloraea densa* Rich., *Chloraea campestris* Poepp., *Chloraea*

stenantha Kraenzl., *Asarca densa* (A. Rich.) Kuntze, *Chloraea poeppigiana* A. Rich., *Asarca poeppigiana* (A. Rich.) Kuntze, *Chloraea pseudo-campestris* Kraenzl., *Chloraea decipiens* Poepp. Hierba. Perenne. Endémica. Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA. Rango altitudinal: 25-1200 m. Nombre vulgar: Gavilú.

Chloraea nudilabia Poepp.
Sinónimos: *Asarca nudilabia* (Poepp.) Kuntze, *Chloraea leucojiflora* Kraenzl., *Chloraea heteroglossa* Rchb.f., *Chloraea homopetala* Phil. Hierba. Perenne. Endémica. Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA. Rango altitudinal: 125-2000 m.

Chloraea parviflora (Poepp.) Mouragues & Novoa
Sinónimos: *Asarca parviflora* Poepp. *Chloraea reflexa* Phil., *Chloraea reflexa* Phil. var. *latifolia* Phil., *Asarca reflexa* (Phil.) Kuntze
Hierba. Perenne. Endémica. Distribución: MAU, BIO. Rango altitudinal: 125-800 m.

Chloraea philippii Rchb.f.
Sinónimos: *Asarca philippii* (Rchb.f.) Kuntze, *Chloraea lagunae-pacis* Kraenzl., *Chloraea lineata* Phil. ex Kraenzl., *Chloraea modesta* Phil. ex Kraenzl.
Hierba. Perenne. Nativa. Distribución: BIO, ARA, LLA, AIS. Rango altitudinal: 20-175 m. Países limítrofes: Argentina.

Chloraea prodigiosa Rchb.f.
Sinónimos: *Asarca prodigiosa* (Rchb.f.) Kuntze, *Chloraea calopogon* Phil., *Asarca calopogon* (Phil.) Kuntze, *Chloraea dasypogon* Phil., *Asarca dasypogon* (Phil.) Kuntze
Hierba. Perenne. Endémica. Distribución: RME, LBO, MAU. Rango altitudinal: 25-1000 m.

Chloraea speciosa Poepp.
Sinónimos: *Chloraea gayana* Rich., *Asarca gayana* (A. Rich.) Kuntze, *Chloraea elwelsii* Rolfe, *Chloraea*

speciosa Poepp. fma. *sterilis* Kraenzl., *Asarca insignis* Kuntze, comb. illeg. Hierba. Perenne. Nativa. Distribución: BIO, ARA, LLA. Rango altitudinal: 60-1200 m. Países limítrofes: Argentina.

Chloraea virescens (Willd.) Lindl.

Sinónimos: *Asarca patagonica* (Phil.) Kuntze, *Chloraea patagonica* Phil., *Chloraea pigichen* Kuntze, *Chloraea piquichen* Lindl., *Chloraea pleistodactyla* Kraenzl. & Speg., *Cymbidium virescens* Willd., *Chloraea incisa* Poepp., *Chloraea odontoglossa* A. Rich., *Chloraea unguis-cati* Rchb.f., *Chloraea chlorosticta* Phil., *Asarca chlorosticta* (Phil.) Kuntze, *Asarca odontoglossa* (A. Rich.) Kuntze, *Asarca unguis-cati* (Rchb.f.) Kuntze, *Asarca incisa* (Poepp.) Kuntze, *Asarca fimbriata* (Phil.) Kuntze, *Chloraea fimbriata* Phil., nom. illeg. Hierba. Perenne. Nativa. Distribución: BIO, ARA, LRI, LLA. Rango altitudinal: 5-1500 m. Países limítrofes: Argentina. Nombre vulgar: Piquichén, pichiquén.

Chloraea viridiflora Poepp.

Sinónimos: *Asarca viridiflora* (Poepp.) Kuntze, *Chloraea verrucosa* Phil., *Chloraea piquichen* (Lam.) Lindl., *Chloraea viridiflora* Poepp. var. *reticulata* Reiche, *Chloraea robusta* Rolfe, *Chloraea leontoglossa* Kraenzl., nom. illeg., *Asarca tuberculata* Kuntze
Hierba. Perenne. Nativa. Distribución: MAU, NUB, BIO. Rango altitudinal: 1720-2250 m. Países limítrofes: Argentina.

Chloraea volkmannii Phil. ex Kraenzl.

Sinónimos: *Chloraea lineata* Phil. ex Kraenzl.
Hierba. Perenne. Endémica. Distribución: BIO, ARA. Rango altitudinal: 190 m.

Codonorchis

Codonorchis lessonii (Brongn.) Lindl.

Sinónimos: *Epipactis lessonii* d'Urv., *Calopogon lessonii* (d'Urv.) Brong., *Pogonia lessonii* (D'Urv.) Rchb.f., *Pogonia tetraphylla* Poepp. & Endl., *Codonorchis tetraphylla* (Poepp. & Endl.) L.O.Williams, *Codonorchis*

poeppigii Lindl., *Pogonia lessonii* (D'Urv.) Rchb.f. var. *poeppigii* Reiche, *Codonorchis lessonii* (Brong.) Lindl. var. *poeppigii* (Lindl.) Reiche, *Codonorchis skottsbergii* Kraenzl., *Pogonia lessonii* (D'Urv.) Rchb.f. var. *skottsbergii* Reiche, *Codonorchis lessonii* (Brong.) Lindl. var. *skottsbergii* (Kraenzl.) Reiche Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 10-2000 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Palomita, azucena.

Correorchis

Correorchis cylindrostachya (Poepp.) Szlach.
Sinónimos: *Chloraea cylindrostachya* Poepp., *Asarca cylindrostachya* (Poepp.) Kuntze, *Chloraea papillosa* Phil., *Chloraea major* Ravenna, *Chloraea leptopetala* Reiche
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, AIS.
Rango altitudinal: 176-2150 m.
Países limítrofes: Argentina.

Gavilea

Gavilea araucana (Phil.) M.N. Correa
Sinónimos: *Asarca araucana* Phil., *Asarca araucana* Phil. var. *incisa* Hauman, *Gavilea araucana* (Phil.) M.N. Correa var. *incisa* Hauman
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: VAL, RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 10-1800 m.
Países limítrofes: Argentina.

Gavilea australis (Skottsb.) M.N. Correa
Sinónimos: *Asarca australis* Skottsb., *Asarca enigmatica* Hauman
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AIS, MAG.
Rango altitudinal: 15-150 m.
Países limítrofes: Argentina.

Gavilea cardioglossa (Reiche) Martic.

Sinónimos: *Gavilea cardioglossa* (Reiche) M.N. Correa, comb. illeg., *Asarca cardioglossa* Reiche
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ARA, LRI, LLA.
Rango altitudinal: 85-800 m.

Gavilea chica (Speg. & Kraenzl.) Chemisquy
Sinónimos: *Chloraea chica* Speg. & Kraenzl., *Chloraea kruegeri* F. Phil. ex Kraenzl.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 20-2560 m.
Países limítrofes: Argentina.

Gavilea gladyssiae Chemisquy
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAG.
Rango altitudinal: 10-100 m.
Países limítrofes: Argentina.

Gavilea glandulifera (Poepp.) M.N. Correa
Sinónimos: *Asarca appendiculata* Phil. ex Kraenzl., *Asarca glandulifera* Poepp., *Chloraea albo-rosea* Kraenzl. & Speg., *Chloraea volucris* Lindl., *Gavilea auriculata* Ravenna
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 155-1600 m.
Países limítrofes: Argentina.

Gavilea insularis M.N. Correa
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: JFE.

Gavilea kingii (Hook. f.) M.N. Correa
Sinónimos: *Asarca kingii* Hook.f., *Chloraea kingii* Macloskie
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: MAG.
Rango altitudinal: 18-20 m.

Gavilea litoralis (Phil.) M.N. Correa
Sinónimos: *Chloraea litoralis* Phil., *Asarca litoralis* (Phil.) Kunze, *Asarca litoralis* (Phil.) Reiche, *Asarca*

macroptera Kraenzl., *Gavilea macroptera* (Kraenzl.) M. N. Correa
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 5-370 m.
Países limítrofes: Argentina.

***Gavilea longibracteata* (Lindl.) Sparre ex L.E. Navas**

Sinónimos: *Chloraea longibracteata* Lindl., *Asarca longibracteata* (Lind.) Kuntze, *Asarca sinuata* Lindl., *Asarca longibracteata* (Lindl.) Skottsb., comb. illeg., *Asarca berteri* Rchb.f., *Asarca verrucosa* A. Rich. ex Gay, *Asarca spectabilis* Phil., *Chloraea semibarbata* Lindl. ssp. *spectabilis*
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 15-2700 m.

***Gavilea lutea* (Pers.) M.N. Correa**

Sinónimos: *Serapias lutea* Comm. ex Pers., *Asarca lutea* (Comm. ex Pers.) Kuntze, *Asarca lutea* (Comm. ex Pers.) Skottsb., comb. illeg., *Chloraea lutea* (Comm. ex Pers.) Skottsb., *Chloraea commersonii* Brongn., nom. illeg., *Asarca commersonii* (Brongn.) Hook. f., comb. illeg., *Asarca commersonii* (Brongn.) Kuntze, comb. illeg., *Gavilea acutiflora* Poepp., *Asarca acutiflora* (Poepp.) Poepp. & Endl., *Asarca brachychila* Phil., *Asarca thermarum* Phil. ex Kraenzl., *Asarca tenuiflora* Rolfe, *Asarca acutifolia* Steud.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 10-2000 m.
Países limítrofes: Argentina.

***Gavilea odoratissima* Poepp.**

Sinónimos: *Asarca odoratissima* Poepp. & Endl., *Chloraea odoratissima* (Poepp. & Endl.) Macloskie, *Asarca chrysostachya* Phil., *Asarca platyantha* Kraenzl. auct. non Rchb.f., *Asarca sulphurea* Phil., *Asarca ventanai* Hauman
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.
Rango altitudinal: 150-1460 m.
Países limítrofes: Argentina.

***Gavilea platyantha* (Rchb.f.) Ormd.**

Sinónimos: *Asarca platyantha* Rchb.f., *Asarca glandulifera* Poepp. var. *illapelina* Reiche, *Gavilea glandulifera* (Poepp.) M.N. Correa var. *illapelina* (Reiche) Novoa, J. Espejo, Cisternas, M. Rubio y Domínguez, comb. illeg.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ, VAL.
Rango altitudinal: 300-515 m.
Países limítrofes: Argentina.

***Gavilea supralabellata* M.N. Correa**

Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AIS, MAG.
Rango altitudinal: 95 m.
Países limítrofes: Argentina.

***Gavilea trullata* Ormd.**

Sinónimos: *Asarca cardioglossa* Reiche var. *patagonica* Garay, *Gavilea cardioglossa* (Reiche) Martic. var. *patagonica* (Garay) M.N. Correa
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: LLA.
Países limítrofes: Argentina.

***Gavilea venosa* (Lam.) Garay & Ormd.**

Sinónimos: *Limodorum venosum* Lam., *Gavilea leucantha* Poepp. & Endl., nom. illeg., *Asarca leucantha* Poepp. & Endl., comb. illeg., *Gavilea feuilleana* (Kraenzl.) Lehnebach, *Asarca feuilleana* Kraenzl.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.
Rango altitudinal: 10-1200 m.

***Gavilea wittei* (Hicken) Ormd.**

Sinónimos: *Asarca patagonica* Skottsb., hom. illeg., *Chloraea wittei* Hicken, *Gavilea patagonica* (Skottsb.) M.N. Correa
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AIS, MAG.
Países limítrofes: Argentina.

Habenaria

***Habenaria pumila* Poepp.**

Sinónimos: *Habenaria paucifolia* Lindl., *Habenaria germainii* Phil., *Habenaria uliginosa* Phil., hom. illeg., *Habenaria brachyceros* Phil., nom. illeg.
Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.
Rango altitudinal: 10-980 m.
Países limítrofes: Argentina.

Myrosmodes

Myrosmodes nervosa (Kraenzl.) Novoa, C. Vargas & Cisternas

Sinónimos: *Aa nervosa* (Kraenzl.) Schltr., *Altensteinia nervosa* Kraenzl.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: AYP, TAR, ANT.
Rango altitudinal: 3700-4420 m.

Ulantha

Ulantha apinnula (Gosewijn) Szlach.

Sinónimos: *Chloraea apinnula* (Gosewijn) Szlach.,

Bipinnula apinnula Gosewijn

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: MAU.

Rango altitudinal: 1700 m.

Ulantha grandiflora (Poepp.) Szlach.

Sinónimos: *Asarca grandiflora* (Poepp.) Kuntze,
Chloraea grandiflora Poepp.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 1000-1720 m.

PHILESIACEAE

Lapageria

Lapageria rosea Ruiz & Pav.

Arbusto trepador. Endémico.

Distribución: COQ, VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 0-400 m.

Nombre vulgar: Copihue.

Philesia

Philesia magellanica J.F. Gmel.

Sinónimos: *Philesia buxifolia* Lam.

Arbusto trepador. Nativo.

Distribución: LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-100 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Coicopihue.

POACEAE

Agropyron

Agropyron cristatum (L.) Gaertn.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: MAG.

Agrostis

Agrostis arvensis Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: BIO, LLA.

Rango altitudinal: 10-420 m.

Agrostis brachyathera Steud.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAU, NUB, BIO, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 300-2200 m.

Países limítrofes: Argentina.

Agrostis breviculmis Hitchc.

Sinónimos: *Agrostis nana* (J. Presl) Kunth, *Trichodium nanum* J. Presl

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: RME, MAU, BIO.

Rango altitudinal: 820-2800 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Agrostis capillaris L.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: COQ, VAL, RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Agrostis castellana Boiss. & Reut.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

***Agrostis gigantea* Roth**

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Agrostis glabra* (J. Presl) Kunth var. *glabra

Sinónimos: *Trichodium glabrum* J. Presl, *Agrostis gayana* E. Desv., *Agrostis andina* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, MAG.

Rango altitudinal: 170-3500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Agrostis glabra* (J. Presl) Kunth var. *melanthes

(Phil.) Rúgolo & De Paula

Sinónimos: *Agrostis melanthes* Pilg., *Calamagrostis laxiflora* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: BIO, ARA, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 45-2070 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Agrostis idahoensis* Nash**

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAU, NUB, LRI, LLA, MAG.

Rango altitudinal: 10-2200 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nota: Especie de distribución disyunta en Norte y Sudamérica.

***Agrostis inconnspicua* Kunze ex E. Desv.**

Sinónimos: *Agrostis airiformis* Steud. (*A. airaeformis*), *Agrostis airoides* Franch.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 10-2250 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Agrostis insularis* Rúgolo & A.M. Molina**

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: LLA.

Rango altitudinal: 25-30 m.

***Agrostis leptotricha* E. Desv.**

Sinónimos: *Agrostis lechleri* Steud.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 5-2300 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Agrostis masafuerana* Pilg.**

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: JFE.

Rango altitudinal: 880-1350 m.

***Agrostis mertensii* Trin.**

Sinónimos: *Agrostis williamsii* Phil., *Agrostis poeppigiana* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 15-2200 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Agrostis meyenii* Trin.**

Sinónimos: *Agrostis conferta* Nees & Meyen

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 15-3200 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

***Agrostis perennans* (Walter) Tuck.**

Sinónimos: *Agrostis tenuifolia* M. Bieb. var. *fretensis* Hook.f., *Agrostis flavidula* Steud., *Agrostis aberrans* Steud., *Agrostis violacea* Phil., *Agrostis exarata* Trin. var. *angustifolia* Hack., *Agrostis canina* L. var. *grandiflora* Hack. hom. illeg.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG.

Rango altitudinal: 10-2200 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Agrostis philippiana* Rúgolo & De Paula**

Sinónimos: *Agrostis clausa* Phil. hom. illeg.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: RME, MAU, NUB, BIO, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 10-2070 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Agrostis scabra* Willd.**

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

***Agrostis serranoi* Phil.**

Sinónimos: *Agrostis vaginata* Phil., *Agrostis delfinii* Phil., *Agrostis oligoclada* Phil., *Agrostis fuegiana* Hack., *Agrostis aristata* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 25-2000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Ilusión.

***Agrostis stenophylla* Phil.**

Sinónimos: *Agrostis imberbis* Phil., *Agrostis scotantha* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 175-3200 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Agrostis stolonifera* L. var. *palustris* (Huds.) Farw.**

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: ANT, ATA, VAL, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Agrostis stolonifera* L. var. *stolonifera

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: TAR, ATA, COQ, VAL, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE, IPA.

***Agrostis tolucensis* Kunth**

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR.

Rango altitudinal: 3930-4750 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Agrostis uliginosa* Phil.**

Sinónimos: *Agrostis paucinodis* Hack.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: NUB, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 10-1500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Agrostis umbellata* Colla**

Sinónimos: *Agrostis chilensis* Trin., *Agrostis canina* var. *umbellata* (Colla) Kuntze, *Agrostis glabra* Hochst. ex E. Desv., *Agrostis paradisiaca* Steud., *Agrostis patens* Trin., *Agrostis stricta* Trin.

Hierba. Anual o perenne. Endémica.

Distribución: VAL, RME, LBO, BIO, AIS.

Rango altitudinal: 70-2000 m.

***Agrostis vidalii* Phil.**

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: LLA.

Rango altitudinal: 15-1250 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Agrostis vinealis* Schreb.**

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: COQ.

Aira

***Aira caryophyllea* L.**

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.

***Aira elegantissima* Schur**

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: VAL, ARA.

***Aira praecox* L.**

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: VAL, LLA, AIS, MAG, JFE.

Alopecurus

***Alopecurus aequalis* Sobol.**

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: MAG.

Alopecurus geniculatus* L. var. *geniculatus

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: MAG.

***Alopecurus geniculatus* L. var. *patagonicus* Parodi**

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: AIS, MAG.
Rango altitudinal: 300-550 m.
Países limítrofes: Argentina.

Alopecurus heleochnoides Hack.
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: COQ, RME, MAG.
Rango altitudinal: 25-3000 m.

Alopecurus lechleri Steud.
Sinónimos: *Alopecurus antarcticus* Lechler ex Steud., nom. illeg. como sin. de *Alopecurus lechleri* Steud., *Alopecurus antarcticus* Vahl var. *lechleri* (Steud.) Parodi
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: LRI.
Rango altitudinal: 10-10 m.

Alopecurus magellanicus Lam. var. ***bracteatus***
(Phil.) Mariano
Sinónimos: *Alopecurus bracteatus* Phil., *Alopecurus antarcticus* Vahl var. *bracteatus* (Phil.) Parodi
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: BIO, LRI, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 5-800 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Alopecurus magellanicus Lam. var. ***magellanicus***
Sinónimos: *Alopecurus antarcticus* Vahl, *Alopecurus alpinus* Sm. var. *antarcticus* (Vahl) Macloskie & Dusén, *Alopecurus alpinus* Sm. fma. *antarctica* (Vahl) Hack., *Alopecurus alpinus* Sm. var. *aristatus* Hook fma., nom. nud.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 5-1750 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Alopecurus myosuroides Huds.
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: MAG.

Alopecurus pratensis L.
Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Amelichloa

Amelichloa brachychaeta (Godr.) Arriaga & Barkworth

Sinónimos: *Stipa brachychaeta* Godr., *Nassella brachychaeta* (Godr.) Barkworth, *Achnatherum brachychaetum* (Godr.) Barkworth, *Jarava brachychaeta* (Godr.) Peñail.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, BIO.
Rango altitudinal: 120-120 m.
Países limítrofes: Argentina y Perú.

Amelichloa brevipes (E. Desv.) Arriaga & Barkworth

Sinónimos: *Stipa brevipes* E. Desv., *Jarava brevipes* (E. Desv.) Peñail.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: RME, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 100-3325 m.
Países limítrofes: Argentina.

Amelichloa caudata (Trin.) Arriaga & Barkworth

Sinónimos: *Stipa caudata* Trin., *Achnatherum caudatum* (Trin.) S.W.L. Jacobs & J. Everett, *Jarava caudata* (Trin.) Peñail., *Stipa bertrandii* Phil., *Stipa amphicarpa* Phil., *Stipa litoralis* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 20-950 m.
Países limítrofes: Argentina.

Ammophila

Ammophila arenaria (L.) Link

Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: COQ, VAL, LBO, MAU, ARA, LLA, MAG.

Amphibromus

Amphibromus scabrivalvis (Trin.) Swallen

Sinónimos: *Avena scabrivalvis* Trin., *Bromus holciformis* Steud. & Hochst., *Helictotrichon scabrivalvis* (Trin.) Renvoie
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: VAL, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.
Rango altitudinal: 10-450 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Anatherostipa

Anatherostipa bomanii (Hauman) Peñail.

Sinónimos: *Nicraella bomanii* (Hauman) Torres, *Stipa bomanii* Hauman
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT.
Rango altitudinal: 3750-4550 m.
Países limítrofes: Argentina.

Anatherostipa hans-meyeri (Pilg.) Peñail.

Sinónimos: *Stipa hans-meyeri* Pilg.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP.
Rango altitudinal: 4000-4200 m.
Países limítrofes: Bolivia y Perú.

Anatherostipa mucronata (Griseb.) F. Rojas

Sinónimos: *Piptochaetium mucronatum* Griseb.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: TAR, ANT.
Rango altitudinal: 3500-4500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Anatherostipa rigidiseta (Pilg.) Peñail.

Sinónimos: *Oryzopsis rigidiseta* Pilg.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT.
Rango altitudinal: 3890-4100 m.
Países limítrofes: Bolivia y Perú.

Anatherostipa venusta (Phil.) Peñail.

Sinónimos: *Stipa venusta* Phil., *Nicraella venusta* (Phil.) Torres
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: AYP, TAR, ANT.
Rango altitudinal: 3400-4600 m.
Nombre vulgar: Vizcachera.

Anthoxanthum

Anthoxanthum altissimum (Steud.) Veldkamp

Sinónimos: *Hierochloe altissima* Steud.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 5-780 m.

Nombre vulgar: Paja ratonera.

Anthoxanthum gunckelii (Parodi) Veldkamp

Sinónimos: *Hierochloe gunckelii* Parodi
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: BIO, ARA, LRI, LLA.
Rango altitudinal: 5-280 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Paja ratonera.

Anthoxanthum juncifolium (Hack.) Veldkamp

Sinónimos: *Hierochloe juncifolia* (Hack.) Parodi,
Hierochloe utriculata (Ruiz & Pav.) Kunth var.
juncifolia Hack.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ARA, LRI, LLA, AIS.
Rango altitudinal: 20-1900 m.
Países limítrofes: Argentina.

Anthoxanthum odoratum L.

Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS,
MAG, JFE.

Anthoxanthum pusillum (Hack. ex Dusén)

Veldkamp
Sinónimos: *Hierochloe pusilla* Hack. ex Dusén
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAG.
Rango altitudinal: 100-900 m.
Países limítrofes: Argentina.

Anthoxanthum redolens (Vahl) P. Royen

Sinónimos: *Hierochloe redolens* (Vahl) Roem. et Schult., *Holcus redolens* Vahl, *Avena redolens* (Vahl) Pers., *Melica magellanica* Desr., *Hierochloe antarctica* (Labill.) R. Brown var. *redolens* (Vahl) Brongn., *Hierochloe redolens* (Vahl) Roem. & Schult. var. *magellanica* (Hook.f.) Macloskie, *Hierochloe magellanica* Hook.f., *Hierochloe sorianoi* De Paula Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ, BIO, LRI, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 10-1320 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.
Nombre vulgar: Paja ratonera.

***Anthoxanthum spicatum* (Parodi) Veldkamp**

Sinónimos: *Hierochloe spicata* Parodi

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ARA, MAG.

Rango altitudinal: 950-950 m.

Nombre vulgar: Paja ratonera.

***Anthoxanthum utriculatum* (Ruiz & Pav.) Y.**

Schouten & Veldkamp

Sinónimos: *Hierochloe utriculata* (Ruiz & Pav.) Kunth, *Torresia utriculata* Ruiz & Pav., *Hierochloe utriculata* (Ruiz & Pav.) Kunth var. *minor* Desv.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 2-2500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Paja ratonera.

Apera

***Apera interrupta* (L.) P. Beauv.**

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: RME, ARA.

Aristida

***Aristida adscensionis* L.**

Sinónimos: *Aristida bromoides* Kunth., *Aristida dispersa* var. *nana* Trin. & Rupr., *Aristida festucoides* Steud. & Hoscht., *Aristida nana* Steud., *Chaetaria bromoides* Roem. & Schult., *Chaetaria nana* Nees ex Steud., *Aristida humilis* Kunth, *Aristida adscensionis* L. var. *bromoides* (Kunth) Henrard

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME.

Rango altitudinal: 25-3660 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Aristida pallens* Cav. var. *intermedia* Trin. & Rupr.**

Sinónimos: *Aristida pallens* var. *geminata* Caro

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 0-300 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Coirón.

Aristida pallens* Cav. var. *pallens

Sinónimos: *Aristida glaberrima* Steud., *Aristida pallens* var. *genuina* Trin. & Rupr., *Chetaria pallens* (Cav.) P. Beauv.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 0-300 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Coirón.

***Aristida spegazzinii* Arechav.**

Sinónimos: *Aristida pampeana* Speg., *Aristida spegazzinii* var. *abbreviata* Hack., *Aristida spegazzinii* fma. *colorata* Hack., *Aristida spegazzinii* var. *genuina* Hack., *Aristida spegazzinii* var. *pallescens* Hack.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 65-1700 m.

Países limítrofes: Argentina.

Arrhenatherum

***Arrhenatherum elatius* (L.) P. Beauv. ex J. Presl & C. Presl var. *bulbosum* (Willd.) Spenn.**

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: VAL, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Arrhenatherum elatius* (L.) P. Beauv. & J. Presl & C. Presl var. *elatius

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: RME, BIO, ARA, LRI, LLA.

Arundo

***Arundo donax* L.**

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Austrostipa

***Austrostipa scabra* (Lindl.) S.W.L. Jacobs & J. Everett**

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: IPA.

Avena

***Avena barbata* Pott ex Link**

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, JFE.

***Avena fatua* L.**

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, IPA.

***Avena sativa* L.**

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, MAG.

***Avena sterilis* L.**

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: RME.

***Avena strigosa* Schreb.**

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: BIO, LLA.

Avenella

***Avenella flexuosa* (L.) Drejer**

Sinónimos: *Aira flexuosa* L., *Deschampsia flexuosa* (L.) Nees, *Deschampsia flexuosa* (L.) Trin., *Deschampsia tenella* Phil. hom. illeg., *Deschampsia philippii* Macloskie, *Aira vestita* Steud., *Deschampsia vestita* (Steud.) Hauman, *Deschampsia martinii* Phil., *Avenella flexuosa* (L.) Parl.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: BIO, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 5-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Axonopus

***Axonopus compressus* (Sw.) P. Beauv.**

Sinónimos: *Axonopus paschalis* (Stapf) Pilg., *Paspalum paschale* Stapf, *Paspalum scoparium* Flüggé var. *oligostachyum* Hack. ex Fuentes, *Milium compressum* Sw.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: IPA.

Rango altitudinal: 5-400 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Heriki hare (Rapa Nui).

Bothriochloa

***Bothriochloa barbinodis* (Lag.) Herter**

Sinónimos: *Andropogon barbinodis* Lag.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: TAR.

Rango altitudinal: 400-3000 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Bothriochloa ischaemum* (L.) Keng**

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: IPA.

***Bothriochloa laguroides* (DC.) Herter**

Sinónimos: *Andropogon laguroides* DC.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: VAL, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 10-1000 m.

Nombre vulgar: Cola de zorro.

***Bothriochloa saccharoides* (Sw.) Rydb. subsp.**

***australis* Scrivanti**

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL.

Rango altitudinal: 120-2600 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Coirón.

***Bothriochloa saccharoides* (Sw.) Rydb. subsp.**

***parvispiculus* (Hitchc.) Davidse**

Sinónimos: *Andropogon saccharoides* Sw. subsp.

parvispiculus Hitchc., *Andropogon cacharoides* Sw. var.

parvispiculus (Hitchc.) Standl., *Bothriochloa*

saccharoides var. *parvispiculus* (Hitchc.) Tovar

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Bothriochloa saccharoides* (Sw.) Rydb. subsp.**

saccharoides

Sinónimos: *Andropogon saccharoides* Sw., *Andropogon berteronianus* Steud.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 10-740 m.

Países limítrofes: Argentina y Perú.

Bouteloua

Bouteloua simplex Lag.

Sinónimos: *Chondrosum tenue* P. Beauv. ex Kunth,

Bouteloua tenuis (P. Beauv. ex Kunth) Griseb.,

Chondrosum humile P. Beauv. ex Kunth, *Bouteloua*

tenuis var. *humilis* (P. Beauv. ex Kunth) Griseb.,

Bouteloua brachyanthera Phil., *Bouteloua rahmeri* Phil.,

Bouteloua simplex var. *rahmeri* (Phil.) Henrard

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT.

Rango altitudinal: 2700-4000 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Brachypodium

Brachypodium distachyon (L.) P. Beauv.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, JFE.

Briza

Briza maxima L.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: ATA, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG, JFE.

Briza minor L.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE, IPA.

Bromelica

Bromelica cepacea (Phil.) Nicora

Sinónimos: *Festuca cepacea* Phil., *Melica cepacea* (Phil.) Scribn.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: RME, LBO, MAU, ARA.

Rango altitudinal: 1000-3500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Bromidium

Bromidium anomalum (Trin.) Döll.

Sinónimos: *Aira anomala* Trin., *Agrostis koelerioides* E.

Desv., *Deyeuxia anomala* (Trin.) Benth. & Hook.f.,

Bromidium hygrometricum (Nees) Nees & Meyen var.

anomalum (Trin.) Kuntze, *Agrostis anomala* (Trin.)

Herter, *Koeleria chilensis* Steud., nom. nud.,

Didymochaeta chilensis Steud.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB,

BIO, ARA, LRI.

Rango altitudinal: 10-900 m.

Países limítrofes: Argentina y Perú.

Bromidium trisetoides (Steud.) Rúgolo

Sinónimos: *Agrostis trisetoides* Steud.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: COQ, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.

Rango altitudinal: 25-300 m.

Bromus

Bromus araucanus Phil.

Sinónimos: *Bromus alpestris* Steud.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ARA, MAG.

Rango altitudinal: 600-900 m.

Países limítrofes: Argentina.

Bromus berteroanus Colla

Sinónimos: *Trisetum hirtum* Trin., *Avena villosula*

Kunze ex E. Desv., *Trisetum barbatum* Steud., *Bromus*

trinii E. Desv. var. *micranthera* E. Desv., *Bromus trinii*

E. Desv. var. *pallidiflora* E. Desv., *Bromus trinii* E.

Desv. var. *manicata* E. Desv., *Bromus trinii* E. Desv.

var. *stricta* E. Desv., *Bromus bicuspis* Nees ex Steud.,

Danthonia pseudo-spicata Muell., *Trisetum litorale*

Phil., *Trisetum trinii* (E. Desv.) Louis-Marie var.

pallidiflorus (E. Desv.) Louis-Marie, *Trisetum trinii* (E.

Desv.) var. *manicatum* (E. Desv.) Louis-Marie, *Trisetum*

trinii (E. Desv.) Louis-Marie var. *micrantherum* (E.

Desv.) Louis-Marie, *Trisetum trinii* (E. Desv.) Louis-

Marie var. *strictum* (E. Desv.) Louis-Marie, *Trisetum*

trinii (E. Desv.) Louis-Marie var. *litorale* (Phil.) Louis-

Marie, *Trisetobromus hirtus* (Trin.) Nevski

Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: AYP, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, AIS, JFE.
Rango altitudinal: 5-1600 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Bromus burkartii Muñoz
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ARA.
Rango altitudinal: 1080-1490 m.

Bromus catharticus Vahl var. *catharticus*
Sinónimos: *Bromus haenkeanus* (J. Presl) Kunth, *Ceratochloa haenkeana* J. Presl, *Bromus willdenowii* Kunth var. *haenkeanus*, *Bromus unioloides* Kunth var. *haenkeanus* (J. Presl) Shear
Hierba. Anual, bienal o perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE, IPA.
Rango altitudinal: 5-4550 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Bromus catharticus Vahl var. *elatus* (E. Desv.)
Planchuelo
Sinónimos: *Bromus cebadilla* Steud., *Bromus stamineus* E. Desv., *Bromus valdivianus* Phil., *Bromus unioloides* fma. *elatus* (E. Desv.) Allen & Thell. ex Kloos, *Ceratochloa valdiviana* (Phil.) Holub, *Ceratochloa staminea* (E. Desv.) Stace, *Bromus catharticus* subsp. *stamineus* (E. Desv.) Massa
Hierba. Anual, bienal o perenne. Nativa.
Distribución: AYP, ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.
Rango altitudinal: 2-4680 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Lanco, cebadilla, pasto del perro.
Nota: Introducida en el Archipiélago de Juan Fernández.

Bromus coloratus Steud.
Sinónimos: *Bromus patagonicus* Phil., *Bromus unioloides* Kunth var. *coloratus* (Steud.) Pilg., *Ceratochloa colorata* (Steud.) Holub
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: RME, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 25-1490 m.
Países limítrofes: Argentina.

Bromus erectus Huds.
Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: BIO, MAG.

Bromus gunckelii Matthei
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: AYP, TAR.
Rango altitudinal: 3100-3740 m.

Bromus hordeaceus L.
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.

Bromus lanatus Kunth
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR.
Rango altitudinal: 4100-4720 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Bromus lanceolatus Roth
Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: MAU.

Bromus lithobius Trin.
Sinónimos: *Bromus unioloides* var. *humilis* E. Desv., *Bromus chilensis* Trin., *Bromus fonckii* Phil., *Bromus scaber* Phil., *Bromus andinus* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, JFE.
Rango altitudinal: 2-1900 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nota: Introducida en el Archipiélago de Juan Fernández.

Bromus madritensis L.
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: COQ, VAL, MAU, ARA.

Bromus mango E. Desv.
Sinónimos: *Ceratochloa mango* (E. Desv.) Holub
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: RME, ARA.
Rango altitudinal: 349-1490 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Mango.

***Bromus pellitus* Hack.**

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 800-900 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Bromus racemosus* L.**

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: LLA, MAG.

***Bromus rigidus* Roth**

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, JFE.

***Bromus scoparius* L.**

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: VAL, RME, LBO, BIO.

***Bromus secalinus* L.**

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

***Bromus setifolius* J. Presl var. *brevifolius* Nees**

Sinónimos: *Bromus macranthos* Meyen, *Bromus macranthos* Meyen ex E. Desv. var. *macrantha*

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, MAU, NUB, BIO, ARA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 15-3950 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Bromus setifolius* J. Presl var. *pictus* (Hook.)**

Skottsb.

Sinónimos: *Bromus pictus* Hook.f., *Bromus macranthos* E. Desv. var. *minor* E. Desv., *Bromus setifolius* J. Presl var. *pictus* (Hook.f.) J.A. Cámara

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: RME, MAG.

Rango altitudinal: 15-2500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Bromus setifolius* J. Presl var. *setifolius

Sinónimos: *Bromus macranthos* Meyen var. *setifolius* (J. Presl) E. Desv.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 80-3600 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Bromus squarrosus* L.**

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: RME, BIO, LLA.

***Bromus stamineus* E.Desv.**

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: ANT, COQ, VAL, RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, MAG, JFE.

***Bromus sterilis* L.**

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: VAL, RME, LBO, BIO, ARA, LLA, MAG.

***Bromus tectorum* L.**

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: LBO, MAU, ARA, LLA.

***Bromus tunicatus* Phil.**

Sinónimos: *Bromus culmineus* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 5-3600 m.

Países limítrofes: Argentina.

Calotheca

***Calotheca brizoides* (Lam.) Desv.**

Sinónimos: *Bromus brizoides* Lam., *Briza patula* Phil., *Chascolytrum brizoides* (Lam.) Essi, Longhi-Wagner & Souza-Chies

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 10-350 m.

Países limítrofes: Argentina.

Catabrosa

***Catabrosa aquatica* (L.) P. Beauv.**

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: MAG.

***Catabrosa werdermannii* (Pilg.) Nicora & Rúgolo**

Sinónimos: *Phippia werdermannii* Pilg., *Phippia werdermannii* Pilg. fma. *minor* Pilg., *Phippia werdermannii* Pilg. fma. *major* Pilg.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 1900-4700 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Catapodium

***Catapodium rigidum* (L.) C.E. Hubb.**

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: COQ, VAL, RME, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG.

Cenchrus

***Cenchrus chilensis* (E. Desv.) Morrone**

Sinónimos: *Gymnotrix chilensis* E. Desv., *Pennisetum chilense* (E. Desv.) B.D. Jacks. ex R.R. Fr.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ, VAL.

Rango altitudinal: 430-3300 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

***Cenchrus clandestinus* (Hochst. ex Chiov.)**

Morrone

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, IPA.

***Cenchrus echinatus* L.**

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: AYP, MAU, LRI, LLA, IPA.

***Cenchrus longisetus* M.C. Johnst.**

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: RME.

***Cenchrus myosuroides* Kunth**

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: AYP, TAR, ATA, MAU.

***Cenchrus spinifex* Cav.**

Hierba. Anual o bienal. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ATA, MAU.

Rango altitudinal: 50-2700 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Chascolytrum

***Chascolytrum koelerioides* (Trin.) Essi, Longhi-Wagner & Souza-Chies**

Sinónimos: *Gymnachne koelerioides* (Trin.) Parodi, *Rhombolytrum berteroanum* E. Desv., *Poa tenuiculmis* Steud., *Gymnachne jaffuelii* Parodi, *Poa philippii* Steud., *Poa koelerioides* Trin.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.

Rango altitudinal: 5-1300 m.

***Chascolytrum rhomboideum* (Link) L. Essi, Longhi-Wagner Souza Chies**

Sinónimos: *Rhombolytrum rhomboideum* Link, *Poa tumidula* Steud., *Rhombolytrum quinquenervium* Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 80-900 m.

***Chascolytrum subaristatum* (Lam.) Desv.**

Sinónimos: *Briza subaristata* Lam., *Calotheca stricta* Hook. & Arn., *Briza stricta* (Hook. & Arn.) Steud., *Briza violascens* Steud., *Briza berteroniana* Steud., *Festuca commersonii* Spreng., nom. illeg. illeg.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE.

Rango altitudinal: 0-1500 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Chloris

***Chloris gayana* Kunth**

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: IPA.

***Chloris radiata* (L.) Sw.**

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: AYP.

***Chloris virgata* Sw.**

Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: AYP.
Rango altitudinal: 50-840 m.

Chusquea

Chusquea argentina Parodi
Sinónimos: *Chusquea culeou* E. Desv. fma. *longiramea* Parodi
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: LLA.
Rango altitudinal: 440-440 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Coligüe, Colihue.

Chusquea ciliata Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: VAL, RME.
Rango altitudinal: 400-400 m.

Chusquea culeou E. Desv.
Sinónimos: *Chusquea andina* Phil., *Chusquea breviglumis* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ, VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.
Rango altitudinal: 0-2060 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Coligüe, colihue.

Chusquea cumingii Nees
Sinónimos: *Chusquea parvifolia* Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB.
Rango altitudinal: 5-1600 m.
Nombre vulgar: Coligüe, Colihue, quila, quila chica, colihue de la zona central.

Chusquea fernandeziana Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: JFE.
Rango altitudinal: 412-830 m.
Nombre vulgar: Colihue.

Chusquea macrostachya Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: RME, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 70-885 m.
Nombre vulgar: Quila, itihue, taihuén.

Chusquea montana Phil. fma. *montana*
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: NUB, LRI, LLA, AIS.
Rango altitudinal: 60-2280 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Quila enana, tihuén.

Chusquea montana Phil. fma. *nigricans* (Phil.) Matthei
Sinónimos: *Chusquea nigricans* Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: LRI, LLA, AIS.
Rango altitudinal: 100-2280 m.
Nombre vulgar: Quila enana.

Chusquea quila Kunth
Sinónimos: *Nastus prolifer* Desv., *Chusquea quila* var. *laxiflora* E. Desv., *C. parvifolia* Phil., *C. parviflora* Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.
Rango altitudinal: 5-1600 m.
Nombre vulgar: Quila.

Chusquea uliginosa Phil.
Sinónimos: *Chusquea tenuiflora* Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: LRI, LLA, AIS.
Rango altitudinal: 5-1500 m.
Nombre vulgar: Quila chica, quila de los ñadis.

Chusquea valdiviensis E. Desv.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.
Rango altitudinal: 10-800 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Quila, quila del sur, quila vutre.

Coix

Coix lacryma-jobi L.
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: IPA.

Nota: Introducida en Rapa Nui (Isla de Pascua).

Cortaderia

Cortaderia araucana Stapf emend. Testoni & Villamil

Sinónimos: *Cortaderia araucana* Stapf, *Cortaderia araucana* Stapf var. *fuenzalidae* Acevedo, *Cortaderia araucana* Stapf var. *skottsbergii* Acevedo, *Cortaderia longicauda* Hack.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 5-2200 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Cola de zorro.

Cortaderia egmontiana (Roem. & Schult.) M. Lyle ex Connor

Sinónimos: *Arundo egmontiana* Roem. & Schult., *Calamagrostis patula* Steud., *Calamagrostis scirpiformis* Phil., *Cortaderia minima* Conert, *Cortaderia pilosa* (d'Urv.) Hack., *Cortaderia pilosa* (d'Urv.) Hack. var. *minima* (Conert) Nicora, *Poa phragmites* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 10-2500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Cola de zorro.

Cortaderia selloana (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn. emend. Testoni & Villamil subsp. *jubata* (Lemoine) Testoni & Villamil

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Cortadera.

Cortaderia selloana (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn. emend. Testoni & Villamil subsp. *selloana*

Sinónimos: *Arundo selliana* Schult. & Schult.f.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, IPA.

Rango altitudinal: 10-3550 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Nombre vulgar: Cortadera.

Cortaderia speciosa (Nees & Meyen) Stapf

Sinónimos: *Gynerium speciosum* Nees & Meyen, *Arundo quila* Mol., *Gynerium quila* (Mol.) Nees & Meyen, *Gynerium argenteum* Nees var. *parviflorum* E. Desv., *Gynerium argenteum* Nees var. *strictum* E. Desv., *Gynerium atacamense* Phil., *Cortaderia rudiaca* Stapf, *Moorea speciosa* (Nees & Meyen) Stapf, *Cortaderia atacamensis* (Phil.) Pilg., *Cortaderia rudiaca* Stapf emend. Acevedo

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, IPA.

Rango altitudinal: 3450 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Espural, espuro.

Corynephorus

Corynephorus divaricatus (Pourr.) Breistr.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: BIO.

Cymbopogon

Cymbopogon citratus (DC.) Stapf

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: TAR.

Cynodon

Cynodon affinis Caro & E.A. Sánchez

Sinónimos: *Cynodon dactylon* (L.) Pers. var. *affinis* (Caro & E.A. Sánchez) Romero Zarco

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, COQ, VAL, RME, NUB.

Rango altitudinal: 10-900 m.

Países limítrofes: Argentina y Perú.

Cynodon dactylon (L.) Pers.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, IPA.

Nombre vulgar: Mati (Rapa Nui).

Cynodon nitidus Caro & E.A. Sánchez

Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: AYP, TAR.
Rango altitudinal: 20-1340 m.

Cynosurus

Cynosurus cristatus L.
Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: VAL, BIO, AIS, MAG.

Cynosurus echinatus L.
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.

Dactylis

Dactylis glomerata L.
Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.

Danthonia

Danthonia araucana Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.
Rango altitudinal: 10-930 m.

Danthonia californica Boland. var. *americana* (Scribn.) Hitchc.
Sinónimos: *Danthonia grandiflora* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 60-450 m.

Danthonia chilensis E. Desv. var. *aureofulva* (E. Desv.) C.M. Baeza
Sinónimos: *Danthonia aureofulva* E. Desv.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.
Rango altitudinal: 5-630 m.

Danthonia chilensis E. Desv. var. *chilensis*
Sinónimos: *Avena ariguensis* Steud.

Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE.
Rango altitudinal: 10-820 m.
Países limítrofes: Argentina.

Danthonia chilensis E. Desv. var. *glabriflora*
Nicora
Sinónimos: *Danthonia calva* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: LRI, LLA.
Rango altitudinal: 25-480 m.
Países limítrofes: Argentina.

Danthonia decumbens (L.) DC.
Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: LLA.

Danthonia malacantha (Steud.) Pilg.
Sinónimos: *Trisetum malacanthum* Steud., *Danthonia collina* Phil., *Danthonia octoflora* Phil., *Danthonia oresigena* Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ, VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, JFE.
Rango altitudinal: 5-1700 m.

Deschampsia

Deschampsia airiformis (Steud.) Benth. & Hook.f.
Sinónimos: *Trisetum airiforme* Steud., *Agrostis desvauxii* Phil.
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: RME, NUB, ARA, AIS.
Rango altitudinal: 60-2200 m.
Países limítrofes: Argentina.

Deschampsia antarctica E. Desv.
Sinónimos: *Aira antarctica* Hook. fma. hom. illeg., *Aridium elegantulum* Steud., *Deschampsia elegans* (Steud.) Parodi, *Deschampsia fueguina* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAU, MAG.
Rango altitudinal: 10-900 m.
Países limítrofes: Argentina.

Deschampsia berteroana (Kunth) Trin.

Sinónimos: *Trisetum berteroanum* Kunth, *Aira berteroiana* (Kunth) Steudel, *Monandraira berteroana* (Kunth) E. Desv., *Deschampsia berteroana* (Kunth) fma. Meigen, *Deschampsia beroana* (Kunth) Trin. var. *parvispicula* Parodi
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO.
Rango altitudinal: 10-3000 m.
Países limítrofes: Argentina.

***Deschampsia caespitosa* (L.) P. Beauv. var.**

caespitosa

Sinónimos: *Aira caespitosa* L., *Deschampsia andina* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 5-4200 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

***Deschampsia caespitosa* (L.) P. Beauv. var.**

***pulchra* (Nees & Meyen) Nicora**

Sinónimos: *Deschampsia pulchra* Nees & Meyen, *Aira pulchra* (Nees & Meyen) Steud.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO.
Rango altitudinal: 1600-4000 m.
Países limítrofes: Argentina.

***Deschampsia cordilleranum* Hauman**

Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ, RME.
Rango altitudinal: 3200-3500 m.
Países limítrofes: Argentina.

***Deschampsia danthonioides* (Trin.) Munro**

Sinónimos: *Aira danthonioides* Trin.
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: COQ, LBO.
Rango altitudinal: 40-700 m.

***Deschampsia elongata* (Hook.) Munro**

Sinónimos: *Aira elongata* Hook., *Aira aciphylla* Franch., *Aira aciphylla* Franch. var. *pumila* Franch., *Deschampsia aciphylla* (Franch.) Speg.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ, ARA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 10-2800 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Deschampsia kingii* (Hook.f.) E. Desv.**

Sinónimos: *Aira kingii* Hook.f., *Deschampsia kingii* (Hook.f.) Macloskie, *Aira elatior* Steud.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ARA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 5-1300 m.
Países limítrofes: Argentina.

***Deschampsia laxa* Phil.**

Sinónimos: *Calamagrostis hirthii* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 10-485 m.
Países limítrofes: Argentina.

Deschampsia looseriana* Parodi var. *looseriana

Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, BIO.
Rango altitudinal: 10-2475 m.

Deschampsia looseriana* Parodi var. *triandra

Parodi
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: RME.
Rango altitudinal: 500-500 m.

***Deschampsia micrantha* Phil.**

Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ.

***Deschampsia monandra* Parodi**

Sinónimos: *Deschampsia glauca* (E. Desv.) Parodi, hom. illeg., *Monandraira glauca* E. Desv.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: VAL, RME, NUB, ARA.
Rango altitudinal: 45-3500 m.

***Deschampsia parvula* (Hook.f.) E. Desv.**

Sinónimos: *Aira parvula* Hook.f., *Trisetum parvulum* (Hook.f.) Speg., *Deschampsia parvula* (Hook.f.) Macloskie
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AIS, MAG.
Rango altitudinal: 20-1100 m.

Países limítrofes: Argentina.

Deschampsia patula (Phil.) Pilg. ex Skottsb.
Sinónimos: *Monandraira patula* Phil., *Deschampsia elegantula* (Steud.) Parodi var. *patula* (Phil.) Parodi
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAG.
Rango altitudinal: 10-900 m.
Países limítrofes: Argentina.

Deschampsia setacea (Huds.) Hack.
Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: COQ, VAL, RME.

Deschampsia venustula Parodi
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: RME, MAU, MAG.
Rango altitudinal: 900-3400 m.
Países limítrofes: Argentina.

Deyeuxia

Deyeuxia breviaristata Wedd.
Sinónimos: *Deyeuxia variegata* Phil., *Calamagrostis variegata* (Phil.) Kuntze
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT, RME.
Rango altitudinal: 3700-4810 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.
Nombre vulgar: Pasto vicuña.

Deyeuxia brevifolia J. Presl var. *brevifolia*
Sinónimos: *Calamagrostis brevifolia* (J. Presl) Steud.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT.
Rango altitudinal: 3000-4700 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Deyeuxia brevifolia J. Presl var. *expansa* Rúgolo & Villav.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: TAR.
Rango altitudinal: 3200-3900 m.
Países limítrofes: Bolivia y Perú.

Deyeuxia cabrerae (Parodi) Parodi var. *aristulata* Rúgolo & Villav.

Sinónimos: *Calamagrostis cabrerae* Parodi var. *aristulata* (Rúgolo & Villav.) Soreng
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ANT, ATA.
Rango altitudinal: 3200-4600 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Deyeuxia cabrerae (Parodi) Parodi var. *cabrerae*
Sinónimos: *Calamagrostis cabrerae* Parodi
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ANT.
Rango altitudinal: 3600-4200 m.
Países limítrofes: Argentina.

Deyeuxia cabrerae (Parodi) Parodi var. *trichopoda* Parodi ex Rúgolo
Sinónimos: *Calamagrostis cabrerae* Parodi var. *trichopoda* (Rúgolo) Soreng
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ANT, ATA.
Rango altitudinal: 3700-4570 m.
Países limítrofes: Argentina y Perú.

Deyeuxia chrysantha J. Presl var. *chrysantha*
Sinónimos: *Calamagrostis nitida* Hack.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT, COQ.
Rango altitudinal: 3500-5000 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.
Nombre vulgar: Sora.

Deyeuxia chrysantha J. Presl var. *phalaroides* (Wedd.) Villav.
Sinónimos: *Deyeuxia phalaroides* Wedd.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT.
Rango altitudinal: 4100-5000 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Deyeuxia chrysophylla Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: TAR, ANT, ATA.
Rango altitudinal: 3800-5300 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

***Deyeuxia chrysostachya* E. Desv.**

Sinónimos: *Deyeuxia chrysostachya* E. Desv. var. *B* E. Desv., *Calamagrostis chrysostachya* (E. Desv.) Kuntze, *Calamagrostis chrysostachya* (E. Desv.) Hack., *Calamagrostis chrysostachya* (E. Desv.) V.N. Vassil. Hierba. Perenne. Nativa. Distribución: ANT, COQ, VAL, RME. Rango altitudinal: 3000-4000 m. Países limítrofes: Argentina.

***Deyeuxia crispa* Rúgolo & Villav.**

Hierba. Perenne. Nativa. Distribución: AYP, TAR, ANT. Rango altitudinal: 4400-5000 m. Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú. Nombre vulgar: Paja viscachera.

***Deyeuxia curvula* Wedd.**

Sinónimos: *Deyeuxia tenuifolia* Phil., *Calamagrostis tenuifolia* (Phil.) R.E. Fr., *Calamagrostis curvula* (Wedd.) Pilg. Hierba. Perenne. Nativa. Distribución: AYP, TAR, ANT. Rango altitudinal: 2600-4900 m. Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú. Nombre vulgar: Pasto vicuña.

Deyeuxia deserticola* Phil. var. *breviaristata

Rúgolo & Villav. Sinónimos: *Calamagrostis deserticola* (Phil.) Phil. var. *breviaristata* (Rúgolo & Villav.) Soreng Hierba. Perenne. Nativa. Distribución: AYP, ANT, ATA. Rango altitudinal: 4300-4950 m. Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Deyeuxia deserticola* Phil. var. *deserticola

Sinónimos: *Calamagrostis deserticola* (Phil.) Phil., *Agrostis canescens* Griseb., *Deyeuxia trisetoides* Phil. Hierba. Perenne. Nativa. Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA. Rango altitudinal: 2800-4900 m. Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

***Deyeuxia diemii* Rúgolo**

Sinónimos: *Calamagrostis diemii* (Rúgolo) Soreng Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAU.

Rango altitudinal: 1250-1950 m. Países limítrofes: Argentina.

***Deyeuxia eminens* J. Presl var. *discreta* Rúgolo & Villav.**

Sinónimos: *Deyeuxia leiopoda* Wedd. var. *discreta* Wedd., *Calamagrostis eminens* (J. Presl) Steud. var. *discreta* (Rúgolo & Villav.) Soreng

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ANT.

Rango altitudinal: 3680-4000 m. Países limítrofes: Bolivia y Perú.

Deyeuxia eminens* J. Presl var. *eminens

Sinónimos: *Calamagrostis eminens* (J. Presl) Steud., *Deyeuxia robusta* Phil., *Agrostis eminens* (J. Presl) Griseb., *Deyeuxia elegans* Wedd., *Deyeuxia polystachya* Wedd., *Deyeuxia arundinacea* Phil., *Calamagrostis robusta* (Phil.) Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 3000-4730 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Pasto huilla, huaya, chillagua, chillagua blanda, iru, guaia, sora-sora.

***Deyeuxia eminens* J. Presl var. *fulva* (Griseb.)**

Rúgolo

Sinónimos: *Deyeuxia laxiflora* Phil., *Calamagrostis eminens* (J. Presl) Steud. var. *fulva* (Griseb.) Soreng Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ANT, ATA, COQ, RME.

Rango altitudinal: 3200-4200 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Pasto de vega, cebadilla de vicuña.

Deyeuxia erythrostachya* E. Desv. var. *erythrostachya

Sinónimos: *Aira gayana* Steud., *Calamagrostis erythrostachya* (E. Desv.) Hack., *Stylagrostis erythrostachya* (E. Desv.) Mez, *Calamagrostis stipitata* Hitchc., *Calamagrostis gayana* (Steud.) Soreng Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 550-4000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Deyeuxia erythrostachya E. Desv. var.

neuquensis Rúgolo

Sinónimos: *Calamagrostis gayana* (Steud.) Soreng var.
neuquensis (Rúgolo) Soreng

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAU, NUB.

Rango altitudinal: 2200-2500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Deyeuxia filifolia Wedd.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ANT.

Rango altitudinal: 2500-2500 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Deyeuxia hackelii (Lillo) Parodi

Sinónimos: *Calamagrostis hackelii* Lillo

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ANT.

Rango altitudinal: 3900-5000 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Deyeuxia heterophylla Wedd.

Sinónimos: *Calamagrostis heterophylla* (Wedd.) Pilg.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR.

Rango altitudinal: 3520-4150 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Cebadilla.

Deyeuxia patagonica Speg.

Sinónimos: *Calamagrostis patagonica* (Speg.)

Macloskie

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ARA.

Rango altitudinal: 1500-1500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Deyeuxia poaeoides (Steud.) Rúgolo

Sinónimos: *Calamagrostis poaeoides* (Steud.) Hack.,

Calamagrostis fuegiana Speg., *Calamagrostis magellanica* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Deyeuxia rigescens (J. Presl) Türpe

Sinónimos: *Agrostis rigescens* J. Presl

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ATA.

Rango altitudinal: 3500-4340 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Deyeuxia rigida Kunth

Sinónimos: *Calamagrostis gusindei* Pilg. ex Skottsb.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 15-4680 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Deyeuxia spicigera J. Presl var. *cephalotes*

(Wedd.) Rúgolo & Villav.

Sinónimos: *Deyeuxia cephalotes* Wedd., *Calamagrostis*

spicigera (J. Presl) Steud. var. *cephalotes* (Wedd.)

Soreng

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: TAR.

Rango altitudinal: 3750-4700 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Deyeuxia spicigera J. Presl var. *spicigera*

Sinónimos: *Calamagrostis spicigera* (J. Presl.) Steud.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP.

Rango altitudinal: 3600-5000 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Deyeuxia suka (Speg.) Parodi

Sinónimos: *Calamagrostis suka* Speg.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 5-785 m.

Países limítrofes: Argentina.

Deyeuxia velutina Nees & Meyen var. *nardifolia*

(Griseb.) Rúgolo

Sinónimos: *Agrostis nardifolia* Griseb., *Deyeuxia*

nardifolia (Griseb.) Phil., *Calamagrostis nardifolia*

(Griseb.) Hack.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 3800-4700 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Deyeuxia velutina* Nees & Meyen var. *velutina

Sinónimos: *Calamagrostis velutina* (Nees & Meyen) Steud., *Deyeuxia chilensis* E. Desv., *Deyeuxia agrostidea* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ANT, ATA, COQ, RME, LLA.

Rango altitudinal: 2300-4200 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Deyeuxia vicunarum* Wedd.**

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP.

Rango altitudinal: 3500-4860 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Deyeuxia viridiflavescens* (Poir.) Kunth var. *montevidensis* (Nees) Cabrera & Rúgolo**

Sinónimos: *Calamagrostis montevidensis* Nees

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: BIO, LRI.

Rango altitudinal: 5-2300 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Deyeuxia viridiflavescens* (Poir.) Kunth var. *viridiflavescens

Sinónimos: *Arundo viridiflavescens* Poir.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: BIO, LRI.

Rango altitudinal: 10-200 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Deyeuxia viridis* Phil.**

Sinónimos: *Calamagrostis nemoralis* Phil., *Calamagrostis nemoralis* Phil. ex Kuntze, *Deyeuxia nemoralis* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: BIO, LRI, LLA, MAG.

Rango altitudinal: 10-820 m.

Países limítrofes: Argentina.

Dichanthelium

***Dichanthelium sabulorum* (Lam.) Gould & Clark var. *polycladum* (E. Ekman) Zuloaga**

Sinónimos: *Panicum polycladum* E. Ekman, *Panicum pencycanum* Phil., *Panicum sabulorum* var. *polycladum* (E. Ekman) Palacios ex Burkart

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: BIO.

Rango altitudinal: 10-10 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Dichanthelium sabulorum* (Lam.) Gould & Clark var. *sabulorum

Sinónimos: *Panicum sabulorum* Lam., *Panicum acutatum* Steud.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAU, BIO.

Rango altitudinal: 10-1460 m.

Países limítrofes: Argentina.

Dichelachne

***Dichelachne crinita* (L.f.) Hook.f.**

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: IPA.

***Dichelachne micrantha* (Cav.) Domin**

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: IPA.

Digitaria

***Digitaria aequiglumis* (Hack. & Arechav.) Parodi**

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA.

***Digitaria ciliaris* (Retz.) Koeler**

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: IPA.

Países limítrofes: Argentina.

***Digitaria ischaemum* (Schreb.) Muhl.**

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: BIO, LLA.

***Digitaria sanguinalis* (L.) Scop.**

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE.

Digitaria setigera Roth ex Roemer & Schultes
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: IPA.

Digitaria violascens Link
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: VAL, IPA.

Diplachne

Diplachne fusca (L.) Kunth subsp. *uninervia* (J. Presl) P.M. Peterson & N. Snow
Sinónimos: *Megastachya uninervia* J. Presl, *Poa uninervia* (J. Presl) Kunth, *Diplachne verticillata* Nees & Meyen, *Uralepis verticillata* (Nees & Meyen) Steud, *Eragrostis uninervia* (J. Presl) Steud., *Brizopyrum uninervium* (J. Presl) E. Fourn., *Diplachne tarapacana* Phil., *Leptochloa uninervia* (J. Presl.) Hitchc. & Chase, *Diplachne uninervia* (J. Presl.) Parodi, *Diplachne fusca* var. *uninervia* (J. Presl.) P.M. Peterson & N. Snow., *Leptochloa fusca* (L.) Kunth subsp. *uninervia* (J. Presl.) N.W. Snow
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL.
Rango altitudinal: 20-1300 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Distichlis

Distichlis humilis Phil.
Sinónimos: *Distichlis misera* Phil., *Distichlis spicata* (L.) Greene var. *humilis* (Phil.) Kuntze
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA.
Rango altitudinal: 2310-4300 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Distichlis scoparia (Nees ex Kunth) Arechav.
Sinónimos: *Poa scoparia* Nees ex Kunth, *Uniola scoparia* (Nees ex Kunth) Steud.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, BIO, ARA, LRI.
Rango altitudinal: 5-4200 m.
Países limítrofes: Argentina.

Distichlis spicata (L.) Greene
Sinónimos: *Distichlis maritima* Rafma., *Distichlis deserticola* Phil., *Distichlis hirsuta* Phil., *Distichlis mendocina* Phil., *Distichlis hirta* Phil., *Distichlis spicata* var. *andina* Beetle, *Distichlis spicata* var. *stricta* (Torr.) Scribn., *Uniola stricta* Torr.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.
Rango altitudinal: 5-3800 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Echinochloa

Echinochloa colona (L.) Link
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, JFE.

Echinochloa crusgalli (L.) P.Beauv. var. *crusgalli*
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.

Echinochloa crusgalli (L.) P.Beauv. var. *mitis* (Pursh) Peterm.
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Echinochloa crusgalli (L.) P.Beauv. var. *zelayensis* (Kunt) Hitchc.
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: MAU.

Echinochloa crus-pavonis (Kunth) Schult.
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: AYP, TAR, COQ, VAL, RME, MAU, NUB, BIO, ARA.

Ehrharta

Ehrharta longiflora Sm.
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: VAL.
Rango altitudinal: 50-100 m.

Ehrharta stipoides Labill.

Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: IPA.

Eleusine

Eleusine indica (L.) Gaertn.

Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: IPA.

Eleusine tristachya (Lam.) Lam.

Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: ANT, ATA, VAL, RME, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE.

Elymus

Elymus angulatus J. Presl

Sinónimos: *Elymus agropyroides* J. Presl, *Elymus andinus* Poepp. ex Trin., *Elymus antarcticus* Hook.f. var. *fulvescens* Kurtz, *Elymus valdiviae* Steud., *Elymus asper* Nees ex Steud., *Elymus chonoticus* Phil., *Elymus corralensis* Phil., *Elymus gayanus* E. Desv., *Elymus gracilis* Phil., *Elymus latiglumis* Phil., *Elymus muticus* Phil., *Elymus oreophilus* Phil., *Elymus palenae* Phil., *Elymus paposanus* Phil., *Elymus pratensis* Phil., *Elymus rigescens* Poepp. ex Trin., *Elymus uniflorus* Phil., *Elymus vaginatus* Phil., *Hordeum valdiviae* (Steud.) Schenck
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 5-2800 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Elymus magellanicus (E. Desv.) A. Löve

Sinónimos: *Triticum repens* L. var. *magellanicum* E. Desv., *Triticum magellanicum* (E. Desv.) Speg., *Agropyron magellanicum* (E. Desv.) Hack., *Triticum pubiflorum* Steud., *Triticum magellanicum* (E. Desv.) Speg. var. *pubiflorum* (Steud.) Speg., *Agropyron pubiflorum* (Steud.) P. Candargy, *Agropyron magellanicum* (E. Desv.) Hack. var. *pubiflorum* (Steud.) Hauman & Vanderv., *Agropyron pubiflorum* (Steud.) Parodi, *Elytrigia pubiflora* (Steud.) Tzvelev, *Elymus glaucescens* Seberg, *Agropyron antarcticum* Parodi, *Agropyron fuegianum* (Speg.) Kurtz var. *brachyatherum* Parodi, *Agropyron fuegianum* (Speg.) Kurtz var.

polystachyum Parodi, *Agropyron pubiflorum* (Steud.)

Parodi var. *fragile* Parodi
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: RME, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 10-1400 m.
Países limítrofes: Argentina.

Elymus patagonicus Speg.

Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AIS.
Rango altitudinal: 900 m.
Países limítrofes: Argentina.

Elymus repens (L.) Gould

Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: RME, ARA, LLA, MAG.

Elymus scabriglumis (Hack.) A. Löve

Sinónimos: *Agropyron repens* P. Beauv. var. *scabriglume* Hack.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ANT, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 100-3300 m.
Países limítrofes: Argentina.

Elytrigia

Elytrigia repens (L.) Nevski

Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: RME, ARA, LRI, MAG.

Enneapogon

Enneapogon desvauxii P. Beauv.

Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT.
Rango altitudinal: 2000-2580 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Eragrostis

Eragrostis atrovirens (Desf.) Trin. ex Steud.

Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: IPA.

Eragrostis attenuata Hitchc.

Sinónimos: *Sporobolus scaber* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ANT, ATA.
Rango altitudinal: 610-610 m.
Países limítrofes: Perú.

Eragrostis curvula (Schrad.) Nees
Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: BIO, MAG.

Eragrostis kuschelii Skottsb.
Sinónimos: *Eragrostis peruviana* var. *macranthera* Skottsb.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: IDE.
Rango altitudinal: 5-100 m.

Eragrostis mexicana (Hornem.) Link subsp. *virescens* (J. Presl) S.D. Koch & Sánchez Vega
Sinónimos: *Eragrostis virescens* J. Presl, *Poa virescens* (Presl) Kunth, *Eragrostis chilensis* (Moris) Nees, *Poa chilensis* Moris, *Eragrostis scabra* Phil., *Eragrostis rahmeri* Phil.
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.
Rango altitudinal: 20-2500 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Eragrostis nigricans (Kunth) Steud. var. *nigricans*
Sinónimos: *Poa nigricans* Kunth, *Eragrostis subatra* Jedwabn., *Eragrostis tristis* Jebwabn., *Eragrostis nigricans* Jebwabn. var. *tristis*
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT.
Rango altitudinal: 2600-3800 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Eragrostis nigricans (Kunth) Steud. var. *punensis*
Nicora
Sinónimos: *Eragrostis mexicana* (Hornem.) Link subsp. *mexicana*
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: AYP, ANT, VAL.
Rango altitudinal: 2950-3800 m.

Eragrostis peruviana (Jacq.) Trin.

Sinónimos: *Eragrostis deserticola* Phil.
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: AYP, ANT, IDE.
Rango altitudinal: 500-3460 m.
Países limítrofes: Perú.

Eragrostis pilosa (L.) P. Beauv.
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: COQ, RME, MAU, MAG.

Eragrostis polytricha Nees
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.
Rango altitudinal: 10-1000 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Eragrostis pycnantha (Phil.) Nicora
Sinónimos: *Poa pycnantha* Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ATA.
Rango altitudinal: 140-140 m.

Eragrostis tenuifolia (A. Rich.) Hochst. ex Steud.
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: IPA.

Eragrostis weberbaueri Pilg.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT.
Rango altitudinal: 2100-3700 m.
Países limítrofes: Perú.

Eremium

Eremium erianthum (Phil.) Seberg & Linde-Laursen
Sinónimos: *Elymus erianthus* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ.
Rango altitudinal: 1800-1800 m.
Países limítrofes: Argentina.

Eriochloa

Eriochloa montevidensis Griseb.
Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP.
Rango altitudinal: 50-840 m.
Países limítrofes: Argentina.

Festuca

Festuca argentina (Speg.) Parodi
Sinónimos: *Poa argentina* Speg., *Festuca cavallieri* St.-Yves
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AIS.
Rango altitudinal: 50-2200 m.
Países limítrofes: Argentina.

Festuca arundinacea Schreb.
Sinónimos: *Festuca orthophylla* Pilg.
Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, MAU, NUB, BIO, LLA, JFE.

Festuca chrysophylla Phil.
Sinónimos: *Festuca deserticola* Phil. var. *chrysophylla* (Phil.) St.-Yves, *Festuca deserticola* Phil. var. *juncea* St.-Yves, *Festuca juncea* Phil., hom. illeg.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT.
Rango altitudinal: 3200-4860 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Festuca cirrosa (Speg.) Parodi
Sinónimos: *Festuca erecta* d'Urv. var. *cirrosa* Speg.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAG.
Rango altitudinal: 5-175 m.
Países limítrofes: Argentina.

Festuca contracta Kirk
Sinónimos: *Festuca erecta* d'Urv., hom. illeg.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAG.
Rango altitudinal: 200-1050 m.
Países limítrofes: Argentina.

Festuca floribunda (Pilg.) P.M. Peterson, Soreng & Romasch.
Sinónimos: *Trisetum floribundum* Pilg., *Dielsiochloa floribunda* (Pilg.) Pilg.

Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT.
Rango altitudinal: 4240-5250 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Festuca gracillima Hook.f. var. *glacialis* Rúgolo & Nicora
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAG.
Rango altitudinal: 5-1300 m.
Países limítrofes: Argentina.

Festuca gracillima Hook.f. var. *gracillima*
Sinónimos: *Festuca gracillima* Hook. var. *brevifolia* Speg.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: NUB, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 5-900 m.
Países limítrofes: Argentina.

Festuca hypsophila Phil.
Sinónimos: *Festuca deserticola* Phil. var. *hypsohylla* (Phil.) St.-Yves
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA.
Rango altitudinal: 3200-4800 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Festuca juncifolia St.-Amans
Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: MAG.

Festuca kurtziana St.-Yves
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ, RME, MAU.
Rango altitudinal: 1630-2740 m.
Países limítrofes: Argentina.

Festuca magellanica Lam.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ, VAL, RME, MAU, NUB, BIO, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 5-3300 m.
Países limítrofes: Argentina.

Festuca monticola Phil.

Sinónimos: *Festuca gracillima* Hook. var. *monticola* (Phil.) St.-Yves, *Festuca subandina* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG.

Rango altitudinal: 5-1550 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Festuca ovina* L. subsp. *tenuifolia* (Sibth.) Celak.**

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: MAG.

***Festuca pallens* (St.-Yves) Parodi**

Sinónimos: *Festuca gracillima* Hook. var. *pallens* St.-Yves

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AIS, MAG.

Rango altitudinal: 15-1700 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Festuca panda* Sw.**

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: AYP, COQ.

Rango altitudinal: 2900-3400 m.

***Festuca purpurascens* Banks & Sol. ex Hook.f.**

Sinónimos: *Festuca purpurascens* Banks & Sol. ex Hook. var. *submutica* E. Desv., *Festuca purpurascens* Banks & Sol. ex Hook. var. *aristata* E. Desv., *Festuca insularis* Steud., *Festuca lechleriana* Steud., *Festuca platyphylla* Steud., *Festuca purpurascens* Banks & Sol. ex Hook. var. *platyphylla* (Steud.) St.-Yves, *Festuca laxiflora* Phil., hom. illeg., *Festuca dumetorum* Phil., hom. illeg., *Festuca trachylepis* Hack. ex Druce, *Festuca philippii* Becherer, nom. illeg., *Festuca davilae* Phil., *Festuca glaucophylla* Phil., *Festuca serranoi* Phil., *Festuca purpurascens* Banks & Sol. ex Hook.f. fma. *aristata* St.-Yves, *Festuca purpurascens* Banks & Sol. ex Hook.f. fma. *scabriuscula* St.-Yves

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 5-1200 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Festuca pyrogea* Speg.**

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: RME, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 100-1100 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Festuca rigescens* (J. Presl) Kunth**

Sinónimos: *Diplachne rigescens* Presl, *Festuca deserticola* Phil., *Festuca paupera* Phil., *Festuca deserticola* Phil. var. *paupera* (Phil.) St.-Yves

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, COQ.

Rango altitudinal: 2500-4800 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Festuca rubra* L.**

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: COQ, VAL, RME, AIS, MAG.

***Festuca scabriuscula* Phil.**

Sinónimos: *Festuca acanthophylla* E. Desv. var. *scabriuscula* (Phil.) Ospina, Aliscioni y Denham, *Festuca robusta* Phil. var. *scabriuscula* (Phil.) St.-Yves, *Festuca asperata* Phil., *Festuca pascua* Phil., *Festuca steudelii* Phil., *Festuca morenensis* Matthei

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ANT, RME, NUB, BIO, ARA, LRI.

Rango altitudinal: 700-2200 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Festuca subantarctica* Parodi**

Sinónimos: *Festuca commersonii* Franch., hom. illeg.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 5-175 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Festuca tunicata* E. Desv.**

Sinónimos: *Festuca acanthophylla* E. Desv., *Festuca coiron* Steud., *Festuca berteroniana* Steud., *Festuca robusta* Phil., *Festuca thermarum* Phil., *Festuca desvauxii* Phil., *Festuca acuta* Phil., *Festuca desvauxii* Phil. var. *ampla* St.-Yves, *Festuca barrazae* Muñoz

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 900-2500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Festuca werdermannii* St.-Yves**

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ANT, ATA, COQ, LBO.
Rango altitudinal: 2800-4200 m.
Países limítrofes: Argentina.

Gastridium

Gastridium phleoides (Nees & Meyen) C.E. Hubb.
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE, IPA.

Gastridium ventricosum (Gouan) Schinz & Thell.
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: IPA, JFE.

Glyceria

Glyceria fluitans (L.) R. Br.
Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: MAU, BIO, ARA, LRI, MAG.

Glyceria multiflora Steud.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: VAL, RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 5-760 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Gynerium

Gynerium sagittatum (Aubl.) P. Beauv.
Hierba o subarbusto. Perenne. Introducida.
Distribución: TAR.

Hainardia

Hainardia cylindrica (Willd.) Greuter
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: VAL, NUB, BIO.

Helictotrichon

Helictotrichon bulbosum (Hitchc.) Parodi
Sinónimos: *Trisetum bulbosum* Hitchc.
Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: BIO.
Países limítrofes: Argentina.

Holcus

Holcus lanatus L.
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Hordeum

Hordeum brachyatherum Phil.
Sinónimos: *Critesion brachyatherum* (Phil.) A. Löve
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ, VAL, MAU, MAG.
Rango altitudinal: 2-50 m.

Hordeum chilense Roem. & Schult.

Sinónimos: *Critesion chilense* (Roem. & Schult.) A. Löve, *Hordeum chilense* Brongn., nom. illeg., *Hordeum secalinum* Schreb. var. *chilense* (Brongn.) E. Desv., *Hordeum pratense* Huds. var. *chilense* (Brongn.) Macloskie, *Hordeum pratense* Huds. var. *brongniartii* Macloskie, *Hordeum cylindricum* Steud., *Hordeum depauperatum* Steud., *Hordeum chilense* Roem. & Schult. var. *pseudosecalinum* Hauman, *Hordeum chilense* Roem. & Schult. var. *pilosum* Nevski
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.
Rango altitudinal: 5-4200 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nota: Introducida en el Archipiélago de Juan Fernández.

Hordeum comosum J. Presl

Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 5-4300 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Hordeum fuegianum Bothmer, N. Jacobsen & R.R. Jorg.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 10-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Hordeum hystrix* Roth**

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: VAL, LBO, MAU, NUB.

***Hordeum jubatum* L.**

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: MAG.

***Hordeum lechleri* (Steud.) Schenck**

Sinónimos: *Critesion lechleri* (Steud.) A. Löve, *Elymus lechleri* Steud

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AIS, MAG.

Rango altitudinal: 10-500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Hordeum marinum* Huds. subsp. *gussoneanum

(Parl.) Thell.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, BIO.

Hordeum marinum* Huds. subsp. *marinum

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: VAL, RME, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

***Hordeum murinum* L. subsp. *leporinum* (Link.)**

Arcang.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: VAL, BIO.

Hordeum murinum* L. subsp. *murinum

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE, IPA.

***Hordeum muticum* J. Presl**

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, RME, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 460-4040 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Hordeum parodii* Covas**

Sinónimos: *Critesion parodii* (Covas) A. Löve

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AIS, MAG.

Rango altitudinal: 10-200 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Hordeum patagonicum* (Hauman) Covas subsp.**

***magellanicum* (Parodi & Nicora) Bothmer, Giles & N. Jacobsen**

Sinónimos: *Hordeum chilense* Roem. & Schult. var.

magellanicum Parodi & Nicora, *Critesion magellanicum* (Parodi & Nicora) A. Löve

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ATA, RME, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 150-700 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Hordeum patagonicum* (Hauman) Covas subsp.**

***santacruceense* (Parodi & Nicora) Bothmer, Giles & N. Jacobsen**

Sinónimos: *Hordeum santacruceense* (Parodi & Nicora), *Critesion santacruceense* (Parodi & Nicora) Á. Löve

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AIS, MAG.

Rango altitudinal: 150-170 m.

Países limítrofes: Argentina.

Hordeum pubiflorum* Hook.f. subsp. *halophilum

(Griseb.) Baden & Bothmer

Sinónimos: *Hordeum halophilum* Griseb., *Hordeum jubatum* L. fma. *versicolor* Kuntze, *Hordeum jubatum* L. fma. *violaceum* Kuntze, *Hordeum jubatum* fma. *viride* Kuntze

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ANT, ATA, COQ, RME, LBO, BIO, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 20-4170 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Hordeum pubiflorum* Hook.f. subsp. *pubiflorum

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: RME, MAU, BIO, MAG.

Rango altitudinal: 15-3500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Hordeum vulgare* L.**

Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: ATA, COQ, RME, BIO, ARA.

Imperata

Imperata brasiliensis Trin.
Sinónimos: *Imperata arundinacea* Cirillo var. *americana*
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: NUB.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.
Nombre vulgar: Paja colorada.

Imperata condensata Steud.
Sinónimos: *Imperata arundinacea* Cirillo var. *condensata* (Steud.) Hack., *Imperata cylindrica* (L.) Raeusch. var. *condensata* (Steud.) Hack.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.
Rango altitudinal: 10-2233 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.
Nombre vulgar: maicillo.

Imperata parodii Acevedo
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ARA.

Jarava

Jarava annua (Mez) Peñail.
Sinónimos: *Stipa annua* Mez
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT.
Rango altitudinal: 100-3700 m.
Países limítrofes: Perú.

Jarava ichu Ruiz & Pav. var. ***pungens*** (Nees & Meyen) Ciald.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP.
Rango altitudinal: 4040-4040 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Jarava leptostachya (Griseb.) F. Rojas
Sinónimos: *Stipa leptostachya* Griseb.

Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT.
Rango altitudinal: 3300-4040 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.
Nombre vulgar: Paja amarilla.

Jarava neaei (Nees ex Steud.) Peñail.
Sinónimos: *Stipa neaei* Nees ex Steud., *Stipa bella* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ, RME, MAU, AIS.
Rango altitudinal: 1000-2700 m.
Países limítrofes: Argentina.

Jarava plumosa (Spreng.) S.W.L. Jacobs & Everett
Sinónimos: *Calamagrostis plumosa* Spreng., *Stipa tenuiflora* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 5-900 m.
Países limítrofes: Argentina.

Jarava plumbosula (Nees ex Steud.) F. Rojas
Sinónimos: *Stipa plumbosula* Nees ex Steud., *Stipa plumosa* Trin.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME.
Rango altitudinal: 10-3500 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Jarava pogonathera (E. Desv.) Peñail.
Sinónimos: *Stipa pogonathera* E. Desv., *Stipa buchtienii* Hack.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, MAU.
Rango altitudinal: 720-3700 m.
Países limítrofes: Argentina.

Jarava psylantha (Speg.) Peñail.
Sinónimos: *Stipa psylantha* Speg.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AIS, MAG.
Rango altitudinal: 150-300 m.
Países limítrofes: Argentina.

Jarava pungionata (Caro & E.A. Sánchez) Matthei
Sinónimos: *Stipa pungionata* Caro & E.A. Sánchez

Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT.
Rango altitudinal: 3725-4150 m.
Países limítrofes: Argentina.

Jarava scabrifolia (Torres) Peñail.
Sinónimos: *Stipa scabrifolia* Torres, *Jarava mattheii* F. Rojas
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ANT.
Rango altitudinal: 4000-4000 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Jarava subaristata (Matthei) Matthei
Sinónimos: *Stipa leptostachya* Griseb. var. *subaristata* Matthei, *Stipa subaristata* (Matthei) Caro & E.A. Sánchez
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR.
Rango altitudinal: 1870-4040 m.
Países limítrofes: Argentina.

Jarava tortuosa (E. Desv.) Peñail.
Sinónimos: *Stipa tortuosa* E. Desv.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ANT, ATA, COQ.
Rango altitudinal: 10-900 m.

Koeleria

Koeleria fueguina Calderón ex Nicora
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAU, NUB, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 400-1600 m.
Países limítrofes: Argentina.

Koeleria kurtzii Hack. emend. A.M. Molina
Sinónimos: *Trisetum subaristatum* E. Desv.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: TAR, RME, MAU, MAG.
Rango altitudinal: 3400-4300 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Lachnagrostis

Lachnagrostis filiformis (G. Forst.) Trin.

Sinónimos: *Agrostis avenacea* J.F. Gmel.
Hierba. Anual o perenne. Nativa.
Distribución: VAL, MAU, LLA, IPA.
Rango altitudinal: 150-320 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Tuere heu (Rapa Nui).
Nota: Introducida en el continente: regiones de Valparaíso, Maule y Los Lagos.

Lagurus

Lagurus ovatus L.
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: COQ, VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, MAG.

Lamarckia

Lamarckia aurea (L.) Moench
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME.

Leptophyllochloa

Leptophyllochloa micrathera (E. Desv.) C.E. Calderón ex Nicora
Sinónimos: *Trisetum micratherum* E. Desv., *Koeleria micrathera* (E. Desv.) Griseb., *Koeleria philippiana* E. Desv., *Trisetum depauperatum* Phil., *Trisetum brachyatherum* Phil., *Trisetum laxiflorum* Phil., *Trisetum laxum* Phil., *Trisetum nemorosum* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE.
Rango altitudinal: 25-1200 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nota: Introducida en el Archipiélago de Juan Fernández.

Lepturus

Lepturus repens (G. Forst.) R. Br.
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: IPA.

Leymus

Leymus arenarius (L.) Hochst.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: VAL, MAG.

Lolium

***Lolium multiflorum* Lam.**

Hierba. Anual o bienal. Introducida.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG, JFE.

***Lolium perenne* L.**

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE, IPA.

***Lolium rigidum* Gaudin**

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, BIO, ARA, LRI, MAG.

***Lolium temulentum* L.**

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: COQ, VAL, RME, BIO, ARA, LRI, LLA.

Megalachne

***Megalachne berteroiana* Steud.**

Sinónimos: *Bromus megalachne* Pilg., *Pantathera fernandeziana* Phil., *Bromus fernandezianus* Phil., *Pantathera avenacea* Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: JFE.

Rango altitudinal: 180-670 m.

***Megalachne masafuerana* (Skottsb. & Pilg.) Matthei**

Sinónimos: *Bromus masafueranus* Skottsb. & Pilg.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: JFE.

Rango altitudinal: 320-1100 m.

***Megalachne robinsoniana* C. Peña**

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: JFE.

Rango altitudinal: 300-400 m.

Megathyrsus

***Megathyrsus maximus* (Jacq.) B. K. Simon & S.**

W. L. Jacobs var. *pubiglumis* (K. Schum.) B. K. Simon & S. W. L. Jacobs

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: IPA.

Melica

***Melica argentea* E. Desv.**

Sinónimos: *Melica glabra* Steud., *Melica ampla* Phil., *Melica nitida* Phil., *Melica tortuosa* Phil., *Melica argenteata* var. *breviglumis* Papp, *Melica violacea* var. *argenteata* Papp

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 15-2200 m.

***Melica commersonii* Nees ex Steud.**

Sinónimos: *Melica commutata* Steud., *Melica violacea* Cav. var. *pallida* E. Desv., *Melica violacea* Cav. var. *commersonii* (Nees ex Steud.) Papp, *Melica violacea* Cav. var. *commutata* (Steud.) Papp

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO.

Rango altitudinal: 15-1900 m.

***Melica longiflora* Steud.**

Sinónimos: *Melica flava* Nees ex Steud., *Melica laxiflora* E. Desv., *Melica laxiflora* E. Desv. var. *hirsuta* E. Desv., *Melica hirta* Phil., *Melica exaltata* Phil., *Melica berteroana* Phil., *Melica berteroana* fma. *violacea* Papp, *Melica berteroana* Phil. var. *exaltata* (Phil.) Papp, *Melica berteroana* Phil. var. *pilosula* Papp, *Melica flava* Nees ex Steud. var. *violacea* Papp, *Melica laxiflora* E. Desv. var. *glabra* Papp, *Melica laxiflora* E. Desv. var. *hirta* Papp, *Melica laxiflora* E. Desv. var. *pilosula* Papp, *Melica laxiflora* fma. *hirta* (Phil.) Hempel

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 20-1300 m.

***Melica mollis* Phil.**

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ATA, COQ.

Rango altitudinal: 340 m.

***Melica paulsenii* Phil.**

Sinónimos: *Melica littoralis* Phil. var. *paulsenii* (Phil.)

Papp, *Melica littoralis* Phil. var. *werdermannii* Papp

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, RME, MAU.

Rango altitudinal: 50-700 m.

***Melica poecilantha* E. Desv.**

Sinónimos: *Melica poecilantha* E. Desv. var. *umbrosa* E.

Desv.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ.

Rango altitudinal: 500-1200 m.

***Melica violacea* Cav.**

Sinónimos: *Melica alata* Nees ex Steud., *Melica filiculmis* E. Desv., *Melica valdiviana* Phil., *Melica alata* Nees ex Steud. var. *filiculmis* (E. Desv.) Papp, *Melica alata* Nees ex Steud. var. *mollis* Papp, *Melica violacea* Cav. fma. *mollis* (Papp) Hempel

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.

Rango altitudinal: 5-2000 m.

Melinis

***Melinis minutiflora* P. Beauv.**

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: IPA.

***Melinis repens* (Willd.) Zizka**

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: IPA.

Microchloa

***Microchloa indica* (L. f.) P. Beauv.**

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: AYP.

***Microchloa kunthii* Desv.**

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR.

Rango altitudinal: 3220-3220 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Miscanthus

***Miscanthus sinensis* Andersson**

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: MAU.

Muhlenbergia

***Muhlenbergia asperifolia* (Nees & Meyen ex Trin.) Parodi**

Sinónimos: *Vilfa asperifolia* Nees & Meyen ex Trin., *Sporobolus copiaphinus* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, RME.

Rango altitudinal: 100-4700 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

***Muhlenbergia fastigiata* (J. Presl) Henrard**

Sinónimos: *Sporobolus fastigiatus* J. Presl

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP.

Rango altitudinal: 3300-4300 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Muhlenbergia peruviana* (P. Beauv.) Steud.**

Sinónimos: *Clomena peruviana* P. Beauv.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, MAU.

Rango altitudinal: 2250-4040 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Munroa

***Munroa andina* Phil.**

Sinónimos: *Hemimunroa andina* (Phil.) Parodi, *Munroa multiflora* Phil.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: TAR, ANT.

Rango altitudinal: 2700-4000 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

***Munroa argentina* Griseb.**

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: ANT.
Rango altitudinal: 2820-3800 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Munroa decumbens Phil.
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: AYP, ANT.
Rango altitudinal: 2850-3660 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nassella

Nassella arcuata (R.E. Fr.) Torres
Sinónimos: *Stipa arcuata* R.E. Fr.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT.
Rango altitudinal: 400-4500 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Nassella asplundii Hitchc.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR.
Rango altitudinal: 3600-4000 m.
Países limítrofes: Bolivia y Perú.

Nassella barbinodis (Phil.) Muñoz-Schick, Ciald. & Morrone
Sinónimos: *Stipa barbinodis* Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: NUB, BIO, ARA, LLA.
Rango altitudinal: 60-280 m.

Nassella caespitosa Griseb.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ANT.
Rango altitudinal: 4120-4120 m.
Países limítrofes: Argentina y Perú.

Nassella chilensis (Trin.) E. Desv. var. ***chilensis***
Sinónimos: *Urachne chilensis* Trin., *Piptatherum ligleyanum* Nees, *Urachne major* Trin. & Rupr., *Nassella major* (Trin. & Rupr.) E. Desv., *Nassella ramosa* E. Desv., *Nassella sadae* Phil., *Nassella landbeckii* Phil., *Nassella landbeckii* Phil. var. *eremophila* Phil., *Nassella laxiflora* Phil., *Nassella planifolia* Phil., *Nassella floribunda* Phil., *Nassella obscura* fma. Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 2700-5000 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Coirón, Coironcillo, Nudillo.

Nassella chilensis (Trin.) E. Desv. var. ***juncea*** (Phil.) Muñoz-Schick
Sinónimos: *Nassella juncea* Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ, RME, LBO, BIO, ARA, LRI.
Rango altitudinal: 20-925 m.

Nassella coquimbensis (Matthei) Peñail.
Sinónimos: *Stipa coquimbensis* Matthei
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ.
Rango altitudinal: 60-350 m.

Nassella duriuscula (Phil.) Barkworth
Sinónimos: *Stipa duriuscula* Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.
Rango altitudinal: 15-1000 m.

Nassella elata (Speg.) Torres
Sinónimos: *Stipa caespitosa* (Griseb.) Speg. var. *elata* Speg.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ATA.
Rango altitudinal: 2200-3000 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Nassella filiculmis (Delile) Barkworth
Sinónimos: *Stipa filiculmis* Delile, *Stipa leucogluma* Steud., *Stipa trichocaulos* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: LBO, NUB, BIO, ARA, LRI.
Rango altitudinal: 5-1200 m.
Países limítrofes: Argentina.

Nassella gibba (Phil.) Muñoz-Schick
Sinónimos: *Piptochaetium gibbum* Phil., *Nassella exserta* Phil. var. *asperata* Parodi
Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB.

Rango altitudinal: 15-1000 m.

***Nassella gigantea* (Steud.) Muñoz-Schick**

Sinónimos: *Urachne gigantea* Steud., *Nassella exserta* Phil., *Nassella fuscescens* Phil., *Nassella melanocarpa* Phil., *Nassella pugae* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 5-1800 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Nassella hirtifolia* (Hitchc.) Barkworth**

Sinónimos: *Stipa hirtifolia* Hitchc.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO.

Rango altitudinal: 20-1650 m.

***Nassella lachnophylla* (Trin.) Barkworth**

Sinónimos: *Stipa lachnophylla* Trin., *Stipa cumingiana* var. *lachnophylla* (Trin.) Trin. & Rupr., *Stipa cumingiana* Trin., *Stipa laxa* E. Desv., *Stipa leiocarpa* Nees ex Steud., *Stipa hirta* Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, ARA.

Rango altitudinal: 10-1000 m.

***Nassella laevissima* (Phil.) Barkworth**

Sinónimos: *Piptochaetium laevissimum* Phil., *Stipa laevissima* (Phil.) Speg., *Nassella longearistata* Phil., *Piptochaetium collinum* Phil., *Stipa breviculmis* Hitchc.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, JFE.

Rango altitudinal: 5-2500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nota: Introducida en el Archipiélago de Juan Fernández.

***Nassella longiglumis* (Phil.) Barkworth**

Sinónimos: *Stipa longiglumis* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, LBO, MAU, NUB.

Rango altitudinal: 60-700 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Nassella macrathera* (Phil.) Barkworth**

Sinónimos: *Stipa macrathera* Phil., *Stipa fernandeziana* Phil., hom. illeg. non Steud. 1854, *Stipa rudolphii* Speg. Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, JFE.

Rango altitudinal: 2-2000 m.

***Nassella manicata* (E. Desv.) Barkworth**

Sinónimos: *Stipa manicata* E. Desv.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.

Rango altitudinal: 10-2800 m.

***Nassella meyeniana* (Trin. & Rupr.) Parodi**

Sinónimos: *Urachne meyeniana* Trin. & Rupr.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP.

Rango altitudinal: 4070 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Nassella nardoides* (Phil.) Barkworth**

Sinónimos: *Danthonia nardoides* Phil., *Stipa nardoides* (Phil.) Hack. ex Hitchc.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA.

Rango altitudinal: 3000-4900 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Nassella neesiana* (Trin. & Rupr.) Barkworth**

Sinónimos: *Stipa neesiana* Trin. & Rupr., *Stipa neesiana* Trin. & Rupr. var. *chilensis* Trin. & Rupr., *Stipa neesiana* Trin. & Rupr. var. *fernandeziana* Trin. & Rupr., *Stipa fernandeziana* (Trin. & Rupr.) Steud., *Stipa longiflora* Steud., *Stipa trachysperma* Phil., *Stipa contracta* Phil., *Stipa hispida* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE.

Rango altitudinal: 5-1100 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: flechilla.

Nota: Introducida en el Archipiélago de Juan Fernández.

***Nassella parodii* (Matthei) Barkworth**

Sinónimos: *Stipa parodii* Matthei

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: LBO, NUB, BIO.

Rango altitudinal: 5-370 m.

***Nassella pfisteri* (Matthei) Barkworth**

Sinónimos: *Stipa pfisteri* Matthei

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, MAU, NUB.

Rango altitudinal: 60-350 m.

***Nassella philippii* (Steud.) Barkworth**

Sinónimos: *Stipa philippii* Steud., *Stipa lenta* Hitchc.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 65-450 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Nassella poeppigiana* (Trin. & Rupr.) Barkworth**

Sinónimos: *Stipa poeppigiana* Trin. & Rupr., *Stipa amethystina* Steud., *Nassella amethystina* (Steud.)

Barkworth, *Stipa pratensis* Phil., *Stipa collina* Phil.,

Stipa curicoana Phil., *Stipa julietii* Phil., *Stipa montana*

Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.

Rango altitudinal: 10-1700 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Quilmén, fechilla.

***Nassella pubiflora* (Trin. & Rupr.) E. Desv.**

Sinónimos: *Urachne pubiflora* Trin. & Rupr.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR.

Rango altitudinal: 2950-4000 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Taj-taja.

***Nassella pungens* E. Desv.**

Sinónimos: *Nassella humilis* Phil., *Nassella johnstonii* Parodi

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, RME.

Rango altitudinal: 5-1000 m.

***Nassella rupestris* (Phil.) Torres**

Sinónimos: *Stipa rupestris* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT.

Rango altitudinal: 3200-4600 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

***Nassella tenuis* (Phil.) Barkworth**

Sinónimos: *Stipa tenuis* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, BIO, ARA.

Países limítrofes: Argentina.

Nicraepoa

***Nicraepoa andina* (Trin.) Soreng & L.J. Gillespie**

Sinónimos: *Poa andina* Trin., *Deschampsia latifolia*

Phil., *Poa aristata* Phil., *Poa acrochaeta* Hack.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: BIO, ARA, LRI.

Rango altitudinal: 935-2600 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Nicraepoa chonotica* (Phil.) Soreng & L.J.**

Gillespie

Sinónimos: *Poa chonotica* Phil., *Poa latifolia* Phil., *Poa robusta* Phil., *Poa borchersii* Phil., *Poa chubutensis*

Speg., *Poa berningeri* Pilg.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: NUB, ARA, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 10-2700 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Nicraepoa pugionifolia* (Speg.) Soreng & L.J.**

Gillespie

Sinónimos: *Poa pugionifolia* Speg., *Poa acutissima* Pilg.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 600-850 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Nicraepoa robusta* (Steud.) Soreng & L.J.**

Gillespie

Sinónimos: *Poa robusta* Steud., *Festuca arenaria* Lam.,

Poa arenicola St.-Ives

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AIS, MAG.

Rango altitudinal: 5-95 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nicoraepoa subenervis (Hack.) Soreng & L.J. Gillespie subsp. ***spegazziniana*** (Nicora) Soreng & L.J. Gillespie
Sinónimos: *Poa spegazziniana* Parodi, *Poa subenervis* Hack. var. *spegazziniana* Nicora
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: RME, LBO.
Rango altitudinal: 2390-2600 m.
Países limítrofes: Argentina.

Nicoraepoa subenervis (Hack.) Soreng & L.J. Gillespie subsp. ***subenervis***
Sinónimos: *Poa subenervis* Hack.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: RME, MAG.
Rango altitudinal: 720-900 m.
Países limítrofes: Argentina.

Ortachne

Ortachne breviseta Hitchc.
Sinónimos: *Stipa breviseta* (Hitchc.) Martic. & Quezada, nom. illeg., *Stipa yatesensis* Martic. & Quezada
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: LRI, LLA.
Rango altitudinal: 1200-1700 m.
Países limítrofes: Argentina.

Ortachne rariflora (Hook.f.) Hughes
Sinónimos: *Muhlenbergia rariflora* Hook.f., *Ortachne retorta* Nees ex Steud., *Stipa rariflora* (Hook.f.) Benth., *Stipa retorta* (Nees ex Steud.) Mez
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 15-1300 m.
Países limítrofes: Argentina.

Oryza

Oryza sativa L.
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: RME, LBO, MAU, BIO.

Panicum

Panicum capillare L.

Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: COQ, VAL, RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.

Panicum dichotomiflorum Michx.
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: RME, LBO, MAU, BIO.

Panicum miliaceum L.
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: NUB, BIO.

Panicum racemosum (P. Beauv.) Spreng.
Sinónimos: *Monachne racemosa* P. Beauv.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAU, BIO, ARA, LRI.
Rango altitudinal: 5-35 m.
Países limítrofes: Argentina.

Panicum urvilleanum Kunth
Sinónimos: *Monachne urvilleana* (Kunth) Herter, *Panicum reversipilum* Steud., *Panicum urvillianum* Brongn.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: LBO, NUB, BIO, ARA, LRI.
Rango altitudinal: 5-140 m.
Países limítrofes: Argentina.

Pappostipa

Pappostipa atacamensis (Parodi) Romasch.
Sinónimos: *Stipa atacamensis* Parodi, *Jarava atacamensis* (Parodi) Peñail.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ANT, ATA, COQ, RME.
Rango altitudinal: 1900-4380 m.
Países limítrofes: Argentina.

Pappostipa chrysophylla (E. Desv.) Romasch.
Sinónimos: *Stipa chrysophylla* E. Desv., *Stipa chrysophylla* E. Desv. var. *major* E. Desv., *Stipa humilis* Cav. fma. *chrysophylla* (E. Desv.) Kuntze, *Stipa speciosa* Trin. & Rupr. subsp. *chrysophylla* (E. Desv.) Dusén, *Jarava chrysophylla* (E. Desv.) Peñail., *Stipa chrysophylla* E. Desv. var. *minor* E. Desv.
Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU.
Rango altitudinal: 470-4290 m.
Países limítrofes: Argentina.

Pappostipa frigida (Phil.) Romasch.
Sinónimos: *Stipa frigida* Phil., *Jarava frigida* (Phil.) F. Rojas
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, RME, MAU.
Rango altitudinal: 50-5000 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.
Nombre vulgar: pasto vicuña.

Pappostipa humilis (Cav.) Romasch.
Sinónimos: *Stipa humilis* Cav., *Jarava humilis* (Cav.) Peñail.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AIS, MAG.
Rango altitudinal: 15-800 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Coirón, coirón amargo.

Pappostipa ibarii (Phil.) Romasch.
Sinónimos: *Stipa ibarii* Phil., *Jarava ibarii* (Phil.) Peñail.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAG.
Rango altitudinal: 100-900 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Coirón enano.

Pappostipa nana (Speg.) Romasch.
Sinónimos: *Stipa nana* Speg., *Jarava nana* (Speg.) Peñail.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AIS.
Rango altitudinal: 400-400 m.
Países limítrofes: Argentina.

Pappostipa speciosa (Trin. & Rupr.) Romasch.
Sinónimos: *Stipa speciosa* Trin. & Rupr., *Stipa humilis* Cav. var. *speciosa* (Trin. & Rupr.) Kuntze, *Achnatherum speciosum* (Trin. & Rupr.) Barkworth
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 5-4120 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.
Nombre vulgar: Pajonal.

Pappostipa vaginata (Phil.) Romasch.
Sinónimos: *Stipa vaginata* Phil., *Jarava vaginata* (Phil.) F. Rojas
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME.
Rango altitudinal: 1100-4300 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Parapholis

Parapholis incurva (L.) C.E. Hubb.
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, BIO.

Parapholis strigosa (Dumort.) C.E. Hubb.
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: BIO, ARA, LLA.

Paspalum

Paspalum chilense Catanzaro & G.H. Rua
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: BIO, ARA, LRI.

Paspalum conjugatum P. J. Berg.
Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: IPA.

Paspalum dasypleurum Kuntze ex E. Desv.
Sinónimos: *Paspalum cumingii* Nees ex Steud., *Paspalum pachyrrhizum* Steud., *Paspalum paradisiacum* Steud.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ATA, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE.
Rango altitudinal: 5-1200 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Chépica.
Nota: Introducida en el Archipiélago de Juan Fernández.

Paspalum dilatatum Poir. ex Lam.

Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, IPA.
Rango altitudinal: 30-1000 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.
Nombre vulgar: Chépica gigante.
Nota: Introducida en Rapa Nui (Isla de Pascua).

***Paspalum distichum* L.**

Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: AYP, ANT, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, JFE.

***Paspalum forsterianum* Flüggé**

Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: IPA.
Nombre vulgar: Herike hare (Rapa Nui).

***Paspalum minus* E. Fourn.**

Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ARA, LRI.
Rango altitudinal: 160-220 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Paspalum notatum* Flüggé var. *saurae* Parodi**

Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: IPA.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Paspalum orbiculare* G. Forst.**

Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: IPA.
Rango altitudinal: 25-100 m.

***Paspalum plicatulum* Michx.**

Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAU.
Rango altitudinal: 1000-1000 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Paspalum urvillei* Steud.**

Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.
Rango altitudinal: 10-1500 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

***Paspalum vaginatum* Sw.**

Sinónimos: *Paspalum gayanum* E. Desv.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.
Rango altitudinal: 20-2000 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.
Nombre vulgar: Chépica.

Phalaris

***Phalaris amethystina* Trin.**

Sinónimos: *Phalaris berteroniana* Steud., *Phalaris robinsoniana* Nees ex Steud., *Phalaris colchaguensis* Phil., *Phalaridanta robinsoniana* (Steud.) St.-Lég.
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, JFE.
Rango altitudinal: 40-1000 m.
Nota: Introducida en el Archipiélago de Juan Fernández.

***Phalaris angusta* Nees ex Trin.**

Sinónimos: *Phalaris chilensis* J. Presl.
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: VAL, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE.
Rango altitudinal: 10-175 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.
Nota: Introducida en el Archipiélago de Juan Fernández.

***Phalaris aquatica* L.**

Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: AYP, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, MAG.

***Phalaris arundinacea* L.**

Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: LLA, MAG.

***Phalaris canariensis* L.**

Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, MAG.

***Phalaris caroliniana* Walter**

Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: VAL.

Piptochaetium

***Phalaris coerulescens* Desf.**

Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: BIO.

***Phalaris minor* Retz.**

Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: COQ, BIO.

***Phalaris paradoxa* L.**

Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: LBO.

Phleum

***Phleum alpinum* L.**

Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 10-3500 m.
Países limítrofes: Argentina.

***Phleum pratense* L.**

Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Phragmites

***Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steud.**

Sinónimos: *Arundo australis* Cav., *Phragmites communis* Trin., *Phragmites phragmites* (L.) H. Karst., *Phragmites phragmites* (L.) Speg., *Phtagmites dioicus* Hack. ex Hicken, *Phragmites dioica* Hack. ex Conert
Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.
Rango altitudinal: 5-2390 m.
Nombre vulgar: Carrizo.

Piptatherum

***Piptatherum miliaceum* (L.) Coss.**

Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: VAL, RME, MAG.

***Piptochaetium angolense* Phil.**

Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 10-740 m.

***Piptochaetium bicolor* (Vahl) E. Desv.**

Sinónimos: *Stipa bicolor* Vahl, *Stipa megalantha* Steud.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, JFE.
Rango altitudinal: 10-1100 m.
Países limítrofes: Argentina.

***Piptochaetium depressum* (Steud.) C. Peña**

Sinónimos: *Urachne depressa* Steud., *Piptochaetium verrucosum* Phil., *Piptochaetium humile* Phil., *Piptochaetium granulatum* Phil., *Piptochaetium moelleri* Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.
Rango altitudinal: 0-1500 m.

***Piptochaetium fuscum* (Nees ex Steud.)**

Barkworth, Cialdella & Gandhi
Sinónimos: *Urachne fusca* Steud., *Piptochaetium purpuratum* Phil., *Piptochaetium pallidum* Phil. ex Griseb., *Piptochaetium macrocarpum* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 10-1100 m.

***Piptochaetium hirtum* Phil.**

Sinónimos: *Piptochaetium brevifolium* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: RME, LBO.
Rango altitudinal: 600-800 m.
Países limítrofes: Argentina.

***Piptochaetium montevidense* (Spreng.) Parodi**

Sinónimos: *Caryochloa montevidensis* Spreng., *Piptochaetium tuberculatum* E. Desv., *Oryzopsis tuberculata* (E. Desv.) Speg., *Urachne depressa* Steud.,

Piptochaetium verrucosum Phil., *Oryzopsis verruculosa* (Phil.) Speg., *Oryzopsis verrucosa* (Phil.) Speg., *Piptochaetium humile* Phil., *Piptochetium moelleri* Phil. Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.
Rango altitudinal: 5-1500 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Piptochaetium panicoides* (Lam.) E. Desv.**
Sinónimos: *Stipa panicoides* Lam., *Piptochaetium subnudum* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.
Rango altitudinal: 15-1400 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Piptochaetium stipoides* (Trin. & Rupr.) Hack.**
Sinónimos: *Urachne stipoides* Trin. & Rupr.,
Piptochaetium cuspidatum Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.
Rango altitudinal: 10-300 m.
Países limítrofes: Argentina.

Poa

***Poa acinaciphylla* E. Desv.**
Sinónimos: *Poa villaroellii* Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ, VAL, RME.
Rango altitudinal: 2500-3700 m.

Poa alopecurus* (Gaudich. ex Mirb.) Kunth subsp. *alopecurus
Sinónimos: *Arundo alopecurus* Gaudich.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ARA, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 20-1080 m.
Países limítrofes: Argentina.

***Poa alopecurus* (Gaudich. ex Mirb.) Kunth subsp. *fuegiana* (Hook.f.) D.M. Moore & Dogg.**
Sinónimos: *Festuca fuegiana* Hook.f., *Poa fuegiana* (Hook.f.) Hack., *Festuca fuegiana* Hook.f. var. *vivipara* Hook., *Aira superbiens* Steud., *Poa superbiens* (Steud.)

Hauman & Parodi, *Deyeuxia vivipara* Phil., *Festuca pogonantha* Franch., *Poa pogonantha* (Franch.) Parodi, *Poa fuegiana* (Hook.f.) Hack. var. *involucrata* Hack., *Poa commersonii* Franch.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 3-1300 m.
Países limítrofes: Argentina.

***Poa alopecurus* (Gaudich. ex Mirb.) Kunth subsp. *shuka* (Speg.) Giussani & Soreng**
Sinónimos: *Festuca shuka* Speg., *Poa shuka* (Speg.) Parodi
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAG.
Rango altitudinal: 1-550 m.
Países limítrofes: Argentina.

***Poa androgyna* Hack.**
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP.
Rango altitudinal: 3400-4156 m.
Países limítrofes: Bolivia.

***Poa annua* L.**
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: TAR, ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE, IPA.

***Poa atropidiformis* Hack.**
Sinónimos: *Disanthelium atropidiforme* (Hack.) Soreng
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAG.
Rango altitudinal: 3-1300 m.
Países limítrofes: Argentina.

***Poa bonariensis* (Lam.) Kunth**
Sinónimos: *Festuca bonariensis* Lam., *Schenodorus bonariensis* (Lam.) Roem. & Schult.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, MAG.
Rango altitudinal: 10-1400 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Poa bulbosa* L. subsp. *bulbosa

Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: MAG.

Poa bulbosa L. subsp. *vivipara* (Koeler) Arcang.
Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: MAG.

Poa compressa L.
Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: ARA, LLA, MAG.

Poa cumingii Trin.
Sinónimos: *Distichlis ammobia* Phil., *Distichlis volkmannii* Phil., *Poa conformis* Nees ex Steud., *Poa curva* Nees ex Steud., *Poa dialystostachya* Phil., *Poa phalaroides* Nees ex Steud., *Poa stachyodes* Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ, VAL, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.
Rango altitudinal: 3-350 m.

Poa darwiniana Parodi
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAG.
Rango altitudinal: 1 m.
Países limítrofes: Argentina.

Poa denudata Steud.
Sinónimos: *Koeleria rigidula* Steud., *Trisetum rigidulum* (Steud.) Domin, *Poa vaginiflora* Steud., *Poa vaginifolia* Steud. ex Lechler, *Poa vaginiformis* Steud. ex fma. Phil., *Poa chiloensis* Phil., *Poa fonckii* Phil., *Poa araucana* Phil., *Poa eligulata* Hack.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.
Rango altitudinal: 1-2750 m.
Países limítrofes: Argentina.

Poa flabellata (Lam.) Raspail
Sinónimos: *Festuca flabellata* Lam., *Poa flabellata* Hook.f., *Parodiochloa flabellata* (Lam.) C.E. Hubb.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAG.
Rango altitudinal: 1-100 m.
Países limítrofes: Argentina.

Poa gayana E. Desv.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB.
Rango altitudinal: 470-3400 m.
Países limítrofes: Argentina.

Poa glauca Vahl
Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: AIS, MAG.

Poa gymnantha Pilg.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR.
Rango altitudinal: 4250-4720 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Poa hachadoensis Nicora var. *hachadoensis*
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: BIO, ARA.
Rango altitudinal: 1284-1430 m.
Países limítrofes: Argentina.

Poa hachadoensis Nicora var. *pilosa* Nicora
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: LBO, ARA.
Rango altitudinal: 980-2150 m.
Países limítrofes: Argentina.

Poa holciformis J. Presl
Sinónimos: *Koeleria poaeoides* Nees ex Steud., *Festuca elliotii* Hack., *Poa chilensis* Trin., *Poa chilensis* Trin. var. *robustior* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 1200-3800 m.
Países limítrofes: Argentina.

Poa humillima Pilg.
Sinónimos: *Poa humillima* Pilg. var. *exserta* Hack. ex Buchtien
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, ANT.
Rango altitudinal: 4500-4925 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Poa infirma Kunth

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: VAL, RME.

***Poa kurtzii* R.E. Fr.**

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR.

Rango altitudinal: 4000-4680 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Poa laetevirens* R.E. Fr.**

Sinónimos: *Poa nana* Phil., *Poa atacamensis* Parodi,
Puccinellia atacamensis (Parodi) Soreng

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR.

Rango altitudinal: 4078-4550 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Poa lanuginosa* Poir. var. *lanuginosa

Sinónimos: *Poa magellanica* Phil. ex Macloskie

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, MAG.

Rango altitudinal: 10-3500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Poa lanuginosa* Poir. var. *patagonica* (Phil.)**

Giussani & Soreng

Sinónimos: *Poa patagonica* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 110-110 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Poa lepidula* (Nees & Meyen) Soreng & L.J.**

Gillespie

Sinónimos: *Anthochloa lepidula* Nees & Meyen

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT.

Rango altitudinal: 4000-5000 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Poa ligularis* Nees ex Steud.**

Sinónimos: *Poa denudata* Steud. var. *minor* Ball

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: BIO, AIS.

Rango altitudinal: 230-930 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Poa lilloi* Hack.**

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP.

Rango altitudinal: 4250-4250 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Poa mendocina* Nicora & F.A. Roig**

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: RME.

Rango altitudinal: 3325-3325 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Poa nemoralis* L.**

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: RME, ARA, AIS, MAG.

***Poa obvallata* Steud.**

Sinónimos: *Deyeuxia vulcanica* Phil., *Poa julietii* Phil.,
Poa pachypogon Nees, *Poa subaristata* Phil., *Poa tristigmatica* E. Desv.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 210-2600 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Poa palustris* L.**

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: VAL, RME, MAG.

***Poa paposana* Phil.**

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME.

Rango altitudinal: 30-820 m.

***Poa parviceps* Hack.**

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ANT.

Rango altitudinal: 4395-4395 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Poa pearsonii* Reeder**

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP.

Rango altitudinal: 4460-4500 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Poa perligulata* Pilg.**

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR.

Rango altitudinal: 4340-4460 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Poa pfisteri* Soreng**

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: BIO.

Rango altitudinal: 200-300 m.

***Poa planifolia* Kuntze**

Sinónimos: *Colpodium planifolium* (Kuntze) K. Schum.,

Poa chilensis Trin. var. *planifolia* (Kuntze) Haumann

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: RME.

Rango altitudinal: 2750-3230 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Poa pratensis* L. subsp. *alpigena* (Lindm.)**

Hiitonen

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: MAG.

Poa pratensis* L. subsp. *pratensis

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.

***Poa scaberula* Hook.f.**

Sinónimos: *Poa dactyliformis* Steud.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ANT, ATA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 95-4200 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Poa schoenoides* Phil.**

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: LRI.

Rango altitudinal: 2230 m.

***Poa secunda* O subsp. *juncifolia* (Scribn.) Soreng**

Sinónimos: *Poa juncifolia* Scribn., *Poa ampla* Merr.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: RME, MAG.

Rango altitudinal: 0-600 m.

Países limítrofes: Argentina.

Poa secunda* J. Presl subsp. *secunda

Sinónimos: *Poa fulvescens* Trin., *Festuca patagonica*

Phil., *Festuca spianantha* Phil., *Poa fallens* Pilg.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL, RME, LBO, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 200-2600 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Poa serpiana* Refulio**

Sinónimos: *Disanthelium peruvianum* (Nees & Meyen)

Pilg., *Phalaridium peruvianum* Nees & Meyen

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: AYP.

Rango altitudinal: 4450-4450 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Poa spiciformis* (Steud.) Hauman & Parodi var.**

***ibarii* (Phil.) Giussani**

Sinónimos: *Poa ibari* var. *ibari* Phil., *Poa rigidifolia*

Steud. var. *ibarii* (Phil.) Giussani

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 5-900 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Poa spiciformis* (Steud.) Hauman & Parodi var.**

spiciformis

Sinónimos: *Aira spiciformis* Steud., *Koeleria sterilis*

Steud., *Poa poecila* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: RME, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 5-1400 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Poa stenantha* Trin.**

Sinónimos: *Poa chorizantha* E. Desv.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: NUB, ARA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 670-2200 m.

***Poa trachyantha* Hack.**

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: AIS.

Poa tricolor Nees ex Steud.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: VAL.

Rango altitudinal: 300 m.

Poa trivialis L.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: VAL, RME, MAU, NUB, BIO, LRI, LLA, MAG.

Poa yaganica Speg.

Sinónimos: *Poa breviculmis* Pilg., *Poa chrysanthia* Lindm.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 50-170 m.

Países limítrofes: Argentina.

Podagrostis

Podagrostis sesquiflora (E. Desv.) Nicora

Sinónimos: *Agrostis sesquiflora* E. Desv., *Deyeuxia sesquiflora* (E. Desv.) Benth. & Hook.f. ex W.D. Jacks., *Briza sesquiflora* (E. Desv.) Pilg.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.

Rango altitudinal: 1000-2400 m.

Países limítrofes: Argentina.

Podophorus

Podophorus bromoides Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: JFE.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Nota: Extinta.

Polypogon

Polypogon australis Brongn.

Sinónimos: *Polypogon chonoticus* Hook.f., *Polypogon crinitus* Trin., hom. illeg. non (Schreb.) Nutt. 1818, *Polypogon littoralis* var. *crinitus* Kuntze, *Polypogon interruptus* var. *crinitus* (Kuntze) Hack., *Polypogon radicans* Steud.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, JFE.

Rango altitudinal: 10-4000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nota: Introducida en el Archipiélago de Juan Fernández.

Polypogon cachinalensis Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ANT, COQ.

Rango altitudinal: 2600-3000 m.

Polypogon chilensis (Kunth) Pilg.

Sinónimos: *Chaetotropis chilensis* Kunth, *Chaetotropis latifolia* Phil.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: ATA, VAL, NUB, BIO, LRI, LLA, JFE.

Rango altitudinal: 5-700 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nota: Introducida en el Archipiélago de Juan Fernández.

Polypogon elongatus Kunth var. *elongatus*

Sinónimos: *Polypogon affinis* Brongn.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ATA, VAL, RME, NUB, LRI, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 400-850 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Polypogon elongatus Kunth var. *strictus* E. Desv.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: RME, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 5-200 m.

Polypogon exasperatus (Trin.) Renvoize var. *exasperatus*

Sinónimos: *Agrostis exasperata* Trin., *Chaetotropis exasperata* (Trin.) Björkman, *Agrostis asperigluma* Steud., *Chaetotropis asperigluma* (Steud.) Nicora, *Chaetotropis araucana* Phil., *Agrostis exasperata* Trin. var. *viridis* Kuntze, *Agrostis speeiana* Mez

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG, JFE.

Rango altitudinal: 5-2250 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Polypogon exasperatus* (Trin.) Renvoize var.**

***kuntzei* (Mez)** Finot

Sinónimos: *Agrostis kuntze* Mez, *Agrostis exasperata*

Trin. var. *purpurascens* Kuntze

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, RME.

Rango altitudinal: 2000-2800 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Polypogon imberbis* (Phil.) Johow**

Sinónimos: *Nowodworskya imberbis* Phil., *Chaetotropis imberbis* (Phil.) Björkman, *Polypogon imberbis* (Phil.)

Johow fma. *aristata* Skottsb.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAU, ARA, LRI, LLA, JFE.

Rango altitudinal: 5-100 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nota: Introducida en el Archipiélago de Juan Fernández.

***Polypogon interruptus* Kunth**

Sinónimos: *Polypogon interruptus* Kunth var.

breviaristatus E. Desv., *Polypogon interruptus* Kunth

var. *longearistata* E. Desv., *Polypogon microstachys*

Phil., *Polypogon tarapacanus* Phil., *Polypogon*

brachyatherus Phil., *Polypogon breviaristatus* Phil.,

Polypogon purpurascens Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, LLA.

Rango altitudinal: 10-3850 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Polypogon linearis* Trin.**

Sinónimos: *Polypogon longiflorus* Nees ex Steud., nom. nud., *Polypogon longiflorus* Nees ex Steud., *Polypogon longiflorus* Nees ex Trin.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, BIO.

Rango altitudinal: 20-740 m.

***Polypogon magellanicus* (Lam.) Finot**

Sinónimos: *Agrostis magellanica* Lam., *Agrostis antarctica* Hook.f., *Agrostis magellanica* Lam. var. *antarctica* (Hook.f.) Franch., *Agrostis magellanica* Lam. var. *antarctica* (Hook.f.) Pilg., *Agrostis cognata* Steud., *Agrostis magellanica* Lam. var. *cognata* (Steud.) Macloskie & Dusén, *Agrostis chonotica* Phil., *Agrostis*

araucana Phil., *Agrostis macrathera* Phil., *Agrostis rinihiensis* Phil., *Vilfa magellanica* (Lam.) P. Beauv.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 10-1200 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Polypogon maritimus* Willd.**

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: VAL, BIO.

***Polypogon monspeliensis* (L.) Desf.**

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: AYP, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, JFE.

***Polypogon viridis* (Gouan) Breistr.**

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: AYP, TAR, ANT, COQ, VAL, RME, LBO, BIO, ARA, LLA.

Puccinellia

***Puccinellia argentinensis* (Hack.) Parodi**

Sinónimos: *Atropis argentinensis* Hack.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ATA.

Rango altitudinal: 2000-4000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Puccinellia biflora* (Steud.) Parodi**

Sinónimos: *Festuca biflora* Steud., *Atropis biflora* (Steud.) St.-Yves & Camus

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 0-15 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Puccinellia frigida* (Phil.) I.M. Johnst.**

Sinónimos: *Catabrosa frigida* Phil., *Poa eremophila* Phil., *Poa oresigena* Phil., *Puccinellia oresigena* (Phil.) Hitchc., *Poa hypsophila* Phil., *Puccinellia hypsophila* (Phil.) Parodi ex Espinosa, *Puccinellia hypsophila* (Phil.) Parodi ex Nicora, *Poa pumila* Phil., *Poa taltalensis* Pilg.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 2300-4500 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

***Puccinellia glaucescens* (Phil.) Parodi**

Sinónimos: *Catabrosa glaucescens* Phil., *Puccinellia johnstonii* Muñoz

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, BIO, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 5-3000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Puccinellia magellanica* (Hook.f.) Parodi**

Sinónimos: *Catabrosa magellanica* Hook.f., *Atropis magellanica* (Hook.f.) E. Desv., *Glyceria magellanica* (Hook.f.) Benth., *Glyceria fuegiana* Speg., *Atropis laxa* Pilg., *Puccinellia laxa* (Pilg.) Parodi

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: LLA, MAG.

Rango altitudinal: 0-90 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Puccinellia preslii* (Hack.) Ponert**

Sinónimos: *Catabrosa tenuifolia* J. Presl, *Aira tenuifolia* (J. Presl) Steud., *Glyceria tenuifolia* (J. Presl) Steud. nom. illeg., *Atropis preslii* (J. Presl) Hauman, *Atropis tenuifolia* (J. Presl) Hauman nom. illeg., *Atropis tenuifolia* (J. Presl) Speg. nom. illeg., *Puccinellia tenuifolia* (J. Presl) Parodi, nom. illeg., *Puccinellia parodi* Nicora nom. illeg.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ATA.

Rango altitudinal: 4000-4000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Puccinellia pusilla* (Hack.) Parodi**

Sinónimos: *Atropis preslii* Hack. subsp. *pusiilla* Hack.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 5-130 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Puccinellia skottsbergii* (Pilg.) Parodi**

Sinónimos: *Atropis skottsbergii* Pilg.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAG.

Países limítrofes: Argentina.

Relchela

***Relchela panicoides* Steud.**

Sinónimos: *Panicum oligostachyum* Steud., *Agrostis asperula* Phil., *Agrostis corralensis* Phil., *Agrostis limonias* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 10-1460 m.

Países limítrofes: Argentina.

Rostraria

***Rostraria cristata* (L.) Tzvelev**

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: TAR, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, MAG, IPA.

***Rostraria trachyantha* (Phil.) Tzvelev ex Soreng**

Sinónimos: *Koeleria trachyantha* Phil., *Raimundochloa trachyantha* (Phil.) A.M. Molina, *Parodiochloa trachyantha* (Phil.) A.M. Molina

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL.

Rango altitudinal: 25-550 m.

Países limítrofes: Perú.

Rytidosperma

***Rytidosperma lechleri* Steud.**

Sinónimos: *Danthonia glabra* Phil., *Rytidosperma glabrum* (Phil.) Nicora, *Notodanthonia lechleri* (Steud.) Veldkamp

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 800-3300 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Rytidosperma paschale* (Pilg.) C.M. Baeza**

Sinónimos: *Danthonia paschalis* Pilg.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: IPA.

Rango altitudinal: 10-10 m.

***Rytidosperma pictum* (Nees & Meyen) Nicora var. *bimucronata* Nicora**

Sinónimos: *Notodanthonia picta* (Nees & Meyen) Veldkamp var. *bimucronata* (Nicora) Veldkamp
Hierba acuática. Perenne. Nativa.
Distribución: BIO, AIS.
Rango altitudinal: 400-3500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Rytidosperma pictum* (Nees & Meyen) Nicora var. *pictum

Sinónimos: *Danthonia picta* Nees & Meyen,
Notodanthonia picta (Nees & Meyen) Veldkamp
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 170-3020 m.
Países limítrofes: Argentina.

***Rytidosperma quirihuense* C.M. Baeza**

Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: VAL, NUB.
Rango altitudinal: 355-390 m.

***Rytidosperma violaceum* (E. Desv.) Nicora**
Sinónimos: *Danthonia violacea* E. Desv., *Notodanthonia violacea* (E. Desv.) Veldkamp
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.
Rango altitudinal: 150-4000 m.
Países limítrofes: Argentina.

***Rytidosperma virescens* (E. Desv.) Nicora**
Sinónimos: *Danthonia virescens* E. Desv., *Danthonia andina* Phil., *Danthonia werdermanni* Pilg.,
Notodanthonia virescens (E. Desv.) Veldkamp var. *virescens*
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 20-2900 m.
Países limítrofes: Argentina.

Saccharum

***Saccharum officinarum* L.**
Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: IPA.

Schismus

Schismus arabicus Nees
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: COQ, VAL.

***Schismus barbatus* (L.) Thell.**

Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME.

Schizachyrium

***Schizachyrium sanguineum* (Retz.) Alston**
Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: VAL, RME, BIO.

Schyzachyrium

***Schyzachyrium spicatum* (Spreng.) Herter**
Sinónimos: *Deyeuxia spicata* Spreng.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: BIO.
Rango altitudinal: 750-750 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.
Nombre vulgar: Pasto escoba.

Setaria

***Setaria palmifolia* (Koenig) Stapf**
Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: IPA.

Setaria parviflora* (Poir.) Kerguélen var. *brachytricha Pensiero
Sinónimos: *Panicum brachytrichum* Steud. ex Lechler,
Setaria brachytricha (Steud. ex Lechler) Mez
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: BIO, ARA, LRI, LLA.
Rango altitudinal: 10-130 m.
Países limítrofes: Argentina.

Setaria parviflora* (Poir.) Kerguélen var. *parviflora
Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, JFE, IPA.

Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: TAR, ATA, VAL, RME, MAU, BIO.

Setaria sphacelata (Schumach.) Stapf & C. E.

Hubb. ex M. B. Moss

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: IPA.

Setaria verticillata (L.) P. Beauv.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, BIO, ARA.

Setaria viridis (L.) P. Beauv.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: ANT, ATA, VAL, RME, BIO.

Sorghum

Sorghum bicolor (L.) Moench.

Hierba. Anual o perenne. Introducida.

Distribución: IPA.

Sorghum halepense (L.) Pers.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, NUB, BIO, ARA, MAG, IPA.

Nombre vulgar: Toroko (Rapa Nui).

Sporobolus

Sporobolus densiflorus (Brongn.) P.M. Peterson & Saarela

Sinónimos: *Chauvinia chilensis* Steud., *Spartina densiflora* Brongn.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 5-150 m.

Países limítrofes: Argentina.

Sporobolus indicus (L.) R. Br.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: IPA.

Nombre vulgar: Here hoi (Rapa Nui).

Sporobolus virginicus (L.) Kunth

Sinónimos: *Agrostis virginica* L.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: AYP, TAR.

Rango altitudinal: 50-340 m.

Stenotaphrum

Stenotaphrum secundatum (Walter) Kuntze

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: AYP, TAR, BIO, LRI, LLA.

Taeniatherum

Taeniatherum caput-medusae (L.) Nevski

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: LBO, MAU.

Trichoneura

Trichoneura weberbaueri Pilg.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: AYP.

Rango altitudinal: 2100-2276 m.

Países limítrofes: Perú.

Tripogon

Tripogon nicorae Rígolo & A.S. Vega

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR.

Rango altitudinal: 2950-3200 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Tripogon spicatus (Nees) Ekman

Sinónimos: *Bromus spicatus* Nees

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR.

Rango altitudinal: 2900-3100 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Trisetum

Trisetum ambiguum Rúgolo & Nicora

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 350-900 m.

Países limítrofes: Argentina.

Trisetum barbinode Trin.

Sinónimos: *Trisetum hirtiflorum* Hack.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: RME, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 550-3500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Trisetum caudulatum Trin.

Sinónimos: *Trisetum chromostachyum* E. Desv.,

Trisetum heteronymum Steud., *Trisetum variabile* E.

Desv., *Trisetum variabile* E. Desv. var. *flavescens* E.

Desv., *Trisetum variabile* E. Desv. var. *virescens* E.

Desv., *Trisetum malacophyllum* Steud., *Trisetum*

splendidulum Steud., *Trisetum chiloense* Phil., *Trisetum*

variabile E. Desv. var. *chiloense* (Phil.) Louis-Marie,

Trisetum monticola Phil., *Trisetum ochrostachyum* Phil.,

Trisetum vidalii Phil., *Trisetum variabile* E. Desv. var.

vidalii (Phil.) Louis-Marie, *Trisetum lechleri* (Steud.)

Nicora, *Koeleria lechleri* Steud.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.

Rango altitudinal: 1170-3500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nota: Introducida en el Archipiélago de Juan Fernández.

Trisetum cernuum Trin.

Sinónimos: *Avena leptostachys* Hook.f., *Trisetum fraudulentum* Steud.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 150-1550 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Trisetum flavescens* (L.) P. Beauv.**

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: MAG.

Trisetum johnstonii* (Louis-Marie) Finot subsp. *johnstonii

Sinónimos: *Trisetum oreophilum* Louis-Marie var. *johnstonii* Louis-Marie

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ATA, COQ, RME.

Rango altitudinal: 3000-4300 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Trisetum johnstonii* (Louis-Marie) Finot subsp.**

***mattheii* (Finot) Finot**

Sinónimos: *Trisetum matthei* Finot

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: AYP.

Rango altitudinal: 4100-4100 m.

***Trisetum longiglume* Hack.**

Sinónimos: *Trisetum andicola* Louis-Marie, *Deschampsia andicola* (Louis-Marie) Valencia

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: RME.

Rango altitudinal: 2000-4000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Trisetum nancaguense* Finot**

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: RME, LBO, MAU, BIO.

Rango altitudinal: 45-2450 m.

***Trisetum preslei* (Kunth) E. Desv.**

Sinónimos: *Avena preslei* Kunth

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, MAU, NUB, BIO, ARA, AIS.

Rango altitudinal: 1300-3800 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Trisetum pyramidatum* Louis-Marie ex Finot**

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: RME, MAU, NUB, BIO, ARA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 5-540 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Trisetum spicatum* (L.) K. Richt. subsp. *cumingii* (Nees ex Steud.) Finot**

Sinónimos: *Trisetum spicatum* (L.) K. Richt. var.

cumingii (Nees ex Steud.) Finot, *Koeleria cumingii* Nees ex Steud., *Trisetum cumingii* (Nees ex Steud.) Nicora, *Trisetum malacophyllum* Phil., *Trisetum mollifolium* Louis-Marie

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: LBO, MAU, NUB, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 150-1460 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Trisetum spicatum* (L.) K. Richt. subsp.**

***dianthemum* (Louis-Marie) Finot**

Sinónimos: *Trisetum dianthemum* (Louis-Marie) Finot,

Trisetum spicatum var. *dianthemum* Louis-Marie,

Trisetum biflorum Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: BIO, LRI, LLA, MAG.

Rango altitudinal: 3-200 m.

Países limítrofes: Argentina.

Trisetum spicatum* (L.) K. Richt. subsp. *phleoides

(d'Urv.) Macloskie

Sinónimos: *Avena phleoides* d'Urv., *Trisetum hirsutum*

Phil., *Trisetum spicatum* var. *hirsutum* (Phil.) Louis-

Marie, *Trisetum phleoides*

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAU, NUB, BIO, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 80-1460 m.

Países limítrofes: Argentina.

Trisetum spicatum* (L.) K. Richt. subsp. *spicatum

Sinónimos: *Aira spicata* L., *Trisetum andinum* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO,

ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 5-2500 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Triticum

***Triticum aestivum* L.**

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: IPA.

Vahlodea

***Vahlodea atropurpurea* (Wahlenb.) Fr. ex Hartm.**

Sinónimos: *Aira atropurpurea* Wahlenb., *Deschampsia*

atropurpurea (Wahlenb.) Schleele, *Aira magellanica*

Hook.f., *Aira atropurpurea* Whalenb. var. *magellanica*

(Hook.f.) Skottsb., *Vahlodea atropurpurea* (Wahlenb.)

Fr. ex Hartm. subsp. *magellanica* (Hook.f.) Hyl.,

Vahlodea magellanica (Hook.f.) Tzvelev, *Deschampsia brachyphylla* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: RME, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 150-2000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Vulpia

***Vulpia antucensis* Trin.**

Sinónimos: *Festuca antucensis* (Trin.) Steud., *Festuca eriolepis* E. Desv., *Vulpia eriolepis* (E. Desv.) C.H. Blom

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 15-2800 m.

Países limítrofes: Argentina.

NOMBRE vulgar: pasto sedilla.

***Vulpia bromoides* (L.) Gray**

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.

***Vulpia muralis* (Kunth) Nees**

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: COQ, VAL, RME, BIO, ARA, JFE.

Vulpia myuros* (L.) C.C.Gmel. fma. *megalura

(Nutt.) Stace & R. Cotton

Sinónimos: *Vulpia myuros* (L.) C.C. Gmel. var. *hirsuta* Hack.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, JFE, IPA.

Vulpia myuros* (L.) C.C.Gmel. fma. *myuros

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: AYP, ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, MAG, IPA.

***Vulpia octoflora* (Walter) Rydb.**

Sinónimos: *Festuca octoflora* Walter, *Vulpia antofagastensis* Parodi

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: AYP, ANT, COQ.

Rango altitudinal: 30-500 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: pasto sedilla.

Zea

Zea mays L.
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: IPA.

PONTEDERIACEAE

Eichhornia

Eichhornia crassipes (Mart.) Solms
Hierba acuática. Perenne. Introducida.
Distribución: ATA, COQ, VAL, BIO.

POTAMOGETONACEAE

Potamogeton

Potamogeton ferrugineus Hagstr.
Hierba acuática. Perenne. Nativa.
Distribución: AIS.
Rango altitudinal: 100-1000 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Potamogeton gayi A. Benn.
Sinónimos: *Potamogeton burkartii* Horn ex Tur
Hierba acuática. Perenne. Nativa.
Distribución: ARA.
Rango altitudinal: 0-1200 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Potamogeton illinoensis Morong
Sinónimos: *Potamogeton dunicola* Tur, *Potamogeton pedersenii* Tur
Hierba acuática. Perenne. Nativa.
Distribución: VAL, ARA, LLA, MAG.
Rango altitudinal: 0-1000 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Potamogeton linguatus Hagstr.
Sinónimos: *Potamogeton badiovirens* Hagstr.,
Potamogeton natans auct. non L., *Potamogeton montanus* C. Presl

Hierba acuática. Perenne. Nativa.
Distribución: NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-1300 m.
Países limítrofes: Argentina.

Potamogeton montevidensis A. Benn.
Hierba acuática. Perenne. Nativa.
Distribución: BIO.
Rango altitudinal: 0-3000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Potamogeton pusillus L.
Sinónimos: *Potamogeton berteroanus* Phil.,
Potamogeton aschersonii A. Benn., *Potamogeton pusillus* L. var. *longepedunculatus* Hicken, *Potamogeton tenuifolius* F. Phil., *Potamogeton uruguayensis* A. Benn. & Graebn., *Potamogeton pusillus* L. var. *argentinus* A. Benn.
Hierba acuática. Anual o bienal. Introducida.
Distribución: ANT, ATA, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.
Rango altitudinal: 0-2000 m.
Nombre vulgar: Espiga de agua.

Potamogeton spirilliformis Hagstr.
Sinónimos: *Potamogeton reniacoensis* Sparre
Hierba acuática. Perenne. Nativa.
Distribución: VAL.
Rango altitudinal: 0-500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Stuckenia

Stuckenia filiformis (Pers.) Boehm. subsp. *alpina* (Blytt) R.R. Haynes, Les & M. Král
Sinónimos: *Potamogeton strictus* Phil., *Potamogeton aulacophyllum* K. Schum., *Potamogeton strictus* Phil. var. *magellanicus* Hagstr., *Potamogeton juncifolius* A. Kern. ex C. Fritsch, *Potamogeton marinus* L. fma. *alpinus* Blytt
Hierba acuática. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, BIO, MAG.
Rango altitudinal: 200-4000 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

***Stuckenia pectinata* (L.) Börner**

Sinónimos: *Potamogeton diffusus* (Hagstr.) Herter, *Potamogeton pectinatus* L. var. *diffusus* Hagstr., *Potamogeton pectinatus* L., *Coleogeton pectinatus* (L.) Les & R.R. Haynes
Hierba acuática. Perenne. Nativa.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, MAU, BIO.
Rango altitudinal: 0-4000 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

***Stuckenia striata* (Ruiz & Pav.) Holub**

Sinónimos: *Potamogeton australis* F. Phil., *Potamogeton dissimilis* A. Benn., *Potamogeton pectinatus* L. var. *striatus* (Ruiz & Pav.) Hagstr., *Potamogeton pectinatus* L. var. *ungulatus* Hagstr., *Coleogeton striatus* (Ruiz & Pav.) Les & R.R. Haynes, *Potamogeton striatus* Ruiz & Pav.
Hierba acuática. Perenne. Nativa.
Distribución: VAL, RME, LLA.
Rango altitudinal: 0-4000 m.
Países limítrofes: Argentina y Perú.
Nombre vulgar: Nori.

Zannichellia

***Zannichellia palustris* L.**

Hierba acuática. Perenne. Introducida.
Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, MAG.
Rango altitudinal: 0-4400 m.

RESTIONACEAE

Apodasmia

***Apodasmia chilensis* (Gay) B.G. Briggs & L.A.S.**

Johnson
Sinónimos: *Leptocarpus chilensis* (Gay) Mast., *Schoenodum chilense* Gay, *Calopsis chilensis* (Gay) Steud.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 1-250 m.
Nombre vulgar: Canutillo.

Gaimardia

***Gaimardia australis* Gaudich.**

Sinónimos: *Gaimardia pusilla* Gaudich.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: LRI, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-300 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Pasto de turbal.

RUPPIACEAE

Ruppia

***Ruppia filifolia* (Phil.) Skottsb.**

Sinónimos: *Potamogeton filifolius* Phil., *Ruppia obtusa* Hagstr., *Ruppia obtusa* Hagstr. var. *repens* Hagstr., *Ruppia andina* Phil.
Hierba acuática. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, MAG.
Rango altitudinal: 0-4400 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.
Nombre vulgar: Pelo de marisma.

***Ruppia maritima* L.**

Sinónimos: *Ruppia maritima* L. var. *rostrata* C. Agardh, *Ruppia maritima* L. subsp. *rostellata* (Koch ex Rchb.) Asch. & Graebn., *Ruppia rostellata* Koch ex Rchb.
Hierba acuática. Perenne. Nativa.
Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, ARA.
Rango altitudinal: 0-500 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

TECOPHILAEACEAE

Conanthera

***Conanthera bifolia* Ruiz & Pav.**

Sinónimos: *Conanthera passeriflora* Ravenna, *Conanthera passeriflora* Ravenna fma. *lilacina* Ravenna, *Conanthera passeriflora* Ravenna fma. *nocticolor* Ravenna, *Conanthera passeriflora* Ravenna fma. *coelestis* Ravenna, *Conanthera passeriflora*

Ravenna fma. *melananthera* Ravenna, *Conanthera passeriflora* Ravenna fma. *immaculata* Ravenna, *Sisyrinchium illmu* Molina
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 1000-1500 m.
Nombre vulgar: Flor de la viuda.

***Conanthera campanulata* Lindl.**

Sinónimos: *Cummingia campanulata* D. Don, *Conanthera bifolia* auct. non Ruiz & Pav., *Conanthera simsii* Sweet, *Cummingia tenella* D. Don, *Conanthera variegata* Fenzl ex Reichardt, *Conanthera tenella* (Kunth) Ravenna, *Conanthera alba* Grau, *Conanthera sabulosa* Ravenna
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: TAR, ANT, COQ, VAL, RME, MAU, NUB, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 0-3200 m.

***Conanthera parvula* (Phil.) Muñoz-Schick**
Sinónimos: *Conanthera johowii* Espinosa, *Conanthera minima* Grau, *Cummingia parvula* Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 100-500 m.

***Conanthera trimaculata* (D. Don) F. Meigen**
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: VAL, RME, LBO, NUB.
Rango altitudinal: 0-800 m.

***Conanthera urceolata* Ravenna**
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ATA.
Rango altitudinal: 0-100 m.

Tecophilaea

***Tecophilaea cyanocrocus* Leyb.**
Sinónimos: *Zephyra cyanocrocus* (Leyb.) Ravenna
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: RME.
Rango altitudinal: 1950-2040 m.

***Tecophilaea violiflora* Bertero ex Colla fma. *polyantha* Skottsb.**

Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ.
Nota: Citada para Chile (Marticorena & Quezada, 1985) sin mencionar ejemplar de referencia.

Tecophilaea violiflora* Bertero ex Colla fma. *violiflora

Sinónimos: *Zephyra violiflora* (Bertero ex Colla) Ravenna
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ, VAL, RME.
Rango altitudinal: 0-800 m.
Nombre vulgar: Violeta de la cordillera.

Zephyra

***Zephyra compacta* C. Ehrh.**
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ATA, COQ.
Rango altitudinal: 0-500 m.

***Zephyra elegans* D. Don**

Sinónimos: *Zephyra amoena* D. Don, *Dicolus caerulescens* Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ.
Rango altitudinal: 0-800 m.
Nombre vulgar: Argentina.

TYPHACEAE

Typha

***Typha angustifolia* L.**
Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: AYP, TAR, VAL, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.

***Typha domingensis* Pers.**
Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: TAR, ANT, VAL, NUB, BIO, ARA.

***Typha latifolia* Pers.**

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: BIO.

ZOSTERACEAE

Zostera

***Zostera chilensis* (J. Kuo) S.W.L. Jacobs & D.H.**

Les

Sinónimos: *Heterozostera chilensis* J. Kuo

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-200 m.

Nombre vulgar: Seba de mar.

MAGNOLIOPHYTA

MAGNOLIOPSIDA

ACANTHACEAE

Dicliptera

Dicliptera paposana Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ANT.
Rango altitudinal: 200-500 m.

Stenandrium

Stenandrium dulce (Cav.) Nees

Sinónimos: *Gerardia dulcis* (Cav.) S.F. Blake, *Ruellia dulcis* Cav., *Nierembergia prunellifolia* Dunal
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 0-3000 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

AEXTOXICACEAE

Aextoxicum

Aextoxicum punctatum Ruiz & Pav.

Árbol. Nativo.
Distribución: COQ, VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.
Rango altitudinal: 0-1800 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Olivillo, palo muerto, tique, teque, aceitunillo.

AIZOACEAE

Carpobrotus

Carpobrotus chilensis (Molina) N.E. Br.

Sinónimos: *Mesembryanthemum chilense* Molina,
Carpobrotus aequilaterus auct. non (Haw.) N.E. Br.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, JFE.
Rango altitudinal: 0-500 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Doca.

Carpobrotus edulis (L.) N.E. Br.

Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: VAL, MAU, BIO, LRI.

Galenia

Galenia pubescens (Eckl. & Zeyh.) Druce

Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: COQ, VAL.

Mesembryanthemum

Mesembryanthemum crystallinum L.

Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL.

Mesembryanthemum nodiflorum L.

Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: ATA, COQ.

Sesuvium

Sesuvium portulacastrum (L.) L.

Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: AYP.

Tetragonia

Tetragonia angustifolia Barnéoud

Arbusto. Endémico.

Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-1200 m.

***Tetragonia copiapina* Phil.**

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-900 m.

***Tetragonia spinosae* Muñoz**

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-600 m.

***Tetragonia macrocarpa* Phil.**

Sinónimos: *Tetragonia pusilla* Phil.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: ANT, ATA, COQ, IDE.

Rango altitudinal: 0-1500 m.

***Tetragonia maritima* Barnéoud**

Arbusto. Endémico.

Distribución: ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-1300 m.

***Tetragonia microcarpa* Phil.**

Sinónimos: *Tetragonia macrocarpa* Phil. var.

microcarpa (Phil.) Reiche, *Tetragonia tenella* I.M.

Johnst., *Tetragonia trigona* Phil., *Tetragonia kuntzei* J. Buchw. ex Kuntze

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA.

Rango altitudinal: 0-3000 m.

Países limítrofes: Perú.

***Tetragonia ovata* Phil.**

Sinónimos: *Tetragonia robusta* Phil.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-700 m.

***Tetragonia pedunculata* Phil.**

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: ATA.

Rango altitudinal: 0-600 m.

Países limítrofes: Perú.

***Tetragonia tetragonoides* (Pall.) Kuntze**

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, LRI, LLA, JFE, IPA, IDE.

Rango altitudinal: 10-1200 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nota: Taylor (1996) señala que es nativa en Australia, Nueva Zelanda, Japón, Argentina y Chile dispersada por corrientes oceánicas, mientras que Prescott (1984) señala que es nativa sólo de Australia y Nueva Zelanda.

Trianthema

***Trianthema portulacastrum* L.**

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: IPA.

AMARANTHACEAE

Alternanthera

***Alternanthera halimifolia* (Lam.) Standl. ex Pittier**

Sinónimos: *Achyranthes halimifolia* Lam.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ATA.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Países limítrofes: Perú.

***Alternanthera philoxeroides* (Mart.) Griseb.**

Hierba acuática. Perenne. Introducida.

Distribución: VAL.

***Alternanthera porrigens* (Jacq.) Kuntze**

Sinónimos: *Alternanthera junciflora* (J. Remy) I.M.

Johnst., *Achyranthes porringens* Jacq.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, VAL.

Rango altitudinal: 0-600 m.

Países limítrofes: Bolivia y Perú.

Amaranthus

***Amaranthus albus* L.**

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: COQ, RME.

***Amaranthus asplundii* Thell.**

Sinónimos: *Amaranthus affinis* Thell., *Amaranthus buchtienianus* Thell.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: LLA.

Rango altitudinal: 2400-3600 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

***Amaranthus blitum* L. subsp. *emarginatus* (Moq.**

ex Uline et W.L. Bray) Carretero, Muñoz Garm. & Pedrol

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: TAR, ANT.

***Amaranthus deflexus* L.**

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG, JFE.

***Amaranthus hybridus* L. subsp. *cruentus* (L.)**

Thell.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: RME, MAU, BIO.

Amaranthus hybridus* L. subsp. *hybridus

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE.

***Amaranthus looseri* Suess.**

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: VAL, RME.

Rango altitudinal: 500 m.

***Amaranthus retroflexus* L.**

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, MAU, NUB, BIO, ARA.

***Amaranthus viridis* L.**

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: ATA, COQ, ARA.

Gomphrena

***Gomphrena meyeniana* Walp.**

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT.

Rango altitudinal: 2000-4500 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Gomphrena umbellata* J. Remy**

Sinónimos: *Xeraea umbellata* (J. Remy) Kuntze

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: TAR.

Rango altitudinal: 3000-4000 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

ANACARDIACEAE

Haplorhus

***Haplorhus peruviana* Engl.**

Árbol. Nativo.

Distribución: AYP, TAR.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Países limítrofes: Perú.

Nombre vulgar: Carza.

Lithrea

***Lithrea caustica* (Molina) Hook. & Arn.**

Sinónimos: *Lithraea caustica* (Molina) Hook. & Arn.

var. *pilosa* Engl., *Laurus caustica* Molina, *Lithraea caustica* (Molina) Hook. & Arn. fma. *pilosa* (Engl.)

Cabrera, *Persea caustica* (Molina) Spreng., *Lithrea venenosa* Miers, nom. nud., *Rhus caustica* Hook. &

Arn., *Lithrea caustica* (Molina) Hook. & Arn. var.

glabra Engler

Árbol. Endémico.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.

Rango altitudinal: 0-2800 m.

Nombre vulgar: Litre.

Schinus

***Schinus areira* L.**

Sinónimos: *Schinus molle* L. var. *areira* (L.) DC., *Schinus huingan* Molina, *Schinus bituminoides* Salisb., *Schinus molle* L. var. *huingan* (Molina) Marchand
Árbol. Nativo.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME.
Rango altitudinal: 0-3500 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.
Nombre vulgar: Molle, pimiento, pimentero.

Schinus kaeselii F.A. Barkley
Arbusto o árbol pequeño. Endémico.
Distribución: VAL, RME, MAU.
Rango altitudinal: 1400-1800 m.

Schinus latifolius (Gillies ex Lindl.) Engl.
Sinónimos: *Litreia molle* auct. non L., *Duvaua latifolia* Gillies ex Lindl., *Schinus dependens* Ortega var. *latifolia* Marchand, *Schinus chilensis* Marchand var. *glabra* Marchand, *Duvaua dependens* (Ortega) DC. var *gamma* Hook., *Duvaua velutina* Turcz., *Schinus chilensis* Marchand, *Schinus latifolius* (Gillies ex Lindl.) Engler var. *tomentosus* Fenzl ex Engler, *Schinus velutinus* (Turcz.) I.M. Johnst.
Árbol. Endémico.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU.
Rango altitudinal: 0-1500 m.
Nombre vulgar: Molle.

Schinus marchandii F.A. Barkley
Arbusto. Nativo.
Distribución: AIS.
Rango altitudinal: 0-900 m.
Países limítrofes: Argentina.

Schinus montanus (Phil.) Engl.
Sinónimos: *Lithraea montana* Phil.
Árbusto. Endémico.
Distribución: VAL, RME, LBO.
Rango altitudinal: 0-2500 m.

Schinus patagonicus (Phil.) I.M. Johnst. ex Cabrera var. *crenuloides* (F.A. Barkley) F.A. Barkley
Sinónimos: *Schinus montanus* (Phil.) Engl. var. *crenuloides* F.A. Barkley
Árbusto. Endémico.
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 0-1000 m.
Nombre vulgar: Litrecillo.

Schinus patagonicus (Phil.) I.M. Johnst. ex Cabrera var. ***patagonicus***
Sinónimos: *Litreia patagonica* Phil., *Schinus crenatus* Engl., *Lithraea montana* Phil. var. *patagonica* Phil., *Duvaua patagonica* Phil., *Schinus montana* (Phil.) Engl. var. *patagonica* Reiche, *Duvaua dependens* (Ortega) DC. var. *patagonica* Phil.
Arbusto o árbol pequeño. Nativo.
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS.
Rango altitudinal: 0-2000 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Laura, litrecillo.

Schinus polygamus (Cav.) Cabrera
Sinónimos: *Amyris polygama* Cav., *Schinus polygamus* (Cav.) Cabrera var. *chilensis* F.A. Barkley, *Schinus polygamus* (Cav.) Cabrera fma. *ovatus* (Lindl.) Cabrera, *Schinus dependens* Ortega var. *brevifolia* Fenzl ex Engl., *Schinus huynjan* Kuntze, *Schinus polygamus* (Cav.) Cabrera var. *parviflorus* (Marchand) F.A. Barkley, *Duvaua crenata* Phil., *Litreia crenata* Phil., *Schinus dependens* Ortega var. *parviflorus* Marchand
Arbusto o árbol pequeño. Nativo.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.
Rango altitudinal: 0-3200 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.
Nombre vulgar: Huingán.
Nota: Especie muy polimorfa, con variaciones especialmente en las hojas, lo que ha motivado la creación de variedades, subespecies y formas. Han sido reunidas en una sola especie.

APIACEAE

Ammi

Ammi majus L.
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: RME, LRI, LLA.

Ammi visnaga (L.) Lam.
Hierba. Anual o bienal. Introducida.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, ARA, JFE.

Anethum

Anethum graveolens L.

Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: JFE.

Anthriscus

Anthriscus caucalis M. Bieb.

Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, BIO.

Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm.

Hierba. Bienal. Introducida.
Distribución: MAG.

Apium

Apium chilense Hook. & Arn.

Sinónimos: *Apium flexuosum* Phil., *Ligusticum dumetorum* Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ANT, ATA, VAL, RME, LBO, MAU, JFE.
Rango altitudinal: 0-1500 m.

Apium fernandezianum Johow

Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: JFE.

Apium graveolens L.

Hierba. Bienal. Introducida.
Distribución: ANT, LRI, LLA.

Apium humile (Phil.) Reiche

Sinónimos: *Ligusticum humile* Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: RME.
Rango altitudinal: 1600-2800 m.

Apium nodiflorum (L.) Lag.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: ATA, COQ, VAL, MAU, NUB, BIO, ARA.

Apium panul (Bertero ex DC.) Reiche

Sinónimos: *Ligusticum pansil* Bertero ex DC., *Ligusticum nemorosum* Phil., *Ligusticum landbeckii* Phil., *Ligusticum apioides* Phil., *Carum panul* (Bertero ex DC.) Griseb., *Apium andinum* Phil., *Apium apiooides* (Phil.) Reiche, *Apium philippii* H. Wolff, *Apium angustilobum* (Phil.) Reiche, *Apium panul* (Bertero ex DC.) Reiche var. *araucanum* (Phil.) Reiche, *Apium peucedanoides* (C. Presl ex DC.) Reiche, *Apium peucedanoides* (C. Presl ex DC.) Reiche var. *tenuifolium* (C. Presl ex DC.) H. Wolff, *Pimpinella araucana* Phil., *Ligusticum peucedanoides* C. Presl ex DC., *Pimpinella andina* Phil., *Ligusticum angustilobum* Phil., *Ligusticum cahuilense* Phil. ex sched., *Pimpinella macrophylla* Phil., *Pimpinella molleri* Phil., *Pimpinella navarri* Phil., *Pimpinella pteroana* Phil., *Pimpinella vidali* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.
Rango altitudinal: 0-2600 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Panul.

Apium pimpinellifolium (Phil.) Reiche

Sinónimos: *Ligusticum pimpinellifolium* Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: LBO.
Rango altitudinal: 1700-3800 m.

Apium prostratum Labill.

Sinónimos: *Apium maclovianum* Gand., *Apium dunicola* Pontioli, *Apium australe* Thouars var. *latisectum* H. Wolff, *Wydleria humilis* Phil., *Apium australe* Thouars
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ, RME, MAU, BIO, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE, IPA.
Rango altitudinal: 0-100 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Rapa.

Asteriscium

Asteriscium aemocarpon Clos

Sinónimos: *Asteriscium ramosissimum* Phil., *Asteriscium verrucosum* Meyen, *Asteriscium haemocarpum* Clos var. *chlorocarpum* Phil.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: COQ, RME, LBO.

Rango altitudinal: 2100-3500 m.

***Asteriscium chilense* Cham. & Schltdl.**

Sinónimos: *Eryngium tricuspidatum* Dombey,

Asteriscium poeppigii DC., *Asteriscium chilense* Cham. & Schltdl. var. *haenkei* DC., *Asteriscium pozoides* Clos Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.

Rango altitudinal: 100-2500 m.

Nombre vulgar: Anicillo, huaralao, muchu, colecilla.

***Asteriscium closii* (Kuntze) Mathias & Constance**

Sinónimos: *Dipterygia closii* Kuntze, *Bustillozia chilensis* Clos, *Asteriscium pungens* Drude, *Bustillozia chilensis* Clos var. *setacea* Phil.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-2000 m.

***Asteriscium vidali* Phil.**

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ATA.

Rango altitudinal: 0-400 m.

Azorella

***Azorella acaulis* (Cav.) Drude**

Sinónimos: *Huanaca acaulis* Cav., *Lechleria palmata* Phil., *Huanaca bergii* Hieron., *Huanaca geraniifolia* DC., *Huanaca cavanillesii* DC., *Spananthe huanaca* (Spreng.) Lag., *Oenanthe huanaca* Spreng.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-1300 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Azorella albovaginata* (Gillies & Hook.) G.M.**

Plunkett & A.N. Nicolas var. *pauciflorum* (Reiche) G.M. Plunkett & A.N. Nicolas

Sinónimos: *Mulinum albovaginatum* Gillies & Hook. var. *pauciflorum* (Reiche) J.C. Zech, *Mulinum*

pauciflorum Reiche, *Azorellopsis trisecta* H. Wolff,

Mulinum reichei H. Wolff

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: LBO, MAU.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

***Azorella ameghinoi* Speg.**

Sinónimos: *Azorella transverse-striata* Hauman

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AIS, MAG.

Rango altitudinal: 200-2500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Llareta.

***Azorella andina* (Phil.) Drude**

Sinónimos: *Trisciadium andinum* Phil., *Huanaca andina* (Phil.) Phil., *Azorella trilobata* Dusén, *Schizeilema trilobatum* (Dusén) Domin

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: BIO, ARA, MAG.

Rango altitudinal: 600-2800 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Azorella atacamensis* G.M. Plunkett & A.N.**

Nicolas

Sinónimos: *Mulinum crassifolium* Phil. non *Azorella* Pers.

Subarbusto. Nativo.

Distribución: TAR, ANT, ATA.

Rango altitudinal: 3700-4500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Azorella biloba* (Schltdl.) Wedd.**

Sinónimos: *Fragosa biloba* Schltdl., *Azorella lemannii* Hieron.

Subarbusto. Nativo.

Distribución: ANT.

Rango altitudinal: 2500-5000 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Llareta.

***Azorella boelckeii* (Mathias & Constance) G.M.**

Plunkett & A.N. Nicolas

Sinónimos: *Huanaca boelckeii* Mathias & Constance

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: LLA, AIS.

Rango altitudinal: 1000-2000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Azorella burkartii* (Mathias & Constance) G.M.**

Plunkett & A.N. Nicolas

Sinónimos: *Huanaca burkartii* Mathias & Constance

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ARA, MAG.

Rango altitudinal: 800-2500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Azorella compacta* Phil.**

Sinónimos: *Azorella columnaris* H. Wolff, *Azorella yareta* Hauman, *Azorella prismatoclada* Domin, *Laretia compacta* (Phil.) Reiche

Subarbusto. Nativo.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA.

Rango altitudinal: 3500-5200 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Llareta, yareta.

***Azorella concolor* Rendle**

Sinónimos: *Mulinum valentini* Speg., *Mulinum lycopodiopsis* Speg.

Subarbusto. Nativo.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 300-1400 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Azorella crassipes* Phil.**

Subarbusto. Nativo.

Distribución: BIO.

Rango altitudinal: 1700-2000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Llareta.

***Azorella cryptantha* (Clos) Reiche**

Sinónimos: *Mulinum integrifolium* Hieron., *Mulinum cryptanthum* Clos

Subarbusto. Nativo.

Distribución: ATA, COQ.

Rango altitudinal: 2500-4300 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Llareta.

***Azorella diversifolia* Clos**

Sinónimos: *Pozoa incisa* Griseb., *Azorella incisa* (Griseb.) Wedd. *Azorella diversifolia* Clos var.

antillanca J.C. Zech

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 1000-3500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Azorella filamentosa* Lam.**

Sinónimos: *Chamitis integrifolia* Gaertn., *Azorella chamitis* Pers.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 0-900 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Azorella fuegiana* Speg.**

Sinónimos: *Azorella mesetae* Skottsb., *Azorella dusenii* H. Wolff

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 0-1500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Azorella lycopodioides* Gaudich.**

Sinónimos: *Azorella nervosa* Phil., *Azorella laevigata* Phil., *Azorella clandestina* Phil., *Azorella vaginata* Phil., *Azorella lycopodioides* Gaudich. var. *compacta* Phil., *Azorella philippi* Gand., *Azorella concolor* auct. non Rendle

Subarbusto. Nativo.

Distribución: VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-2500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Llareta.

***Azorella madreporica* Clos**

Sinónimos: *Azorella bolacina* Clos, *Azorella piligera* Phil., *Azorella muscoides* Phil., *Azorella obtusiloba* Phil. Subarbusto. Nativo.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, ARA.

Rango altitudinal: 1800-3600 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Llareta.

***Azorella monantha* Clos**

Sinónimos: *Azorella cespitosa* auct. non Cav., *Azorella hookeriana* Clos, *Azorella apoda* A. Gray, *Azorella sessiliflora* Phil., *Azorella bryoides* Phil., *Azorella nucamentacea* (Phil.) Hauman, *Apleura nucamentacea* Phil., *Azorella glacialis* Phil.

Subarbusto. Nativo.

Distribución: COQ, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-3000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Llareta.

***Azorella monteroi* S. Martínez & Constance**

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: BIO, ARA.

Rango altitudinal: 1800 m.

***Azorella nivalis* Phil.**

Sinónimos: *Mulinum leptacanthum* Phil., *Mulinum patagonicum* Speg.

Subarbusto. Nativo.

Distribución: ARA, LLA.

Rango altitudinal: 1400-2600 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Azorella patagonica* Speg.**

Sinónimos: *Azorella patagonica* Speg. var. *compacta* Speg., *Azorella plantaginea* Speg.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Azorella prolifera* (Cav.) G.M. Plunkett & A.N. Nicolas**

Nicolas

Sinónimos: *Mulinum spinosum* (Cav.) Pers., *Selinum spinosum* Cav., *Selinum proliferum* Cav., *Mulinum proliferum* (Cav.) Pers., *Mulinum laxum* Phil., *Mulinum leoninum* Lorentz, *Mulinum chillanense* Phil., *Mulinum ovalleanum* Phil., *Mulinum spinosum* (Cav.) Pers. var. *leoninum* Kuntze, *Mulinum spinosum* (Cav.) Pers. var. *quinquepartitum* Kuntze, *Mulinum spinosum* (Cav.) Pers. var. *trispinescens* Kuntze, *Mulinum gandogerii* M. Hiroe, *Mulinum spinosum* (Cav.) Pers. var. *longeinvolucrata* Hicken, *Mulinum spinosum* (Cav.) Pers. var. *proliferum* (Cav.) Kuntze, *Mulinum spinosum* (Cav.) Pers. var. *chillanense* (Phil.) Reiche, *Mulinum spinosum* (Cav.) Pers. var. *laxum* (Phil.) Reiche, *Mulinum hirsutum* Phil.

Arbusto. Nativo.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-1500 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Nombre vulgar: Neneo, mata barrosa, dichillo, hierba de la culebra, hierba negra, chila, espinillo, churquecillo.

***Azorella ranunculus* d'Urv.**

Sinónimos: *Schizeilema ranunculus* (d'Urv.) Domin, *Pozoa ranunculus* (d'Urv.) Hook.f.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-900 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Azorella ruizii* G.M. Plunkett & A.N. Nicolas**

Sinónimos: *Selinum acaule* Cav., *Mulinum acaule* (Cav.) Pers., *Laretia acaulis* (Cav.) Gillies & Hook.

Subarbusto. Nativo.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 2000-3500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Llareta.

***Azorella selago* Hook.f.**

Sinónimos: *Azorella selago* Hook.f. var. *compacta* Albov, *Azorella selago* Hook.f. var. *pulvinaris* Albov, *Azorella antipoda* Gand., *Azorella maquariensis* Orchard Subarbusto. Nativo.

Distribución: AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Llareta.

***Azorella spinosa* (Ruiz & Pav.) Pers.**

Sinónimos: *Fragosa spinosa* Ruiz & Pav., *Mulinum cuneatum* Hook. & Arn., *Azorella pectinata* Phil., *Mulinum clandestinum* Phil.

Subarbusto. Endémico.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.

Rango altitudinal: 0-2000 m.

***Azorella trifoliolata* Clos**

Sinónimos: *Azorella gayana* Phil., *Azorella depauperata* Phil., *Azorella pinnatiloba* Gand.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ANT, ATA, COQ, RME, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 500-3500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Azorella trifurcata* (Gaertn.) Pers.**

Sinónimos: *Chamitis trifurcata* Gaertn., *Azorella cespitosa* Cav., *Bolax gilliesii* Hook., *Azorella gilliesii* (Hook.) Hook. & Arn., *Azorella utriculata* Griseb., *Azorella rahmeri* Phil., *Azorella albida* Phil., *Azorella crassifolia* Pers., *Chamitis tricuspidata* Gaertn.

Subarbusto. Nativo.

Distribución: ATA, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-3500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Llareta.

***Azorella ulicina* (Gillies & Hook.) G.M. Plunkett & A.N. Nicolas**

Sinónimos: *Mulinum ulicinum* Gillies & Hook.

Subarbusto. Nativo.

Distribución: ANT.

Rango altitudinal: 4100-4700 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Bolax

***Bolax caespitosa* Hombr. & Jacq. ex Decne.**

Sinónimos: *Azorella bovei* Speg., *Azorella gummifera* Poir., *Bolax bovei* (Speg.) Dusén

Subarbusto. Nativo.

Distribución: LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-1500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Bolax gummifera* (Lam.) Spreng.**

Sinónimos: *Hydrocotyle gummifera* Lam., *Bolax columnifera* Gand., *Bolax glebaria* Comm. ex Gaudich., *Azorella glebaria* (Comm. ex Gaudich.) A. Gray, *Bolax complicatus* Spreng.

Subarbusto. Nativo.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 0-3500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Bowlesia

***Bowlesia incana* Ruiz & Pav.**

Sinónimos: *Bowlesia geraniifolia* Cham. & Schldl., *Bowlesia nodiflora* DC., *Bowlesia rotundifolia* Phil., *Bowlesia tenera* Spreng., *Bowlesia incana* Ruiz & Pav. fma. *tenera* Urb.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, BIO.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Bowlesia lobata* Ruiz & Pav.**

Sinónimos: *Bowlesia acutiloba* H. Wolff, *Bowlesia acutangula* Benth., *Drusa acutangula* (Benth.) Drude

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: TAR.

Rango altitudinal: 1300-4600 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Bowlesia macrophysa* Zoellner**

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: COQ.

Rango altitudinal: 2900 m.

***Bowlesia paposana* I.M. Johnst.**

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: AYP, TAR, ANT.

Rango altitudinal: 3000-3500 m.

***Bowlesia sodiroana* H. Wolff**

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: COQ.

Rango altitudinal: 200-500 m.

Países limítrofes: Bolivia y Perú.

***Bowlesia tropaeolifolia* Gillies & Hook.**

Sinónimos: *Bowlesia tropaeolifolia* Gillies & Hook. var. *gayana* Domin, *Bowlesia tropaeolifolia* Gillies & Hook. var. *heterophylla* Speg., *Bowlesia tropaeolifolia* Gillies & Hook. var. *patagonica* Speg., *Bowlesia cirrosa* Phil., *Bowlesia pulchella* Wedd., *Bowlesia flexilis* Meyen, *Bowlesia tropaeolifolia* Gillies & Hook. var. *cirrosa* (Phil.) Reiche

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 100-4500 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Barba de gato.

***Bowlesia uncinata* Colla**

Sinónimos: *Bowlesia tropaeolifolia* Gillies & Hook. var. *tripartita* Hook. & Arn., *Bowlesia tripartita* (Hook. & Arn.) Clos, *Bowlesia reichei* Phil., *Bowlesia tripartita* (Hook. & Arn.) Clos var. *reichei* (Phil.) Reiche, *Bowlesia axilliflora* Phil., *Bowlesia tripartita* (Hook. & Arn.) Clos var. *axilliflora* (Phil.) Reiche, *Bowlesia dumetorum* Phil., *Bowlesia tripartita* (Hook. & Arn.) Clos var. *dumetorum* (Phil.) Reiche, *Bowlesia tripartita* (Hook. & Arn.) Clos var. *triloba* Reiche, *Bowlesia macroisperma* H. Wolff

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, BIO.

Rango altitudinal: 700-2000 m.

Centella

***Centella asiatica* (L.) Urb.**

Sinónimos: *Hydrocotyle asiatica* L., *Hydrocotyle triflora* Ruiz & Pav., *Centella triflora* (Ruiz & Pav.) Nannf.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.

Rango altitudinal: 10-600 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Conium

***Conium maculatum* L.**

Hierba. Anual o bienal. Introducida.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG, JFE.

Coriandrum

***Coriandrum sativum* L.**

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: LLA, JFE.

Cyclospurmum

***Cyclospurmum laciniatum* (DC.) Constance**

Sinónimos: *Helosciadium laciniatum* DC., *Helosciadium laciniatum* DC. var. *humile* Hook. & Arn., *Helosciadium gracile* Clos, *Apium laciniatum* (DC.) Urb. var. *gracile* (Clos) Reiche, *Apium laciniatum* (DC.) Urb. var. *hispidulum* H. Wolff, *Helosciadium deserticolum* Phil., *Apium laciniatum* (DC.) Urb. fma. *deserticolum* H. Wolff, *Helosciadium binternatum* Phil., *Apium binternatum* (Phil.) Reiche

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 0-1600 m.

Países limítrofes: Perú.

***Cyclospurmum leptophyllum* (Pers.) Sprague**

Sinónimos: *Apium leptophyllum* (Pers.) F. Muell., *Pimpinella leptophylla* Pers., *Helosciadium leptophyllum* (Pers.) DC., *Apium ammi* Urb., *Apium ranunculifolium* auct. non Kunth, *Apium laciniatum* (DC.) Urb. fma. *elatius* (Hook. & Arn.) H. Wolff, *Apium ranunculifolium* (DC.) Reiche, comb. illeg., *Helosciadium ranunculifolium* DC., *Helosciadium laciniatum* DC. var. *elatius* Hook. & Arn., *Apium ammi* Urb. var. *genuinum* H. Wolff, *Apium ammi* Urb. fma. *filamentosum* (Kuntze) H. Wolff, *Apium ammi* Urb. var. *filamentosum* Kuntze, *Apium ammi* Urb. fma. *nanum* Kuntze, *Apium ammi* Urb. fma. *pedunculata* Chodat, *Apium ammi* Urb. var. *leptophyllum* (Pers.) Kuntze

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, JFE, IPA.

Rango altitudinal: 0-4000 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nota: Introducida en el Archipiélago de Juan Fernández.

Daucus

***Daucus carota* L.**

Hierba. Anual o bienal. Introducida.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, IPA.

***Daucus montanus* Humb. & Bonpl. ex Spreng.**

Sinónimos: *Daucus toriloides* DC., *Daucus australis* Poepp.

Hierba. Anual o bienal. Nativa.

Distribución: ANT, COQ, VAL, MAU, LLA, AIS, MAG, JFE.

Rango altitudinal: 0-3000 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.
Nota: Introducida en el Archipiélago de Juan Fernández.

***Daucus pusillus* Michx.**

Sinónimos: *Daucus scaber* Larrañaga, *Daucus montevidensis* Link ex Spreng., *Daucus hispidifolius* Clos
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, BIO, LLA, AIS.
Rango altitudinal: 0-2300 m.

Diposis

***Diposis bulbocastanum* DC.**
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO.
Rango altitudinal: 500-2500 m.

Domeykoa

***Domeykoa andina* Saldivia & Faúndez**
Hierba. Anual o perenne. Endémica.
Distribución: TAR.
Rango altitudinal: 2650-3120 m.

***Domeykoa oppositifolia* Phil.**
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: ANT, ATA.
Rango altitudinal: 100-1000 m.

***Domeykoa perennis* I.M. Johnst.**
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ANT, ATA.
Rango altitudinal: 0-200 m.

Eremocharis

***Eremocharis confinis* I.M. Johnst.**
Subarbusto. Nativo.
Distribución: AYP.
Rango altitudinal: 3100-3200 m.
Países limítrofes: Perú.

***Eremocharis fruticosa* Phil.**

Sinónimos: *Eremocharis flexuosa* Phil., *Dipterygia philippiana* Kuntze
Arbusto. Endémico.
Distribución: TAR, ANT, ATA.
Rango altitudinal: 100-1800 m.

Eryngium

***Eryngium anomalum* Hook. & Arn.**
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ATA, COQ, VAL.
Rango altitudinal: 100 m.

***Eryngium bupleuroides* Hook. & Arn.**
Arbusto o árbol pequeño. Endémico.
Distribución: JFE.
Rango altitudinal: 400-900 m.

***Eryngium cardosii* Clos**
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: BIO.
Rango altitudinal: 100-200 m.

***Eryngium coquimbanum* Phil. ex Urb.**
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: ATA, COQ.
Rango altitudinal: 0-500 m.

***Eryngium depressum* Hook. & Arn.**
Sinónimos: *Eryngium arvense* Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.
Rango altitudinal: 100-1000 m.
Nombre vulgar: Caucha.

***Eryngium fernandezianum* Skottsb.**
Arbusto. Endémico.
Distribución: JFE.
Rango altitudinal: 300-500 m.
Nota: Probable híbrido entre *E. bupleuroides* y *E. inaccessum*.

***Eryngium humifusum* Clos**
Sinónimos: *Eryngium pratense* Phil. var. *depressum* Phil., *Eryngium pratense* Phil., *Eryngium humifusum* Clos var. *pratense* (Phil.) Reiche

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: BIO, ARA, LRI.

Rango altitudinal: 0-1400 m.

***Eryngium inaccessum* Skottsb.**

Arbusto. Endémico.

Distribución: JFE.

Rango altitudinal: 0-300 m.

***Eryngium macracanthum* Phil.**

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: ATA.

Rango altitudinal: 0-200 m.

***Eryngium paniculatum* Cav. & Dombey ex F.**

Delaroche

Sinónimos: *Eryngium paniculatum* Cav. & Dombey ex F. Delaroche var. *chilensis* DC.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 100-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Cardoncillo, chupalla, quisco, pitillo.

***Eryngium polyrhizum* Clos**

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: NUB, BIO.

Rango altitudinal: 200-300 m.

***Eryngium pseudojunceum* Clos**

Sinónimos: *Eryngium fistulosum* Phil., *Eryngium crantzoides* Griseb., *Eryngium pseudojunceum* Clos var. *crantzoides* (Griseb.) Reiche, *Eryngium pseudojunceum* Clos var. *fistulosum* (Phil.) Reiche

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 0-1500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Eryngium pulchellum* Phil.**

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL.

Rango altitudinal: 0-600 m.

***Eryngium rostratum* Cav.**

Sinónimos: *Eryngium rostratum* Cav. var. *diversifolium*

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 0-700 m.

Nombre vulgar: Caucha, cardilla.

***Eryngium sarcophyllum* Hook. & Arn.**

Arbusto o árbol pequeño. Endémico.

Distribución: JFE.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Nota: Extinta.

Foeniculum

***Foeniculum vulgare* Mill.**

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, JFE.

Gymnophyton

***Gymnophyton flexuosum* Clos**

Sinónimos: *Dipterygia flexuosa* Kuntze, *Asteriscium flexuosum* Drude, *Gymnophyton kingii* Phil., *Dipterygia kingii* Kuntze, *Gymnophyton robustum* Clos var. *kingii* Reiche

Arbusto. Endémico.

Distribución: ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 800-2600 m.

***Gymnophyton foliosum* Phil.**

Sinónimos: *Dipterygia foliosa* Kuntze

Arbusto. Endémico.

Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-400 m.

***Gymnophyton isatidicarpum* (C. Presl ex DC.)**

Mathias & Constance

Sinónimos: *Mulinum isatidicarpum* C. Presl ex DC., *Dipterygia isatidicarpa* C. Presl ex DC., *Asteriscium isatidicarpum* Hook. & Arn., *Gymnophyton spinescens* Phil., *Dipterygia spinescens* Kuntze, *Asteriscium spinescens* Drude

Arbusto. Endémico.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO.

Rango altitudinal: 800-3500 m.

***Gymnophyton robustum* Clos**

Sinónimos: *Asteriscium robustum* Baill.
Arbusto. Endémico.
Distribución: TAR, ATA, COQ.
Rango altitudinal: 400-2500 m.
Nombre vulgar: Bóbio.

Gymnophyton spinosissimum Phil.
Sinónimos: *Dipterygia spinosissima* Kuntze, *Asteriscium spinosissimum* Drude
Arbusto. Endémico.
Distribución: ANT, ATA, COQ.
Rango altitudinal: 2800-4500 m.

Homalocarpus

Homalocarpus bowlesioides Hook. & Arn.
Sinónimos: *Bowlesia elegans* Clos, *Bowlesia elata* Clos, *Bowlesia cana* Phil.
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME.
Rango altitudinal: 900-1900 m.

Homalocarpus dichotomus (Poepp. ex DC.) Mathias & Constance
Sinónimos: *Bowlesia dichotoma* Poepp. ex DC., *Bowlesia dichotoma* Poepp. ex DC. var. *albo-squamata* Phil., *Bowlesia dichotoma* Poepp. ex DC. var. *chrysocarpa* Phil., *Bowlesia multiradiata* Colla
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO.
Rango altitudinal: 400-3000 m.

Homalocarpus digitatus (Phil.) Mathias & Constance
Sinónimos: *Bowlesia dichotoma* Poepp. ex DC. var. *digitata* (Phil.) Domin, *Bowlesia digitata* Phil.
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: ATA.
Rango altitudinal: 800-1100 m.

Homalocarpus dissectus Mathias & Constance
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: COQ, VAL, RME.
Rango altitudinal: 100-1400 m.

Homalocarpus integerrimus (Turcz.) Mathias & Constance

Sinónimos: *Bowlesia integerrima* Turcz., *Bowlesia dichotoma* Poepp. ex DC. var. *integerrima* Domin
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: ANT, ATA, COQ, LBO.
Rango altitudinal: 100-1000 m.

Homalocarpus nigripetalus (Clos) Mathias & Constance
Sinónimos: *Bowlesia nigripetala* Clos
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: COQ, VAL, RME.
Rango altitudinal: 200-2000 m.

Hydrocotyle

Hydrocotyle bonariensis Lam.
Sinónimos: *Hydrocotyle umbellata* L. var. *bonariensis* (Lam.) Roem. & Schult., *Hydrocotyle multiflora* Ruiz & Pav.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, COQ, VAL, BIO.
Rango altitudinal: 0-2500 m.
Países limítrofes: Argentina y Perú.

Hydrocotyle chamaemorus Cham. & Schldl.
Sinónimos: *Hydrocotyle araucana* Phil., *Hydrocotyle araucana* Phil. var. *patagonica* Speg., *Hydrocotyle carrerae* Phil., *Hydrocotyle rahmeri* Phil., *Hydrocotyle valdiviana* Phil., *Hydrocotyle chamaemorus* Cham. & Schldl. var. *valdiviana* Reiche, *Hydrocotyle skottsbergii* Gand.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-2500 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Malva del monte.

Hydrocotyle cryptocarpa Speg.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ, LBO, NUB, ARA.
Rango altitudinal: 0-200 m.
Países limítrofes: Argentina.

Hydrocotyle indecora DC.
Sinónimos: *Hydrocotyle bonplandii* A. Rich. var. *chilensis* DC., *Hydrocotyle marchantiooides* Clos
Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 500-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Hydrocotyle modesta* Cham. & Schltdl.**

Sinónimos: *Hydrocotyle modesta* Cham. & Schltdl. var. *repens* Clos

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.

Rango altitudinal: 0-1200 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Hydrocotyle poeppigii* DC.**

Sinónimos: *Hydrocotyle lechleri* Phil., *Hydrocotyle uliginosa* Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 0-1100 m.

***Hydrocotyle ranunculoides* L.f.**

Sinónimos: *Hydrocotyle batrachoides* DC., *Hydrocotyle ranunculoides* L. var. *lobata* Urb., *Hydrocotyle ranunculoides* L. var. *inciso-crenata* Urb.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.

Rango altitudinal: 0-3500 m.

Países limítrofes: Argentina y Perú.

Nombre vulgar: Hierba de la plata, tangue.

***Hydrocotyle umbellata* L.**

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: TAR, VAL, BIO.

Rango altitudinal: 0-1500 m.

Países limítrofes: Perú.

***Hydrocotyle verticillata* Thunb.**

Sinónimos: *Hydrocotyle volckmanni* Phil., *Hydrocotyle verticillata* Thunb. var. *pluriradiata* Urb.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: RME, LBO, MAU, BIO.

Rango altitudinal: 0-800 m.

Países limítrofes: Argentina y Perú.

Levisticum

***Levisticum officinale* W.D.J. Koch**

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: LLA, MAG.

Lilaeopsis

***Lilaeopsis macloviana* (Gand.) A.W. Hill**

Sinónimos: *Crantzia macloviana* Gand., *Lilaeopsis andina* A.W. Hill, *Lilaeopsis andina* A.W. Hill var. *multivittata* A.W. Hill, *Lilaeopsis sinuata* A.W. Hill, *Crantzia lineata* (Michx.) Nutt. var. *subulata* Wedd., *Lilaeopsis lineata* Green

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-4700 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Isru.

Oreomyrrhis

***Oreomyrrhis hookeri* Mathias & Constance**

Sinónimos: *Azorella daucoides* d'Urv., *Oreomyrrhis daucoides* auct. non Urb.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 0-200 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Osmorrhiza

***Osmorrhiza chilensis* Hook. & Arn.**

Sinónimos: *Osmorrhiza berteroii* DC., *Osmorrhiza berteroii* DC. var. *gracilior* Phil., *Schudia chilensis* Molina ex Clos

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-2500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Asta de cabra.

***Osmorrhiza depauperata* Phil.**

Sinónimos: *Osmorrhiza obtusa* (J.M. Coul. & Rose)

Fernald, *Washingtonia obtusa* J.M. Coul. & Rose

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: BIO, MAG.

Rango altitudinal: 0-2500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Osmorrhiza glabrata* Phil.**

Sinónimos: *Myrrhis renjifoana* Phil., *Uraspermum glabratum* (Phil.) Kuntze, *Elleimataenia renjifoana* (Phil.) Koso-Poliansky

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 1500-2000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Pastinaca

***Pastinaca sativa* L.**

Hierba. Bienal. Introducida.

Distribución: RME, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS.

Petroselinum

***Petroselinum crispum* (Mill.) A.W.Hill.**

Hierba. Bienal. Introducida.

Distribución: VAL, JFE.

Pozoa

***Pozoa coriacea* Lag.**

Sinónimos: *Pozoa hydrocotylifolia* Bridges, *Azorella coriacea* (Lag.) Kuntze, *Azorella hydrocotylifolia* (Bridges) Macloskie, *Pozoa denticulata* Meyen

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 1000-4000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Anislao.

***Pozoa volcanica* Mathias & Constance**

Sinónimos: *Azorella volcanica* M. Hiroe

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.

Rango altitudinal: 1200-2400 m.

Países limítrofes: Argentina.

Sanicula

***Sanicula crassicaulis* Poepp. ex DC.**

Sinónimos: *Sanicula liberta* auct. non Cham. & Schleidl.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, JFE.

Rango altitudinal: 500-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Pata de león.

Nota: Introducida en el Archipiélago de Juan Fernández.

***Sanicula graveolens* Poepp. ex DC.**

Sinónimos: *Sanicula macrorhiza* Bertero ex Colla, *Sanicula macrorhiza* Bertero ex Colla var. *andina* Meigen

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, AIS.

Rango altitudinal: 1500-3000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Pata de león.

Scandix

***Scandix pecten-veneris* L.**

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Seseli

***Seseli libanotis* (L.) Koch**

Hierba. Bienal. Introducida.

Distribución: BIO.

Sium

***Sium latifolium* L.**

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: ATA, COQ, VAL.

Torilis

***Torilis arvensis* (Huds.) Link**

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: MAU, NUB, BIO.

Torilis nodosa (L.) Gaertn.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, BIO, ARA, JFE.

Subarbusto trepador. Endémico.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME.

Rango altitudinal: 0-800 m.

Nombre vulgar: Pehuendum, pahueldum.

APOCYNACEAE

Araujia

Araujia seracifera Brot.

Arbusto trepador. Introducido.

Distribución: VAL.

Rango altitudinal: 130-400 m.

Asclepias

Asclepias curassavica L.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: AYP, TAR, IPA.

Diplolepis geminiflora (Decne.) Liede & Rapini

Sinónimos: *Astephanus geminiflorus* Decne.

Arbusto trepador. Endémico.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME.

Rango altitudinal: 0-1800 m.

Nombre vulgar: Azahar de quissco, azahar, cuerdecilla, cordelillo, lichilahuén, voquicillo.

Diplolepis hieronymi (Lorentz) Liede & Rapini

Sinónimos: *Astephanus hieronymi* (Lorentz) Malme,

Cynanchum fallax Hicken, *Cynanchum hieronymi*

(Lorentz) Hicken, *Astephanus fallax* (Hicken) T. Mey.,

Grisebachielia hieronymi Lorentz

Arbusto. Nativo.

Distribución: MAU.

Rango altitudinal: 600-1800 m.

Países limítrofes: Argentina.

Catharanthus

Catharanthus roseus (L.) G. Don

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: IPA.

Diplolepis menziesii Schult.f.

Arbusto trepador. Endémico.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 300-900 m.

Nombre vulgar: Voquicillo, voqui amarillo.

Diplolepis

Diplolepis biflora (Phil.) Hechem & C. Ezcurra

Sinónimos: *Diplolepis nummulariifolia* (Hook. & Arn.)

Liede & Rapini var. *biflora* (Phil.) Hechem & C.

Ezcurra, *Cynocontonum biflorum* Phil., *Cynanchum*

nummulariifolium Hook. & Arn. var. *biflorum* (Phil.)

Reiche, *Vincetoxicum biflorum* (Phil.) Kuntze

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL, RME, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 1000-2500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Diplolepis mucronata (Decne.) Hechem & C.

Ezcurra

Sinónimos: *Cynanchum chilense* (Phil.) Malme,

Holostemma chilense Phil., *Cynocontonum mucronatum*

Decne., *Cynanchum mucronatum* (Decne.) Reiche,

comb. illeg., *Vincetoxicum mucronatum* (Decne.) Kuntze

Hierba trepadora. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, NUB.

Rango altitudinal: 800-2000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Voqui.

Diplolepis boerhaviifolia (Hook. & Arn.) Liede & Rapini

Sinónimos: *Cynanchum boerhaviifolium* Hook. & Arn.,

Cynocontonum boerhaviifolium (Hook. & Arn.) Decne.,

Oxypetalum parvifolium Phil., hom. illeg., *Schizostemma*

kingii Phil., *Vincetoxicum biflorum* (Phil.) Kuntze

Diplolepis myrtifolia (Hook. & Arn.) Hechem & C.

Ezcurra

Sinónimos: *Cynanchum myrtifolium* Hook. & Arn.,

Cynocontonum myrtifolium (Hook. & Arn.) Decne.,

Cynocontonum nemorosum Phil., *Vincetoxicum*

nemorosum (Phil.) Kuntze

Subarbusto trepador. Endémico.

Distribución: ARA, LRI.

Rango altitudinal: 0-900 m.

Nombre vulgar: Hierba del tricao.

***Diplolepis nummulariifolia* (Hook. & Arn.) Liede & Rapini**

Sinónimos: *Cynanchum patagonicum* (Phil.) Malme, *Cynoconnum nummulariifolium* (Hook. & Arn.) Decne., *Cynoconnum undulatum* Decne., *Cynanchum nanum* Skottsb., hom. illeg., *Cynoconnum patagonicum* Phil., *Vincetoxicum patagonicum* (Phil.) Kuntze, *Cynanchum undulatum* (Decne.) K. Schum., *Cynanchum nummulariifolium* Hook. & Arn., *Vincetoxicum nummularifolium* (Hook. & Arn.) Kuntze, *Vincetoxicum undulatum* (Decne.) Kuntze, *Cynanchum andinum* Liede, *Cynanchum nanissimum* Liede, nom. illeg., *Cynanchum nanellum* P.T. Li

Arbusto o subarbusto. Nativo.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.

Rango altitudinal: 700-3000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Diplolepis pachyphylla* (Decne.) Hechem & C. Ezcurra**

Sinónimos: *Cynanchum acutifolium* (Phil.) Reiche, *Cynanchum pachyphyllum* (Decne.) K. Schum., *Cynoconnum acutifolium* Phil., *Cynoconnum pachyphyllum* Decne., *Cynoconnum chiloense* Decne., *Cynanchum lancifolium* Hook. & Arn., hom. illeg., *Vincetoxicum chiloense* (Decne.) Kuntze, *Vincetoxicum pachyphyllum* (Decne.) Kuntze, *Cynanchum chiloense* (Decne.) Malme

Hierba trepadora. Perenne. Nativa.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 100-500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Pahueldin, pahueldum, pahueldun.

***Diplolepis viridis* (Phil.) Hechem & C. Ezcurra**

Sinónimos: *Cynanchum deserticola* A.R. Flores & J.M. Watson, *Cynoconnum viride* Phil., *Cynanchum viride* (Phil.) Reiche, nom. illeg., *Cynanchum atacamense* Liede

Arbusto. Endémico.

Distribución: ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-1300 m.

Elytropus

***Elytropus chilensis* (A. DC.) Müll. Arg.**

Sinónimos: *Echites chilensis* A. DC., *Echites ptarmicus* Poepp., *Echites heterophyllus* Miq., *Elytropus ptarmica* (Poepp.) Miers, *Vinca sternutatoria* Poepp. ex Reiche., *Elytropus heterophyllus* Miers, *Elytropus pubescens* Miers

Arbusto trepador. Nativo.

Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Poroto del campo, quilmay, voqui.

Philibertia

***Philibertia candolleana* (Hook. & Arn.) Goyder**

Sinónimos: *Brachylepis candolleana* Hook. & Arn., *Ast Stephanus cordifolius* Phil., *Mitostigma cordifolium* (Phil.) E. Fourn., *Aphanostelma candolleanum* (Hook. & Arn.) Malme, *Melinia candolleana* (Hook. & Arn.) Decne.

Subarbusto trepador. Nativo.

Distribución: RME.

Rango altitudinal: 0-2000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Philibertia solanoides* Kunth**

Sinónimos: *Blepharodon rahmeri* Phil., *Philibertia rahmeri* (Phil.) Malme

Subarbusto trepador. Nativo.

Distribución: AYP, TAR, ANT.

Rango altitudinal: 2000-4500 m.

Países limítrofes: Bolivia y Perú.

Skytanthus

***Skytanthus acutus* Meyen**

Sinónimos: *Scy恬anthus acutus* Walp., *Neriandra angustifolia* DC.

Arbusto. Endémico.

Distribución: ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-800 m.

Nombre vulgar: Cuerno, cuerno de cabra, monte de burro, cuernecillo.

Tweedia

Tweedia andina (Phil.) G.H. Rua

Sinónimos: *Tweedia hookeri* (Decne.) Malme, *Oxypetalum andinum* Phil., *Oxypetalum hookeri* Decne., *Oxypetalum möllerii* Phil.
Subarbusto trepador. Endémico.
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 0-1000 m.
Nombre vulgar: Voquicillo.

Tweedia birostrata (Hook. & Arn.) Hook. & Arn.

Sinónimos: *Tweedia confertiflora* (Decne.) Malme, *Tweedia obliquifolia* (Colla) Malme, *Cynanchum birostratum* Hook. & Arn., *Gonolobus obliquifolius* Colla, *Gonolobus voquicillo* Colla, *Oxypetalum saxatile* Decne., *Oxypetalum confertiflorum* Decne., *Oxypetalum brevipes* Phil., *Gothofreda birostrata* (Hook. & Arn.) Kuntze, *Gothofreda obliquifolia* (Colla) Kuntze, *Gothofreda confertiflora* (Decne.) Kuntze, *Gothofreda brevipes* (Phil.) Kuntze, *Oxypetalum angustifolium* Phil., *Tweedia brevipes* (Phil.) Malme
Subarbusto trepador. Endémico.
Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO.
Rango altitudinal: 0-1700 m.
Nombre vulgar: Voquicillo.

Tweedia stipitata G.H. Rua & Liede

Subarbusto trepador. Endémico.
Distribución: COQ, VAL, RME.
Rango altitudinal: 0-800 m.

Vinca

Vinca major L.

Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE.

ARALIACEAE

Hedera

Hedera helix L.

Arbusto trepador. Introducido.

Distribución: BIO, ARA, LRI, LLA.

Nombre vulgar: Hiedra.

Raukaua

Raukaua laetevirens (Gay) Frodin

Sinónimos: *Aralia laetevirens* Gay, *Aralia paniculata* Phil., *Cheirodendron laetevirens* (Gay) Seem., *Pseudopanax laetevirens* (Gay) Dusén, comb. illeg., *Pseudopanax laetevirens* (Gay) Franchet
Arbusto o árbol pequeño. Nativo.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-1500 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Sauco cimarrón, sauco del diablo.

Raukaua valdiviensis (Gay) Frodin

Sinónimos: *Aralia valdiviensis* Gay, *Aralia valdiviensis* Gay, *Pseudopanax valdiviensis* (Gay) Seem. ex Harms, *Pseudopanax valdiviensis* (Gay) Seem. ex Harms
Arbusto trepador. Endémico.
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.
Rango altitudinal: 0-500 m.
Nombre vulgar: Curaco, traumén, voquinaranjillo, hueldahuaca.

ARISTOLOCHIACEAE

Aristolochia

Aristolochia bridgesii (Klotzsch) Duch.

Sinónimos: *Howardia bridgesii* Klotzsch, *Howardia bridgesii* Klotzsch
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: RME.
Rango altitudinal: 290-600 m.
Nombre vulgar: Oreja de zorro.

Aristolochia chilensis Bridges ex Lindl.

Sinónimos: *Aristolochia setigera* Klotzsch
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME.
Rango altitudinal: 0-1500 m.
Nombre vulgar: Oreja de zorro, hierba de la Virgen María, clon.

***Aristolochia pearcei* Phil.**

Sinónimos: *Conyza kunthiana* DC., *Conyza pusilla* Kunth
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ATA, COQ.
Rango altitudinal: 10-1900 m.
Nombre vulgar: Oreja de zorro.

Rango altitudinal: 800-1600 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Abrotanella trilobata* Swenson**

Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAG.
Rango altitudinal: 400-800 m.
Países limítrofes: Argentina.

Lactoris

***Lactoris fernandeziana* Phil.**

Arbusto. Endémico.
Distribución: JFE.
Rango altitudinal: 500 m.

Achillea

***Achillea millefolium* L.**

Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: COQ, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

***Achillea ptarmica* L.**

Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: LLA.

ASTERACEAE

Abrotanella

***Abrotanella emarginata* (Gaudich.) Cass.**

Sinónimos: *Oligosporus emarginatus* Gaudich.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-1000 m.
Países limítrofes: Argentina.

***Achyrocline ramosissima* Britton**

Subarbusto. Nativo.
Distribución: AYP.
Rango altitudinal: 2200-4000 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Abrotanella linearifolia* A. Gray**

Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: LLA, AIS, MAG, JFE.
Rango altitudinal: 0-1400 m.

***Achyrocline tomentosa* Rusby**

Sinónimos: *Achyrocline polycephala* Rusby
Subarbusto. Nativo.
Distribución: AYP.
Rango altitudinal: 700-3600 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

***Abrotanella purpurea* Swenson**

Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-800 m.

Acmella

***Abrotanella submarginata* A. Gray**

Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: MAG.
Rango altitudinal: 0-700 m.

***Acmella glaberrima* (Hassl.) R.K. Jansen**

Sinónimos: *Spilanthes glaberrima* Hassl.
Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: MAU.
Rango altitudinal: 0-500 m.

***Abrotanella trichoachaenia* Cabrera**

Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AIS, MAG.

Acrisione

***Acrisione cymosa* (J. Remy) B. Nord.**

Sinónimos: *Senecio cymosus* J. Remy, *Senecio lechleri* Sch.Bip. nom. Nud.

Arbusto o árbol pequeño. Endémico.

Distribución: VAL, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 0-1100 m.

Nombre vulgar: Matico, para ná.

Acrisione denticulata* (Hook. & Arn.) B. Nord. var. *denticulata

Sinónimos: *Senecio yegua* (Colla) Cabrera var. *yegua*, *Cacalia denticulata* Hook. & Arn., *Danaa yegua* Colla, *Senecio denticulatus* (Hook. & Arn.) DC., hom. illeg.,

Senecio ovalifolius Turcz., *Senecio rancaguensis* J.

Remy, *Senecio yegua* (Colla) Cabrera var. *depilis* (Phil.) Cabrera

Arbusto. Nativo.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 700-900 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Palpalen, palo de yegua.

***Acrisione denticulata* (Hook. & Arn.) B. Nord. var. *pilota* (Phil.) B. Nord.**

Sinónimos: *Senecio denticulatus* (Hook. & Arn.) DC. var. *pilotus* Phil., *Senecio yegua* (Colla) Cabrera var. *pilotus* (Phil.) Cabrera

Arbusto. Endémico.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.

Rango altitudinal: 0-1200 m.

Adenocaulon

***Adenocaulon chilense* Less.**

Sinónimos: *Adenocaulon lechleri* Sch. Bip., *Boerhavia nudicaulis* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Ageratum

***Ageratum conyzoides* L.**

Hierba. Anual o perenne. Introducida.

Distribución: IPA.

Agoseris

***Agoseris chilensis* (Less.) Greene**

Sinónimos: *Macrorhynchus chilensis* Less., *Troximon chilense* (Less.) A. Gray

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO.

Rango altitudinal: 0-1100 m.

Nombre vulgar: Yesquilla.

***Agoseris coronopifolia* (d'Urv.) K.L. Chambers ex D.M. Moore**

Sinónimos: *Agoseris australis* (Phil.) Macloskie, *Agoseris pumila* (Gaudich.) Macloskie, *Macrorhynchus australis* Phil., *Macrorhynchus elatus* Phil., *Macrorhynchus poeppigii* DC., *Macrorhynchus pumilum* (Gaudich.) DC., *Taraxacum coronopifolium* d'Urv., *Taraxacum pumilum* Gaudich., *Agoseris poeppigii* (DC.) Greene, *Troximon coronopifolius* (d'Urv.) Cabrera, *Troximon poeppigii* (DC.) De Wild., *Troximon pumilum* (Gaudich.) De Wild.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, NUB, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-800 m.

Países limítrofes: Argentina.

Aldama

***Aldama adenotricha* (S.F. Blake) E.E. Schill. & Panero**

Sinónimos: *Viguiera adenotricha* S.F. Blake

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: COQ.

Rango altitudinal: 900-2050 m.

***Aldama atacamensis* (Phil.) E.E. Schill. & Panero**

Sinónimos: *Viguiera atacamensis* Phil., *Viguiera linearis* Reiche, *Rhysolepis atacamensis* (Phil.) H. Rob. & A.J. Moore

Subarbusto. Endémico.

Distribución: AYP, TAR, ANT.

Rango altitudinal: 2800-2900 m.

***Aldama helianthoides* (Rich.) E.E. Schill. & Panero**

Sinónimos: *Viguiera pazensis* Rusby, *Flourensia atacamensis* (Phil.) Reiche, *Helianthus atacamensis* Phil., *Sanvitalia helianthoides* Rich., *Rhysolepis helianthoides* (Rich.) H. Rob. & A.J. Moore

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: TAR.

Rango altitudinal: 2000-3500 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Sorona.

***Aldama revoluta* (Meyen) E.E. Schill. & Panero**

Sinónimos: *Viguiera revoluta* (Meyen) S.F. Blake, *Flourensia corymbosa* DC., *Flourensia corymbosa* DC. var. *araucana* (Phil.) Reiche, *Helianthus araucanus* Phil., *Helianthus revolutus* Meyen, *Viguiera corymbosa* (DC.) Blake, *Viguiera poeppigii* A. Gray, nom. illeg., *Viguiera gayana* (Phil.) Cabrera ex Espinosa, nom. illeg., *Flourensia gayana* (Phil.) Reiche, *Helianthus gayanus* Phil.

Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ATA, COQ, RME, LBO, MAU, NUB, BIO.

Rango altitudinal: 0-1200 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Botón de oro del monte, china del campo, maravilla.

Amblyopappus

***Amblyopappus pusillus* Hook. & Arn. var. *pauciflorus* (Phil.) Reiche**

Sinónimos: *Amblyopappus pauciflorus* Phil.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: ATA.

Rango altitudinal: 1000 m.

Nombre vulgar: Manzanilla.

Amblyopappus pusillus* Hook. & Arn. var. *pusillus

Sinónimos: *Aroma tenuifolia* Nutt., *Infantea chilensis* J. Remy

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: ANT, ATA, COQ, JFE.

Rango altitudinal: 0-200 m.

Nombre vulgar: Manzanilla.

Nota: Introducida en el Archipiélago de Juan Fernández.

Ambrosia

***Ambrosia arborescens* Mill.**

Arbusto. Introducido.

Distribución: COQ.

***Ambrosia artemisioides* Meyen & Walp. ex Meyen**

Sinónimos: *Franseria fruticosa* Phil., *Franseria meyeniana* Sch. Bip.

Arbusto. Nativo.

Distribución: AYP, TAR, ANT.

Rango altitudinal: 1700-4600 m.

Países limítrofes: Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Tikara, pikara, cadillo, monte verde, tola negra, pegapega, lipelipe.

***Ambrosia chamissonis* (Less.) Greene**

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: COQ, VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

***Ambrosia elatior* L.**

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: MAU, NUB, BIO.

***Ambrosia peruviana* Willd.**

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: AYP, TAR.

***Ambrosia tenuifolia* Spreng.**

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: BIO.

Anaphalis

***Anaphalis chilensis* Reiche**

Sinónimos: *Helichrysum chilense* Hook. & Arn.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 500-800 m.

Antennaria

Antennaria chilensis* J. Remy var. *chilensis

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 1600-3000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Antennaria chilensis* J. Remy var. *magellanica
(Sch. Bip.) Reiche
Sinónimos: *Antennaria magellanica* Sch. Bip.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAG.
Rango altitudinal: 0-1000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Anthemis

***Anthemis arvensis* L.**
Hierba. Anual o bienal. Introducida.
Distribución: RME, LBO, NUB, BIO, ARA, LLA.

***Anthemis cotula* L.**
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG, JFE.

Aphyllocladus

***Aphyllocladus denticulatus* (J. Remy) Cabrera var. *calvus* (Phil.) Cabrera**
Sinónimos: *Jobaphes virgatus* Phil. var. *calvus* Phil.
Arbusto. Endémico.
Distribución: AYP, TAR.
Rango altitudinal: 2500-2800 m.

Aphyllocladus denticulatus* (J. Remy) Cabrera var. *denticulatus
Sinónimos: *Cyclolepis denticulata* J. Remy, *Jobaphes virgatus* Phil., *Plazia virgata* (Phil.) O. Hoffm.
Arbusto. Endémico.
Distribución: ATA.
Rango altitudinal: 700-2700 m.
Nombre vulgar: Piyaya sureña, monte blanco.

Archidasyphllum

***Archidasyphllum diacanthoides* (Less.) P.L.**
Ferreira, Saavedra & Gropo

Sinónimos: *Chuquiraga leucoxylon* Poepp. ex Less., *Flotovia diacanthoides* Less., *Piptocarpha diacanthoides* Hook. & Arn., *Dasyphyllum diacanthoides* (Less.) Cabrera
Árbol. Nativo.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.
Rango altitudinal: 500-1500 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Palo blanco, palo santo, tayu, trevo, tallu.

***Archidasyphllum excelsum* (D. Don) P.L.**

Ferreira, Saavedra & Gropo
Sinónimos: *Chuquiraga excelsa* D. Don, *Flotovia excelsa* (D. Don) DC., *Piptocarpha excelsa* (D. Don) Hook. & Arn., *Dasyphyllum excelsum* (D. Don) Cabrera
Árbol. Endémico.
Distribución: VAL, RME, LBO.
Rango altitudinal: 0-1000 m.
Nombre vulgar: Palo santo, tayú.

Arctium

***Arctium minus* (Hill) Bernh.**
Hierba. Bienal. Introducida.
Distribución: VAL, RME, LBO, BIO, ARA, LLA.

Arctotheca

***Arctotheca calendula* (L.) Levyns**
Hierba. Anual o perenne. Introducida.
Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Argyranthemum

***Argyranthemum frutescens* (L.) Sch. Bip.**
Subarbusto. Introducido.
Distribución: COQ, RME.

Arnica

***Arnica angustifolia* Vahl**
Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: LLA.

Artemisia

***Artemisia absinthium* L.**

Subarbusto. Introducido.

Distribución: VAL, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG, JFE.

Artemisia copa* Phil. var. *copa

Arbusto o árbol pequeño. Nativo.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, VAL.

Rango altitudinal: 3000-4700 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Copa, kopa, salvia blanca.

***Artemisia copa* Phil. var. *trifida* Acevedo**

Arbusto. Endémico.

Distribución: ANT.

Rango altitudinal: 2400 m.

***Artemisia magellanica* Sch. Bip.**

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 0-1500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Artemisia verlotorum* Lamotte**

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: MAU.

Baccharis

***Baccharis acaulis* (Wedd. ex R.E. Fr.) Cabrera**

Sinónimos: *Heterothalamus acaulis* Wedd. ex R.E. Fr., *Pseudobaccharis acaulis* (Wedd. ex R.E. Fr.) Cabrera, *Psila caespitosa* Phil., *Baccharis acaulis* (Wedd. ex R.E. Fr.) Malag., nom. illeg.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: TAR, ANT.

Rango altitudinal: 3300-3700 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Nombre vulgar: Mamañika, qatari, anojarpsike, psike de perro.

***Baccharis alnifolia* Meyen & Walp.**

Arbusto. Nativo.

Distribución: AYP, TAR, ANT.

Rango altitudinal: 3000-3800 m.

Países limítrofes: Perú.

Nombre vulgar: Chilca blanca, pichana, monte.

***Baccharis boliviensis* (Wedd.) Cabrera**

Sinónimos: *Baccharis boliviensis* (Wedd.) Cuatrec., comb. illeg., *Heterothalamus boliviensis* Wedd., *Pseudobaccharis boliviensis* (Wedd.) Cabrera, *Psila boliviensis* (Wedd.) Cabrera, *Baccharis boliviensis* (Wedd.) Malag., comb. illeg.

Arbusto. Nativo.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 1500-4700 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Tolilla, tolita, tola chica, monte de paloma, tola amarilla, tola hembra.

***Baccharis caespitosa* (Ruiz & Pav.) Pers.**

Sinónimos: *Molina caespitosa* Ruiz & Pav.

Subarbusto. Nativo.

Distribución: AYP, TAR, ANT, LBO.

Rango altitudinal: 3500-4000 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Baccharis calliprinos* Griseb.**

Sinónimos: *Pingraea scandens* (Ruiz & Pav.) F.H. Hellwig, *Baccharis petiolata* DC., *Baccharis petiolata* DC. var. *rotundifolia* Phil., *Baccharis scandens* auct. non (Ruiz & Pav.) Pers., *Molina scandens* Ruiz & Pav., *Baccharis salicifolia* (Ruiz & Pav.) Pers. subsp. *calliprinos* (Griseb.) Joch.Müll., *Baccharis scandens* (Ruiz & Pav.) Pers.

Arbusto. Nativo.

Distribución: TAR, ANT.

Rango altitudinal: 1400-3500 m.

Países limítrofes: Argentina y Perú.

Nombre vulgar: Chilca, chillka, suncho, pichana, sangayo.

***Baccharis concava* (Ruiz & Pav.) Pers.**

Sinónimos: *Baccharis macraei* Hook. & Arn. var. *intermedia* Heering, *Molina concava* Ruiz & Pav.

Arbusto. Endémico.

Distribución: BIO.

Rango altitudinal: 0-300 m.

Nombre vulgar: Vautro, gaultro, guauchu.

***Baccharis cymosa* Phil.**

Sinónimos: *Pingraea cymosa* (Phil.) F.H. Hellwig

Arbusto. Endémico.

Distribución: LRI.

Rango altitudinal: 1000-1300 m.

***Baccharis darwinii* Hook. & Arn.**

Sinónimos: *Neomolina darwinii* (Hook. & Arn.) F.H. Hellwig, nom. illeg., *Baccharis angulata* Griseb. var. *gracilis* Heering

Subarbusto. Nativo.

Distribución: LLA, AIS.

Rango altitudinal: 0-3500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Baccharis elaeoides* J. Remy**

Arbusto. Nativo.

Distribución: LRI, LLA.

Rango altitudinal: 0-3000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Baccharis genistelloides* (Lam.) Pers.**

Sinónimos: *Molina venosa* Ruiz & Pav., *Baccharis venosa* (Ruiz & Pav.) Pers.

Subarbusto. Nativo.

Distribución: TAR.

Rango altitudinal: 3900 m.

Países limítrofes: Bolivia y Perú.

***Baccharis glutinosa* Pers.**

Sinónimos: *Baccharis angustifolia* (Cass.) Desf., nom. illeg., *Baccharis pingraea* DC. var. *angustissima* DC., *Baccharis pingraea* DC. var. *pingraea*, *Baccharis pingraea* DC. fma. *latifolia* DC., *Baccharis serrulata* (Lam.) Pers. var. *pingraea* (DC.) Baker, *Baccharis viscosa* (Ruiz & Pav.) Kuntze, comb. illeg., *Molina viscosa* Ruiz & Pav., *Pingraea viscosa* (Ruiz & Pav.) F.H. Hellwig, *Baccharis huydoriana* J. Remy p.p., *Baccharis litoralis* Phil., *Baccharis longipes* Kunze ex DC. var. *angustissima* Phil., *Baccharis glutinosa* Pers. var. *angustissima* (DC.) Giuliano, *Baccharis pingraea* DC. var. *latifolia* DC., nom. illeg.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.

Rango altitudinal: 0-2500 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Chilca, chilquilla.

***Baccharis intermedia* DC.**

Sinónimos: *Baccharis gayana* Phil., *Baccharis volckmannii* Phil.

Arbusto. Endémico.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO.

Rango altitudinal: 0-3000 m.

***Baccharis juncea* (Cass.) Desf.**

Sinónimos: *Arrhenachne juncea* Cass.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, MAU, LRI, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 0-3500 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Nombre vulgar: Suncho, pasto loco, totora, chukchuka, mutumutu.

Baccharis linearis* (Ruiz & Pav.) Pers. subsp. *linearis

Sinónimos: *Baccharis lingulata* Kunze ex Less., *Baccharis linifolia* Meyen, *Baccharis rosmarinifolia* Hook. & Arn., *Molina linearis* Ruiz & Pav., *Baccharis montteana* Phil.

Arbusto. Nativo.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.

Rango altitudinal: 0-3000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Romerillo, romero, romero de la tierra.

***Baccharis linearis* (Ruiz & Pav.) Pers. subsp. *pycnocephala* F.H. Hellwig**

Sinónimos: *Baccharis callistemooides* Walp., *Baccharis rosmarinifolia* Hook. & Arn. var. *callistemooides* (Walp.) Heering ex Reiche, *Baccharis rosmarinifolia* Hook. & Arn. var. *subsinguata* DC., *Baccharis subandina* Phil., *Baccharis rosmarinifolia* Hook. & Arn. var. *subandina* (Phil.) Heering

Arbusto. Nativo.

Distribución: VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.

Rango altitudinal: 0-1700 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Baccharis lycooides* J. Remy**

Sinónimos: *Baccharis negeri* Heering, *Baccharis valdiviana* Phil.

Arbusto. Nativo.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 0-1500 m.

Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Romerillo.

***Baccharis macraei* Hook. & Arn.**

Sinónimos: *Baccharis macraei* Hook. & Arn. var. *lucida* Heering
Arbusto. Endémico.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO.
Rango altitudinal: 0-500 m.

***Baccharis magellanica* (Lam.) Pers.**

Sinónimos: *Baccharis tricuneata* (L.f.) Pers. var. *magellanica* (Lam.) Cuatrec., *Conyza magellanica* Lam.
Arbusto. Nativo.
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-3500 m.
Países limítrofes: Argentina.

***Baccharis mylodontis* F.H. Hellwig**

Arbusto. Endémico.
Distribución: MAG.
Rango altitudinal: 0-500 m.

***Baccharis neaei* DC.**

Sinónimos: *Baccharis bezanilleana* J. Remy, *Baccharis bezanilleana* J. Remy var. *solisii* (Phil.) Reiche, *Baccharis rhetinodes* Meyen & Walp., *Baccharis solieri* J. Remy, *Baccharis solisii* Phil., *Baccharis talcareguensis* Heering ex Reiche, *Baccharis solieri* J. Remy var. *williamsii* (Phil.) Heering, *Baccharis williamsii* F. Phil. ex Phil.
Arbusto. Nativo.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.
Rango altitudinal: 0-3200 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Romerillo del monte.

***Baccharis nivalis* (Wedd.) Sch. Bip. ex Phil.**

Sinónimos: *Palenia delfinii* Phil., *Heterothalamus nivalis* Wedd., *Lucilia dioica* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: NUB, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 500-3500 m.
Países limítrofes: Argentina.

***Baccharis obovata* Hook. & Arn.**

Sinónimos: *Baccharis umbelliformis* DC., *Baccharis foliosa* Hook. & Arn., *Baccharis obovata* Hook. & Arn. subsp. *umbelliformis* (DC.) F.H. Hellwig, *Baccharis umbelliformis* DC. fma. *frigida* Heering, nom. illeg., *Baccharis umbelliformis* DC. var. *typica* Heering, nom. illeg., *Baccharis umbelliformis* DC. var. *vulgaris* Heering, *Baccharis umbelliformis* DC. var. β Arbusto. Nativo.
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.
Rango altitudinal: 0-3000 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Chilca, vautro.

***Baccharis paniculata* DC.**

Sinónimos: *Baccharis philippii* Heering, *Neomolina paniculata* (DC.) F.H. Hellwig, nom. illeg., *Baccharis floribunda* Phil., hom. illeg., *Baccharis leptcephala* Phil., hom. illeg., *Nardophyllum paniculatum* Phil.
Arbusto. Endémico.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO.
Rango altitudinal: 0-1000 m.

***Baccharis patagonica* Hook. & Arn.**

Sinónimos: *Baccharis cuneifolia* (Lam.) DC., hom. illeg., *Conyza cuneifolia* Lam.
Arbusto. Nativo.
Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.
Rango altitudinal: 0-3000 m.
Países limítrofes: Argentina.

***Baccharis patagonica* Hook. & Arn. subsp. *palenae* (Phil.) F.H. Hellwig**

Arbusto. Nativo.
Distribución: NUB, BIO, ARA, LLA, AIS.
Rango altitudinal: 5-1500 m.
Países limítrofes: Argentina.

***Baccharis pilcensis* F.H. Hellwig**

Arbusto. Endémico.
Distribución: MAU, BIO.
Rango altitudinal: 1600-2200 m.

***Baccharis poeppigiana* DC. subsp. *austropedicellata* F.H. Hellwig**

Arbusto. Nativo.
Distribución: RME, LBO, MAU, BIO.
Rango altitudinal: 2000-2500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Baccharis poeppigiana DC. subsp. *ocellata* (Phil.) F.H. Hellwig
Sinónimos: *Baccharis ocellata* Phil., *Baccharis umbelliformis* DC. var. *ocellata* (Phil.) Heering ex Reiche
Arbusto. Nativo.
Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO.
Rango altitudinal: 1000-2000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Baccharis poeppigiana DC. subsp. *poeppigiana*
Sinónimos: *Baccharis obovata* Hook. & Arn. var. *poeppigiana* (DC.) Cabrera, *Baccharis umbelliformis* DC. var. *poeppigiana* (DC.) Heering ex Reiche, *Baccharis pedicellata* DC.
Arbusto. Endémico.
Distribución: COQ, VAL, RME.
Rango altitudinal: 2000-3000 m.
Nombre vulgar: Chilca cordillerana.

Baccharis pycnantha Phil.
Sinónimos: *Pingraea pycnantha* (Phil.) F.H. Hellwig
Arbusto. Endémico.
Distribución: ATA.
Rango altitudinal: 1250-2500 m.

Baccharis racemosa (Ruiz & Pav.) DC.
Sinónimos: *Baccharis eupatorioides* Hook. & Arn., *Baccharis racemosa* (Ruiz & Pav.) DC. var. *eupatorioides* (Hook. & Arn.) Heering ex Reiche, comb. illeg., *Molina racemosa* Ruiz & Pav., *Neomolina racemosa* (Ruiz & Pav.) Hellwig, *Baccharis fastigiata* Phil. ex Reiche, *Baccharis racemosa* (Ruiz & Pav.) DC. var. *angolensis* Kuntze, *Baccharis racemosa* (Ruiz & Pav.) DC. var. *eupatorioides* (Hook. & Arn.) Kuntze, *Baccharis rigida* Hook. & Arn., *Baccharis racemosa* (Ruiz & Pav.) DC. var. *typica* Heering, nom. illeg., *Baccharis eupatorioides* Hook. & Arn. var. β , *Baccharis eupatorioides* Hook. & Arn. var. *gama*, *Baccharis ovata* Hook. & Arn.
Arbusto. Nativo.
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 0-3000 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Chilca.

Baccharis rhomboidalis J. Remy
Sinónimos: *Baccharis rhomboidalis* J. Remy subsp. *truncata* (Phil.) F.H. Hellwig, *Baccharis involucrata* Phil., *Baccharis nemorosa* Phil., *Baccharis rhomboidalis* J. Remy var. *nemorosa* (Phil.) Heering ex Reiche
Arbusto. Endémico.
Distribución: ATA, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.
Rango altitudinal: 0-3000 m.

Baccharis sagittalis (Less.) DC.
Sinónimos: *Molina sagittalis* Less., *Pingraea sagittalis* (Less.) F.H. Hellwig
Subarbusto. Nativo.
Distribución: TAR, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.
Rango altitudinal: 0-2400 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.
Nombre vulgar: Verbena de tres esquinas.

Baccharis salicifolia (Ruiz & Pav.) Pers.
Sinónimos: *Baccharis longipes* Kunze ex DC., *Baccharis marginalis* DC. var. *longipes* (Kunze ex DC.) Heering, *Baccharis viscosa* (Ruiz & Pav.) Kuntze var. *nigricans* Kuntze, *Molina salicifolia* Ruiz & Pav., *Baccharis confertifolia* Bertero ex Colla, *Baccharis kraussei* Heering ex Reiche, *Baccharis marginalis* DC., *Baccharis pallida* Heering ex Reiche, *Pingraea marginalis* (DC.) F.H. Hellwig, *Pingraea salicifolia* (Ruiz & Pav.) F.H. Hellwig, *Baccharis chilquilla* DC., nom. illeg., *Baccharis araucana* Phil., *Baccharis cuervii* Phil., *Baccharis glutinosa* Pers. var. *incisa* Heering, *Baccharis huydobiiana* J. Remy, *Baccharis linifolia* Phil., hom. illeg., *Baccharis marginalis* DC. var. *araucana* (Phil.) Heering, *Baccharis marginalis* DC. var. *linifolia* (Phil.) Heering, *Baccharis sphaerocephala* Hook. & Arn. var. *krausei* (Heering) Malag., comb. illeg.
Arbusto. Nativo.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.
Rango altitudinal: 0-3500 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.
Nombre vulgar: Chilca, chilquilla, chilquilla del río, suncho, culpío, radín.

***Baccharis sessilifolia* DC.**

Subarbusto. Endémico.

Distribución: VAL, MAU, BIO.

Rango altitudinal: 0-500 m.

***Baccharis spartoides* (Hook. & Arn. ex DC.) J. Remy**

Sinónimos: *Baccharis sarophora* Phil., *Heterothalamus spartoides* Hook. & Arn. ex DC., *Pseudobaccharis spartoides* (Hook. & Arn. ex DC.) Cabrera, *Psila spartoides* (Hook. & Arn. ex DC.) Cabrera

Arbusto. Nativo.

Distribución: ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-3000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Escoba, hierba de la escoba, pichana.

***Baccharis sphaerocephala* Hook. & Arn.**

Sinónimos: *Pingraea sphaerocephala* (Hook. & Arn.)

F.H. Hellwig, *Baccharis radin* Phil.

Arbusto. Endémico.

Distribución: BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 0-700 m.

Nombre vulgar: Rari.

***Baccharis taltalensis* I.M. Johnst.**

Sinónimos: *Neomolina taltalensis* (I.M. Johnst.) F.H.

Hellwig, nom. illeg.

Subarbusto. Endémico.

Distribución: ANT, ATA.

Rango altitudinal: 300-900 m.

***Baccharis tola* Phil. subsp. *santelicensis* (Phil.) Joch.**

Müller var. *chrysophylla* (F.H. Hellwig) Joch.

Müller

Sinónimos: *Baccharis santelicensis* Phil. subsp.

chrysophylla F.H. Hellwig

Arbusto. Nativo.

Distribución: AYP, TAR.

Rango altitudinal: 3000-4600 m.

Países limítrofes: Bolivia.

***Baccharis tola* Phil. subsp. *santelicensis* (Phil.) Joch.**

Müller var. *incarum* (Wedd.) Joch. Müller

Sinónimos: *Baccharis santelicensis* Phil., *Baccharis microphylla* Kunth var. *incarum* Wedd., *Baccharis incarum* Wedd.

Arbusto. Nativo.

Distribución: AYP, TAR, ANT.

Rango altitudinal: 1900-4800 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Ñaka, lejía, tola lejía, ñakat'ula.

Baccharis tola* Phil. subsp. *tola* var. *tola

Sinónimos: *Baccharis incarum* (Wedd.) Perkins var. *lejia* (Phil.) Cabrera, *Baccharis tola* Phil. var. *lejia* (Phil.) Reiche, *Baccharis lejia* Phil.

Arbusto. Nativo.

Distribución: ANT, ATA.

Rango altitudinal: 2200-4500 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Nombre vulgar: Lejía, tola, leña lejía, loire, ñaka.

***Baccharis tola* Phil. subsp. *tola* var. *viscosissima* (Kuntze) Joch. Müller**

Sinónimos: *Baccharis magellanica* (Lam.) Pers. var. *viscosissima* Kuntze, *Baccharis tola* Phil. subsp. *altilanicola* F.H. Hellwig, *Baccharis tola* Phil. var. *viscosissima* (Kuntze) Joch. Müll.

Arbusto. Nativo.

Distribución: TAR, ANT.

Rango altitudinal: 3100-4500 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Nombre vulgar: Tolita, chachakoma de burro.

***Baccharis vernalis* F.H. Hellwig**

Sinónimos: *Baccharis concava* (Ruiz & Pav.) Pers. var. *floribunda* Heering

Arbusto. Endémico.

Distribución: ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, NUB, BIO.

Rango altitudinal: 0-700 m.

Baccharis zoellneri* F.H. Hellwig subsp. *minor

F.H. Hellwig

Arbusto. Endémico.

Distribución: BIO, ARA.

Rango altitudinal: 800-1400 m.

Baccharis zoellneri* F.H. Hellwig subsp. *zoellneri

Arbusto. Nativo.

Distribución: ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-1300 m.
Países limítrofes: Argentina.

Bahia

Bahia ambrosioides Lag.

Sinónimos: *Achyropappus maritimus* Poepp. ex DC., nom. nud., *Stylesia ambrosioides* (Lag.) Nutt., *Stylesia puberula* Nutt., *Eriophyllum ambrosioides* (Lag.) Kuntze Subarbusto. Endémico.

Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, JFE.

Rango altitudinal: 0-600 m.

Nombre vulgar: Chamicilla, manzanilla cimarroma, chamiza blanca.

Nota: Introducida en el Archipiélago de Juan Fernández.

Bellis

Bellis perennis L.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG.

Belloa

Belloa chilensis (Hook. & Arn.) J. Remy

Sinónimos: *Chevreulia nivea* Phil., *Gnaphalium andicola* Kuntze, hom. illeg., *Lucilia araucana* Phil., *Lucilia chilensis* Hook. & Arn., *Lucilia chilensis* Poepp. & Endl., hom. illeg., *Lucilia frigida* Reiche, nom. illeg., *Lucilia nivea* (Phil.) Cabrera

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: TAR, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.

Rango altitudinal: 900-2000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Bidens

Bidens aurea (Aiton) Sherff

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, LRI, LLA, IPA.

Bidens laevis (L.) Britton, Sterns & Poggenb.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: ANT, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.

Bidens pilosa L. var. *alausensis* (Kunth) Sherff

Sinónimos: *Bidens alausensis* Kunth, *Bidens valparadisiaca* Colla, *Bidens chilensis* DC.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: TAR, COQ, VAL, RME, LBO, BIO, JFE.

Rango altitudinal: 0-2800 m.

Países limítrofes: Bolivia y Perú.

Bidens pilosa L. var. *apiifolia* (DC.) Sherff

Sinónimos: *Bidens chilensis* DC. var. *apiifolia* DC.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO.

Rango altitudinal: 0-1300 m.

Bidens pilosa L. var. *pilosa*

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, JFE, IPA.

Bidens pseudocosmos Sherff

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: ANT, COQ.

Rango altitudinal: 2900-3400 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Amor seco.

Bidens subalternans DC.

Sinónimos: *Bidens quadrangularis* DC.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT.

Rango altitudinal: 0-1500 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Bidens triplinervia Kunth var. *macrantha* (Wedd.)

Sherff

Sinónimos: *Bidens macrantha* Griseb., *Bidens humilis* Wedd. var. *macrantha* Wedd.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT.

Rango altitudinal: 1000-3300 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Flor amarilla.

Bidens triplinervia Kunth var. *triplinervia*

Sinónimos: *Bidens pedunculata* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP.
Rango altitudinal: 2000-2500 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Blennosperma

***Blennosperma chilense* Less.**
Sinónimos: *Soliva radiata* Poepp. ex Less., *Unxia anthemidifolia* Bertero ex Colla, *Unxia anthemidifolia* Bertero ex Less., *Apalus anthemifolius* (Bertero ex Colla) DC.
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 0-1700 m.

Brachyclados

***Brachyclados caespitosus* (Phil.) Speg.**
Sinónimos: *Brachyclados obtusifolius* Kuntze, *Brachyclados pygmaeus* Kuntze, *Lavidia caespitosa* Phil.
Subarbusto. Nativo.
Distribución: MAG.
Rango altitudinal: 0-500 m.
Países limítrofes: Argentina.

***Brachyclados lycioides* D. Don**
Sinónimos: *Baucis lavandulifolia* Phil., *Brachyclados involutus* Kuntze, *Brachyclados macrocephalus* Kuntze
Arbusto. Nativo.
Distribución: COQ, VAL.
Rango altitudinal: 0-2000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Calendula

***Calendula arvensis* L.**
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: COQ, VAL, RME, BIO.

***Calendula officinalis* L.**
Hierba. Anual o bienal. Introducida.
Distribución: COQ, VAL, RME, BIO, JFE.

***Calendula tripterocarpa* Rupr.**
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: COQ.

Calopappus

***Calopappus acerosus* Meyen**
Sinónimos: *Nassauvia remiana* Wedd., *Calopappus acanthifolius* J. Remy, *Nassauvia acanthifolia* (J. Remy G.F. Grandjot, *Nassauvia acerosa* (Meyen) Wedd.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU.
Rango altitudinal: 2300-3200 m.

Calyptocarpus

***Calyptocarpus vialis* Less.**
Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: IPA.

Carduus

***Carduus nutans* L.**
Hierba. Bienal. Introducida.
Distribución: VAL, RME, ARA.

***Carduus pycnocephalus* L.**
Hierba. Anual o bienal. Introducida.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE.

***Carduus tenuiflorus* Curtis**
Hierba. Anual o bienal. Introducida.
Distribución: VAL.

***Carduus thoermeri* Weinm.**
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: VAL, RME, LBO, ARA, AIS, MAG.

Carthamus

***Carthamus lanatus* L.**
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, JFE.

***Carthamus tinctorius* L.**

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: COQ, RME, BIO.

Centaurea

***Centaurea atacamensis* (Reiche) I.M. Johnst.**

Sinónimos: *Centaurea floccosa* Hook. & Arn. var. *atacamensis* Reiche, *Centaurea atacamensis* (Reiche) Ravenna, comb. illeg.

Arbusto. Endémico.

Distribución: ANT, ATA, VAL.

Rango altitudinal: 0-100 m.

***Centaurea benedicta* (L.) L.**

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: VAL, RME, MAU.

***Centaurea bulbosa* Hook. & Arn.**

Sinónimos: *Centaurea dianthoides* J. Remy

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, BIO, ARA, LLA.

Rango altitudinal: 0-700 m.

***Centaurea cachinalensis* Phil.**

Arbusto. Endémico.

Distribución: ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-2800 m.

***Centaurea calcitrapa* L.**

Hierba. Anual o bienal. Introducida.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Centaurea chilensis* Hook. & Arn. var. *breviloba

DC.

Subarbusto. Endémico.

Distribución: COQ, VAL.

Centaurea chilensis* Hook. & Arn. var. *chilensis

Subarbusto. Endémico.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO.

Rango altitudinal: 1500-3500 m.

Nombre vulgar: Hierba o flor del minero.

Centaurea chilensis* Hook. & Arn. var. *stenolepis

Phil.

Subarbusto. Endémico.

Distribución: ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-100 m.

***Centaurea cyanus* L.**

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: RME, AIS.

***Centaurea floccosa* Hook. & Arn.**

Sinónimos: *Centaurea illapelina* Phil.

Subarbusto. Endémico.

Distribución: ATA, COQ, VAL.

Rango altitudinal: 0-2900 m.

***Centaurea gayana* J. Remy**

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ATA, COQ.

Rango altitudinal: 50 m.

***Centaurea jacea* L.**

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: ARA.

***Centaurea melitensis* L.**

Hierba. Anual o bienal. Introducida.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG, JFE, IPA.

***Centaurea monocephala* J. Remy**

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: BIO.

***Centaurea nigra* L.**

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: ARA.

***Centaurea solstitialis* L.**

Hierba. Anual o bienal. Introducida.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU.

Centaurodendron

***Centaurodendron dracaenoides* Johow**

Sinónimos: *Plectocephalus dracaenoides* (Johow) F.H. Hellwig
Arbusto o árbol pequeño. Endémico.
Distribución: JFE.
Rango altitudinal: 0-500 m.

Centaurodendron palmiforme Skottsb.
Arbusto o árbol pequeño. Endémico.
Distribución: JFE.
Rango altitudinal: 0-500 m.

Centipeda

Centipeda elatinoides (Less.) Benth. & Hook.f. ex O. Hoffm.
Sinónimos: *Myriogyne elatinoides* Less.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.
Rango altitudinal: 500-1000 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Pedorrilla, peorrilla.

Chaetanthera

Chaetanthera albiflora (Phil.) A.M.R. Davies
Sinónimos: *Chaetanthera linearis* Poepp. ex Less. var. *albiflora* Phil., *Chaetanthera linearis* Poepp. ex Less. var. *taltalensis* I.M. Johnst., *Chaetanthera microphylla* (Cass.) Hook. & Arn. var. *albiflora* (Phil.) Cabrera, *Chaetanthera linifolia* Bertero ex Less. var. *albiflora* Phil., *Chaetanthera albiflora* Phil., nom. illeg.
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL.
Rango altitudinal: 1600-1800 m.

Chaetanthera chilensis (Willd.) DC. var. ***chilensis***
Sinónimos: *Chaetanthera chilensis* (Willd.) DC. var. *argentea* (Phil.) Cabrera, *Chaetanthera chilensis* (Willd.) DC. var. *involuta* (Phil.) Cabrera, *Chaetanthera argentea* D. Don, p.p. *Chaetanthera argentea* Phil., hom. illeg., *Chaetanthera collina* Phil., *Chaetanthera eryngioides* D. Don, *Chaetanthera grandiflora* Steud., *Chaetanthera nana* Phil., *Chaetanthera sericea* Lag., *Chaetanthera serrata* Ruiz & Pav. var. *argentea* (Phil.) Reiche, *Chaetanthera serrata* Ruiz & Pav. var. *nana* (Phil.) Reiche, *Chaetanthera sublignosa* Kuntze, *Perdicium chilense*

Willd., *Chaetanthera involucrata* Phil., *Chaetanthera tenuifolia* D. Don var. *eryngioides* (D. Don) Hook. & Arn.

Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 0-2500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Chaetanthera chilensis (Willd.) DC. var. ***tenuifolia*** (D. Don) Cabrera

Sinónimos: *Chaetanthera argentea* D. Don, p.p., *Chaetanthera tenuifolia* D. Don
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ, VAL, LBO, MAU, NUB, BIO.
Rango altitudinal: 20-1800 m.
Países limítrofes: Argentina.

Chaetanthera ciliata Ruiz & Pav.

Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 0-1200 m.

Chaetanthera depauperata (Hook. & Arn.) A.M.R. Davies

Sinónimos: *Chaetanthera linifolia* Bertero ex Less. var. *depauperata* (Hook. & Arn.) DC., *Chaetanthera leptocepala* Cabrera, *Chaetanthera microphylla* (Cass.) Hook. & Arn. var. *depauperata* Hook. & Arn.
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME.
Rango altitudinal: 700-2900 m.

Chaetanthera elegans Phil. var. ***elegans***

Sinónimos: *Chaetanthera elata* Phil., *Chaetanthera brachylepis* Phil., *Chaetanthera valdiviana* Phil., *Chaetanthera humilis* Phil., *Chaetanthera serrata* Ruiz & Pav. var. *humilis* (Phil.) Reiche, *Chaetanthera volckmanni* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.
Rango altitudinal: 1500-2000 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: China.

Chaetanthera elegans Phil. var. ***pratensis*** (Phil.) Cabrera

Sinónimos: *Chaetanthera andina* Phil., *Chaetanthera andina* Phil. var. *pratensis* (Phil.) Reiche, *Chaetanthera araucana* Phil., *Chaetanthera comata* Phil., *Chaetanthera elegans* Phil. var. *andina* (Phil.) Cabrera, *Chaetanthera foliosa* Phil., *Chaetanthera montana* Phil., *Chaetanthera pratensis* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 1100-1680 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Chaetanthera elegans* Phil. var. *pulchra* Cabrera**

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 1240-1600 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Chaetanthera euphrasiooides* (DC.) F. Meigen**

Sinónimos: *Chaetanthera debilis* Meyen & Walp., *Elachia euphrasiooides* DC., *Chaetanthera euphrasiooides* Reiche var. *spinulosa* (Phil.) Reiche, *Elachia spinulosa* Phil., *Chaetanthera euphrasiooides* Reiche, hom. illeg., *Tylloma euphrasiooides* (DC.) Wedd.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, BIO.

Rango altitudinal: 1200-3700 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Chaetanthera flabellata* D. Don**

Sinónimos: *Chaetanthera multicaulis* DC. var. *prostata* DC., *Chaetanthera prostrata* D. Don, *Elachia euphrasiooides* Deless. non DC., hom. illeg., *Chaetanthera flabellata* D. Don var. *prostrata* (D. Don) Hook. & Arn.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: VAL, RME, MAU.

Rango altitudinal: 1600-2600 m.

***Chaetanthera flabellifolia* Cabrera**

Sinónimos: *Pachylaena elegans* Phil.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: COQ.

Rango altitudinal: 3000-3500 m.

***Chaetanthera frayjorgensis* A.M.R. Davies**

Sinónimos: *Tylloma brachylepis* Phil., *Tylloma glabratum* DC. var. *brachylepis* (Phil.) Reiche, *Tylloma glabratum* DC. var. *microphyllum* Phil.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-500 m.

***Chaetanthera glabrata* (DC.) F. Meigen**

Sinónimos: *Tylloma glabratum* DC., *Tylloma glabratum* DC. var. *rotundifolium* (Phil.) Reiche, *Tylloma glabratum* DC. var. *stolpi* (Phil.) Reiche, *Tylloma glabratum* DC. var. *strictum* (Phil.) Reiche, *Tylloma rotundifolium* Phil., *Tylloma stolpi* Phil.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO.

Rango altitudinal: 0-3000 m.

Chaetanthera glandulosa* J. Remy var. *glandulosa

Sinónimos: *Tiltilia pungens* Phil. ex Reiche, nom. nud.
Subarbusto. Endémico.

Distribución: COQ, VAL, RME.

Rango altitudinal: 1000-3000 m.

Chaetanthera glandulosa* J. Remy var. *gracilis

A.M.R. Davies

Subarbusto. Endémico.

Distribución: VAL.

Rango altitudinal: 1000-2000 m.

***Chaetanthera incana* Poepp. ex Less.**

Sinónimos: *Chaetanthera incana* Poepp. ex Less. var. *spathulata* DC., *Chaetanthera obtusata* Phil., *Chaetanthera scariosa* D. Don, *Chaetanthera spathulata* Poepp. ex Less., *Chaetanthera chilensis* Hook. & Arn., hom. illeg.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, RME.

Rango altitudinal: 0-500 m.

***Chaetanthera kalinae* A.M.R. Davies**

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: ATA, COQ.

Rango altitudinal: 2300-3100 m.

***Chaetanthera lanata* (Phil.) I.M. Johnst.**

Sinónimos: *Chaetanthera philippii* B.L. Rob., *Chondrochilus grandiflorus* Phil., *Chondrochilus involucratus* Phil., *Chondrochilus lanatus* Phil., *Tylloma lanatum* Phil., *Tylloma involucratum* (Phil.) Reiche

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME.

Rango altitudinal: 2600-3900 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Chaetanthera limbata* (D. Don) Less.**

Sinónimos: *Chaetanthera schroederi* G.F. Grandjot & K.

Grandjot, *Tylloma ciliatum* Phil., *Tylloma eurylepis*

Phil., *Tylloma glabratum* DC. var. *eurylepis* (Phil.)

Reiche, *Tylloma limbatum* D. Don, *Tylloma strictum*

Phil.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO.

Rango altitudinal: 0-2500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Chaetanthera linearis* Poepp. ex Less.**

Sinónimos: *Chaetanthera kunthiana* Less. p.p.,

Chaetanthera linearifolia Poepp. ex Steud., nom. nud.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: AYP, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 0-2000 m.

***Chaetanthera microphylla* (Cass.) Hook. & Arn.**

Sinónimos: *Chaetanthera linifolia* Bertero ex Less.,

Chaetanthera salsolooides (D. Don) Kuntze, *Cherina*

microphylla Cass., *Onoseris linifolia* Bertero, nom. nud.,

Euthrixia salsolooides D. Don, *Chaetanthera delicatula*

Phil., *Chaetanthera pentapetala* Phil., *Euthrixia affinis* D. Don

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO.

Rango altitudinal: 0-1600 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Chaetanthera moenchioides* Less.**

Sinónimos: *Chaetanthera moenchioides* Less. var.

pauciflora F. Meigen, *Chaetanthera moenchioides* Less.

var. *sulphurea* F. Meigen, *Chaetanthera tenuifolia*

Deless., hom. illeg., *Chaetanthera albicans* Bertero,

nom. nud.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.

Rango altitudinal: 0-2300 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Chaetanthera multicaulis* DC.**

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: VAL, RME, LBO.

Rango altitudinal: 0-1500 m.

***Chaetanthera perpusilla* (Wedd.) Anderb. & S.E.**

Freire

Sinónimos: *Chaetanthera aymarae* Martic. & Quezada, *Luciliopsis perpusilla* Wedd.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: AYP, TAR.

Rango altitudinal: 2200-3300 m.

Países limítrofes: Bolivia.

Nombre vulgar: Pasto de lluvia.

***Chaetanthera peruviana* A. Gray**

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: AYP.

Rango altitudinal: 2700-3900 m.

Países limítrofes: Perú.

***Chaetanthera pubescens* A.M.R. Davies**

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: ATA, COQ.

Rango altitudinal: 600-3500 m.

***Chaetanthera ramosissima* D. Don**

Sinónimos: *Chaetanthera tenella* Less. var. *tenella*,

Chaetanthera berteriana Colla, hom. illeg., *Minythodes*

umbellata Phil., *Chaetanthera kunthiana* Less. p.p

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

***Chaetanthera renifolia* (J. Remy) Cabrera**

Sinónimos: *Chaetanthera crenata* (Phil.) F. Meigen, comb. illeg., *Chondrochilus crenatus* Phil., *Elachia*

renifolia J. Remy, *Tylloma renifolium* (J. Remy) Wedd.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: RME.

Rango altitudinal: 2000-4000 m.

***Chaetanthera serrata* Ruiz & Pav.**

Sinónimos: *Chaetanthera spinulosa* Cass., *Proselia*

serrata (Ruiz & Pav.) D. Don

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO,

ARA, LRI.

Rango altitudinal: 0-1500 m.

***Chaetanthera spathulifolia* Cabrera**

Sinónimos: *Carmelita spathulata* Phil., *Chaetanthera spathulata* (Phil.) Hauman, comb. illeg.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL.

Rango altitudinal: 2700-4100 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Chaetanthera splendens* (J. Remy) B.L. Rob.**

Sinónimos: *Elachia splendens* J. Remy, *Tylloma splendens* (J. Remy) Wedd.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: COQ, RME.

Rango altitudinal: 2500-4000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Chaetanthera taltalensis* (Cabrera) A.M.R. Davies**

Sinónimos: *Chaetanthera tenella* Less. var. *taltalensis* Cabrera

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-500 m.

***Chaetanthera villosa* D. Don**

Sinónimos: *Carmelita formosa* Gay ex DC.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 1000-3000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Chaptalia

***Chaptalia exscapa* (Pers.) Baker var. *chilensis* (DC.) Burkart**

Sinónimos: *Gerbera chilensis* (DC.) Sch. Bip., *Thyrsanthema chilensis* (DC.) Kuntze, *Loxodon chilensis* DC.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Chersodoma

***Chersodoma arequipensis* (Cuatrec.) Cuatrec.**

Sinónimos: *Senecio arequipensis* Cuatrec., *Chersodoma longipedicellata* Ricardi & Martic.

Subarbusto. Nativo.

Distribución: AYP, TAR, ANT.

Rango altitudinal: 3200-3700 m.

Países limítrofes: Perú.

Nombre vulgar: Chachakoma blanca, coquilla.

***Chersodoma candida* Phil.**

Sinónimos: *Senecio chersodomus* Reiche, nom. nud., *Senecio oxyodon* Phil.

Arbusto. Nativo.

Distribución: AYP, TAR, ANT.

Rango altitudinal: 3600-4200 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

***Chersodoma jodopappa* (Sch. Bip.) Cabrera**

Sinónimos: *Senecio jodopappus* Sch. Bip. ex Wedd., nom. illeg., *Senecio jodopappa* Sch. Bip.

Arbusto. Nativo.

Distribución: AYP, TAR, ANT.

Rango altitudinal: 3000-4300 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Chachakoma blanca, poq'ot'ula, coquilla.

Chevreulia

***Chevreulia diemii* Cabrera**

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAU, ARA, LLA.

Rango altitudinal: 0-1600 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Chevreulia lycopodioides* (d'Urv.) DC.**

Sinónimos: *Gnaphalium lycopodioides* d'Urv.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ARA, LLA.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Chevreulia pusilla* DC.**

Sinónimos: *Chevreulia lanceolata* J. Remy

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL, LBO, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Chevreulia sarmentosa* (Pers.) S.F. Blake**

Sinónimos: *Chevreulia stolonifera* Cass., nom. illeg., *Chevreulia thouarsii* J. Remy, nom. illeg., *Tussilago sarmentosa* Pers., *Chaptalia sarmentosa* (Pers.) S.F. Blake

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 0-1700 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Nombre vulgar: Pasto dulce.

Chiliotrichum

***Chiliotrichum diffusum* (G. Forst.) Kuntze**

Sinónimos: *Amellus diffusus* G. Forst., *Aster magellanicus* Spreng., hom. illeg., *Chiliotrichum rosmarinifolium* Less., *Chiliotrichum amelloideum* Cass., nom. illeg., *Chiliotrichum amelloideum* Cass., nom. illeg. var. *lanceolatum* Nees, *Chiliotrichum amelloideum* Cass., nom. illeg. var. *rosmarinifolium* (Less.) Nees, *Chiliotrichum diffusum* (G. Forst.) Kuntze var. *angustifolium* Speg., *Chiliotrichum diffusum* (G. Forst.) Kuntze var. *media* Speg., *Chiliotrichum longifolium* Phil., *Chiliotrichum virgatum* Phil., *Chiliotrichum feliciae* Hombr. & Jacq., *Chiliotrichum angustifolium* Phil., *Chiliotrichum tenue* Phil., *Tropidolepis diffusa* (G. Forst.) Tausch, *Chiliotrichum amelloideum* Cass., nom. illeg. var. *diffusum* (G. Forst.) Nees, *Chiliotrichum diffusum* (G. Forst.) Kuntze fma. *typica* Speg., nom. illeg.

Arbusto. Nativo.

Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-2700 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Fascine, romerillo.

***Chiliotrichum fuegianum* (O. Hoffm.) Bonifacino**

Sinónimos: *Chiliophyllum fuegianum* O. Hoffm.

Arbusto. Nativo.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 0-300 m.

Países limítrofes: Argentina.

Chrysanthemoides

***Chrysanthemoides monilifera* (L.) Norl.**

Arbusto. Introducido.

Distribución: VAL, RME.

Chrysanthemum

***Chrysanthemum coronarium* L.**

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: ATA, COQ, VAL, MAU, BIO, JFE.

***Chrysanthemum segetum* L.**

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: LLA.

Chuquiraga

***Chuquiraga atacamensis* Kuntze**

Sinónimos: *Chuquiraga glabra* Phil., nom. illeg.

Arbusto. Nativo.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA.

Rango altitudinal: 3000-4500 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Nombre vulgar: Tajtará, quebraolla, azafrán, lengua de gallo, rezongón.

***Chuquiraga kuschelii* Acevedo**

Arbusto. Endémico.

Distribución: AYP.

Rango altitudinal: 2900-3900 m.

***Chuquiraga oppositifolia* D. Don**

Sinónimos: *Barnadesia flavescens* Meyen, *Chuquiraga alpina* Poepp. ex Less., *Chuquiraga chrysanthra* Field & Gardner, *Chuquiraga oppositifolia* D. Don var. *angustifolia* Ces., *Chuquiraga oppositifolia* D. Don var. *macrantha* J. Remy

Arbusto. Nativo.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 1500-2500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Hierba blanca.

***Chuquiraga spinosa* Less. subsp. *australis* C.**

Ezcurra

Arbusto. Nativo.

Distribución: ANT, ATA.

Rango altitudinal: 3500-4500 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Nombre vulgar: Ch'ana, chinchillawa macho.

Chuquiraga spinosa* Less. subsp. *rotundifolia

(Wedd.) C. Ezcurra

Sinónimos: *Chuquiraga rotundifolia* Wedd.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT.

Rango altitudinal: 3500-4500 m.

Países limítrofes: Bolivia y Perú.

***Chuquiraga ulicina* (Hook. & Arn.) Hook. & Arn.
subsp. *acicularis* (D. Don) C. Ezcurra**

Sinónimos: *Chuquiraga acicularis* D. Don, *Chuquiraga revoluta* Fielding & Gardner

Arbusto. Endémico.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME.

Rango altitudinal: 0-1200 m.

***Chuquiraga ulicina* (Hook. & Arn.) Hook. & Arn.
subsp. *ulicina***

Sinónimos: *Chuquiraga incana* D. Don, *Chuquiraga ulicina* (Hook. & Arn.) Hook. & Arn. var. *incana* (Phil.) I.M. Johnst., *Barnadesia ulicina* Hook. & Arn., *Chuquiraga incana* Phil., nom. illeg.

Arbusto. Endémico.

Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-1700 m.

Nombre vulgar: Hierba de la yesca, araña de la ballena.

Cichorium

***Cichorium intybus* L.**

Hierba. Anual o bienal. Introducida.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG, JFE, IPA.

Cirsium

***Cirsium arvense* (L.) Scop.**

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: VAL, RME, NUB, BIO, ARA, AIS, MAG.

***Cirsium vulgare* (Savi) Ten.**

Hierba. Anual o bienal. Introducida.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE, IPA.

Cladanthus

***Cladanthus mixtus* (L.) Chevall.**

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG.

Coleostephus

***Coleostephus myconis* (L.) Cass.**

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: MAU, ARA, AIS.

Conyza

***Conyza andina* J. Remy**

Sinónimos: *Conyza dumetorum* Phil., *Conyza hirtella* (DC.) Martic., nom. illeg., *Conyza arvensis* Phil., *Erigeron hirtellus* DC.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, RME.

Rango altitudinal: 0-500 m.

***Conyza arabidifolia* J. Remy**

Sinónimos: *Conyza paulsenii* Phil., *Conyza asperula* Phil., *Conyza coxi* Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: VAL, RME, LBO.

Rango altitudinal: 1500-2000 m.

***Conyza bonariensis* (L.) Cronquist var.**

***angustifolia* (Cabrera) Cabrera**

Sinónimos: *Conyza linearis* DC., *Erigeron bonariensis* L. var. *angustifolius* Cabrera

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: VAL.

Rango altitudinal: 0-3000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Conyza bonariensis* (L.) Cronquist var. *bonariensis

Sinónimos: *Conyza hispida* Kunth, *Conyza plebeja* Phil., *Erigeron bonariensis* L., *Erigeron bonariensis* L. fma. *grisea* Chodat, *Marsea bonariensis* (L.) V.M. Badillo
Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, JFE, IPA.

Rango altitudinal: 0-2000 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Puringa hiva (Rapa Nui).

Nota: Introducida en el Archipiélago de Juan Fernández y en Rapa Nui (Isla de Pascua).

***Conyza bustillosiana* J. Remy**

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: VAL, RME.

Rango altitudinal: 1300 m.

***Conyza copiapina* Phil.**

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: ATA.

Rango altitudinal: 200-1500 m.

***Conyza depilis* Phil.**

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: BIO.

Rango altitudinal: 0-500 m.

***Conyza deserticola* Phil.**

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT.

Rango altitudinal: 2000-4400 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Maransela, anojarjinchu, oreja de perro.

***Conyza foliosa* Phil.**

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ARA.

Rango altitudinal: 60-70 m.

***Conyza gayana* Phil.**

Sinónimos: *Conyza consanguinea* Phil., *Erigeron consanguineus* (Phil.) Cabrera, *Conyza araucana* Phil., *Conyza canescens* Phil., *Conyza monticola* Phil., *Conyza vulgaris* Phil., hom. illeg., *Erigeron stenophyllus* Hook. & Arn.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, MAG.

Rango altitudinal: 0-500 m.

***Conyza glabrata* Phil.**

Hierba. Anual o bienal. Endémica.

Distribución: RME.

Rango altitudinal: 1000 m.

***Conyza larrainiana* J. Remy**

Sinónimos: *Conyza conglomerata* Phil., *Conyza pratensis* Phil., *Erigeron larrainianus* (J. Remy) Cabrera
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa.

Distribución: LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 500-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Conyza lateralis* Phil.**

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, RME.

Rango altitudinal: 500-600 m.

***Conyza lechleri* (Sch. Bip.) Cabrera**

Sinónimos: *Erigeron lechleri* Sch. Bip.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: LLA, MAG.

Rango altitudinal: 500-2100 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Conyza pencana* Phil.**

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: BIO.

***Conyza primulifolia* (Lam.) Cuatrec. & Lourteig**

Sinónimos: *Conyza chilensis* Spreng., *Conyza scabiosaeifolia* J. Remy, *Conyza yungasensis* Rusby, *Erigeron chilensis* (Spreng.) D. Don ex G. Don, *Conyza myosotifolia* Kunth, *Inula primulifolia* Lam., *Marsea chilensis* (Spreng.) Kuntze, *Marsea chilensis* (Spreng.) V.M. Badillo, nom. illeg., *Conyza chilensis* Spreng. var. *integrifolia* Phil.

Hierba. Bienal. Nativa.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 0-2000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Conyza spiculosa* (Hook. & Arn.) Zardini**

Sinónimos: *Conyza colinensis* Phil., *Conyza patens* Phil., *Erigeron colinensis* Phil., *Erigeron spiculosus* Hook. & Arn., *Erigeron spinulosum* Hook. & Arn. var. *umbrosa* Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: VAL, RME, MAU.

Rango altitudinal: 600-900 m.

Nombre vulgar: Huilmo.

***Conyza stenophylla* Phil.**

Sinónimos: *Conyza armeriifolia* Phil., *Conyza linifolia* Phil., hom. illeg., *Erigeron flagellifolius* Cabrera

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.

Rango altitudinal: 100-1000 m.

***Conyza suffruticosa* Phil.**

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: RME.

Países limítrofes: Bolivia.

***Conyza sumatrensis* (Retz.) E. Walker var. *leiotheca* (S.F. Blake) Pruski & G. Sancho**
Sinónimos: *Conyza bilbaoana* J. Remy, *Conyza bonariensis* (L.) Cronquist var. *leiotheca* (S.F. Blake) Cuatrec., *Conyza elata* Kunth & Bouché, *Conyza myriocephala* J. Remy, *Erigeron bilbaoanus* (J. Remy) Cabrera, *Erigeron bonariensis* L. var. *floribundum* (Kunth) Cuatrec., *Erigeron bonariensis* L. var. *leiothecus* S.F. Blake, *Erigeron floribundus* (Kunth) Sch. Bip., *Marsea bonariensis* (L.) V.M. Badillo var. *leiotheca* (S.F. Blake) V.M. Badillo, *Conyza floribunda* Kunth, *Conyza sumatrensis* (Retz.) E. Walker var. *floribunda* (Kunth) J.B. Marshall
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.
Rango altitudinal: 0-2500 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

***Conyza tenera* Phil.**

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: VAL.

Rango altitudinal: 20 m.

***Conyza thermarum* Phil.**

Sinónimos: *Erigeron thermarum* (Phil.) Cabrera

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 1000-2500 m.

***Conyza valdiviana* Phil.**

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: LLA.

Rango altitudinal: 700-800 m.

Coreopsis

***Coreopsis suaveolens* Sherff**

Subarbusto. Endémico.

Distribución: AYP, TAR.

Rango altitudinal: 3400-3800 m.

Nombre vulgar: Flor amarilla, chirichiri, chilile.

Cotula

***Cotula australis* (Sieber ex Spreng.) Hook. f.**

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, JFE, IPA, IDE.

***Cotula coronopifolia* L.**

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE.

***Cotula mexicana* (DC.) Cabrera**

Sinónimos: *Cotula minuta* (L.f.) Schinz, nom. illeg., *Hippia minuta* L.f., *Lancisia minuta* (L.f.) Rydb., *Soliva mexicana* DC., *Soliva minuta* (L.f.) Sweet
Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, COQ.

Rango altitudinal: 3500-4000 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Pichipichi, champa, t'champa.

Crepis

***Crepis capillaris* (L.) Wallr.**

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: ATA, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE, IPA.

***Crepis pulchra* L.**

Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO.

Crepis setosa Haller f.
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: ARA.

Crepis vesicaria L. subsp. *taraxacifolia* (Thuill.)
Thell. ex Schinz & R. Keller
Hierba. Anual o perenne. Introducida.
Distribución: BIO, ARA.

Cuatrecasasiella

Cuatrecasasiella argentina (Cabrera) H. Rob.
Sinónimos: *Luciliopsis argentina* Cabrera
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT.
Rango altitudinal: 2500-4300 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Cynara

Cynara cardunculus L.
Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB,
BIO, JFE, IPA.

Delairea

Delairea odorata Lem.
Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: VAL, NUB, BIO, LRI, JFE.

Dendroseris

Dendroseris berteroana (Decne.) Hook. & Arn.
Sinónimos: *Dendroseris pinnata* (Bertero ex Decne.)
Hook. & Arn. var. *insignis* (Bertero) Johow,
Phoenicoseris berteriana (Decne.) Skottsb., *Rea*
beteriana Decne., *Rea pinnata* Bertero ex Decne. var.
insignis Bertero
Arbusto o árbol pequeño. Endémico.
Distribución: JFE.
Rango altitudinal: 0-500 m.
Nombre vulgar: Colecillo, col.

Dendroseris gigantea Johow
Árbol. Endémico.
Distribución: JFE.
Rango altitudinal: 0-500 m.
Nombre vulgar: Colecillo, col.

Dendroseris litoralis Skottsb.
Arbusto o árbol pequeño. Endémico.
Distribución: JFE.
Rango altitudinal: 0-500 m.
Nombre vulgar: Colecillo, col.

Dendroseris macrantha (Bertero ex Decne.)
Skottsb.
Sinónimos: *Rea macrantha* Bertero ex Decne.
Arbusto o árbol pequeño. Endémico.
Distribución: JFE.
Rango altitudinal: 0-500 m.
Nombre vulgar: Colecillo, col.

Dendroseris macrophylla D. Don
Arbusto o árbol pequeño. Endémico.
Distribución: JFE.
Rango altitudinal: 0-500 m.
Nombre vulgar: Colecillo, col.

Dendroseris marginata (Bertero ex Decne.) Hook.
& Arn.
Sinónimos: *Dendroseris macrophylla* D. Don var.
marginata (Bertero ex Decne.) Johow, *Rea marginata*
Bertero ex Decne.
Arbusto o árbol pequeño. Endémico.
Distribución: JFE.
Rango altitudinal: 0-500 m.
Nombre vulgar: Colecillo, col.

Dendroseris micrantha (Bertero ex Decne.) Hook.
& Arn.
Sinónimos: *Rea micrantha* Bertero ex Decne., *Rea*
longifolia Phil. ex Reiche
Arbusto o árbol pequeño. Endémico.
Distribución: JFE.
Rango altitudinal: 0-500 m.
Nombre vulgar: Colecillo, col.

Dendroseris nerifolia (Decne.) Hook. & Arn.

Sinónimos: *Rea leucantha* Bertero, *Rea nerifolia* Decne.
Árbol. Endémico.
Distribución: JFE.
Rango altitudinal: 0-500 m.
Nombre vulgar: Colecillo, col.

Dendroseris pinnata (Bertero ex Decne.) Hook. & Arn.
Sinónimos: *Phoenicoseris pinnata* (Bertero ex Decne.) Skottsb., *Rea pinnata* Bertero ex Decne.
Arbusto o árbol pequeño. Endémico.
Distribución: JFE.
Rango altitudinal: 0-500 m.
Nombre vulgar: Colecillo, col.

Dendroseris pruinata (Johow) Skottsb.
Sinónimos: *Dendroseris micrantha* (Bertero ex Decne.) Hook. & Arn. var. *pruinata* Johow, *Rea pruinata* (Johow) Skottsb.
Arbusto o árbol pequeño. Endémico.
Distribución: JFE.
Rango altitudinal: 0-500 m.
Nombre vulgar: Colecillo, col.

Dendroseris regia Skottsb.
Arbusto o árbol pequeño. Endémico.
Distribución: JFE.
Rango altitudinal: 0-500 m.
Nombre vulgar: Colecillo, col.

Diplostephium

Diplostephium cinereum Cuatrec.
Arbusto. Nativo.
Distribución: AYP, TAR.
Rango altitudinal: 3800-4400 m.
Países limítrofes: Bolivia y Perú.
Nombre vulgar: Koa, koba, koya, hembra.

Diplostephium meyenii Wedd.
Sinónimos: *Aster trachyticus* Phil.
Arbusto. Nativo.
Distribución: AYP, TAR, ANT.
Rango altitudinal: 3000-3900 m.
Países limítrofes: Perú.
Nombre vulgar: Tola, tola del alma, leña quebrolla, manzanillón.

Diplostephium tacorense Hieron.
Arbusto. Nativo.
Distribución: ATA.
Rango altitudinal: 3000-4000 m.
Países limítrofes: Perú.

Dittrichia

Dittrichia viscosa (L.) Greuter
Arbusto. Introducido.
Distribución: VAL.

Doniophyton

Doniophyton anomalum (D. Don) Kurtz
Sinónimos: *Chuquiraga anomala* D. Don, *Chuquiraga patagonica* Phil., *Doniophyton andicolum* Wedd., *Doniophyton patagonicum* (Phil.) Hieron.
Subarbusto. Nativo.
Distribución: RME, ARA.
Rango altitudinal: 0-1800 m.
Países limítrofes: Argentina.

Doniophyton weddellii Katinas & Stuessy
Subarbusto. Nativo.
Distribución: ANT, ATA, COQ, RME.
Rango altitudinal: 1900-4000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Eclipta

Eclipta prostrata (L.) L.
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: VAL, MAU.

Encelia

Encelia canescens Lam. var. *canescens*
Arbusto o subarbusto. Nativo.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ.
Rango altitudinal: 0-1500 m.
Países limítrofes: Bolivia y Perú.

Encelia canescens Lam. var. *oblongifolia* (DC.) S.F. Blake

Sinónimos: *Encelia oblongifolia* DC.
Subarbusto. Endémico.
Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ.
Rango altitudinal: 0-2700 m.
Nombre vulgar: Coronilla del fraile, incienso.

Encelia canescens Lam. var. ***parvifolia*** (Kunth) Ball
Sinónimos: *Encelia canescens* Lam. var. *lanuginosa* I.M. Johnst., *Encelia canescens* Lam. var. *tomentosa* (Walp.) Ball, *Encelia parvifolia* Kunth, *Encelia tomentosa* Walp.
Subarbusto. Nativo.
Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ.
Rango altitudinal: 0-3000 m.
Países limítrofes: Perú.
Nombre vulgar: Coronilla del fraile, incienso, hormiguero.

Erechtites

Erechtites leptanthus (Phil.) Cabrera
Sinónimos: *Senecio leptanthus* Phil.
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: ANT, ATA.
Rango altitudinal: 0-800 m.

Eriachaenium

Eriachaenium magellanicum Sch. Bip.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAG.
Rango altitudinal: 0-1000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Erigeron

Erigeron andicola DC.
Sinónimos: *Erigeron araucanus* Phil., *Erigeron ciliaris* Phil., *Erigeron andinus* Phil., *Erigeron biflorus* Phil., *Aster bellidiastrium* Nees ex Walp., hom. illeg.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 500-4000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Erigeron campanensis Valdeb., Lowrey & Stuessy
Subarbusto. Endémico.
Distribución: VAL.
Rango altitudinal: 1500-2000 m.

Erigeron cinereus Hook. & Arn.
Sinónimos: *Erigeron poeppigii* DC.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: VAL, RME, MAU, NUB, BIO, ARA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 500-3000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Erigeron fasciculatus Colla
Sinónimos: *Haplopappus hispidulus* DC., *Aster breviflorus* Phil., *Aster litoralis* Phil., *Erigeron berterianus* DC., *Erigeron subandinus* Phil.
Subarbusto. Endémico.
Distribución: COQ, VAL.
Rango altitudinal: 0-1500 m.
Nombre vulgar: Escabiosa.

Erigeron fernandezius (Colla) Harling
Sinónimos: *Erigeron fernandezianus* (Colla) Solbrig, nom. illeg., *Erigeron fruticosum* DC., *Terranea fernandezia* Colla
Hierba o subarbusto. Perenne. Endémica.
Distribución: JFE.
Rango altitudinal: 0-500 m.

Erigeron gilliesii (Hook. & Arn.) Cabrera
Sinónimos: *Aster albertii* Phil., *Aster gayanus* DC., *Aster gilliesii* Hook. & Arn., *Astradelphus chilensis* J. Remy, *Erigeron pratensis* Phil., *Erigeron remyanus* Wedd., *Gusmania chilensis* J. Remy
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, MAG.
Rango altitudinal: 800-2000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Erigeron illapelinus Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ.
Rango altitudinal: 2400-3000 m.
Países limítrofes: Argentina.

***Erigeron ingae* Skottsb.**

Sinónimos: *Erigeron ingae* Skottsb. var. *innocentium*

Skottsb., *Erigeron turricola* Skottsb.

Subarbusto. Endémico.

Distribución: JFE.

Distribución: COQ, RME, LBO, MAU, NUB, BIO,

ARA, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Erigeron karvinskianus* DC.**

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: VAL, RME, BIO, LRI.

***Erigeron othonnifolius* Hook. & Arn.**

Sinónimos: *Aster prostratus* Phil., *Erigeron vidali* Phil.

Subarbusto. Endémico.

Distribución: VAL, MAU, BIO.

Rango altitudinal: 0-300 m.

***Erigeron leptopetalus* Phil.**

Sinónimos: *Erigeron brevicaulis* Phil., *Erigeron nubigenus* Phil.

Subarbusto. Nativo.

Distribución: ATA, COQ, RME, MAU, NUB, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-4000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Erigeron patagonicus* Phil.**

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Erigeron luteoviridis* Skottsb.**

Subarbusto. Endémico.

Distribución: JFE.

Rango altitudinal: 0-500 m.

***Erigeron pulcher* Phil.**

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL, RME.

Rango altitudinal: 2700-3200 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Erigeron luxurians* (Skottsb.) Solbrig**

Sinónimos: *Erigeron litoralis* (Phil.) Skottsb. var. *luxurians* Skottsb.

Subarbusto. Endémico.

Distribución: COQ, VAL.

Rango altitudinal: 0-700 m.

***Erigeron rosulatus* Wedd.**

Sinónimos: *Erigeron brittonianus* Rusby, *Erigeron pulvinatus* Wedd.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP.

Rango altitudinal: 4000-4500 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Erigeron myosotis* Pers.**

Sinónimos: *Erigeron fernandezii* Phil., *Erigeron ibari* Phil., *Erigeron lacarensis* Phil., *Erigeron myosotis* Pers. var. *elongatum* Sch. Bip., *Erigeron myosotis* Pers. subsp. *polymorphoides* Vierh., *Erigeron myosotis* Pers. subsp. *pseudomagellanicus* Vierh., *Erigeron myosotis* Pers. fma. *spithameus* Vierh., *Erigeron philippii* Sch. Bip. ex Wedd., *Erigeron philippii* Sch. Bip. ex Wedd. fma. *densehirsutus* Vierh., *Erigeron philippii* Sch. Bip. ex Wedd. fma. *sparsehirsutus* Vierh., *Erigeron philippii* Sch. Bip. ex Wedd. fma. *tragopogonoides* Skottsb. ex Vierh., *Erigeron platylepis* Vierh., *Erigeron sullivanii* Hook.f. var. *magellanicum* Sch. Bip., *Erigeron angustifolius* Phil., *Erigeron polyphyllum* Phil., *Erigeron glabratus* Reiche, hom. illeg.

Hierba. Perenne. Nativa.

***Erigeron rupicola* Phil.**

Subarbusto. Endémico.

Distribución: JFE.

Rango altitudinal: 0-500 m.

***Erigeron stuessyi* Valdeb.**

Subarbusto. Endémico.

Distribución: JFE.

Rango altitudinal: 900-950 m.

Eupatorium

***Eupatorium glechonophyllum* Less.**

Sinónimos: *Ageratina glechonophylla* (Less.) R.M. King & H. Rob., *Eupatorium remyanum* Phil., *Ageratina remyana* (Phil.) R.M. King & H. Rob.

Arbusto. Nativo.

Distribución: ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO.

Rango altitudinal: 0-200 m.

Países limítrofes: Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Barba de viejo, barbón.

***Eupatorium salvium* Colla**

Sinónimos: *Aristeguietia salvia* (Colla) R.M. King & H. Rob.

Arbusto. Endémico.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO.

Rango altitudinal: 0-200 m.

Nombre vulgar: Pegajosa, salvia macho, pega.

Facelis

***Facelis plumosa* (Wedd.) Sch. Bip.**

Sinónimos: *Lucilia plumosa* Wedd.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: AYP.

Rango altitudinal: 2800-4500 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Facelis retusa* (Lam.) Sch. Bip.**

Sinónimos: *Facelis retusa* (Lam.) Sch. Bip. var. *patula* Beauverd, *Facelis apiculata* Cass., nom. illeg., *Gnaphalium retusum* Lam., *Leptalea apiculata* (Cass.) D. Don ex Hook. & Arn., *Facelis retusa* (Lam.) Sch. Bip. var. *andicola* (Nees) Beauverd, *Helichrysum retusum* Spreng., *Pteropogon chilense* Fisch. & Meyer, nom. nud., *Pteropogon andicola* Ness, *Facelis retusa* (Lam.) Sch. Bip. fma. *gigantea* Beauverd, *Facelis retusa* (Lam.) Sch. Bip. var. *candelabrum* Beauverd, *Facelis retusa* (Lam.) Sch. Bip. fma. *laxa* Beauverd, *Facelis retusa* (Lam.) Sch. Bip. fma. *congesta* Beauverd, *Facelis retusa* (Lam.) Sch. Bip. fma. *planifolia* Beauverd, *Facelis retusa* (Lam.) Sch. Bip. fma. *nana* Beauverd Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Flaveria

***Flaveria bidentis* (L.) Kuntze**

Sinónimos: *Ethulia bidentis* L., *Eupatorium chilense* Molina, *Flaveria capitata* Juss. ex Sm., *Flaveria chilensis* (Molina) J.F. Gmel., *Flaveria contrayerba* (Cav.) Pers., *Milleria chiloensis* Juss., nom. nud., *Milleria contrayerba* Cav., *Flaveria bidentis* (L.) B.L. Rob., comb. illeg.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO.

Rango altitudinal: 0-3000 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Contrahierba, dasdaqui, daudá, mata gusanos, sinapaya, monte colorado.

***Flaveria haumanii* Dimitri & Orfila**

Sinónimos: *Flaveria bidentis* (L.) Kuntze var. *angustifolia* Kuntze

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: TAR, ANT, ATA.

Rango altitudinal: 0-1500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Flourensia

***Flourensia thurifera* (Molina) DC.**

Sinónimos: *Helianthus thurifera* Molina, *Diomedea thurifera* (Molina) Bertero ex Colla, *Helianthus glutinosus* Hook. & Arn., *Flourensia besseriana* Hook. & Arn., *Helianthus besserianus* (Meyen & Walp.) Benth. & Hook., *Flourensia thurifera* (Molina) DC. var. *lanceolata* J. Remy

Arbusto. Endémico.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME.

Rango altitudinal: 400-1000 m.

Nombre vulgar: Incienso, maravilla del campo.

Gaillardia

***Gaillardia aristata* Pursh**

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: TAR.

Galinsoga

Galinsoga parviflora Cav.

Sinónimos: *Galinsoga quinqueradiata* Ruiz & Pav., nom. illeg., *Wiborgia parviflora* (Cav.) Kunth

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE, IPA.

Rango altitudinal: 0-2500 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Pacoyuyo, miri vaihi (Rapa Nui).

Nota: Introducida en Rapa Nui (Isla de Pascua).

Gamochaeta

Gamochaeta aliena (Hook. & Arn.) Cabrera

Sinónimos: *Gnaphalium alienum* Hook. & Arn., *Gnaphalium stachydifolium* Lam. var. *alienum* (Hook. & Arn.) Reiche

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, LBO, MAU, NUB, BIO, LLA.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Gamochaeta alpina (Poepp. & Endl.) S.E Freire & Anderb.

Sinónimos: *Gamochaetopsis alpina* (Poepp. & Endl.) Anderb. & S.E. Freire, *Laennecia alpina* Poepp., *Lucilia alpina* (Poepp.) Cabrera

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ARA, LLA.

Rango altitudinal: 1200-1900 m.

Países limítrofes: Argentina.

Gamochaeta americana (Mill.) Wedd.

Sinónimos: *Gnaphalium americanum* Mill., *Gnaphalium purpureum* L. var. *americanum* (Mill.) Klatt, *Gnaphalium spicatum* Mill. var *chonoticum* Hook.f.

Hierba. Bienal o perenne. Nativa.

Distribución: AYP, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE, IPA.

Rango altitudinal: 0-3200 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nota: Introducida en el Archipiélago de Juan Fernández y en Rapa Nui (Isla de Pascua).

Gamochaeta andina (Phil.) Cabrera

Sinónimos: *Gnaphalium andinum* Phil., *Gnaphalium petraeum* Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: RME, MAU, BIO.

Rango altitudinal: 2400-2700 m.

Gamochaeta axillaris (J. Remy) Cabrera

Sinónimos: *Gnaphalium axillare* J. Remy, *Gnaphalium stachydifolium* Lam. var. *axillare* (J. Remy) Reiche

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: RME.

Rango altitudinal: 1700-2000 m.

Gamochaeta chamissonis (DC.) Cabrera

Sinónimos: *Gamochaeta polybotrya* (Phil.) Cabrera, *Gamochaeta julietii* (Phil.) Anderb., *Gamochaeta serranoi* (Phil.) Cabrera, *Gnaphalium chamissonis* DC., *Gnaphalium fernandezianum* Phil., *Gnaphalium julietii* Phil., *Gnaphalium polybotryum* Phil., *Gnaphalium purpureum* L. var. *chamissonis* (DC.) Klatt, *Gnaphalium purpureum* L. var. *julietii* (Phil.) Reiche, *Gnaphalium serranoi* Phil., *Gamochaeta fernandeziana* (Phil.) Anderb., *Gnaphalium suffruticosum* Phil., *Gamochaeta suffruticosa* (Phil.) Anderb.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, JFE.

Rango altitudinal: 1000-1800 m.

Países limítrofes: Argentina.

Gamochaeta depilata (Phil.) Cabrera

Sinónimos: *Gnaphalium depilatum* Phil., *Gnaphalium obscurum* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL, MAU, NUB, BIO, ARA, AIS.

Rango altitudinal: 500-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Gamochaeta deserticola Cabrera

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: TAR, ANT, COQ, VAL, RME, BIO, ARA, MAG.

Rango altitudinal: 3000-4000 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Gamochaeta falcata (Lam.) Cabrera

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 950-1940 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Gamochaeta filaginea* (DC.) Cabrera**

Sinónimos: *Gnaphalium filaginea* DC., *Gamochaeta berteriana* (DC.) Cabrera, *Gnaphalium berterianum* DC., *Gnaphalium stachydifolium* Lam. var. *berterianum* (DC.) Klatt, *Gnaphalium bellidifolium* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL, RME, MAU, NUB, BIO.

Rango altitudinal: 0-300 m.

***Gamochaeta humilis* Wedd.**

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, ANT.

Rango altitudinal: 3500-4600 m.

Países limítrofes: Bolivia y Perú.

***Gamochaeta neuquensis* Cabrera**

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: RME, ARA, MAG.

Rango altitudinal: 500-1500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Gamochaeta nivalis* Cabrera**

Sinónimos: *Gnaphalium nivale* Phil., hom. illeg.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL, RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 800-3000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Gamochaeta oligantha* (Phil.) L.E. Navas**

Sinónimos: *Gnaphalium oliganthum* Phil., *Gamochaeta monticola* (Phil. ex Reiche) Cabrera, *Gnaphalium monticola* Phil. ex Reiche

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, MAU.

Rango altitudinal: 500-2000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Gamochaeta procumbens* (Phil.) Cabrera**

Sinónimos: *Gnaphalium procumbens* Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: LBO, MAU, NUB, MAG.

Rango altitudinal: 900-1500 m.

***Gamochaeta purpurea* (L.) Cabrera**

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: IPA.

***Gamochaeta ramosa* S.E. Freire, N. Bayón & C.M.**

Baeza

Sinónimos: *Gnaphalium ramosum* Phil., nom. illeg.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 0-3000 m.

***Gamochaeta serpyllifolia* Wedd.**

Sinónimos: *Gamochaeta munnozii* Cabrera, nom. illeg., *Gnaphalium serpyllifolium* J. Remy, hom. illeg.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, AIS.

Rango altitudinal: 1000-1500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Gamochaeta simplicicaulis* (Willd. ex Spreng.)**

Cabrera

Sinónimos: *Gnaphalium purpureum* L. var. *simplicicaule* (Willd. ex Spreng.) Klatt, *Gnaphalium simplicicaule* Willd. ex Spreng.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: VAL, RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.

Rango altitudinal: 0-3700 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Gamochaeta spiciformis* (Sch. Bip.) Cabrera**

Sinónimos: *Gamochaeta foliosa* (Phil.) Anderb., *Gnaphalium foliosum* Phil., *Gamochaeta pteroana* (Phil.) Anderb., *Gnaphalium mucronatum* Phil., nom. illeg., *Gnaphalium pteroanum* Phil., *Gnaphalium purpureum* L. var. *mucronatum* (Phil.) Skottsb., *Gnaphalium spiciforme* Sch. Bip., *Gamochaeta chilensis* Deble

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 200-1500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Gamochaeta stachydifolia* (Lam.) Cabrera**

Sinónimos: *Gnaphalium purpureum* L. var. *stachydifolium* (Lam.) Baker, *Gnaphalium stachydifolium* Lam., *Gnaphalium agreste* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL, RME, BIO, LRI, JFE.

Rango altitudinal: 400-1800 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nota: Introducida en el Archipiélago de Juan Fernández.

***Gamochaeta subfalcata* (Cabrera) Cabrera**

Sinónimos: *Gnaphalium subfalcatum* Cabrera

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, MAU, BIO.

Rango altitudinal: 0-4100 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Gamochaeta valparadisea* (Phil.) Anderb.**

Sinónimos: *Gnaphalium valparadiseum* Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, MAU.

Rango altitudinal: 0-300 m.

***Gamochaeta villaroelii* (Phil.) Cabrera**

Sinónimos: *Gnaphalium villaroelii* Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, RME, NUB.

Rango altitudinal: 750-2200 m.

Gazania

***Gazania rigens* (L.) Gaertn.**

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO.

Gochnatia

***Gochnatia foliolosa* (D. Don) D. Don ex Hook. & Arn. var. *fascicularis* (D. Don) Cabrera**

Sinónimos: *Gochnatia fascicularis* (D. Don) D. Don ex Hook. & Arn., *Gochnatia multiflora* F. Phil., *Pentaphorus fascicularis* D. Don

Arbusto. Endémico.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 0-1200 m.

Nombre vulgar: Mira.

Gochnatia foliolosa* (D. Don) D. Don ex Hook. & Arn. var. *foliolosa

Sinónimos: *Gochnatia australis* Phil., *Gochnatia berteroana* Phil., *Gochnatia cuspidata* Phil., *Gochnatia integerrima* Phil., *Gochnatia laxiflora* Phil., *Gochnatia litoralis* Phil., *Gochnatia pyrifolia* (D. Don) D. Don ex

Hook. & Arn., *Gochnatia racemosa* Phil., *Gochnatia rigida* D. Don ex Hook. & Arn., *Pentaphorus foliolosus* D. Don, *Pentaphorus pyrifolius* D. Don

Arbusto. Endémico.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.

Rango altitudinal: 0-1200 m.

Nombre vulgar: Mira, mira-mira.

Grindelia

***Grindelia chiloensis* (Cornel.) Cabrera**

Sinónimos: *Grindelia foliosa* D. Don ex Hook. & Arn., *Haplopappus hoorebekia* DC., nom. illeg., *Hoorebekia chiloense* Cornel.

Subarbusto. Nativo.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.

Rango altitudinal: 0-3000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Grindelia glutinosa* (Cav.) Mart.**

Sinónimos: *Aster glutinosus* Cav., *Grindelia glutinosa* (Cav.) Dunal, nom. illeg., *Grindelia montana* Phil.

Subarbusto. Nativo.

Distribución: AYP, TAR.

Rango altitudinal: 500 m.

Países limítrofes: Perú.

***Grindelia tarapacana* Phil.**

Sinónimos: *Grindelia obovata* Rusby

Arbusto. Nativo.

Distribución: AYP, TAR.

Rango altitudinal: 2500 m.

Países limítrofes: Perú.

Nombre vulgar: Chiñechinchillawa, keñakeña, bailahuén.

Gutierrezia

***Gutierrezia baccharoides* Sch. Bip.**

Subarbusto. Nativo.

Distribución: AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-4000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Gutierrezia spinosae* Acevedo**

Arbusto. Endémico.

Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

***Gutierrezia gayana* (J. Remy) Reiche**

Sinónimos: *Brachyris gayana* (J. Remy) J. Remy,

Odontocarpha gayana J. Remy

Arbusto. Endémico.

Distribución: ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-1400 m.

Nombre vulgar: Monte amarillo.

***Gutierrezia neaeana* (DC.) Sch. Bip. ex S.F. Blake**

Sinónimos: *Brachyris neaeana* DC.

Arbusto. Endémico.

Distribución: ATA.

Rango altitudinal: 2500-4000 m.

***Gutierrezia resinosa* (Hook. & Arn.) S.F. Blake**

Sinónimos: *Brachyris floribunda* Phil., *Brachyris paniculata* DC., *Galinsoga resinosa* Hook. & Arn., *Gutierrezia compacta* Phil., *Gutierrezia laricifolia* D. Don, *Odontocarpha poeppigii* DC.

Arbusto. Endémico.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO.

Rango altitudinal: 0-1200 m.

Nombre vulgar: Delgadilla, monte amarillo, pichanilla, pichana.

***Gutierrezia taltalensis* Phil.**

Sinónimos: *Gutierrezia copiapina* Phil.

Arbusto. Endémico.

Distribución: ANT, ATA.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Guynesomia

***Guynesomia scoparia* (Phil.) Bonifacino & Sancho**

Sinónimos: *Hinterhubera scoparia* (Phil.) Cabrera,

Nardophyllum scoparium Phil.

Arbusto. Endémico.

Distribución: ATA, COQ.

Rango altitudinal: 1400-3000 m.

Gypothamnium

***Gypothamnium pinifolium* Phil.**

Sinónimos: *Plazia pinnifolia* (Phil.) O. Hoffm.

Arbusto. Endémico.

Distribución: ANT, ATA.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Nombre vulgar: Palo de yote.

Haplopappus

Haplopappus angustifolius* (DC.) Reiche subsp. *angustifolius

Sinónimos: *Haplopappus durus* Reiche, *Pyrrocoma angustifolia* DC., *Pyrrocoma rigida* Phil., *Aster atenes* Kuntze, *Aster sternbergii* Kuntze

Arbusto. Endémico.

Distribución: ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-1500 m.

Nombre vulgar: Bailahuen.

***Haplopappus angustifolius* (DC.) Reiche subsp. *saxatilis* (J. Remy) Klingenb.**

Sinónimos: *Haplopappus saxatilis* (Remy) Reiche, *Haplopappus sphacelatus* (Phil.) Reiche, *Pyrrocoma saxatilis* J. Remy, *Aster saxatilis* (J. Remy) Kuntze, *Haplodiscus sphacelatus* Phil.

Arbusto. Endémico.

Distribución: COQ, RME, MAU.

Rango altitudinal: 400-1700 m.

***Haplopappus anthylloides* Meyen & Walp.**

Sinónimos: *Haplopappus radicans* J. Remy, *Aster anthylloides* (Meyen & Walp.) Kuntze, *Aster radicans* (J. Remy) Kuntze

Arbusto. Nativo.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 700-3000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Haplopappus arbutooides* J. Remy**

Sinónimos: *Aster arbutooides* (J. Remy) Kuntze, *Haplopappus obovatus* Phil., *Haplopappus baccharidifolius* Phil., *Haplopappus zanartui* (Phil.) Reiche, *Haplodiscus zanartui* Phil.

Subarbusto. Nativo.

Distribución: COQ, VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 700-2400 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Haplopappus baylahuen* J. Remy subsp.**

baylahuen

Sinónimos: *Haplopappus lastarrianus* J. Remy,
Haplopappus medicinalis Phil., *Aster baylahuen* (J. Remy) Kuntze, *Aster lastarrianus* (J. Remy) Kuntze,
Haplopappus domeykoi Phil., *Haplopappus fluehmannii* Phil.
Arbusto. Nativo.
Distribución: ATA, COQ.
Rango altitudinal: 2700-3500 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Bailahuen.

***Haplopappus baylahuen* J. Remy subsp.**

***fluehmannii* (Phil.) Klingenb.**

Sinónimos: *Haplopappus fluehmannii* Phil.
Arbusto. Endémico.
Distribución: ATA.
Rango altitudinal: 2400-3700 m.
Nombre vulgar: Bailahuen.

***Haplopappus bezanillanus* (J. Remy) Reiche**

Sinónimos: *Pyrrocoma bezanillana* J. Remy, *Aster bezanillanus* Kuntze
Subarbusto. Endémico.
Distribución: COQ.
Rango altitudinal: 300-2800 m.

***Haplopappus bustillosianus* J. Remy**

Sinónimos: *Aster bustillosianus* (J. Remy) Kuntze,
Haplopappus australis Phil., *Haplopappus patagonicus* Phil., *Haplopappus subandinus* Phil.
Subarbusto. Nativo.
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.
Rango altitudinal: 1500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Haplopappus cerberoanus* (J. Remy) Reiche subsp. ***cerberoanus**

Sinónimos: *Pyrrocoma cerberoana* J. Remy, *Aster cerberoanus* (J. Remy) Kuntze
Arbusto. Nativo.
Distribución: ATA, COQ.
Rango altitudinal: 0-1000 m.
Países limítrofes: Perú.

***Haplopappus cerberoanus* (J. Remy) Reiche**

***elquianus* Klingenb.**

Arbusto. Endémico.
Distribución: COQ.
Rango altitudinal: 800-2000 m.

***Haplopappus chrysanthemifolius* (Less.) DC.**

Sinónimos: *Haplopappus berteri* DC., *Haplopappus leucanthemifolius* Phil., *Grindelia glutinosa* Bertero,
Andromachia alternifolia Kuntze, *Diplopappus chrysanthemifolius* Less.

Arbusto. Endémico.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO.
Rango altitudinal: 0-200 m.

***Haplopappus coquimbensis* (Hook. & Arn.)**

Klingenb.

Sinónimos: *Haplopappus acanthodon* Phil.,
Haplopappus hirsutus Phil., *Haplopappus hirtellus* Phil. var. *hirsutus* (Phil.) Reiche, *Diplopappus coquimbensis* Hook. & Arn., *Haplopappus hirtellus* Phil., *Aster hirtellus* (Phil.) Kuntze, *Haplopappus limarensis* Phil., *Haplopappus hirtellus* Phil. var. *limarensis* Reiche, *Haplopappus vidalii* Phil., *Haplodiscus elatus* Phil., *Haplopappus elatus* (Phil.) Reiche
Arbusto. Endémico.

Distribución: ATA, COQ, VAL, LBO.
Rango altitudinal: 10-1000 m.

***Haplopappus decurrens* J. Remy**

Sinónimos: *Aster remyanus* Kuntze
Arbusto. Endémico.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO.
Rango altitudinal: 0-2000 m.

***Haplopappus deserticulus* Phil.**

Sinónimos: *Haplopappus involucratus* Phil.,
Haplopappus rengifoanus Phil.
Arbusto. Endémico.
Distribución: ANT, ATA, COQ.
Rango altitudinal: 0-700 m.

***Haplopappus diplopappus* J. Remy subsp.**

diplopappus

Sinónimos: *Aster diplopappus* (J. Remy) Kuntze,
Haplopappus pallidus Phil., *Haplopappus heterophyus* Phil., *Haplopappus marginalis* Phil. var. *heterophyus*

(Phil.) Reiche, *Haplopappus pteroanus* Phil., *Haplopappus reticulatus* Phil., *Aster venosus* Kuntze
Subarbusto. Nativo.

Distribución: LBO, MAU.

Rango altitudinal: 800-3540 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Blanquillo.

Haplopappus diplopappus* J. Remy subsp. *villosus
(Phil.) Klingeb.

Sinónimos: *Haplopappus villosus* Phil., *Aster villiger* Kuntze

Subarbusto. Nativo.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 1000-3000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Haplopappus donianus* (Hook. & Arn.) Reiche**
Sinónimos: *Diplopappus donianus* Hook. & Arn.,
Haplodiscus tenuifolius Phil., *Haplodiscus exserens* Phil., *Haplopappus canescens* (Phil.) Reiche var.
exserens Reiche

Arbusto. Endémico.

Distribución: VAL, LBO, MAU, BIO.

Rango altitudinal: 0-600 m.

***Haplopappus foliosus* (Hook. & Arn.) Hook. & Arn.**

Sinónimos: *Aster polyphyllus* (Phil.) Kuntze, *Aster foliosus* (DC.) Kuntze, *Diplopappus foliosus* Hook. & Arn., *Haplopappus foliosus* DC., *Haplodiscus polyphyllus* Phil., *Haplopappus phyllophorus* Reiche, *Haplodiscus densifolius* Phil.

Arbusto. Endémico.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 0-750 m.

Nombre vulgar: Cuerno de cabra, palo negro.

***Haplopappus glabratus* Phil.**

Sinónimos: *Haplopappus arbutooides* J. Remy var. *glabratus* (Phil.) Reiche, *Aster glabratus* (Phil.) Kuntze
Subarbusto. Nativo.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 1600-3300 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Haplopappus glutinosus* Cass.**

Sinónimos: *Aster senebierifolius* Kuntze, nom. illeg., *Diplopappus coronopifolius* Less., nom. illeg., *Haplopappus coronopifolius* (Less.) DC., nom. illeg.
Arbusto. Nativo.

Distribución: VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 10-2500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Buchú.

***Haplopappus grindeloides* (Less.) DC.**

Sinónimos: *Aster marginalis* (Phil.) Kuntze, *Haplopappus marginalis* Phil., *Haplopappus corniculatus* Phil., *Haplopappus heterocomas* Phil., *Haplopappus reflexus* Phil., *Diplopappus grindeloides* Less., *Aster reversus* Kuntze, *Aster grindeloides* (Less.) Kuntze

Subarbusto. Nativo.

Distribución: RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 600-2500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Haplopappus humilis* (Phil.) Reiche**

Sinónimos: *Haplodiscus humilis* Phil.

Arbusto. Endémico.

Distribución: RME, LBO, MAU, NUB.

Rango altitudinal: 160-1100 m.

***Haplopappus integrerrimus* (Hook. & Arn.) H.M. Hall**

Sinónimos: *Haplopappus acerosus* (Bertero) Phil., *Haplopappus pulchellus* DC. var. *elongatus* J. Remy, *Grindelia acerosa* Bertero ex Phil., nom. nud., *Diplopappus integrerrimus* Hook. & Arn., *Steriphe acerosa* (Bertero ex Phil.) Phil.

Arbusto. Endémico.

Distribución: COQ, VAL, RME.

Rango altitudinal: 500-2000 m.

***Haplopappus linifolius* (Phil.) Reiche**

Sinónimos: *Pyrrhocoma linifolia* Phil., *Aster linoides* Kuntze
Arbusto. Endémico.

Distribución: ATA, COQ.

Rango altitudinal: 1800-2200 m.

***Haplopappus litoralis* Phil.**

Arbusto. Endémico.

Distribución: COQ, VAL.

Rango altitudinal: 0-700 m.

***Haplopappus macrocephalus* (Poepp. ex Less.) DC.**

Sinónimos: *Haplopappus caespitosus* Nutt.,

Diplopappus macrocephalus Poepp. ex Less., *Aster macrocephalus* (Poepp. ex Less.) Kuntze, *Haplopappus scaposus* J. Remy, *Haplopappus spinulosus* Phil., *Haplopappus serrulatus* Reiche, *Aster spinuliger* Kuntze Subarbusto. Endémico.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 100-2000 m.

***Haplopappus maulinus* Klingenb.**

Arbusto. Endémico.

Distribución: MAU, BIO.

Rango altitudinal: 400-2300 m.

***Haplopappus meyenii* Walp.**

Sinónimos: *Haplopappus foliosus* DC. subsp. *meyenii* (Walp.) Klingenb., *Aster meyenii* (Walp.) Kuntze Subarbusto. Endémico.

Distribución: COQ.

Rango altitudinal: 0-400 m.

***Haplopappus mieresii* P. Medina & Nic. García**

Arbusto. Endémico.

Distribución: COQ.

Rango altitudinal: 400-1600 m.

***Haplopappus mucronatus* (Hook. & Arn.) Hook. & Arn. ex B.D. Jacks.**

Sinónimos: *Baccharis mucronata* Hook. & Arn., hom. illeg., *Haplopappus fonckii* Phil., *Haplopappus hookerianus* DC., *Haplopappus ilicifolius* J. Remy, *Diplopappus mucronatus* Hook. & Arn., *Baccharis hookeriana* DC., *Aster ilicifolius* (J. Remy) Kuntze, *Haplopappus axilliflorus* Phil., *Haplopappus ilicifolius* J. Remy var. *platylepis* (Phil.) Reiche, *Haplopappus platylepis* Phil., *Haplopappus macraenus* (Remy) Reiche, *Pyrrocoma macraena* Remy, *Aster macraenus* (Remy) Kuntze, *Aplopappus macraenus* Gray, comb. inval.

Arbusto. Endémico.

Distribución: ATA, COQ, VAL.

Rango altitudinal: 0-900 m.

***Haplopappus multifolius* Phil. ex Reiche subsp. *baccharidiformis* Klingenb.**

Arbusto. Endémico.

Distribución: RME.

Rango altitudinal: 1800 m.

Haplopappus multifolius* Phil. ex Reiche subsp. *multifolius

Sinónimos: *Haplopappus rotundifolius* H.M. Hall, *Pyrrocoma foliosa* Phil., *Aster multifolius* (Phil. ex Reiche) Kuntze, *Diplopappus foliolosus* Hook. & Arn., *Diplopappus ilicifolius* Hook. & Arn.

Arbusto. Nativo.

Distribución: COQ, VAL, RME.

Rango altitudinal: 700-3200 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Haplopappus multifolius* Phil. ex Reiche subsp. *ovalifolius* Klingenb.**

Arbusto. Endémico.

Distribución: VAL, RME.

Rango altitudinal: 1300-3200 m.

***Haplopappus nahuelbutae* Klingenb.**

Subarbusto. Endémico.

Distribución: BIO, ARA.

Rango altitudinal: 100-1460 m.

***Haplopappus ochagavianus* Phil.**

Sinónimos: *Haplopappus tiltilensis* (Phil.) Reiche, *Aster ochayaviensis* Kuntze, *Haplopappus reicheanus* H.M. Hall, *Haplopappus vernicosus* Phil. ex Reiche

Arbusto. Endémico.

Distribución: COQ, VAL, RME.

Rango altitudinal: 100-2200 m.

***Haplopappus parvifolius* (DC.) Gay**

Sinónimos: *Pyrrocoma parvifolia* DC., *Aster parvifolius* (DC.) Kuntze

Subarbusto. Endémico.

Distribución: ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-1800 m.

NOMBRE vulgar: Crespilla.

***Haplopappus paucidentatus* Phil.**

Sinónimos: *Aster oligodontus* Kuntze, *Haplopappus glutinosus* (Less.) DC., hom. illeg., *Diplopappus glutinosus* Less., *Aster glutinosus* (Less.) Kuntze, *Haplopappus prostratus* Phil.

Subarbusto. Nativo.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.

Rango altitudinal: 950-2000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Haplopappus philippii* (Kuntze) H.M. Hall**

Sinónimos: *Haplopappus paniculatus* Phil., *Aster philippii* Kuntze, *Haplopappus breviradiatus* Reiche

Arbusto. Endémico.

Distribución: ATA, COQ, VAL.

Rango altitudinal: 0-500 m.

***Haplopappus pinea* (Phil.) Reiche**

Sinónimos: *Pyrrhocoma pinea* Phil., *Aster pineus* (Phil.)

Kuntze

Arbusto. Endémico.

Distribución: COQ, VAL.

Rango altitudinal: 2000-2400 m.

***Haplopappus pinnatifidus* Nutt.**

Sinónimos: *Haplopappus setigerus* (Phil.) Meigen, *Pyrrocoma nuttallii* J. Remy, nom. illeg., *Aster andinus* Kuntze, *Diplopappus setiger* Hook. & Arn., *Pyrrocoma setigera* Phil., *Aster setiger* (Phil.) Kuntze

Arbusto. Endémico.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 550-1200 m.

***Haplopappus poeppigianus* (Hook. & Arn.) A.**

Gray

Sinónimos: *Diplopappus poeppigianus* Hook. & Arn., *Haplodiscus polycladus* Phil., *Haplopappus argenteus* Steud., *Haplodiscus polycladus* Phil., *Haplopappus canescens* (Phil.) Reiche, *Grindelia canescens* Bertero, *Pyrrocoma canescens* Phil., *Aster griseus* Kuntze

Arbusto. Endémico.

Distribución: VAL, RME, LBO.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

***Haplopappus pulchellus* DC.**

Sinónimos: *Aster valparaisanus* Kuntze

Arbusto. Endémico.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 300-1600 m.

***Haplopappus punctatus* (Willd.) H.M. Hall**

Sinónimos: *Haplopappus chamissonis* (Less.) DC., *Conyza punctata* Willd., *Diplopappus chamissonis* Less., *Diplopappus punctatus* Less. ex DC., *Aster adalbertii*

Kuntze, *Haplopappus corymbosus* (Phil.) Reiche, *Haplopappus rosmarinifolius* Reiche, *Steriphe corymbosa* Phil., *Aster pedunculosus* (J. Remy) Kuntze, *Haplopappus pedunculosus* J. Remy, *Haplopappus integrerrimus* (Hook. & Arn.) H.M. Hall var. *punctatus* (Willd.) G.K. Br. & W.D. Clark

Arbusto. Endémico.

Distribución: RME, LBO, MAU, BIO.

Rango altitudinal: 100-1600 m.

***Haplopappus pusillus* Klingeb.**

Sinónimos: *Diplopappus bellidifolius* Hook. & Arn., *Haplopappus cuneifolius* Nutt., *Aster cuneifolius* (Nutt.) Kuntze

Arbusto. Nativo.

Distribución: COQ, VAL, RME.

Rango altitudinal: 3300 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Haplopappus racemiger* Klingeb.**

Arbusto. Endémico.

Distribución: ATA, COQ.

Rango altitudinal: 30-560 m.

***Haplopappus remyanus* Wedd.**

Sinónimos: *Haplopappus prinophyllus* Phil., *Pyrrocoma ilicifolia* J. Remy, *Aster remyanus* (Wedd.) Kuntze, *Haplodiscus vernicosus* Phil., *Haplopappus latifolius* (Phil.) Reiche, *Haplodiscus latifolius* Phil., *Haplodiscus vernicosus* Phil., *Haplodiscus vernicosus* Phil. var. *geissei* Phil., *Haplodiscus kingii* Phil., *Haplopappus kingii* (Phil.) Reiche

Arbusto. Endémico.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO.

Rango altitudinal: 300-2500 m.

Nombre vulgar: Bailahuen.

***Haplopappus rengifoanus* J. Remy**

Sinónimos: *Aster rengifoanus* (J. Remy) Kuntze, *Haplodiscus pachyphyllus* Phil.

Arbusto. Endémico.

Distribución: ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 100-700 m.

Haplopappus retinervius (Kuntze) Klingenb.
Sinónimos: *Aster retinervius* Kuntze, *Pyrrhcoma reticulata* Phil., *Haplopappus reticulatus* (Phil.) Reiche nom. illeg., *Haplopappus ischnos* (Phil.) Reiche, *Haplodiscus ischnos* Phil., *Haplodiscus landbecki* Phil. Arbusto. Endémico.
Distribución: COQ, VAL.
Rango altitudinal: 500-1800 m.

Haplopappus rigidus Phil.
Sinónimos: *Haplopappus villanuevae* Phil., *Aster atacamensis* Kuntze, nom. illeg.
Arbusto. Nativo.
Distribución: ANT, ATA, COQ.
Rango altitudinal: 2500-4000 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Bailahuen, gualavina, chajchajra.

Haplopappus rosulatus H.M. Hall
Subarbusto. Endémico.
Distribución: ANT, ATA, COQ.
Rango altitudinal: 400-700 m.

Haplopappus schumannii (Kuntze) G.K. Br. & W.D. Clark
Sinónimos: *Haplopappus armerioides* Phil., *Haplopappus poeppigianus* (Hook. & Arn.) A. Gray var. *radiatus* A. Gray, *Haplopappus sericeus* Phil., *Aster schumannii* Kuntze, *Steriphe navarri* Phil.
Arbusto. Endémico.
Distribución: VAL, RME.
Rango altitudinal: 1400-3000 m.

Haplopappus scrobiculatus (Nees) DC.
Sinónimos: *Aster densifolius* (J. Remy) Kuntze, *Aster scrobiculatus* (Nees) Kuntze, *Diplopappus cuneatus* Hook. & Arn., *Diplopappus scrobiculatus* Nees, *Haplopappus densifolius* J. Remy, *Perezia spathulata* Phil., hom. illeg.
Arbusto. Nativo.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 2600-3700 m.
Países limítrofes: Argentina.

Haplopappus setulosus Klingenb.
Arbusto. Endémico.

Distribución: MAU, NUB.
Rango altitudinal: 250 m.

Haplopappus stelliger J. Remy
Sinónimos: *Aster stelliger* (J. Remy) Kuntze, *Haplopappus denticulatus* (Phil.) Reiche, *Pyrrhcoma denticulata* Phil., *Aster denticulatus* (Phil.) Kuntze
Arbusto. Endémico.
Distribución: COQ.

Haplopappus stolpii Phil.
Arbusto. Endémico.
Distribución: RME, MAU, NUB, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 50-700 m.

Haplopappus taeda Reiche
Sinónimos: *Haplodiscus ptereanus* Phil., *Haplopappus graveolens* (Phil.) Reiche, *Haplodiscus graveolens* Phil.
Arbusto. Endémico.
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU.
Rango altitudinal: 300-2000 m.

Haplopappus uncinatus Phil.
Sinónimos: *Haplopappus candolei* Phil., *Haplopappus uncinatus* Phil. var. *candolei* (Phil.) Reiche, *Diplopappus canescens* Hook. & Arn., *Aster uncinatus* (Phil.) Kuntze
Arbusto. Endémico.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU.
Rango altitudinal: 0-2500 m.

Haplopappus undulatus Klingenb.
Arbusto. Endémico.
Distribución: COQ, VAL, RME.
Rango altitudinal: 2000-3500 m.

Haplopappus valparadisiacus Klingenb.
Sinónimos: *Diplopappus inuloides* Hook. & Arn., *Haplopappus berteroii* var. *lanceolatus* DC., *Haplopappus formosus* Phil.
Arbusto. Endémico.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO.
Rango altitudinal: 10-60 m.

Haplopappus velutinus J. Remy subsp. *illinitus* (Phil.) Klingenb.

Sinónimos: *Haplopappus illinitus* Phil., *Aster illinitus* (Phil.) Kuntze, *Haplopappus glutinosus* Cass. var. *illinitus* (Phil.) Reiche
Arbusto. Endémico.
Distribución: LBO, MAU.
Rango altitudinal: 800 m.

Haplopappus velutinus* J. Remy subsp. *longipes
(Phil.) Klingenb.
Sinónimos: *Haplodiscus longiscapus* Phil., *Haplopappus longipes* (Phil.) Reiche, *Pyrrocoma longipes* Phil., *Aster longipes* (Phil.) Kuntze
Arbusto. Endémico.
Distribución: LBO, MAU.
Rango altitudinal: 800-2300 m.

Haplopappus velutinus* J. Remy subsp. *velutinus
Sinónimos: *Haplopappus virgatus* Phil., *Haplopappus longiscapus* Phil., *Haplopappus stenophyllus* Phil., *Haplopappus fallax* (Phil.) Reiche, *Haplodiscus fallax* Phil., *Aster gayanus* Kuntze, *Aster scopiformis* Phil., *Diplopappus glutinosus* Hook. & Arn., nom. illeg.
Arbusto. Nativo.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU.
Rango altitudinal: 1300-2100 m.
Países limítrofes: Argentina.

***Haplopappus vicuniensis* Klingenb.**
Arbusto. Endémico.
Distribución: COQ.
Rango altitudinal: 1100-3400 m.

Hedypnois

***Hedypnois cretica* (L.) Dum. Cours.**
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: COQ, VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

***Hedypnois rhagadioloides* (L.) F.W. Schmidt**
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: COQ, VAL, MAU, BIO, ARA.

Helenium

***Helenium aromaticum* (Hook.) L.H. Bailey**

Sinónimos: *Cephalophora aromatica* (Hook.) Schrad., *Cephalophora collina* Phil., *Cephalophora lanceolata* Phil., *Cephalophora tenera* Cass., *Graemia aromatica* Hook., *Helenium collinum* (Phil.) F. Meigen, *Gaillardia aromatica* (Hook.) Baill.
Hierba. Anual o perenne. Nativa.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU.
Rango altitudinal: 0-1200 m.
Países limítrofes: Perú.
Nombre vulgar: Manzanilla del campo.

***Helenium atacamense* Cabrera**
Sinónimos: *Cephalophora litoralis* Phil.
Hierba. Anual o bienal. Endémica.
Distribución: ANT, ATA, COQ.
Rango altitudinal: 0-800 m.

***Helenium glaucum* (Cav.) Stuntz**
Sinónimos: *Cephalophora berteroana* Phil., *Cephalophora borchersii* Phil., *Cephalophora foliosa* Phil., *Cephalophora glauca* Cav., *Cephalophora gracilis* Phil., *Cephalophora plantaginea* DC., *Cephalophora plantaginea* DC. var. *spathulata* (F. Phil.) Reiche, *Cephalophora punctata* Klatt, *Cephalophora rigida* Phil., *Cephalophora spathulata* F. Phil., *Cephalophora stolpii* Phil., *Heleniastrum glaucum* (Cav.) Kuntze, *Gaillardia glauca* (Cav.) Baill., *Helenium borchersii* (Phil.) Cabrera, *Helenium foliosum* (Phil.) Cabrera, *Helenium gracile* (Phil.) Cabrera, *Hymenopappus glaucus* (Cav.) Spreng., *Helenium plantagineum* (DC.) J.F. Macbr.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.
Rango altitudinal: 0-800 m.
Nombre vulgar: Poquil.

***Helenium insulare* (Phil.) Cabrera**
Sinónimos: *Actinea insularis* (Phil.) Kuntze, *Cephalophora insularis* Phil.
Hierba. Bienal o perenne. Endémica.
Distribución: BIO.
Rango altitudinal: 0-100 m.

***Helenium ovallense* Bierner**
Hierba. Anual o bienal. Endémica.
Distribución: COQ.
Rango altitudinal: 200-400 m.

Helenium urmenetae* (Phil.) Cabrera var. *leguiffei
(Phil.) Bierner

Sinónimos: *Cephalophora leguiffei* Phil., *Cephalophora peraltae* Phil., *Helenium leguiffei* (Phil.) J.F. Macbr.
Hierba. Anual o bienal. Endémica.
Distribución: ATA, COQ.
Rango altitudinal: 300-1300 m.

***Helenium urmenetae* (Phil.) Cabrera var.
*urmenetae***

Sinónimos: *Cephalophora setigera* Phil., *Cephalophora urmenatae* Phil., *Helenium longiaristatum* (Phil.) Cabrera
Hierba. Anual o bienal. Endémica.
Distribución: ANT, ATA, COQ, RME.
Rango altitudinal: 0-300 m.

***Helenium vallenariense* (Phil.) Bierner**

Sinónimos: *Cephalophora vallenariense* Phil.
Hierba. Anual o bienal. Endémica.
Distribución: ATA, COQ.
Rango altitudinal: 400-1200 m.

Helianthus

***Helianthus tuberosus* L.**

Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO,
ARA, LLA.

Helminthotheca

***Helminthotheca echiooides* (L.) Holub**

Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: TAR, ATA, COQ, VAL, RME, LBO,
MAU, BIO, ARA, LLA.

Hełogyne

***Hełogyne apaloidea* Nutt.**

Sinónimos: *Brachyandra tenuifolia* (Phil.) Reiche, *Leto tenuifolia* Phil.
Arbusto. Nativo.
Distribución: AYP, TAR.
Rango altitudinal: 700-3200 m.

Países limítrofes: Perú.
Nombre vulgar: Chilisaya, tola.

***Hełogyne macrogyne* (Phil.) B.L. Rob.**

Sinónimos: *Brachyandra macrogyne* Phil.
Arbusto. Endémico.
Distribución: AYP, TAR, ANT.
Rango altitudinal: 2000-3800 m.
Nombre vulgar: Tíkara.

Heterosperma

***Heterosperma nanum* (Nutt.) Sherff**

Sinónimos: *Bidens involucrata* Phil., *Heterosperma involucratum* (Phil.) Reiche, *Microdonta nana* Nutt.
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT.
Rango altitudinal: 1000-4000 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Heterosperma ovatifolium* Cav.**

Sinónimos: *Heterosperma pinnatum* Kunth var.
ovatifolium (Cav.) Kuntze
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: TAR.
Rango altitudinal: 500-3000 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Hieracium

***Hieracium antarcticum* d'Urv.**

Sinónimos: *Hieracium antarcticum* d'Urv. var.
myosotidifolium (Sch. Bip.) Sleumer, *Hieracium andinum* Phil., *Hieracium gracile* Hook. subsp. *andinum* (Phil.) Zahn, *Hieracium gracile* Hook. subsp.
antarcticum (d'Urv.) Zahn, *Hieracium gracile* Hook. subsp. *myosotidifolium* (Sch. Bip.) Zahn, *Hieracium magellanicum* Sch. Bip., *Hieracium myostidifolium* Sch. Bip., *Hieracium philippii* Albov, *Hieracium triste* Macloskie, hom. illeg., *Pilosella magellanica* (Sch. Bip.) F.W. Schultz & Sch. Bip., *Pilosella myosotidifolia* (Sch. Bip.) F.W. Schultz & Sch. Bip.
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: ARA, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-2000 m.
Países limítrofes: Argentina.

***Hieracium aurantiacum* L.**

Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: LLA, MAG.

***Hieracium chilense* Less.**

Sinónimos: *Hieracium gayanum* Arv.-Touv., *Hieracium orthotrichum* R.E. Fr., *Pilosella chilensis* (Less.) F.W. Schultz & Sch. Bip., *Pilosella orthotricha* (R.E. Fr.) F.W. Schultz & Sch. Bip.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 500-1500 m.
Países limítrofes: Argentina y Perú.

***Hieracium glaucifolium* Poepp. ex Froel.**

Sinónimos: *Hieracium chilense* Ball, *Pilosella glaucifolia* (Poepp. ex Froel.) F.W. Schultz & Sch. Bip., *Hieracium chilense* Skottsb., nom. illeg.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS.
Rango altitudinal: 500-2000 m.
Países limítrofes: Argentina.

***Hieracium patagonicum* Hook.f.**

Sinónimos: *Hieracium chilense* Less. var. *navarinum* Zahn, *Hieracium poeppigianum* Zahn, *Pilosella patagonica* (Hook.f.) F.W. Schultz & Sch. Bip.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, MAG.
Rango altitudinal: 0-1000 m.
Países limítrofes: Argentina.

***Hieracium pilosella* L. subsp. *euronotum* Nägeli & Peter**

Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: MAG.

***Hieracium praealtum* Vill. ex Gochnat**

Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: MAG.

Hypochaeris

***Hypochaeris acaulis* (J. Remy) Britton**

Sinónimos: *Achyrophorus acaulis* J. Remy

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, RME, MAU, NUB, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 1400-3000 m.
Países limítrofes: Argentina.

***Hypochaeris apargoides* Hook. & Arn.**

Sinónimos: *Hypochaeris berteri* Colla, *Achyrophorus apargoides* (Hook. & Arn.) DC.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 500-2000 m.
Nombre vulgar: Escorzonera.

***Hypochaeris arenaria* Gaudich.**

Sinónimos: *Achyrophorus andinus* DC., *Achyrophorus arenarius* (Gaudich.) DC., *Achyrophorus humilis* Phil., *Hypochaeris arenaria* Gaudich. var. *andina* (DC.) Cabrera, *Hypochaeris andina* (DC.) Benth. & Hook. ex Griseb., *Hypochaeris humilis* (Phil.) Reiche, *Hypochaeris pygmaea* Phil., *Leontodon arenarius* (Gaudich.) Albov, *Hypochaeris psychrophila* (Wedd.) Reiche, *Seriola andina* DC., nom. illeg., *Achyrophorus psychrophilus* Wedd., *Hypochaeris andina* (DC.) Benth. & Hook. ex Griseb. var. *laciniata* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: VAL, ARA, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-2400 m.
Países limítrofes: Argentina.

***Hypochaeris chondrilloides* (A. Gray) Cabrera**

Sinónimos: *Achyrophorus chondrilloides* A. Gray, *Achyrophorus deserticola* Phil., *Achyrophorus glaucus* Phil., *Oreophila chondrilloides* D. Don ex A. Gray, nom. illeg., *Hypochaeris glauca* (Phil.) Reiche, comb. illeg., *Oreophila chondrilloides* Hook. & Arn., nom. nud., *Hypochaeris glabrata* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, ANT, ATA, COQ, VAL, RME.
Rango altitudinal: 0-3500 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Nombre vulgar: Lokoche, romaza.

***Hypochaeris clarionoides* (J. Remy) Reiche**

Sinónimos: *Achyrophorus clarionoides* J. Remy, *Achyrophorus microphyllus* J. Remy, *Hypochaeris clarionoides* (J. Remy) Reiche var. *microphylla* (J. Remy) Cabrera, *Hypochaeris tenuifolia* (Hook. & Arn.)

Griseb. var. *clarionoides* (J. Remy) Bortiri, *Hypochaeris microphylla* (J. Remy) Reiche, *Hypochaeris nana* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, MAG.

Rango altitudinal: 2500-3400 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Hypochaeris cupressorum* F. Phil.**

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: RME, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 1000-2000 m.

***Hypochaeris deserticola* Phil.**

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ATA.

***Hypochaeris eremophila* Cabrera**

Sinónimos: *Distoecha taraxacoides* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT.

Rango altitudinal: 2800-4700 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

***Hypochaeris foliosa* (Phil.) Reiche**

Sinónimos: *Achyrophorus foliosus* Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ANT.

Rango altitudinal: 0-500 m.

***Hypochaeris gayana* (DC.) Cabrera**

Sinónimos: *Achyrophorus tenuifolius* (Hook. & Arn.)

DC. var. *gayanus* DC.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: RME, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 0-2500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Hypochaeris glabra* L.**

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB,

ARA, MAG, JFE, IPA.

***Hypochaeris grandidentata* (Phil.) Reiche**

Sinónimos: *Achyrophorus grandidentatus* Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ANT, ATA.

Rango altitudinal: 200-2500 m.

Nombre vulgar: Cerrajilla, renca.

***Hypochaeris hispidula* Phil.**

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: LLA.

Rango altitudinal: 0-100 m.

***Hypochaeris incana* (Hook. & Arn.) Macloskie**

var. *incana*

Sinónimos: *Achyrophorus incanus* (Hook. & Arn.) Sch.

Bip., *Seriola incana* Hook. & Arn.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ARA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-1500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Hypochaeris incana* (Hook. & Arn.) Macloskie**

var. *integrifolia* (Sch. Bip.) Cabrera

Sinónimos: *Achyrophorus coronopifolius* Sch. Bip.,

Hypochaeris arenaria Gaudich. var. *coronopifolia* (Sch.

Bip.) Speg., *Hypochaeris ibari* Phil., *Leontodon*

coronopifolium (Sch. Bip.) Comm. ex Albov,

Hypochaeris coronopifolia (Sch. Bip.) Franch.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Hypochaeris laciniosa* Phil.**

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: BIO.

Rango altitudinal: 0-100 m.

***Hypochaeris lessingii* (Sch. Bip.) Reiche**

Sinónimos: *Achyrophorus lessingii* Sch. Bip.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: BIO, ARA.

Rango altitudinal: 2000-2500 m.

***Hypochaeris melanolepis* Phil.**

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: VAL.

Rango altitudinal: 1500-2500 m.

***Hypochaeris meyeniana* (Walp.) Benth. & Hook.f.**

ex Griseb.

Sinónimos: *Oreophila meyeniana* Walp., *Achyrophorus meyenianus* (Walp.) Walp.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR.
Rango altitudinal: 3300-3900 m.
Países limítrofes: Perú.

***Hypochaeris montana* (Phil.) Reiche**
Sinónimos: *Achyrophorus montanus* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: RME.
Rango altitudinal: 1800-4000 m.
Países limítrofes: Argentina.

***Hypochaeris nahuelvutae* Phil.**
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ARA.
Rango altitudinal: 1500-2500 m.

***Hypochaeris palustris* (Phil.) De Wild.**
Sinónimos: *Achyrophorus palustris* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-2100 m.
Países limítrofes: Argentina.

***Hypochaeris pilosa* Reiche**
Sinónimos: *Hypochaeris hirta* Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: BIO, ARA.
Rango altitudinal: 0-500 m.

***Hypochaeris radicata* L.**
Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: COQ, VAL, RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.

***Hypochaeris scorzonerae* (DC.) F. Muell. var. *glabrata* (DC.) Reiche**
Sinónimos: *Achyrophorus scorzonerae* DC. var. *glabrata* DC., *Hypochaeris chrysantha* Poepp. ex DC., *Oreophila taraxacoides* Don, *Seriola taraxacoides* (Don) Hook. & Arn., *Achyrophorus chrysanthus* DC.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO.
Rango altitudinal: 0-500 m.

***Hypochaeris scorzonerae* (DC.) F. Muell. var. *ramosa* (DC.) Reiche**
Sinónimos: *Achyrophorus scorzonerae* DC. var. *ramosa* DC.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: VAL.
Rango altitudinal: 0-500 m.

Hypochaeris scorzonerae* (DC.) F. Muell. var. *scorzonerae
Sinónimos: *Hypochaeris sonchoides* Kunth, *Achyrophorus scorzonerae* DC.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO.
Rango altitudinal: 0-2000 m.
Nombre vulgar: Escorzonera.

***Hypochaeris spathulata* (J. Remy) Reiche var. *chiloensis* (J. Remy) Reiche**
Sinónimos: *Achyrophorus spathulatus* J. Remy var. *chiloensis* J. Remy
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: LBO, LLA.
Rango altitudinal: 0-500 m.

Hypochaeris spathulata* (J. Remy) Reiche var. *spathulata
Sinónimos: *Achyrophorus spathulatus* J. Remy
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-800 m.

***Hypochaeris taraxacoides* Ball**
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT.
Rango altitudinal: 2600-5000 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.
Nombre vulgar: Psiñe de burro, jap'epsike, waripsike.

***Hypochaeris tenerifolia* (J. Remy) Dusén**
Sinónimos: *Achyrophorus tenerifolius* J. Remy
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: BIO, ARA, LLA, MAG.
Rango altitudinal: 0-1500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Hypochaeris tenuifolia (Hook. & Arn.) Griseb.
var. *eurylepis* (Phil.) Cabrera
Sinónimos: *Achyrophorus araucanus* Phil.,
Achyrophorus odoratus (Poepp. & Endl.) Walp.,
Oreophila odorata Poepp. & Endl., *Hypochaeris eurylepis* Phil., *Hypochaeris odorata* (Poepp. & Endl.) Benth. & Hook.f. var. *eurylepis* (Phil.) Reiche,
Hypochaeris odorata (Poepp. & Endl.) Benth. & Hook.f. Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.
Rango altitudinal: 2000-3000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Hypochaeris tenuifolia (Hook. & Arn.) Griseb.
var. *linearifolia* (DC.) Bortiri
Sinónimos: *Achyrophorus graminifolius* Phil., nom. nud., *Achyrophorus tenuifolius* (Hook. & Arn.) DC. var. *linearifolius* DC., *Hypochaeris graminifolia* Phil., *Achyrophorus angustissimus* Phil. Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: RME, LBO, MAU.
Rango altitudinal: 1500-2000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Hypochaeris tenuifolia (Hook. & Arn.) Griseb.
var. *tenuifolia*
Sinónimos: *Achyrophorus tenuifolius* (Hook. & Arn.) DC., *Seriola tenuifolia* Hook. & Arn., *Hypochaeris spinuligera* (Phil.) Reiche, *Hypochaeris volckmannii* (Phil.) Phil., *Oreophila tenuifolia* D. Don ex Hook. & Arn., nom. illeg., *Achyrophorus tenuifolius* (Hook. & Arn.) DC. var. *neaeanus* DC., *Achyrophorus spinuliger* Phil., *Achyrophorus volckmannii* Phil. Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 1300-3200 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Escorzonera.

Hypochaeris thermarum Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: MAU.
Rango altitudinal: 2500-3400 m.

Hypochaeris thrincoides (J. Remy) Reiche

Sinónimos: *Achyrophorus brevicaulis* Phil., *Achyrophorus philippi* Sch. Bip. ex Reiche Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.
Rango altitudinal: 0-1000 m.

Hypochaeris tolteca Reiche
Sinónimos: *Hypochaeris grandiflora* F. Phil. Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ARA.
Rango altitudinal: 0-500 m.

Jungia

Jungia polita Griseb.
Arbusto o subarbusto. Nativo.
Distribución: TAR.
Países limítrofes: Argentina y Perú.
Nota: No hay registros en herbarios nacionales.
Duplicados en GH, NY, US, recolectados por Shepard en la Provincia de Tarapacá (TAR). Ver Harling, 1995. Acta Regiae Soc. Litt. Gothob., Bot. 4:5-133.

Kieslingia

Kieslingia chilensis Faúndez, Saldivia & A.E. Martic.
Arbusto. Endémico.
Distribución: ATA.
Rango altitudinal: 1600-2500 m.

Lactuca

Lactuca sativa L.
Hierba. Anual o bienal. Introducida.
Distribución: AYP, RME.

Lactuca serriola L.
Hierba. Anual o bienal. Introducida.
Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Lactuca virosa L.
Hierba. Anual o bienal. Introducida.
Distribución: RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Laennecia

***Laennecia artemisioides* (Meyen & Walp.) G.L.**

Nesom

Sinónimos: *Conyza artemisioides* Meyen & Walp., *Conyza andicola* Phil., *Erigeron artemisioides* (Meyen & Walp.) Sch. Bip., *Marsea artemisiaefolia* (Meyen & Walp.) Kuntze

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, RME.

Rango altitudinal: 3500-4500 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Lagenophora

***Lagenophora hariotii* Franch.**

Sinónimos: *Lagenifera hariotii* (Franch.) T.R. Dudley, comb. illeg., *Lagenophora hirsuta* auct. non Less.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.

Rango altitudinal: 0-1500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Lagenophora hirsuta* Poepp. ex Less.**

Sinónimos: *Lagenophora commersonii* Cass. var. *hirsuta* (Poepp. ex Less.) Hook.f.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 500-1500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Lagenophora nudicaulis* (Comm. ex Lam.) Dusén**

Sinónimos: *Aster nudicaulis* Comm. ex Lam., *Bellis magellanica* DC., *Calendula magellanica* Willd., *Lagenifera nudicaulis* (Comm. ex Lam.) T.R. Dudley, *Lagenophora commersonii* Cass., *Lagenophora purpurascens* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-2200 m.

Países limítrofes: Argentina.

Lapsana

***Lapsana communis* L.**

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, JFE.

Lasthenia

***Lasthenia kunthii* (Less.) Hook. & Arn.**

Sinónimos: *Hymenatherum kunthii* Less., *Lasthenia bridgesii* (Poepp. & Endl.) Steud., *Lasthenia chilensis* Steud., nom. nud., *Lasthenia obtusifolia* Cass., *Lasthenia obtusifolia* Cass. var. *bridgesii* (Poepp. & Endl.) DC., *Rancagua bridgesii* Poepp. & Endl., *Rancagua feuillei* (Bertero ex Colla) Poepp. & Endl., *Tagetes feuillei* Bertero ex Colla

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, MAG.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Rancagua.

Leontodon

***Leontodon autumnalis* L.**

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: VAL, MAG.

***Leontodon hirtus* L.**

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: VAL, NUB, BIO, LRI, LLA.

***Leontodon saxatilis* Lam.**

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Lepidophyllum

***Lepidophyllum cypresiforme* (Lam.) Cass.**

Sinónimos: *Baccharis cypresiformis* (Lam.) Pers., *Conyza cypresiformis* Lam., *Gutierrezia cypresiformis* (Lam.) Sch. Bip., *Athanasia cypresiformis* (Lam.) Comm. ex Cass., *Brachyridium cypresiforme* (Lam.) Meisn., nom. illeg., *Grindelia cypresiformis* (Lam.) Sch. Bip. ex Reiche

Arbusto. Nativo.
Distribución: MAG.
Rango altitudinal: 0-500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Leptinella

Leptinella scariosa Cass.
Sinónimos: *Cotula acaenoides* (Hook. & Arn.) Alb.,
Cotula hombroni Franch., *Cotula scariosa* (Cass.)
Franch., *Leptinella acaenoides* Hook. & Arn.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: LRI, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-1000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Leptocarpha

Leptocarpha rivularis DC.
Arbusto. Endémico.
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.
Rango altitudinal: 0-1000 m.
Nombre vulgar: Palo negro.

Leucanthemum

Leucanthemum vulgare Lam.
Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI,
LLA, MAG.

Leucheria

Leucheria achillaeifolia Hook. & Arn.
Sinónimos: *Chabaea fragans* Phil., *Lasiorhiza
anthemidifolia* (Phil.) Kuntze, *Lasiorhiza fragans* (Phil.)
Kuntze, *Lasiorhiza achillaeifolia* (Hook. & Arn.)
Macloskie, *Lasiorhiza ibari* (Phil.) Macloskie, *Leuceria
anthemidifolia* Phil., *Leuceria ibari* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-2000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Leucheria amoena Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: LBO, MAU.
Rango altitudinal: 1000-2000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Leucheria apiifolia Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: MAU.
Rango altitudinal: 2500 m.

Leucheria bridgesii Hook. & Arn.
Sinónimos: *Chabraea pulchella* Phil., *Lasiorhiza
pulchella* (Phil.) Kuntze, comb. illeg., *Leuceria
microcephala* Reiche
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO.
Rango altitudinal: 1000-3300 m.

Leucheria candidissima D. Don
Sinónimos: *Chabaea candidissima* (D. Don) DC.,
Lasiorhiza candidissima (D. Don) Macloskie, *Leuceria
candidissima* D. Don fma. *subintegra* Skottsb., *Leuceria
laciinata* Hook. & Arn.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: RME, MAU.
Rango altitudinal: 2000-3200 m.
Países limítrofes: Argentina.

Leucheria cerberoana J. Remy
Sinónimos: *Leuceria glabrata* Phil.
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME.
Rango altitudinal: 0-1100 m.

Leucheria coerulescens J. Remy
Sinónimos: *Leucheria aurita* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: NUB, ARA, LRI.
Rango altitudinal: 0-1000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Leucheria congesta D. Don
Sinónimos: *Chabaea canescens* Phil., *Lasiorhiza
glomerulata* Kuntze, *Leuceria canescens* (Phil.) Reiche,
Leuceria glomerulata (Kuntze) K. Schum., *Leuceria
sonchoides* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ, VAL, RME.

Rango altitudinal: 2500-3000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Leucheria cumingii* Hook. & Arn.**

Sinónimos: *Chabraea modesta* Phil., *Leuceria debilis*

Phil., *Leuceria modesta* (Phil.) Reiche

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-500 m.

***Leucheria daucifolia* (D. Don) Crisci**

Sinónimos: *Ptilurus daucifolius* D. Don, *Chabraea*

daucifolia (D. Don) Wedd., *Chabraea laciniata* Wedd.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR.

Rango altitudinal: 2600-4800 m.

Países limítrofes: Bolivia y Perú.

***Leucheria floribunda* DC.**

Sinónimos: *Eizaguirrea candellei* J. Remy, nom. illeg.,

Eizaguirrea cirsoides Phil., *Eizaguirrea sonchifolia*

Turcz., *Lasiorhiza floribunda* (DC.) Kuntze, *Leuceria*

racemosa Phil., *Leuceria sonchifolia* (Turcz.) Reiche

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 2000-3000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Leucheria garciana* J. Remy**

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: LBO, MAU.

Rango altitudinal: 2500 m.

***Leucheria gayana* (J. Remy) Reiche**

Sinónimos: *Chabraea gayana* J. Remy, *Leuceria*

nudicaulis Phil., *Leuceria popetana* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 1800-3000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Leucheria gilliesii* Hook. & Arn.**

Sinónimos: *Leuceria hieracioides* D. Don, hom. illeg.,

Leuceria nivea Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: RME, MAU, ARA.

Rango altitudinal: 1900-2500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Leucheria glabriuscula* (Phil.) Reiche**

Sinónimos: *Chabraea glabriuscula* Phil.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: RME.

Rango altitudinal: 1000 m.

***Leucheria glacialis* (Poepp. ex Less.) Reiche**

Sinónimos: *Chabraea glacialis* (Poepp. ex Less.) DC.,

Lasiorhiza glacialis Poepp. ex Less., *Leuceria araucana*

Phil., *Leuceria discolor* Phil., *Leuceria glacialis* (Poepp.

ex Less.) Reiche var. *longifolia* (Phil.) Cabrera, *Leuceria*

longifolia Phil., *Leuceria pauciflora* Phil., *Leuceria*

thermarum (Phil.) Reiche var. *araucana* (Phil.) Reiche

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 0-2600 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Leucheria glandulosa* D. Don**

Sinónimos: *Chabraea elongata* Bertero ex Colla,

Chabraea glandulosa (D. Don) DC., *Lasiorhiza*

glandulosa (D. Don) DC., *Leuceria peduncularis* J.

Remy

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, BIO.

Rango altitudinal: 600-2000 m.

***Leucheria graui* Katinas, M.C. Tellería & Crisci**

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: MAU.

Rango altitudinal: 2200-2400 m.

***Leucheria hahnii* Franch.**

Sinónimos: *Chabraea integrifolia* Phil., hom. illeg.,

Lasiorhiza hahnii (Franch.) Macloskie, *Leuceria fuegina*

Phil., *Leucheria gossypina* Hook. & Arn. var.

integrifolia Sch. Bip., *Leucheria gossypina* Hook. &

Arn. var. *pinnatifida* Sch. Bip., *Lasiorhiza fueguiana*

(Phil.) Kuntze, *Leucheria integrifolia* (Phil.) Reiche ex

B.L. Rob., *Chabraea suaveolens* (d'Urv.) DC. var.

pinnatifida Sch. Bip., nom. nud., *Chabraea suaveolens*

(d'Urv.) DC. var. *integrifolia* Sch. Bip., nom. nud.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-1600 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Leucheria hieracioides* Cass.**

Sinónimos: *Lasiorhiza acanthoides* (D. Don) Kuntze, *Lasiorhiza hieracioides* (Cass.) Kuntze, *Leuceria acanthoides* D. Don, *Leuceria divaricata* D. Don, *Chabraea prenanthoides* Bertero
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU.
Rango altitudinal: 0-2200 m.

***Leucheria leontopodiooides* (Kuntze) K. Schum.**

Sinónimos: *Lasiorhiza leontopodiooides* Kuntze
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAG.
Rango altitudinal: 0-1500 m.
Países limítrofes: Argentina.

***Leucheria lithospermifolia* (Less.) Reiche subsp.**

***integrifolia* (Phil.) Grau & Zinnecker**

Sinónimos: *Leucheria integrifolia* (Phil.) Crisci,

Chabraea integrifolia Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAU, NUB, BIO.

Rango altitudinal: 1000-1500 m.

***Leucheria lithospermifolia* (Poepp. ex Less.)**

Reiche subsp. *lithospermifolia*

Sinónimos: *Chabraea lithospermifolia* (Poepp. ex Less.)

DC., *Lasiorhiza lithospermifolia* Poepp. ex Less.,

Leucheria volcanica Hook. & Arn.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 1400-2000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Leucheria magna* Phil.**

Sinónimos: *Lasiorhiza stricta* (Phil.) Macloskie,

Leuceria stricta Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ARA, AIS.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Leucheria meladensis* Katinas, Crisci & A.E.**

Martic.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: MAU.

Rango altitudinal: 1000-1100 m.

***Leucheria menana* J. Remy**

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-500 m.

***Leucheria millefolium* Dusén & Skottsb.**

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-2500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Leucheria multiflora* Phil.**

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO.

Rango altitudinal: 0-500 m.

***Leucheria nutans* (J. Remy) Reiche**

Sinónimos: *Chabraea nutans* J. Remy, *Chabraea poeppigii* Phil., *Clybatis volkmanii* Phil., *Lasiorhiza nutans* (J. Remy) Kuntze

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 1300-2000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Leucheria oligocephala* J. Remy**

Sinónimos: *Trixis seneciooides* Hook.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: VAL, RME, LBO.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

***Leucheria paniculata* Poepp. ex Less.**

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: RME, NUB, BIO, ARA, MAG.

Rango altitudinal: 0-2800 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Leucheria papillosa* Cabrera**

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 1000-2000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Leucheria polyclados* (J. Remy) Reiche**

Sinónimos: *Chabaea polyclados* J. Remy
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ATA.
Rango altitudinal: 3000-3100 m.

Leucheria pteropogon (Griseb.) Cabrera
Sinónimos: *Senecio pteropogon* Griseb.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ANT.
Rango altitudinal: 3500-0 m.
Países limítrofes: Argentina.

Leucheria purpurea (Vahl) Hook. & Arn.
Sinónimos: *Chabaea purpurea* (Vahl) DC., *Perdicium purpureum* Vahl, *Lasiorhiza purpurea* (Vahl) Less., *Leuceria purpurea* (Vahl) S. Moore ex Rendle
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAG.
Rango altitudinal: 500-1000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Leucheria rosea Poepp. ex Less.
Sinónimos: *Lasiorhiza rosea* Less. var. *albiflora* Kuntze, *Lasiorhiza rosea* Less. var. *andryaloides* (DC.) Kuntze, comb. illeg., *Leuceria andryaloides* DC., nom. illeg., *Leucheria lepida* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU.
Rango altitudinal: 1000-2000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Leucheria runcinata D. Don
Sinónimos: *Leucheria landbeckii* (Phil.) Reiche, *Chabaea barrasiana* J. Remy, *Chabaea concinna* Phil., *Chabaea coquimbana* Phil., *Chabaea landbeckii* Phil., *Chabaea oligocephala* Phil., *Chabaea runcinata* (D. Don) Hook., *Chabaea tenerifolia* Phil., *Leuceria barrasiana* (J. Remy) Reiche, comb. illeg., *Leuceria barrasiana* (J. Remy) Reiche var. *tenerifolia* (Phil.) Reiche, *Leuceria coquimbana* (Phil.) Reiche, *Leuceria meyeniana* Walp., *Leuceria paucicapitata* Reiche, *Leucheria tenerifolia* (Phil.) Phil., *Leuceria concinna* (Phil.) Reiche, *Leuceria barrasiana* (J. Remy) F. Meigen, comb. illeg.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB.
Rango altitudinal: 3000-0 m.

Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Blanquillo.

Leucheria salina (J. Remy) Hieron. subsp. *salina*
Sinónimos: *Chabaea salina* J. Remy, *Chabaea salinasi* Phil. var. *bipinnatifida* Phil., *Lasiorhiza salina* (J. Remy) Kuntze, *Leuceria salina* (J. Remy) Dusén, comb. illeg., *Leuceria salina* (J. Remy) Reiche
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME.
Rango altitudinal: 2000-4500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Leucheria salina (J. Remy) Hieron. subsp. *zöllneri*
Crisci
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ, RME, LBO.
Rango altitudinal: 3000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Leucheria scrobiculata D. Don
Sinónimos: *Chabaea glabra* DC., *Chabaea scrobiculata* (D. Don) DC., *Chabaea scrobiculata* (D. Don) DC. var. *pentacephala* Phil., *Lasiorhiza glabra* (DC.) Kuntze, *Lasiorhiza scrobiculata* (D. Don) Kuntze, *Leuceria scrobiculata* D. Don var. *glabra* (DC.) Hauman, *Mimela pedicularifolia* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: VAL, RME, LBO.
Rango altitudinal: 1900-3500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Leucheria senecioides Hook. & Arn.
Sinónimos: *Lasiorhiza cinerea* (D. Don) Less., *Chabaea abbreviata* Bertero ex Colla, *Chabaea cinerea* (D. Don) DC., *Lasiorhiza senecioides* (Hook. & Arn.) Kuntze, *Leuceria abbreviata* (Bertero) Steud., *Leuceria cinerea* D. Don, *Leuceria senecioides* Hook. & Arn. var. *purpurescens* DC.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 0-500 m.

Leucheria tenuis Less.
Sinónimos: *Chabaea berteroniana* Steud., *Chabaea tenuior* Bertero ex Colla
Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, ARA.

Rango altitudinal: 900-2000 m.

***Leucheria thermarum* (Phil.) Phil.**

Sinónimos: *Chabraea thermarum* Phil., *Leuceria thermarum* (Phil.) Reiche, nom. illeg.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: NUB, ARA, LRI, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Leucheria tomentosa* (Less.) Crisci**

Sinónimos: *Chabraea tomentosa* (Less.) DC., *Lasiorhiza pulchella* (D. Don) Steud., *Lasiorhiza tomentosa* Less., *Leuceria eriochlaena* J. Remy, *Leuceria pulchella* D. Don

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, RME, MAU.

Rango altitudinal: 0-500 m.

***Leucheria viscosa* (Bertero ex Colla) Crisci**

Sinónimos: *Chabraea rosea* DC., *Chabraea viscida* Bertero ex Colla, *Chabraea viscosa* Bertero ex DC., nom. nud., *Lasiorhiza philippiana* Kuntze, *Lasiorhiza rosea* Less., *Leuceria chillanensis* Reiche, *Leuceria glandulosa* Phil., nom. illeg., *Leuceria leucomalla* Phil., *Leuceria neaei* DC., *Leuceria rosea* (Less.) Reiche Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 0-3000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Leunisia

***Leunisia laeta* Phil.**

Arbusto. Nativo.

Distribución: COQ, VAL.

Rango altitudinal: 2000-3000 m.

Logfia

***Logfia gallica* (L.) Coss. & Germ.**

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Lophopappus

***Lophopappus cuneatus* R.E. Fr.**

Arbusto. Nativo.

Distribución: TAR.

Rango altitudinal: 2800-4000 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

***Lophopappus foliosus* Rusby**

Sinónimos: *Proustia foliosa* (Rusby) Ferreyra

Arbusto. Nativo.

Distribución: AYP, TAR.

Rango altitudinal: 3000-4000 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Lophopappus tarapacanus* (Phil.) Cabrera**

Sinónimos: *Gochnatia tarapacana* Phil.

Arbusto. Nativo.

Distribución: AYP, TAR.

Rango altitudinal: 2200-4700 m.

Nombre vulgar: Tajana, tagtaga, chari, moñe, leñadura.

Lucilia

***Lucilia eriophora* J. Remy**

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: VAL, RME, LBO, ARA.

Rango altitudinal: 1000-1500 m.

Lycapsus

***Lycapsus tenuifolius* Phil.**

Sinónimos: *Alomia tenuifolia* (Phil.) Benth. & Hook.f.

ex Reiche

Subarbusto. Endémico.

Distribución: IDE.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Macrachaenium

***Macrachaenium gracile* Hook.f.**

Sinónimos: *Macrachaenium foliosum* Albov

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Madia

***Madia chilensis* (Nutt.) Reiche**

Sinónimos: *Madariopsis chilensis* Nutt.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, MAG.

Rango altitudinal: 10-2500 m.

Nombre vulgar: Madia, madi, melosa.

***Madia sativa* Molina**

Sinónimos: *Madia viscosa* Cav.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.

Rango altitudinal: 0-1300 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Madi, melosa.

Nota: Introducida en el Archipiélago de Juan Fernández.

Malacothrix

***Malacothrix clevelandii* A. Gray**

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: ATA, COQ.

Rango altitudinal: 10-1000 m.

***Malacothrix coulteri* A. Gray**

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: COQ.

Marticorenia

***Marticorenia foliosa* (Phil.) Crisci**

Sinónimos: *Leuceria foliosa* Phil., *Lasiorhiza foliosa* (Phil.) Kuntze

Arbusto. Endémico.

Distribución: ATA, VAL, RME.

Rango altitudinal: 2700-3300 m.

Matricaria

***Matricaria chamomilla* L.**

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, JFE.

***Matricaria discoidea* DC.**

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG.

Micropsis

***Micropsis nana* DC.**

Sinónimos: *Lasiophyton pusillum* Hook. & Arn.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, JFE.

Rango altitudinal: 300-2500 m.

Nota: Introducida en el Archipiélago de Juan Fernández.

Microseris

***Microseris pygmaea* D. Don**

Hierba. Anual o perenne. Introducida.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, BIO, ARA.

Mikania

***Mikania mendocina* Phil.**

Hierba trepadora. Perenne. Nativa.

Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 500-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Mniodes

***Mniodes coarctata* Cuatrec.**

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP.

Rango altitudinal: 4600 m.

Países limítrofes: Perú.

***Mniodes kunthiana* (DC.) S.E. Freire, Chemisquy,**

Anderb. & Urtubey

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP.

Rango altitudinal: 4000-4269 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Mniodes piptolepis (Wedd.) S.E. Freire, Chemisquy, Anderb. & Urtubey
Sinónimos: *Belloa piptolepis* (Wedd.) Cabrera, *Gnaphalium piptolepis* (Wedd.) Griseb., *Lucilia piptolepis* Wedd., *Merope piptolepis* Wedd., *Luciliocline piptolepis* (Wedd.) M.O. Dillon & Sagást.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: TAR.
Rango altitudinal: 3200-4500 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Mniodes schultzii (Wedd.) S.E. Freire, Chemisquy, Anderb. & Urtubey
Sinónimos: *Belloa schultzii* (Wedd.) Cabrera, *Gnaphalium schultzii* (Wedd.) Cabrera, *Lucilia schultzii* (Wedd.) A. Gray, *Merope schultzii* Wedd., *Luciliocline schultzii* (Wedd.) M.O. Dillon & Sagást.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: TAR, ANT.
Rango altitudinal: 3900-5000 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.
Nombre vulgar: Yaretilla.

Mniodes subspicata (Cabrera) S.E. Freire, Chemisquy, Anderb. & Urtubey
Sinónimos: *Luciliocline subspicata* (Wedd.) Anderb. & S.E. Freire, *Belloa subspicata* Wedd., *Lucilia subspicata* (Wedd.) Hieron.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR.
Rango altitudinal: 3700-4400 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Moscharia

Moscharia pinnatifida Ruiz & Pav.
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB.
Rango altitudinal: 0-2000 m.
Nombre vulgar: Almizcle.

Moscharia solbrigii Crisci
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: COQ.

Rango altitudinal: 300-500 m.

Mutisia

Mutisia acerosa Poepp. ex Less.
Sinónimos: *Mutisia parviflora* J. Remy, *Mutisia ulicina* D. Don
Arbusto. Nativo.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB.
Rango altitudinal: 1200-3000 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Romerillo de cordillera.

Mutisia acuminata Ruiz & Pav. var. ***hirsuta*** (Meyen) Cabrera
Sinónimos: *Mutisia viciaefolia* Cav. var. *hirsuta* (Meyen) Wedd., *Mutisia hirsuta* Meyen
Arbusto trepador. Nativo.
Distribución: AYP, TAR.
Rango altitudinal: 2500-3500 m.
Países limítrofes: Bolivia y Perú.

Mutisia araucana Phil.
Subarbusto trepador. Endémico.
Distribución: BIO, ARA.
Rango altitudinal: 800-1400 m.

Mutisia brachyantha Phil.
Subarbusto. Endémico.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 1200 m.

Mutisia cana Poepp.
Sinónimos: *Mutisia glauca* J. Remy, *Mutisia polyphylla* Phil., *Mutisia reticulata* Phil., *Mutisia volckmanni* Phil., *Mutisia glauca* Phil.
Arbusto trepador. Endémico.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME.
Rango altitudinal: 1000-2000 m.
Nombre vulgar: Granadilla.

Mutisia decurrens Cav. var. ***decurrens***
Sinónimos: *Aplophyllum decurrens* (Cav.) Cass., *Mutisia decurrens* Cav. var. *andina* Phil.
Subarbusto trepador. Nativo.
Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, AIS.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Mutisia decurrens* Cav. var. *patagonica* (Phil.)**

S.F. Blake

Sinónimos: *Mutisia patagonica* Phil.

Subarbusto trepador. Nativo.

Distribución: NUB.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Mutisia hamata* Reiche**

Sinónimos: *Mutisia microphylla* Phil., hom. illeg.

Subarbusto trepador. Nativo.

Distribución: AYP, TAR, ANT.

Rango altitudinal: 2500-4500 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

***Mutisia ilicifolia* Hook. var. *decandolleana* (Phil.)**

ex Reiche Cabrera

Sinónimos: *Mutisia candolleana* Phil., *Mutisia decandolleana* Phil.

Arbusto trepador. Endémico.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 200-2000 m.

Mutisia ilicifolia* Hook. var. *ilicifolia

Sinónimos: *Aplophyllum ilicifolium* (Cav.) Cass.,

Mutisia breviflora Phil., *Mutisia consobrina* Phil.,

Mutisia eriocephala Phil., *Mutisia grossedentata* Phil.,

Mutisia ilicifolia Hook., *Mutisia ilicifolia* Hook. var. *cavanillesii* DC., *Mutisia involucrata* Phil. var. *consobrina* Phil.

Arbusto trepador. Endémico.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB.

Rango altitudinal: 1000-1800 m.

Nombre vulgar: Clavel del campo, grasilla, flor de granada, hierba del jote, flor de la canela.

***Mutisia involucrata* Phil.**

Subarbusto. Endémico.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 300-1700 m.

***Mutisia lanigera* Wedd.**

Subarbusto. Nativo.

Distribución: AYP, TAR, ANT.

Rango altitudinal: 4000 m.

Países limítrofes: Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Chirchirkuma, chinkachinka, wichakaña.

***Mutisia latifolia* D. Don fma. *bracteata* (J. Remy)**

Cabrera

Sinónimos: *Mutisia bracteata* J. Remy

Arbusto trepador. Endémico.

Distribución: COQ, VAL.

Rango altitudinal: 0-600 m.

Mutisia latifolia* D. Don fma. *latifolia

Arbusto trepador. Endémico.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, NUB.

Rango altitudinal: 0-2400 m.

***Mutisia ledifolia* Decne. ex Wedd.**

Arbusto. Nativo.

Distribución: AYP, TAR, ANT.

Rango altitudinal: 3000-4200 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Quinchamale, chinchirkoma, tola negra, kaputula, tola romero.

***Mutisia linearifolia* Cav.**

Sinónimos: *Aplophyllum linearifolium* (Cav.) Cass.

Arbusto. Nativo.

Distribución: RME, LBO, MAU, NUB.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Mutisia macrophylla* Phil.**

Subarbusto. Endémico.

Distribución: NUB.

Rango altitudinal: 200-500 m.

***Mutisia oligodon* Poepp. & Endl.**

Sinónimos: *Mutisia gayana* J. Remy, *Mutisia meyeniana* J. Remy ex Phil.

Subarbusto trepador. Nativo.

Distribución: NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Mutisia rosea* Poepp. ex Less.**

Sinónimos: *Mutisia alba* Phil., *Mutisia berteriana* Endl. ex Poepp., *Mutisia berterii* DC., *Mutisia landbeckii* Phil., *Mutisia subulata* Ruiz & Pav. var. *rosea* (Less.) Ruiz & Pav. Subarbusto trepador. Endémico. Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, BIO. Rango altitudinal: 1000-2000 m.

***Mutisia sinuata* Cav.**

Sinónimos: *Guariruma sinuatum* (Cav.) Cass., *Mutisia dentata* Phil., *Mutisia popetana* Phil., *Mutisia sanguinea* Meyen, *Mutisia sinuata* Cav. var. *brachycephala* Phil., *Mutisia sinuata* Cav. var. *taraxacifolia* (Less.) Kuntze, *Mutisia taraxacifolia* Less., *Mutisia taraxacifolia* Less. var. *integerrima* Phil.

Arbusto trepador. Nativo. Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU. Rango altitudinal: 1700-3500 m. Países limítrofes: Argentina.

***Mutisia spectabilis* Phil.**

Subarbusto. Endémico. Distribución: COQ, VAL. Rango altitudinal: 1300-2800 m. Nombre vulgar: Clavel del aire.

***Mutisia spinosa* Ruiz & Pav. var. *pulchella* (Speg.)**

Cabrera
Sinónimos: *Mutisia bridgesii* Endl. ex Poepp. & Endl., *Mutisia pulchella* Speg., *Mutisia retusa* J. Remy, *Mutisia retusa* J. Remy var. *pulchella* (Speg.) Skottsb. Subarbusto trepador. Nativo. Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS. Rango altitudinal: 0-1000 m. Países limítrofes: Argentina. Nombre vulgar: Clavel del campo, flor de la estrella.

Mutisia spinosa* Ruiz & Pav. var. *spinosa

Sinónimos: *Mutisia auriculata* Poepp. ex Less., *Mutisia hastata* Bertero ex DC., nom. nud., *Mutisia ilicifolia* Hook. var. *truncata* (D. Don) DC., *Mutisia retusa* J. Remy var. *glaberrima* Phil., *Mutisia truncata* D. Don Subarbusto trepador. Nativo. Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS. Rango altitudinal: 0-1000 m. Países limítrofes: Argentina. Nombre vulgar: Clavel del campo, flor de la estrella.

***Mutisia splendens* Renjifo**
Subarbusto. Endémico. Distribución: VAL, RME. Rango altitudinal: 570 m.

***Mutisia subspinosa* Cav.**

Sinónimos: *Guariruma subspinosum* (Cav.) Cass. Subarbusto. Nativo. Distribución: ATA, NUB. Rango altitudinal: 1500-2500 m. Países limítrofes: Argentina.

***Mutisia subulata* Ruiz & Pav. fma. *rosmarinifolia* (Poepp. & Endl.) Cabrera**

Sinónimos: *Mutisia linearifolia* Hook., hom. illeg., *Mutisia gracilis* Meyen, *Mutisia hookeri* Meyen, *Mutisia subulata* Ruiz & Pav. var. *major* Hook. & Arn., *Mutisia hookeri* Meyen var. *rosmarinifolia* Poepp. & Endl., *Mutisia elegans* Phil., *Mutisia subulata* Ruiz & Pav. var. *gracilis* (Meyen) Walp., *Mutisia linearifolia* Cav. var. *hookeri* (Meyen) Reiche Subarbusto trepador. Nativo. Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO. Rango altitudinal: 1700-3000 m. Países limítrofes: Bolivia.

Mutisia subulata* Ruiz & Pav. fma. *subulata

Sinónimos: *Guariruma inflexum* (Cav.) Cass., *Mutisia hookeri* Meyen var. *scandens* Poepp. & Endl., *Mutisia inflexa* Cav., *Mutisia inflexa* Cav. var. *imberbis* Poepp. & Endl., *Mutisia inflexa* Cav. var. *melanopoga* Poepp. & Endl., *Mutisia subulata* Ruiz & Pav. var. *cavanillesii* Hook. & Arn., *Mutisia versicolor* Phil. Subarbusto trepador. Nativo. Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA. Rango altitudinal: 0-500 m. Países limítrofes: Argentina.

***Mutisia tridens* Poepp. ex Less.**

Subarbusto. Endémico. Distribución: BIO. Rango altitudinal: 650 m.

Nardophyllum

***Nardophyllum bryoides* (Lam.) Cabrera**

Sinónimos: *Anactinia hookeri* J. Remy, nom. illeg., *Nardophyllum obtusifolium* Hook. & Arn., *Baccharis bryoides* (Lam.) Pers., *Chiliotrichum darwinii* Hook.f., *Chiliotrichum humile* Hook.f., *Chiliotrichum kingii* Hook.f., *Conyza bryoides* Lam., *Microchaete humilis* (Hook.f.) Sch. Bip., *Nardophyllum darwinii* (Hook.f.) A. Gray, *Nardophyllum humile* (Hook.f.) A. Gray, *Nardophyllum kingii* (Hook.f.) A. Gray, *Nardophyllum parvifolium* Phil., *Dolichogyne parvifolia* Phil. ex Kuntze
Arbusto. Nativo.
Distribución: AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-1200 m.
Países limítrofes: Argentina.

***Nardophyllum chiliotrichoides* (J. Remy) A. Gray**
Sinónimos: *Dolichogyne chiliotrichoides* J. Remy
Arbusto. Nativo.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO.
Rango altitudinal: 0-3800 m.
Países limítrofes: Argentina.

***Nardophyllum genistoides* (Phil.) A. Gray**
Sinónimos: *Dolichogyne genistoides* Phil.
Arbusto. Endémico.
Distribución: VAL, RME.
Rango altitudinal: 2500 m.

***Nardophyllum lanatum* (Meyen) Cabrera**
Sinónimos: *Barnadesia lanata* Meyen, *Dolichogyne candollei* J. Remy, nom. illeg., *Dolichogyne gnaphaloides* DC., *Gochnatia revoluta* D. Don ex Hook. & Arn., *Nardophyllum candollei* (J. Remy) F. Meigen, comb. illeg., *Nardophyllum revolutum* (D. Don ex Hook. & Arn.) Hook. & Arn.
Arbusto. Endémico.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO.
Rango altitudinal: 1200-3200 m.
Nombre vulgar: Macabeo.

Nassauvia

Nassauvia aculeata* (Less.) Poepp. & Endl. var. *aculeata
Sinónimos: *Nassauvia aculeata* (Less.) Poepp. & Endl. var. *spinosa* (D. Don) Cabrera, *Nassauvia diazii* (Phil.) Reiche, *Nassauvia latifolia* (Phil.) F. Meigen, *Nassauvia spinosa* (D. Don) Reiche, comb. illeg., *Panargyrum*

diazii Phil., *Panargyrum latifolium* Phil., *Panargyrum pectinatum* Phil., *Panargyrum spinosum* D. Don, *Penthanthus aculeatus* Less.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, MAG.
Rango altitudinal: 1500-2500 m.
Países limítrofes: Argentina.

***Nassauvia aculeata* (Less.) Poepp. & Endl. var. *azoreloides* (Speg.) Cabrera**
Sinónimos: *Nassauvia abbreviata* (Hook. & Arn.) Dusén, *Nassauvia abbreviata* (Hook. & Arn.) Dusén var. *azoreloides* Speg., *Nassauvia abbreviata* (Hook. & Arn.) Dusén var. *subspinosa* (Phil.) Macloskie, *Nassauvia subspinosa* (Phil.) Albov, *Panargyrum abbreviatum* Hook. & Arn., *Panargyrum subspinosum* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-1000 m.
Países limítrofes: Argentina.

***Nassauvia aculeata* (Less.) Poepp. & Endl. var. *robusta* (Cabrera) Cabrera**
Sinónimos: *Nassauvia abbreviata* (Hook. & Arn.) Dusén var. *robusta* Cabrera
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-1000 m.
Países limítrofes: Argentina.

***Nassauvia argentea* Phil.**
Sinónimos: *Nassauvia revoluta* D. Don var. *argentea* (Phil.) Hosseus
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: NUB, ARA, LRI.
Rango altitudinal: 1500-2000 m.
Países limítrofes: Argentina.

***Nassauvia axillaris* (Lag. ex Lindl.) D. Don**
Sinónimos: *Acanthophyllum axillare* (Lag. ex Lindl.) Hook. & Arn., *Strongyloma axillare* (Lag. ex Lindl.) DC., *Triptilon axillare* Lag. ex Lindl.
Arbusto. Nativo.
Distribución: COQ, VAL, RME.
Rango altitudinal: 1000-4600 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Nassauvia coronipappa M.T.K. Arroyo & Martic.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: MAG.
Rango altitudinal: 800-1100 m.

Nassauvia cumingii Hook. & Arn.
Sinónimos: *Nassauvia glabrata* Phil., *Nassauvia macracantha* DC., *Nassauvia macracantha* DC. var. *glabrata* (Phil.) Reiche, *Nassauvia macracantha* DC. var. *spicata* (J. Remy) Hauman, *Nassauvia spicata* J. Remy, *Nassauvia spinosa* Phil., *Nassauvia suaveolens* D. Don, hom. illeg.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU.
Rango altitudinal: 2700-4000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Nassauvia darwinii (Hook. & Arn.) O. Hoffm. & Dusén
Sinónimos: *Nassauvia candollei* Macloskie, *Nassauvia darwinii* (Hook. & Arn.) O. Hoffm. & Dusén var. *laxa* (Phil.) Skottsb., *Nassauvia lagascae* (DC.) Reiche, hom. illeg., *Nassauvia laxa* (Phil.) Speg., *Panargyrum darwinii* Hook. & Arn., *Panargyrum lagascae* DC., *Panargyrum laxum* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-1000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Nassauvia dentata Griseb.
Sinónimos: *Nassauvia cespitosa* Wedd., *Nassauvia patula* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: RME, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 1200-2100 m.
Países limítrofes: Argentina.

Nassauvia digitata Wedd.
Sinónimos: *Nassauvia lycopodioides* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAU, NUB, BIO.
Rango altitudinal: 2000-2500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Nassauvia dusenii O. Hoffm.

Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-1000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Nassauvia glomerata (D. Don) Wedd.
Sinónimos: *Panargyrum densifolium* Phil., *Panargyrum glomeratum* D. Don
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: RME, LBO, MAU, BIO.
Rango altitudinal: 2500-3500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Nassauvia glomerulosa (Lag. ex Lindl.) D. Don
Sinónimos: *Nassauvia glomerulosa* (Lag. ex Lindl.) D. Don fma. *struthionum* (Phil.) Skottsb., *Nassauvia struthionum* (Phil.) Speg., *Strongyloma glomerulosum* (Lag. ex Lindl.) DC., *Strongyloma struthionum* Phil., *Triptilion glomerulosum* Lag. ex Lindl., *Nassauvia maeiae* Cabrera
Arbusto. Nativo.
Distribución: RME, MAG.
Rango altitudinal: 0-1500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Nassauvia lagascae (D. Don) F. Meigen var. *globosa* Skottsb.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAG.
Rango altitudinal: 700-1300 m.
Países limítrofes: Argentina.

Nassauvia lagascae (D. Don) F. Meigen var. *lagascae*
Sinónimos: *Caloptilium lagascae* (D. Don) Hook. & Arn., *Nassauvia lanata* Reiche, *Portalesia procumbens* Meyen, *Sphaerocephalus lagascae* D. Don
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, ARA, LRI, MAG.
Rango altitudinal: 700-4300 m.
Países limítrofes: Argentina.

Nassauvia lagascae (D. Don) F. Meigen var. *lanata* (Phil.) Skottsb.
Sinónimos: *Caloptilium lagascae* (D. Don) Hook. & Arn. var. *lanata* Phil., *Nassauvia humilis* Phil., *Nassauvia*

lanata Reiche var. *lanigera* (Phil.) Reiche, *Nassauvia lanigera* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 150-2250 m.
Países limítrofes: Argentina.

Nassauvia latissima Skottsb.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAG.
Rango altitudinal: 0-500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Nassauvia looseri Cabrera
Sinónimos: *Panargyrum heterophyllum* Phil.,
Panargyrum acerosum Phil., *Nassauvia heterophylla* (Phil.) Reiche
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: RME.
Rango altitudinal: 2500-3000 m.

Nassauvia magellanica J.F. Gmel.
Sinónimos: *Nassauvia suaveolens* Willd.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAG.
Rango altitudinal: 0-1000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Nassauvia pinnigera D. Don
Sinónimos: *Nassauvia multiflora* Meyen
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU.
Rango altitudinal: 3000-4000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Nassauvia pulcherrima Cabrera
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: LRI.
Rango altitudinal: 1800-2000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Nassauvia pygmaea (Cass.) Hook.f. var. *intermedia* (Phil.) Cabrera
Sinónimos: *Nassauvia intermedia* Phil., *Nassauvia pumila* Poepp. & Endl., *Nassauvia pumila* Poepp. & Endl. var. *intermedia* (Phil.) Reiche

Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: NUB, BIO, ARA, LLA.
Rango altitudinal: 1500-2000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Nassauvia pygmaea (Cass.) Hook.f. var. *pygmaea*
Sinónimos: *Nassauvia nordenskjoldii* O. Hoffm. ex Dusén, *Nassauvia pumila* Poepp. & Endl. var. *nordenskjoldii* (O. Hoffm. ex Dusén) Reiche, *Triachne pygmaea* Cass.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: VAL, NUB, BIO, ARA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-1000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Nassauvia pyramidalis Meyen
Sinónimos: *Nassauvia macracantha* DC. var. *pungens* (Phil.) Hauman, *Nassauvia pungens* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: RME, LBO, MAU, BIO.
Rango altitudinal: 2000-2700 m.
Países limítrofes: Argentina.

Nassauvia ramosissima DC.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: LBO, MAU, LRI, LLA.
Rango altitudinal: 600-2000 m.

Nassauvia revoluta D. Don
Sinónimos: *Nassauvia brevifolia* Phil., *Nassauvia nivalis* Poepp. ex Less., *Nassauvia nivalis* Poepp. & Endl. var. *brevifolia* (Phil.) Reiche, *Nassauvia nivalis* Poepp. & Endl. var. *sericea* Phil., *Nassauvia revoluta* D. Don var. *nivalis* (Poepp. ex Less.) Hosseus, *Nassauvia sericea* Phil.
Subarbusto. Nativo.
Distribución: RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 1000-4000 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Cadislao, calahuala.

Nassauvia sprengelioides DC.
Sinónimos: *Nassauvia araucana* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 2000-3000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Hierba de la culebra.

***Nassauvia uniflora* (D. Don) Hauman**

Sinónimos: *Nassauvia oligocephala* (DC.) Wedd., *Panargyrum oligocephalum* DC., *Panargyrum uniflorum* D. Don

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME.

Rango altitudinal: 2800-4000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Noticastrum

***Noticastrum adscendens* DC.**

Sinónimos: *Noticastrum pradense* (Phil.) Phil., *Aster adscendens* (DC.) Reiche, *Aster pradensis* Phil., *Diplopappus sericeus* Less. var. *glandulosa* Hook. & Arn., *Noticastrum glandulosum* Phil., *Noticastrum sanfurgi* Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

***Noticastrum antucense* Phil.**

Sinónimos: *Aster antucensis* (Phil.) Kuntze, *Aster erectus* (J. Remy) Kuntze var. *antucensis* (Phil.) Reiche

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 100-300 m.

***Noticastrum erectum* J. Remy**

Sinónimos: *Aster erectus* (J. Remy) Kuntze, *Aster erectus* (J. Remy) Reiche

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.

Rango altitudinal: 100-1000 m.

***Noticastrum eriophorum* J. Remy**

Sinónimos: *Aster eriophorus* (J. Remy) Kuntze, *Aster eriophorus* (J. Remy) Reiche, *Aster leucopappus* (Phil.) Reiche, *Leucopsis harveyi* Baker, *Leucopsis sericea* (Less.) Baker var. *eriophora* (J. Remy) Baker, *Noticastrum leucopappum* Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.

Rango altitudinal: 0-1300 m.

***Noticastrum sericeum* (Less.) Less. ex Phil.**

Sinónimos: *Aster albus* (Phil.) Reiche, comb. illeg., *Aster albus* (Phil.) Kuntze, *Aster haplopappus* (J. Remy) Kuntze, comb. illeg., *Aster haplopappus* (J. Remy) Reiche, *Aster marginatus* Kunth var. *tomentosus* Wedd., *Aster nitens* Kuntze, *Aster notosericeus* Griseb., *Aster sericeus* (Less.) Nees, *Diplopappus sericeus* Less., *Noticastrum philippii* Sch. Bip., nom. nud., *Haplopappus sericeus* (Less.) DC., *Leucopsis sericea* (Less.) Baker, *Noticastrum album* Phil., *Noticastrum haplopappus* J. Remy, nom. illeg.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.

Rango altitudinal: 0-1500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Notopappus

***Notopappus andinus* (Phil.) Klingeb.**

Sinónimos: *Grindelia andina* (Phil.) Phil., *Chrysophthalmum andinum* Phil., *Helianthus australis* Phil.

Subarbusto. Endémico.

Distribución: MAU.

Rango altitudinal: 2200 m.

***Notopappus chryseus* (Kuntze) Klingeb. var.**

***discoides* Tortosa & A. Bartoli**

Sinónimos: *Aster chryseus* Kuntze, *Haplopappus chrysocephalus* Reiche, *Haplopappus chryseus* (Kuntze) Cabrera, *Pyrrocoma aurea* Phil., *Grindelia prunelloides* (Poepp. ex Less.) A. Bartoli & Tortosa var. *discoides* Tortosa & A. Bartoli

Subarbusto. Nativo.

Distribución: MAU.

Rango altitudinal: 2300-2700 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Notopappus pectinatus* (Phil.) Klingeb.**

Sinónimos: *Aster anethifolius* (Phil.) Kuntze, *Grindelia anethifolia* (Phil.) A. Bartoli & Tortosa, *Aster pectinatus* (Phil.) Kuntze, *Diplopappus pinnatifidus* Hook. & Arn., hom. illeg., *Haplopappus anethifolius* Phil., *Haplopappus moyanoi* Speg., *Haplopappus pectinatus* Phil. var. *anethifolius* (Phil.) Reiche, *Haplopappus pectinatus* Phil., *Haplopappus araucanus* Phil.

Arbusto. Nativo.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 500-1000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Notopappus prunelloides (Poepp. ex Less.)
Klingeb.
Sinónimos: *Aster prunelloides* (Poepp. ex Less.) Kuntze,
Haplopappus prunelloides (Poepp. ex Less.) DC.,
Diplopappus prunelloides Poepp. ex Less., *Haplopappus prunelloides* (Poepp. ex Less.) DC. var. *sphaerocephalus* Reiche, *Grindelia prunelloides* (Poepp. ex Less.) A. Bartoli & Tortosa, *Haplopappus bellidifolius* Phil. var. *brachylepis* (Phil.) Reiche, *Haplopappus brachylepis* Phil.
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa.
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.
Rango altitudinal: 500-1700 m.
Países limítrofes: Argentina.

Ocyroe

Ocyroe armata (Wedd.) Bonifacino
Sinónimos: *Dolichogyne armata* Wedd., *Ocyroe spinosa* Phil., *Nardophyllum armatum* (Wedd.) Reiche
Arbusto. Nativo.
Distribución: ANT.
Rango altitudinal: 2800-4600 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Onopordum

Onopordum acanthium L.
Hierba. Bienal. Introducida.
Distribución: RME, ARA.

Ophryosporus

Ophryosporus anomalus R.M. King & H. Rob.
Sinónimos: *Piqueria cumingii* B.L. Rob., hom. illeg.
Arbusto. Nativo.
Distribución: TAR, ANT.
Rango altitudinal: 0-200 m.
Países limítrofes: Perú.

Ophryosporus floribundus (DC.) R.M. King & H. Rob.
Sinónimos: *Piqueria floribunda* DC.
Arbusto. Nativo.

Distribución: AYP, TAR, ANT.
Países limítrofes: Perú.

Ophryosporus heptanthus (Sch.Bip. ex Wedd.) R.M. King & H. Rob.
Sinónimos: *Eupatorium heptanthus* (Sch.Bip. ex Baker) R.M. King & H. Rob., *Ophryosporus origanoides* (Meyen & Walp.) Hieron., *Eupatorium origanoides* Meyen & Walp.
Arbusto. Nativo.
Distribución: AYP, TAR.
Rango altitudinal: 2800-3320 m.
Países limítrofes: Bolivia y Perú.

Ophryosporus hoppii (B.L. Rob.) R.M. King & H. Rob.
Sinónimos: *Trychionolepis hoppii* B.L. Rob.
Arbusto. Nativo.
Distribución: AYP, TAR, ANT.
Rango altitudinal: 300-3200 m.
Países limítrofes: Perú.

Ophryosporus johnstonii B.L. Rob.
Arbusto. Endémico.
Distribución: ATA.
Rango altitudinal: 1200-1300 m.

Ophryosporus paradoxus (Hook. & Arn.) Benth. & Hook. ex B.D. Jacks.
Sinónimos: *Eupatorium paradoxus* Hook. & Arn.
Arbusto. Endémico.
Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME.
Rango altitudinal: 0-1800 m.

Ophryosporus pinifolius (Phil.) R.M. King & H. Rob.
Sinónimos: *Stevia pinifolia* Phil., *Piqueria pinifolia* (Phil.) Hieron. ex B.L. Rob.
Arbusto. Nativo.
Distribución: AYP, TAR, ANT.
Rango altitudinal: 3000-3500 m.
Países limítrofes: Perú.
Nombre vulgar: Sapama.

Ophryosporus triangularis Meyen
Sinónimos: *Eupatorium foliolosum* DC., *Ophryosporus foliolosus* (DC.) Reiche

Arbusto. Endémico.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-3400 m.

Nombre vulgar: Rabo de zorro.

Oriastrum

Oriastrum acerosum (J. Remy) Phil. var. *acerosum*

Sinónimos: *Chaetanthera acerosa* (J. Remy) Benth. & Hook.f. ex Griseb. var. *acerosa*, *Chaetanthera pallida* (Phil.) Hauman, *Egania acerosa* J. Remy, *Egania pallida* Phil., *Oriastrum incanum* Phil., *Oriastrum parviflorum* Phil., *Oriastrum uncinatum* Phil., *Oriastrum pallidum* (Phil.) Phil., *Oriastrum pusillum* Poepp. & Endl. var. *uncinatum* (Phil.) Reiche

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME.

Rango altitudinal: 2800-4000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Oriastrum acerosum (J. Remy) Phil. var. *dasyacarpum* Cabrera

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ.

Rango altitudinal: 3600-4000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Oriastrum achenohirsutum (Tombesi) A.M.R. Davies

Sinónimos: *Chaetanthera pulvinata* (Phil.) Hauman var. *acheno-hirsutum* Tombesi, *Chaetanthera acheno-hirsuta* (Tombesi) M.T.K. Arroyo, A.M.R. Davies & Till-Bottraud

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: ATA.

Rango altitudinal: 3900-4100 m.

Países limítrofes: Argentina.

Oriastrum apiculatum (J. Remy) A.M.R. Davies

Sinónimos: *Chaetanthera apiculata* (J. Remy) F. Meigen, *Chaetanthera lanigera* Phil., *Egania apiculata* J. Remy, *Oriastrum albicaule* Phil. var. *albicaule*, *Oriastrum albicaule* Phil. var. *nivale* (Phil.) Reiche, *Oriastrum nivale* Phil.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB.

Rango altitudinal: 3000-3300 m.

Países limítrofes: Argentina.

Oriastrum chilense (J. Remy) Wedd.

Sinónimos: *Aldunantea chilensis* J. Remy, *Chaetanthera pusilla* (D. Don) Hook. & Arn., *Oriastrum pusillum* Reiche, hom. illeg. var. *uncinatum* Reiche, *Tylloma pusillum* D. Don, *Oriastrum pusillum* Reiche, hom. illeg. Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: COQ, RME.

Rango altitudinal: 2100-3800 m.

Países limítrofes: Argentina.

Oriastrum dioicum (J. Remy) Phil.

Sinónimos: *Chaetanthera dioica* (J. Remy) B.L. Rob., *Egania dioica* J. Remy

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: ANT, COQ, RME.

Rango altitudinal: 3000-5000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Oriastrum gnaphaliooides (J. Remy) Wedd.

Sinónimos: *Aldunantea gnaphaliooides* J. Remy, *Chaetanthera gnaphaliooides* (J. Remy) I.M. Johnst., *Chondrochilus parvifolius* Phil., *Oriastrum albiflorum* (Phil.) Reiche, *Oriastrum leucocephalum* Phil., *Tylloma albiflorum* Phil.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME.

Rango altitudinal: 3000-4000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Oriastrum lycopodioides (J. Remy) Wedd.

Sinónimos: *Aldunantea lycopodioides* J. Remy, *Chaetanthera lycopodioides* (J. Remy) Cabrera, *Oriastrum gayi* Phil., *Oriastrum glabriuscum* Phil., *Oriastrum lycopodioides* (J. Remy) Wedd. var. *glabriuscum* (Phil.) Reiche

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, LBO.

Rango altitudinal: 3000-3900 m.

Países limítrofes: Argentina.

Oriastrum minutum (Phil.) Nicola, S.E. Freire & Ariza

Sinónimos: *Chaetanthera minuta* (Phil.) Cabrera, *Oriastrum gossypinum* Phil., *Tylloma minutum* Phil., *Tylloma gnaphaliooides* Phil.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL.
Rango altitudinal: 3000-4000 m.
Países limítrofes: Argentina.

***Oriastrum pentacaenoides* Phil.**

Sinónimos: *Chaetanthera pentacaenoides* (Phil.)
Hauman
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: VAL, RME.
Rango altitudinal: 2850-3600 m.
Países limítrofes: Argentina.

Oriastrum pulvinatum* Phil. var. *polymallum

(Phil.) Hicken
Sinónimos: *Chaetanthera pulvinata* (Phil.) Hauman var.
polymalla (Phil.) Hicken, *Chaetanthera acerosa* auct.
non (J. Remy) Bonpl. & Humb., *Oriastrum polymallum*
Phil., *Oriastrum tontalensis* A.M.R. Davies
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: TAR, COQ.
Rango altitudinal: 3000-4600 m.
Países limítrofes: Argentina.

Oriastrum pulvinatum* Phil. var. *pulvinatum

Sinónimos: *Chaetanthera pulvinata* (Phil.) Hauman var.
pulvinata
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ.
Rango altitudinal: 2800-4500 m.
Países limítrofes: Argentina.

***Oriastrum pusillum* Poepp. & Endl.**

Sinónimos: *Chaetanthera planiseta* Cabrera
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: COQ, VAL, RME.
Rango altitudinal: 2300-3400 m.

***Oriastrum revolutum* (Phil.) A.M.R. Davies**

Sinónimos: *Chaetanthera revoluta* (Phil.) Cabrera,
Egania appressa Phil., *Egania revoluta* Phil., *Oriastrum dioicum* (J. Remy) Phil. var. *revolutum* (Phil.) Reiche
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA.
Rango altitudinal: 3500-4600 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.
Nombre vulgar: Keúche, tieuchi, comida de perdiz.

***Oriastrum sphaeroidale* Reiche**

Sinónimos: *Chaetanthera sphaeroidalis* (Reiche)
Hicken, *Chaetanthera pulvinata* (Phil.) Hauman var.
acuminati-bracteata Hauman
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: ANT, ATA, COQ.
Rango altitudinal: 3200-5000 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Flor de la puna.

***Oriastrum stuebelii* (Hieron.) A.M.R. Davies**

Sinónimos: *Chaetanthera stuebelii* Hieron.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: TAR, ANT.
Rango altitudinal: 4320 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Oriastrum tarapacensis* A.M.R. Davies**

Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: AYP, TAR.
Rango altitudinal: 4100-4600 m.

***Oriastrum werdermannii* A.M.R. Davies**

Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: COQ.
Rango altitudinal: 0-1000 m.

Oxyphyllum

***Oxyphyllum ulicinum* Phil.**

Arbusto. Endémico.
Distribución: ANT, ATA.
Rango altitudinal: 20-1300 m.

Pachylaena

***Pachylaena atriplicifolia* D. Don ex Hook. & Arn.**

Sinónimos: *Chionoptera gayophyta* DC., *Pachylaena gayophyta* (DC.) Hieron., *Pachylaena rosea* I.M. Johnst.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU.
Rango altitudinal: 1400-4000 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Oreja de chancho, hierba santa.

Parastrepbia

Parastrepia lepidophylla (Wedd.) Cabrera
Sinónimos: *Parastrepia lepidophylla* (Wedd.) Cabrera, *Dolichogyne lepidophylla* Wedd., *Lepidophyllum tola* Cabrera, nom. illeg.
Arbusto. Nativo.
Distribución: AYP, TAR, ANT.
Rango altitudinal: 3500-4500 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.
Nombre vulgar: Tola vaca, tola, sipu, chijarwaya, pulika, tola amarga, qiroqiro.

Parastrepia lucida (Meyen) Cabrera
Sinónimos: *Baccharis lucida* Meyen, *Dolichogyne glabra* Phil., *Polycladus abietinus* Phil., *Lepidophyllum abietinum* (Phil.) Reiche, *Lepidophyllum lucidum* (Meyen) Cabrera
Arbusto. Nativo.
Distribución: AYP, TAR, ANT.
Rango altitudinal: 2900-5000 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.
Nombre vulgar: Tola del rio, tola de agua, umatola, tola amarga, unutola.

Parastrepia quadrangularis (Meyen) Cabrera
Sinónimos: *Baccharis quadrangularis* Meyen, *Polycladus cupressinus* Phil., *Lepidophyllum cupressinum* (Phil.) Kuntze, *Lepidophyllum meyenii* A. Gray, nom. illeg., *Lepidophyllum quadrangulare* (Meyen) Benth. & Hook.
Arbusto. Nativo.
Distribución: AYP, TAR, ANT.
Rango altitudinal: 3000-4700 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.
Nombre vulgar: Chacha, coba, pulika, tola amarilla.

Parastrepia teretiuscula (Kuntze) Cabrera
Sinónimos: *Lepidophyllum teretiusculum* Kuntze
Arbusto. Nativo.
Distribución: TAR, ANT.
Rango altitudinal: 3200-4200 m.
Países limítrofes: Bolivia.
Nombre vulgar: Chacha, coba, pulika, tola amarilla, kobatola.

Pascalia

Pascalia glauca Ortega

Sinónimos: *Wedelia glauca* (Ortega) O. Hoffm. ex Hicken, *Helianthus copiapinus* Phil., *Wedelia copiapina* (Phil.) Reiche, *Wedelia glauca* (Ortega) S.F. Blake, comb. illeg.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ATA.
Rango altitudinal: 0-2000 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.
Nombre vulgar: Sunchillo, huilmo, huilmo copiapino.

Perezia

Perezia atacamensis (Phil.) Reiche
Sinónimos: *Clarionea atacamensis* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ.
Rango altitudinal: 3500-5000 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Marancel, aycha-aycha.

Perezia calophylla (Phil.) Reiche
Sinónimos: *Homoeanthus calophyllus* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: LLA.
Rango altitudinal: 1500-2000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Perezia capito (Phil.) Reiche
Sinónimos: *Homoeanthus capito* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO.
Rango altitudinal: 1500-2600 m.
Países limítrofes: Argentina.

Perezia carthamoides (D. Don) Hook. & Arn.
Sinónimos: *Clarionea carthamoides* D. Don var. *crispa* (Meyen) Phil., *Clarionea multicapitata* J. Remy, *Clarionea spectabilis* Phil., *Clarionea carthamoides* D. Don, *Perezia diversifolia* Meyen, *Perezia diversifolia* Meyen var. *crispa* Meyen, *Perezia multicapitata* (J. Remy) Wedd.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU.
Rango altitudinal: 1800-3800 m.
Países limítrofes: Argentina.

Perezia ciliosa (Phil.) Reiche

Sinónimos: *Clarionea ciliosa* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT.

Rango altitudinal: 2500-3000 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Maransel hembra.

***Perezia delicata* Vuilleum.**

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: LLA.

Rango altitudinal: 1550 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Perezia fonkii* (Phil.) Reiche**

Sinónimos: *Clarionea affinis* Phil., *Clarionea fonkii* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: NUB, BIO, ARA, LRI.

Rango altitudinal: 1000-2000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Perezia lactucoides* (Vahl) Less.**

Sinónimos: *Perezia lactucoides* (Vahl) Less. subsp. *palustris* (Phil.) Vuilleum., *Aster magellanicus* Lam., *Chaetanthera magellanica* (Lam.) Spreng., *Clarionea lactucoides* (Vahl) D. Don, *Perdicium lactucoides* Vahl, *Homoianthus magellanicus* (Lam.) DC., *Homoianthus palustris* Phil., *Perezia palustris* (Phil.) Reiche, *Homoianthus magellanicus* (Lam.) DC. var. *lactucoides* (Vahl) Hook., *Perdicium laevigatum* Banks & Sol. ex Hook.f., nom. nud.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-1600 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Perezia linearis* Less.**

Sinónimos: *Homoeanthus rigidus* Phil., *Homoianthus linearis* (Less.) DC.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 600-1600 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Perezia lyrata* (J. Remy) Wedd.**

Sinónimos: *Clarionea pinnata* Phil., *Homoianthus gayanus* J. Remy, *Homoianthus lyratus* J. Remy, *Perezia pinnata* (Phil.) Reiche

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.

Rango altitudinal: 1500-2000 m.

***Perezia magellanica* (L.f.) Lag.**

Sinónimos: *Clarionea elegans* Phil., *Clarionea magellanica* (L.f.) Lag. ex DC., *Perdicium magellanicum* L.f., *Perezia lagascae* Cass., nom. illeg., *Perezia magellanica* (L.f.) Less., comb. illeg., *Perezia elegans* (Phil.) Albov, *Perdicium sinuatum* Banks & Sol. ex Hook.f., nom. nud.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 200-1400 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Perezia megalantha* Speg.**

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 1200-0 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Perezia multiflora* (Humb. & Bonpl.) Less.**

Sinónimos: *Chaetanthera multiflora* Humb. & Bonpl., *Homanthis multiflorus* (Humb. & Bonpl.) Kunth, *Homoianthus multiflorus* (Humb. & Bonpl.) DC.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP.

Rango altitudinal: 1100-4900 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Perezia nutans* Less.**

Sinónimos: *Perezia gayana* DC., *Perezia perfoliata* J. Remy, *Calorezia nutans* (Less.) Panero, *Perdicium nutans* Poepp. ex Less., nom. nud.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 1000-2500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Perezia pedicularidifolia* Less.**

Sinónimos: *Clarionea comosa* Phil., *Clarionea laciniata* Phil., *Clarionea parvifolia* Phil., *Clarionea variabilis* Phil., *Clarionea volckmanii* Phil., *Clarionea humilis* Phil., *Perezia laciniata* (Phil.) Reiche, *Perezia laciniata* (Phil.) Reiche var. *comosa* (Phil.) Reiche, *Homoeanthus variabilis* Phil., *Perezia pedicularidifolia* Less. var.

humilis (Phil.) Reiche, *Perezia pedicularidifolia* Less. var. *parvifolia* (Phil.) Reiche, *Perezia variabilis* (Phil.) Reiche, *Perdicium pedicularidifolium* Poepp. ex Less., nom. nud.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 1000-2200 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Perezia pilifera* (D. Don) Hook. & Arn.**

Sinónimos: *Clarionea lechleri* Sch. Bip., *Clarionea pilifera* D. Don, *Homoeanthus humilis* Phil., *Perezia linearis* Less. var. *humilis* (Phil.) Reiche, *Perezia lechleri* (Sch. Bip.) De Wild.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 1500-4300 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Perezia pinnatifida* (Humb. & Bonpl.) Wedd.**

Sinónimos: *Chaetanthera pinnatifida* Humb. & Bonpl.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: TAR.

Rango altitudinal: 3300-5000 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Perezia poeppigii* Less.**

Sinónimos: *Clarionea caulescens* Phil., *Clarionea nana* Phil., *Clarionia virens* D. Don, *Clarionema virens* (D. Don) Phil. var. *humilis* Phil., *Homoeanthus remyanus* Phil., *Homoeanthus brevicaulis* Phil., *Homoianthus pristiphyllus* J. Remy, *Perezia pristiphyla* (J. Remy) Wedd., *Perezia virens* (D. Don) Hook. & Arn., *Homoianthus brevicaulis* Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 1200-2900 m.

***Perezia prenanthoides* Less.**

Sinónimos: *Perezia brachylepis* Phil., *Calorezia prenanthoides* (Less.) Panero

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: NUB, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 1200-2000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Estrella de los Andes.

***Perezia pungens* (Humb. & Bonpl.) Less.**

Sinónimos: *Perezia ciliaris* D. Don ex Hook. & Arn., *Clarionea ciliaris* (D. Don ex Hook. & Arn.) DC., *Chaetanthera pungens* Humb. & Bonpl., *Homoeanthus pungens* (Humb. & Bonpl.) Spreng., *Homanthis pungens* (Humb. & Bonpl.) Kunth, *Clarionia pungens* (Humb. & Bonpl.) D. Don

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: TAR, ANT, ATA.

Rango altitudinal: 2000-5000 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Maransel, waji.

Perezia recurvata* (Vahl) Less. subsp. *beckii

(Hook. & Arn.) Cabrera

Sinónimos: *Perezia beckii* Hook. & Arn., *Homoeanthus pectinatus* Phil., *Perezia pectinata* (Phil.) Reiche

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 1900-2200 m.

Países limítrofes: Argentina.

Perezia recurvata* (Vahl) Less. subsp. *recurvata

Sinónimos: *Chaetanthera recurvata* (Vahl) Spreng.,

Clarionea recurvata (Vahl) D. Don, *Perdicium recurvatum* Vahl, *Perezia doniana* Less., *Homoianthus donianus* (Less.) J. Remy, *Homoianthus inermis* Meyen & Walp., nom. illeg., *Perezia reflexa* Meyen, *Clarionia recurvata* (Vahl) D. Don, *Clarionea reflexa* (Meyen) Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-3000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Perezia recurvata* (Vahl) Less. subsp. *triceps

(Phil.) Cabrera

Sinónimos: *Homoeanthus triceps* Phil., *Perezia triceps* (Phil.) Reiche

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ARA.

Rango altitudinal: 1150-1200 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Perezia spathulata* (Lag. ex D. Don) Hook. & Arn.**

Sinónimos: *Clarionea spathulata* Lag. ex D. Don,
Perezia viscosa Poepp. ex Less., *Homoianthus viscosus*
(Poepp. ex Less.) DC., *Perdicium viscosum* Poepp. ex
Less., nom. nud., *Homoianthus germaini* Phil. ex
Reiche, nom. nud.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: BIO, ARA, LRI.
Rango altitudinal: 100-1200 m.
Países limítrofes: Argentina.

Perityle

Perityle emoryi Torr.

Sinónimos: *Closia cotula* J. Remy var. *elata* (Phil.)
Reiche, *Closia discoidea* Phil., *Closia elata* Phil.,
Laphamia emoryi (Torr.) Benth. & Hook.f. ex Jacks.,
Perityle discoidea (Phil.) I.M. Johnst., *Perityle emoryi*
Torr. var. *elata* (Phil.) I.M. Johnst., *Closia anthemoides*
Phil., *Closia brachypetala* Phil., *Closia chilensis* Regel
& Körn., *Closia cotula* J. Remy, *Closia digitata* Phil.,
Closia elata Phil. var. *nana* Phil., *Closia foliosa* Phil.,
Closia pusilla Phil., *Closia viridis* Phil., *Closia villosa*
Phil.
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ.
Rango altitudinal: 0-3600 m.
Países limítrofes: Perú.

Picradeniopsis

Picradeniopsis multiflora (Hook. & Arn.) B.G. Baldwin
Sinónimos: *Bahia gilliesii* A. Gray, *Rothia intermedia*
Kuntze, *Rothia pusilla* (Wedd.) Kuntze, *Schkuhria*
multiflora Hook. & Arn.
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT.
Rango altitudinal: 500-4500 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.
Nombre vulgar: Soiko de cabra, pasto de campo,
manzanillón.

Picris

Picris echioides L.
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: AYP, ATA, COQ, VAL, RME, LBO,
MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, IPA.

Picrosia

Picrosia longifolia D. Don

Sinónimos: *Picrosia australis* Decne., *Psilopogon*
albiflorus Phil., *Tragopogon fritillarioides* Less.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: TAR, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 0-1000 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Plazia

Plazia cheiranthifolia (J. Remy) Wedd.

Sinónimos: *Aglaodendron cheiranthifolium* J. Remy
Arbusto. Nativo.
Distribución: COQ.
Rango altitudinal: 2600-2800 m.

Plazia daphnoides Wedd.

Arbusto. Nativo.
Distribución: AYP.
Rango altitudinal: 2600-4400 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.
Nombre vulgar: Chinchirkuma, koya macho, chajilla.

Pleocarphus

Pleocarphus revolutus D. Don

Sinónimos: *Jungia dentata* (D. Don) Reiche, *Jungia*
revoluta (D. Don) Reiche, *Jungia revoluta* (D. Don)
Reiche var. *dentata* (Phil.) Reiche, *Pleocarphus dentatus*
Phil.
Arbusto. Endémico.
Distribución: ATA, COQ, VAL.
Rango altitudinal: 0-3000 m.
Nombre vulgar: Cola de ratón.

Pluchea

Pluchea chingoyo (Kunth) DC.

Sinónimos: *Conyza chingoyo* Kunth
Arbusto. Nativo.
Distribución: AYP, TAR, ANT.
Rango altitudinal: 1000-2500 m.
Países limítrofes: Perú.

Nombre vulgar: Chilca, chingoyo.

Podanthus

***Podanthus mitiqui* Lindl.**

Sinónimos: *Euxenia mitiqui* DC.

Arbusto. Endémico.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB.

Rango altitudinal: 0-2000 m.

Nombre vulgar: Mitique, mitriu.

***Podanthus ovatifolius* Lag.**

Arbusto. Endémico.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 0-800 m.

Nombre vulgar: Mitique, palo negro.

Polyachyrus

***Polyachyrus annuus* I.M. Johnst.**

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-700 m.

Países limítrofes: Perú.

***Polyachyrus carduoides* Phil.**

Sinónimos: *Polyachyrus foliosus* Phil., *Polyachyrus glabratus* Phil., *Polyachyrus latifolius* Phil., *Polyachyrus rigidus* I.M. Johnst.

Subarbusto. Endémico.

Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ, VAL.

Rango altitudinal: 800-3000 m.

Nombre vulgar: Renguilla, borbón de alforja, hediondilla, sokasoka.

***Polyachyrus cinereus* Ricardi & Weldt**

Subarbusto. Endémico.

Distribución: ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-800 m.

***Polyachyrus fuscus* (Meyen) Walp.**

Sinónimos: *Polyachyrus fuscus* (Meyen) Walp. var. *roseus* (Phil.) Reiche, *Polyachyrus roseus* Phil.,

Diaphoranthus fuscus Meyen

Subarbusto. Nativo.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL.

Rango altitudinal: 0-800 m.

Países limítrofes: Perú.

***Polyachyrus gayi* J. Remy**

Subarbusto. Endémico.

Distribución: ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-500 m.

***Polyachyrus poeppigii* Kuntze ex Less. subsp.**

***multifidus* (D. Don) Ricardi & Weldt**

Sinónimos: *Polyachyrus multifidus* D. Don, *Polyachyrus sanromani* Phil., *Polyachyrus selinoides* Reiche

Subarbusto. Endémico.

Distribución: ANT, ATA.

Rango altitudinal: 0-500 m.

***Polyachyrus poeppigii* Kuntze ex Less. subsp.**

poeppigii

Sinónimos: *Polyachyrus calderensis* Phil., *Polyachyrus decurrens* Lag. ex DC., *Polyachyrus litoralis* Phil., *Polyachyrus macrotis* Phil., *Polyachyrus poeppigii* Kuntze ex Less. var. *litoralis* (Phil.) Reiche, *Polyachyrus tenuifolius* Phil., *Polyachyrus virgatus* I.M. Johnst. Subarbusto. Nativo.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Países limítrofes: Bolivia.

***Polyachyrus sphaerocephalus* D. Don**

Sinónimos: *Polyachyrus bridgesii* Poepp. & Endl., *Polyachyrus tarapacanus* Phil.

Subarbusto. Nativo.

Distribución: AYP, TAR, ANT.

Rango altitudinal: 0-4000 m.

Países limítrofes: Perú.

Nombre vulgar: Sokasoka.

Porophyllum

***Porophyllum ruderale* (Jacq.) Cass.**

Sinónimos: *Cacalia glandulosa* Salisb., nom. illeg., *Cacalia porophyllum* L., *Cacalia ruderale* (Jacq.) Sw., *Kleinia porophyllum* (L.) Willd., *Kleinia ruderale* Jacq., *Porophyllum ellipticum* Cass., *Porophyllum ellipticum* Cass. var. *genuinum* Urb., nom. illeg., *Porophyllum ellipticum* Cass. var. *intermedium* DC., *Porophyllum ellipticum* Cass. var. *ruderale* (Jacq.) Urb., *Porophyllum*

latifolium Benth., *Porophyllum macrolepidium* Malme, *Porophyllum porophyllum* (L.) Kuntze, comb. illeg., *Porophyllum ruderale* (Jacq.) Cass. var. *angustifolium* Hassl., *Porophyllum ruderale* (Jacq.) Cass. var. *ellipticum* (Cass.) A. Gray ex B.L. Rob., *Porophyllum ruderale* (Jacq.) Cass. var. *glandulosum* Chodat & Hassl., *Porophyllum ruderale* (Jacq.) Cass. var. *macrolepidium* (Malme) Chodat & Hassl., *Porophyllum ruderale* (Jacq.) Cass. fma. *suffruticosum* Chodat & Hassl., *Tagetes integrifolia* Muschl.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ANT.
Rango altitudinal: 0-2500 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Proustia

Proustia cuneifolia D. Don subsp. *cinerea* (Phil.) Luebert
Sinónimos: *Proustia cinerea* Phil., *Proustia cuneifolia* D. Don fma. *cinerea* (Phil.) Fabris
Arbusto. Endémico.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, MAU.
Rango altitudinal: 300-1200 m.

Proustia cuneifolia D. Don subsp. *cuneifolia*
Sinónimos: *Proustia pungens* Poepp. ex Less., *Proustia pungens* Poepp. ex Less. var. *heterophylla* Kuntze, *Proustia cuneifolia* D. Don var. *integrifolia* Hook. & Arn., *Proustia cuneifolia* D. Don var. *spinulosa* Hook. & Arn., *Proustia pungens* Poepp. ex Less. var. *cuneifolia* (D. Don) Wedd., *Proustia cuneifolia* D. Don fma. *cuneifolia*
Arbusto. Nativo.
Distribución: TAR, ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO.
Rango altitudinal: 2000-3500 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.
Nombre vulgar: Huañil, pucana, tipia, palo de yegua.

Proustia cuneifolia D. Don subsp. *tipia* (Phil.) Luebert
Sinónimos: *Proustia tipia* Phil., *Proustia cuneifolia* D. Don fma. *tipia* (Phil.) Fabris
Arbusto. Endémico.
Distribución: TAR, ANT.
Rango altitudinal: 0-700 m.
Nombre vulgar: Tipia.

***Proustia pyrifolia* DC.**

Sinónimos: *Proustia pyrifolia* DC. var. *canescens* DC., *Proustia oblongifolia* D. Don, *Proustia glandulosa* DC., *Proustia pyrifolia* DC. fma. *glandulosa* (DC.) Fabris
Arbusto trepador. Endémico.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.
Rango altitudinal: 200-1200 m.
Nombre vulgar: Parrila blanca, tola blanca, voqui blanco.

Pseudognaphalium

***Pseudognaphalium aldunateoides* (J. Remy) C. Monti, Bayón & S.E. Freire**
Sinónimos: *Gnaphalium aldunateoides* J. Remy, *Gnaphalium diminutivum* Phil., *Gnaphalium perpusillum* Phil., *Gnaphalium phaeolepis* Phil., *Pseudognaphalium perpusillum* (Phil.) C. Monti, Bayón & S.E. Freire, *Gnaphalium insulare* Phil.
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, JFE.
Rango altitudinal: 500-3700 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nota: Introducida en el Archipiélago de Juan Fernández.

***Pseudognaphalium cabrerae* (S.E. Freire) S.E. Freire, Bayón, Baeza, Giuliano & C. Monti**
Sinónimos: *Gnaphalium philippii* Cabrera, hom. illeg., *Gnaphalium fastigiatum* Phil., hom. illeg., *Gnaphalium cabrerae* S.E. Freire, nom. illeg., *Pseudognaphalium cabrerae* (S.E. Freire) Deble, nom. illeg., *Pseudognaphalium fastigiatum* Bayón, nom. illeg., *Gnaphalium cabrerae* S.E. Freire
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: TAR, RME, MAU, ARA.
Rango altitudinal: 0-2000 m.
Países limítrofes: Argentina.

***Pseudognaphalium cheiranthifolium* (Lam.) Hilliard & B.L. Burtt**

Sinónimos: *Gnaphalium cheiranthifolium* Lam., *Gnaphalium acutifolium* Phil., *Gnaphalium araucanum* Phil., *Gnaphalium citrinum* Hook. & Arn., *Gnaphalium paniculatum* Bertero ex Colla, *Gnaphalium valdivianum*

Phil., *Gnaphalium cheiranthifolium* Lam. var. *paniculatum* (Bertero ex Colla) Skottsb.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE.
Rango altitudinal: 0-2500 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.
Nombre vulgar: Té de burro.
Nota: Introducida en el Archipiélago de Juan Fernández.

Pseudognaphalium cymatoides (Kunze ex DC.) Anderb.
Sinónimos: *Gnaphalium moelleri* Phil., *Gnaphalium canum* Phil., hom. illeg., *Pseudognaphalium moelleri* (Phil.) Anderb., *Gnaphalium ulophyllum* Hook. & Arn., *Gnaphalium cymatoides* Kunze ex DC. var. *glabrum* Walp., *Gnaphalium cymatoides* Kunze ex DC., *Gnaphalium cheiranthifolium* Bertero, hom. illeg.
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: AYP, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.
Rango altitudinal: 0-4000 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.
Nombre vulgar: Hierba de San Juan.

Pseudognaphalium gayanum (J. Remy) Anderb.
Sinónimos: *Gnaphalium heterophyllum* Phil., *Gnaphalium heterotrichum* Phil., *Gnaphalium leucocephalum* Phil., nom. illeg., *Gnaphalium pseudoherlichrysum* Reiche, *Gnaphalium gayanum* J. Remy, *Gnaphalium robustum* Phil., *Pseudognaphalium heterotrichum* (Phil.) Anderb., *Pseudognaphalium robustum* (Phil.) Anderb., *Hypelichrysum heterotrichum* (Phil.) Kirp.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-3500 m.

Pseudognaphalium lacteum (Meyen & Walp.) Anderb.
Sinónimos: *Gnaphalium lacteum* Meyen & Walp., *Gnaphalium argyrolepis* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT, COQ, BIO.
Rango altitudinal: 2500-4600 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.
Nombre vulgar: Viravira, viravira blanca.

Pseudognaphalium landbeckii (Phil.) Anderb.
Sinónimos: *Gnaphalium landbeckii* Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU.
Rango altitudinal: 0-1000 m.

Pseudognaphalium munoziae Bayón C. Monti & S.E. Freire
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: AYP.
Rango altitudinal: 3500-4200 m.

Pseudognaphalium psilophyllum (Meyen & Walp.) Anderb.
Sinónimos: *Gnaphalium glandulosum* Klatt, *Gnaphalium psilophyllum* Meyen & Walp., *Pseudognaphalium glandulosum* (Klatt) Anderb.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT, COQ, VAL, LBO, MAU, LLA.
Rango altitudinal: 800-4600 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.
Nombre vulgar: Viravira, chuncho viravira.

Pseudognaphalium remyanum (Phil.) Anderb.
Sinónimos: *Gnaphalium remyanum* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: RME.
Rango altitudinal: 500-1000 m.
Países limítrofes: Bolivia.

Pseudognaphalium tarapacanum (Phil.) Anderb.
Sinónimos: *Gnaphalium tarapacanum* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT, COQ, RME, MAU, NUB, BIO.
Rango altitudinal: 3000-4100 m.
Países limítrofes: Argentina.

Pseudognaphalium viravira (Molina) Anderb.
Sinónimos: *Gnaphalium andicola* Phil., *Gnaphalium pratense* Phil., *Gnaphalium longifolium* Phil., *Gnaphalium subnudum* Phil., *Pseudognaphalium pratense* (Phil.) Anderb., *Gnaphalium coquimbense* Phil., *Gnaphalium illapelinum* Phil. var. *illapelinum*, *Gnaphalium viravira* Molina, *Pseudognaphalium*

coquimbense (Phil.) Anderb., *Pseudognaphalium illapelinum* (Phil.) Anderb., *Gnaphalium viravira* Less., hom. illeg., *Pseudognaphalium andicola* (Phil.) C. Monti, Bayón & S.E. Freire
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-4000 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Hierba de la diuca, hierba de la vida, viravira.

Pseudogynoxys

***Pseudogynoxys cordifolia* (Cass.) Cabrera**
Sinónimos: *Pseudogynoxys volubilis* (Hook.) Cabrera, *Gynoxys cordifolia* Cass., *Senecio volubilis* Hook.
Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: AYP.
Rango altitudinal: 250 m.

Psilocarphus

***Psilocarphus brevissimus* Nutt.**
Sinónimos: *Psilocarphus globiferus* Nutt.
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 300-3000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Psilocarphus tenellus* Nutt. var. *globiferus
(Bertero ex DC.) Morefield
Sinónimos: *Benzanilla chilensis* J. Remy, *Micropus globiferus* Bertero ex DC., *Psilocarphus chilensis* (J. Remy) A. Gray, *Psilocarphus globiferus* (Bertero ex DC.) Speg., comb. illeg., *Psilocarphus berteri* I.M. Johnst., *Psilocarphus globiferus* (Bertero ex DC.) Speg. var. *minimus* Cabrera
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO.
Rango altitudinal: 0-1000 m.

Schkuhria

***Schkuhria pinnata* (Lam.) Kuntze ex Thell.**

Sinónimos: *Amblyopappus mendocina* Phil., *Schkuhria pinnata* (Lam.) Kuntze ex Thell. var. *abrotanoides* (Roth) Cabrera, *Schkuhria pinnata* (Lam.) Kuntze ex Thell. var. *octoaristata* (DC.) Cabrera, *Pectis pinnata* Lam., *Rothia pinnata* (Lam.) Kuntze, *Rothia pinnata* (Lam.) Kuntze ex Thell. var. *pallida* Kuntze, *Rothia pinnata* (Lam.) Kuntze ex Thell. var. *purpurascens* Kuntze, *Schkuhria abrotanoides* Roth, *Schkuhria abrotanoides* Roth var. *isopappa* (Benth.) Hieron., *Schkuhria abrotanoides* Roth var. *pomasquiensis* Hieron., *Schkuhria advena* Thell., *Schkuhria bonariensis* Hook. & Arn., *Schkuhria coquimbana* Phil., *Schkuhria isopappa* Benth., *Schkuhria octoaristata* DC., *Schkuhria pinnata* (Lam.) Kuntze ex Thell. var. *typica* Cabrera, nom. illeg.
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, COQ.
Rango altitudinal: 0-3000 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.
Nombre vulgar: Cachanalhuen cimarrón, canchalahua.

Scolymus

***Scolymus hispanicus* L.**
Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: VAL.

Senecio

***Senecio acanthifolius* Hombr. & Jacquinot**
Sinónimos: *Senecio acanthifolius* Hombr. & Jacquinot subsp. *virens* (Phil.) Cabrera & Zardini, *Senecio virens* Phil., *Iocenes acanthifolius* (Hombr. & Jacq.) Nord., *Iocenes acanthifolius* (Hombr. & Jacq.) Nord. subsp. *virens* (Phil.) B. Nord., *Senecio ombrophyllus* Skottsb.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: LRI, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 200-1200 m.
Países limítrofes: Argentina.

***Senecio adenophyllus* Meyen & Walp.**
Arbusto. Nativo.
Distribución: AYP, TAR, ANT.
Rango altitudinal: 4200-4800 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.
Nombre vulgar: Tola hedionda, hachakoma del burro, tola del burro.

***Senecio adenotrichius* DC.**

Sinónimos: *Adenotrichia amplexicaulis* Lindl.,
Heterolepis conyzoides Bertero ex DC.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ, VAL, RME.
Rango altitudinal: 300-1200 m.

***Senecio alcicornis* Hook. & Arn.**

Sinónimos: *Senecio chrysanthemoides* Phil.
Arbusto. Endémico.
Distribución: ATA, COQ.
Rango altitudinal: 0-900 m.

***Senecio algens* Wedd.**

Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT.
Rango altitudinal: 4200-5200 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Senecio alloeophyllus* O. Hoffm.**

Subarbusto. Nativo.
Distribución: MAG.
Rango altitudinal: 1300-1800 m.
Países limítrofes: Argentina.

***Senecio almeidae* Phil.**

Arbusto o subarbusto. Endémico.
Distribución: ANT, ATA, COQ.
Rango altitudinal: 0-1300 m.

***Senecio angulatus* L.f.**

Arbusto trepador. Introducido.
Distribución: TAR, COQ, VAL, RME, LBO, MAU.

***Senecio angustissimus* Phil.**

Sinónimos: *Senecio linariifolius* Poepp. ex DC. var.
angustissimus (Phil.) Speg., *Senecio nahuelbutanus* Phil.
Subarbusto. Nativo.
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 1700 m.
Países limítrofes: Argentina.

***Senecio anthemidiphyllus* J. Remy**

Sinónimos: *Senecio campanae* Phil., *Senecio hakeifolius*
Hook. & Arn. var. *viscidus* Hook. & Arn., *Senecio*
brachylepis Phil., *Senecio psammophilus* Phil., hom.
illeg.

Arbusto. Nativo.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO.
Rango altitudinal: 2700 m.
Países limítrofes: Argentina.

***Senecio antofagastanus* Cabrera**

Subarbusto. Endémico.
Distribución: ANT.
Rango altitudinal: 1000 m.

Senecio aquaticus* Hill. subsp. *aquaticus

Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: BIO, LLA.

Senecio aquaticus* Hill. subsp. *barbareifolius

(Wimm. & Grab.) Walters
Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: VAL, BIO, ARA, LRI, LLA.

***Senecio argyreus* Phil.**

Subarbusto. Nativo.
Distribución: BIO, ARA, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 1000-1800 m.
Países limítrofes: Argentina.

***Senecio aristianus* J. Remy**

Sinónimos: *Senecio guayanensis* Phil.
Subarbusto. Endémico.
Distribución: ATA, COQ, VAL.
Rango altitudinal: 0-300 m.

***Senecio arleguianus* J. Remy**

Arbusto. Endémico.
Distribución: COQ.
Rango altitudinal: 1200 m.

***Senecio arnicoides* Hook. & Arn.**

Sinónimos: *Senecio plantagineus* Bertero ex Colla, *Aster*
plantagineus Poepp. ex DC.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: VAL, RME, LBO, NUB, BIO, ARA, LRI.
Rango altitudinal: 800 m.

***Senecio arnottii* Hook.f.**

Sinónimos: *Senecio limbardioides* Hook. & Arn., hom.
illeg., *Senecio limbardioides* Hook. & Arn. var. *beta*

Hook. & Arn., *Senecio arnottii* Hook.f. var. *major*
Macloskie
Subarbusto. Nativo.
Distribución: LLA, MAG.
Rango altitudinal: 0-300 m.
Países limítrofes: Argentina.

Senecio aspericaulis J. Remy
Sinónimos: *Senecio hypsophilus* Phil.
Subarbusto. Nativo.
Distribución: MAU, NUB, BIO.
Rango altitudinal: 2400-2800 m.
Países limítrofes: Argentina.

Senecio atacamensis Phil.
Arbusto. Nativo.
Distribución: AYP, TAR, ANT.
Rango altitudinal: 3100 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Mukuraka, chachacoma blanca, cacho de cabra, chachacoma del burro.

Senecio baccharidifolius Poepp. ex DC.
Subarbusto. Nativo.
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.
Rango altitudinal: 1500-1600 m.
Países limítrofes: Argentina.

Senecio bahioides Hook. & Arn.
Sinónimos: *Senecio bahioides* Hook. & Arn. var. *glaber*
Hook. & Arn., *Senecio bahioides* Hook. & Arn. var. *lanosus* Hook. & Arn., *Senecio irregularis* Phil.
Arbusto. Endémico.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME.
Rango altitudinal: 0-1000 m.

Senecio balsamicus Phil.
Subarbusto. Endémico.
Distribución: ATA.
Rango altitudinal: 2700 m.

Senecio barbara Cabrera
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ANT.
Rango altitudinal: 4300-5000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Senecio barrosianus Cabrera
Subarbusto. Endémico.
Distribución: MAU.
Rango altitudinal: 200-500 m.

Senecio beaufilsii Kuntze
Subarbusto. Nativo.
Distribución: MAG.
Rango altitudinal: 1500-1900 m.
Países limítrofes: Argentina.

Senecio behnii Ricardi & Martic.
Subarbusto. Endémico.
Distribución: AYP, TAR.
Rango altitudinal: 3200-3300 m.
Nombre vulgar: Viravira.

Senecio benaventianus J. Remy
Subarbusto. Endémico.
Distribución: COQ.
Rango altitudinal: 200-2000 m.

Senecio bertero (DC.) Pelser
Sinónimos: *Robinsonia bertero* (DC.) Sanders, Stuessy & Martic., *Balbisia bertero* DC., *Vendredia berterii* (DC.) Baillon, *Rhetinodendron bertero* (DC.) Hemsl.
Arbusto. Endémico.
Distribución: JFE.
Rango altitudinal: 0-500 m.
Nota: Posiblemente extinta.

Senecio bipontinii Wedd.
Sinónimos: *Senecio carnifolius* Cabrera, *Senecio sarcophyllus* Phil., hom. illeg., *Senecio schultzii* Wedd., hom. illeg., *Senecio julietii* Phil.
Subarbusto. Endémico.
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS.
Rango altitudinal: 120-2520 m.

Senecio botijae Ehrh.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ANT.
Rango altitudinal: 500-1000 m.

Senecio brachylobus Phil.
Subarbusto. Endémico.
Distribución: ATA, COQ.

Rango altitudinal: 500 m.

***Senecio bracteolatus* Hook. & Arn. var.
*bracteolatus***

Sinónimos: *Senecio coxi* Phil.

Arbusto. Nativo.

Distribución: BIO, ARA.

Rango altitudinal: 0-1400 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Senecio bracteolatus* Hook. & Arn. var.
valderramae (Phil.) Cabrera**

Sinónimos: *Senecio valderramae* Phil.

Arbusto. Nativo.

Distribución: ARA, LRI, LLA, MAG.

Rango altitudinal: 1000-1400 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Senecio breviscapus* DC.**

Sinónimos: *Senecio acaulis* Phil., *Senecio chamaecephalus* Wedd.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME.

Rango altitudinal: 2600-4600 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Senecio bridgesii* Hook. & Arn.**

Subarbusto. Endémico.

Distribución: COQ, VAL, RME.

Rango altitudinal: 0-3000 m.

***Senecio brunonianus* Hook. & Arn.**

Sinónimos: *Senecio serenensis* J. Remy

Subarbusto. Endémico.

Distribución: ATA, COQ, VAL.

Rango altitudinal: 100 m.

***Senecio buglossus* Phil.**

Sinónimos: *Senecio limonius* Phil., *Senecio valdivianus* Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 0-1400 m.

Nombre vulgar: Hualtata, lengua de vaca.

***Senecio bustillosianus* J. Remy var. *borchersii* (Phil.) Cabrera**

Sinónimos: *Senecio borchersii* Phil.

Subarbusto. Endémico.

Distribución: VAL, RME.

Rango altitudinal: 1800-2200 m.

Senecio bustillosianus* J. Remy var. *bustillosianus

Sinónimos: *Senecio schulzeanus* Meigen

Subarbusto. Endémico.

Distribución: VAL, RME, LBO.

Rango altitudinal: 2600-2700 m.

Senecio cachinalensis* Phil. var. *cachinalensis

Sinónimos: *Senecio breanus* Phil., *Senecio larrañagae* Phil.

Arbusto. Endémico.

Distribución: ANT, ATA.

Rango altitudinal: 200-400 m.

***Senecio cachinalensis* Phil. var. *copiapinus* (Phil.)**

Cabrera

Sinónimos: *Senecio copiapinus* Phil.

Arbusto. Endémico.

Distribución: ATA.

Rango altitudinal: 2289 m.

***Senecio calocephalus* Poepp.**

Sinónimos: *Senecio columbaria* J. Remy

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: NUB, BIO, ARA, LRI.

Rango altitudinal: 0-1500 m.

***Senecio candidans* DC.**

Sinónimos: *Brachypappus candidans* (J. Vahl) Sch. Bip., *Cacalia candidans* Vahl, *Culcitium gayanum* J. Remy, *Senecio culciremy* Cuatrec.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: BIO, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Senecio candollei* Wedd.**

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP.

Rango altitudinal: 3500-5000 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Chukuchuku.

Senecio cerberoanus* J. Remy var. *cerberoanus

Sinónimos: *Senecio berterianus* DC. var. *obtusus* DC.,
Senecio phaedrus Phil.

Arbusto. Endémico.

Distribución: ATA, COQ, VAL.

Rango altitudinal: 0-800 m.

***Senecio cerberoanus* J. Remy var. *lanatus* Cabrera**

Arbusto. Endémico.

Distribución: COQ.

Rango altitudinal: 0-800 m.

***Senecio chamomillifolius* Phil.**

Subarbusto. Endémico.

Distribución: ATA.

Rango altitudinal: 0-1300 m.

***Senecio chañaralensis* Phil.**

Arbusto. Endémico.

Distribución: ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-100 m.

***Senecio chilensis* Less. var. *argophyllus* (Phil.)**

Cabrera fma. *argophyllus*

Sinónimos: *Senecio argophyllus* Phil.

Subarbusto. Nativo.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 2000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Senecio chilensis* Less. var. *argophyllus* (Phil.)**

Cabrera fma. *discoideus* Cabrera

Subarbusto. Nativo.

Distribución: MAU.

Rango altitudinal: 1500-3000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Senecio chilensis* Less. var. *chilensis

Sinónimos: *Senecio argenteus* Kuntze ex DC., *Senecio linearifolius* Colla, *Senecio phagnaloides* DC.

Subarbusto. Nativo.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 200-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Senecio chillanensis* Cabrera**

Subarbusto. Endémico.

Distribución: NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 700-1800 m.

***Senecio chionophilus* Phil.**

Sinónimos: *Senecio vulcanicus* Phil., hom. illeg.

Subarbusto. Nativo.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 1500-2100 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Senecio chrysocomoides* Hook. & Arn.**

Subarbusto. Nativo.

Distribución: AIS.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Senecio chrysolepis* Phil.**

Sinónimos: *Senecio juncalensis* Phil.

Subarbusto. Nativo.

Distribución: TAR, ANT, ATA.

Rango altitudinal: 3400-4200 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

***Senecio clarioneifolius* J. Remy**

Subarbusto. Nativo.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 2300-3000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Senecio coquimbensis* Phil.**

Sinónimos: *Senecio berterianus* DC., hom. illeg.,

Senecio glandulosohirtellus Reiche

Arbusto. Endémico.

Distribución: ATA, COQ.

Rango altitudinal: 100-700 m.

***Senecio coronopodiphyllus* J. Remy**

Sinónimos: *Metazanthus cacalioides* Meyen

Subarbusto. Nativo.

Distribución: COQ, RME, LBO.

Rango altitudinal: 2500-3000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Senecio corrugatus* (Phil.) Pelser**

Sinónimos: *Robinsonia gayana* Decne., *Robinsonia corrugata* Phil., *Robinsonia longifolia* Phil.

Arbusto. Endémico.

Distribución: JFE.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Nombre vulgar: Resino.

***Senecio coscayanus* Ricardi & Martic.**

Arbusto. Endémico.

Distribución: TAR.

Rango altitudinal: 3200 m.

***Senecio covasii* Cabrera**

Subarbusto. Nativo.

Distribución: RME, MAU.

Rango altitudinal: 1800-2800 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Senecio crepidioides* Phil.**

Subarbusto. Endémico.

Distribución: ATA, COQ, VAL.

Rango altitudinal: 400-600 m.

***Senecio crithmoides* Hook. & Arn.**

Sinónimos: *Senecio carnifolius* Cabrera, *Senecio diazii* Phil., *Senecio remyanus* Phil., *Senecio sarcophyllus* Phil., hom. illeg., *Senecio schultzii* Wedd., hom. illeg., *Senecio julietii* Phil., *Senecio iberidifolius* Phil., p.p.

Subarbusto. Nativo.

Distribución: COQ, VAL, RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.

Rango altitudinal: 1700-4500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Senecio crusoei* Pelser**

Sinónimos: *Robinsonia gracilis* Decne., *Robinsonia micrantha* Phil. ex Hemsl.

Arbusto. Endémico.

Distribución: JFE.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Nombre vulgar: Resinillo.

***Senecio ctenophyllus* Phil.**

Sinónimos: *Senecio vittatus* Reiche

Arbusto. Endémico.

Distribución: AYP, TAR, ANT.

Rango altitudinal: 1000-3000 m.

Nombre vulgar: Flor amarilla, monte manzanilla, tuksatuksa.

***Senecio cumingii* Hook. & Arn. var. *bracteosus* (J.**

Remy) Cabrera

Sinónimos: *Senecio bracteosus* J. Remy

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL.

Rango altitudinal: 0-600 m.

Senecio cumingii* Hook. & Arn. var. *cumingii

Sinónimos: *Senecio paralias* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO.

Rango altitudinal: 0-600 m.

Países limítrofes: Perú.

***Senecio cuneatus* Hook.f.**

Sinónimos: *Senecio arenicola* Reiche

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AIS, MAG.

Rango altitudinal: 600 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Senecio darwinii* Hook. & Arn.**

Sinónimos: *Senecio darwinii* Hook. & Arn. var. *laxus* Hook. & Arn.

Subarbusto. Nativo.

Distribución: LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-2000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Senecio davilae* Phil.**

Subarbusto. Endémico.

Distribución: VAL, RME.

Rango altitudinal: 600-3000 m.

***Senecio depressus* Hook. & Arn.**

Sinónimos: *Culcitium depressum* D. Don ex Hook. & Arn., nom. nud., *Senecio poeppigii* Hook. & Arn. var. *condensatus* Reiche

Subarbusto. Nativo.

Distribución: LBO, MAU.

Rango altitudinal: 3100 m.

Países limítrofes: Argentina.

Senecio dichotomus Phil.
Subarbusto. Endémico.
Distribución: ANT.
Rango altitudinal: 0-2900 m.

Senecio diemii Cabrera
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ARA.
Rango altitudinal: 1900 m.
Países limítrofes: Argentina.

Senecio digitatus Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: TAR, ANT.
Rango altitudinal: 3500-4000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Senecio donianus Hook. & Arn.
Sinónimos: *Senecio arachnoideus* Phil., hom. illeg.
Subarbusto. Nativo.
Distribución: COQ, VAL, RME.
Rango altitudinal: 2700-4000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Senecio dryophyllus Meyen & Walp.
Sinónimos: *Senecio tarapacanus* Phil., *Senecio amphibolus* Wedd., *Senecio amphibolus* Wedd. var. *socialis* (Wedd.) Cabrera, *Senecio socialis* Wedd.
Subarbusto. Nativo.
Distribución: AYP, TAR, ANT.
Rango altitudinal: 3500-4500 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.
Nombre vulgar: Wilaparpa, parpaparpa.

Senecio elquiensis Cabrera
Hierba o subarbusto. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ.
Rango altitudinal: 800 m.

Senecio eriophyton J. Remy
Arbusto. Nativo.
Distribución: ANT, ATA, COQ.
Rango altitudinal: 3500-4800 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Chachacoma, cachacoma.

Senecio eruciformis J. Remy var. ***brachycephalus***
(Phil.) Cabrera
Sinónimos: *Senecio rutaceus* Phil. var. *brachycephalus* Phil.
Subarbusto. Nativo.
Distribución: COQ, VAL, RME, MAU.
Rango altitudinal: 1200-3000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Senecio eruciformis J. Remy var. ***eruciformis***
Sinónimos: *Senecio rutaceus* Phil.
Subarbusto. Nativo.
Distribución: COQ, VAL, RME, MAU, NUB, BIO.
Rango altitudinal: 2200-2600 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Nica.

Senecio espinosae Cabrera
Subarbusto. Endémico.
Distribución: MAU.
Rango altitudinal: 2500 m.

Senecio evacoides Sch. Bip.
Subarbusto. Nativo.
Distribución: AYP.
Rango altitudinal: 4290-4300 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Senecio evenius (Phil.) Pelser
Sinónimos: *Robinsonia evenia* Phil.
Arbusto. Endémico.
Distribución: JFE.
Rango altitudinal: 0-500 m.

Senecio farinifer Hook. & Arn.
Sinónimos: *Senecio apricus* Phil., *Senecio belophyllus* J. Remy, *Senecio linariifolius* Poepp. ex DC. var. *longifolia* Phil.
Subarbusto. Endémico.
Distribución: COQ, VAL, RME, MAU.
Rango altitudinal: 700-1600 m.

Senecio filaginoides DC.
Sinónimos: *Senecio albolanatus* Phil., hom. illeg., *Senecio leuciscus* Phil., *Senecio leyboldtii* Phil., *Senecio meyenii* Phil., *Senecio sericeus* Kuntze, p.p.
Arbusto. Nativo.

Distribución: NUB, MAG.

Rango altitudinal: 400-2700 m.

Países limítrofes: Argentina.

Senecio fistulosus* Poepp. ex Less. var. *fistulosus

Sinónimos: *Senecio haultata* Bertero ex DC., *Senecio amplus* J. Remy, *Senecio cordillerae* Phil., *Senecio dombeyanus* DC., *Senecio haultata* Bertero ex DC. var. *variabilis* (Phil.) Reiche, *Senecio quillotensis* Phil., *Senecio variabilis* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 1600-2400 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Hualtata, lampazo, paco.

***Senecio fistulosus* Poepp. ex Less. var. *ochroleucus* (Hook. & Arn.) Cabrera**

Sinónimos: *Senecio fistulosus* Poepp. ex DC., nom. illeg., *Senecio ochroleucus* Hook. & Arn.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, BIO, LRI.

Rango altitudinal: 1200-3500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Senecio francisci* Phil.**

Arbusto. Nativo.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 1300-3500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Senecio garaventai* Cabrera**

Subarbusto. Endémico.

Distribución: COQ, VAL.

Rango altitudinal: 1600-1900 m.

***Senecio gayanus* DC.**

Sinónimos: *Senecio soloanus* Phil., *Senecio sotoanus* Phil.

Subarbusto. Endémico.

Distribución: RME, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 700-1000 m.

***Senecio gilliesii* Hook. & Arn.**

Sinónimos: *Cacalia candicans* Poepp. ex DC., *Cacalia nivea* Kuntze ex DC., *Culcitium poeppigii* DC., *Senecio poeppigii* (DC.) Wedd., hom. illeg.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: LBO, MAU, BIO.

Rango altitudinal: 700-3200 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Senecio glaber* Less.**

Sinónimos: *Senecio molinae* Phil., *Senecio ahrendsi* Phil., *Senecio delphinii* Phil., *Senecio fernandezii* Phil., *Senecio möelleri* Phil., *Senecio phyllocomus* Phil., *Senecio pratensis* Phil., *Senecio pratensis* Phil. var. *delfinii* (Phil.) Reiche, *Senecio glaber* Less. var. *pratensis* (Phil.) Cabrera, *Senecio tocornali* Phil.

Subarbusto. Nativo.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 1100-2000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Chilquilla.

***Senecio glabratus* Hook. & Arn.**

Sinónimos: *Senecio auriculatus* Poepp. ex DC., *Senecio berterianus* Colla, *Senecio valparadisiacus* Colla, *Senecio macrotus* Kuntze ex Meyen

Subarbusto. Endémico.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME.

Rango altitudinal: 0-900 m.

***Senecio gnidioides* Phil. var. *gilvus* (Phil.) Cabrera**

Sinónimos: *Senecio gilvus* Phil.

Subarbusto. Nativo.

Distribución: BIO, ARA, LRI.

Rango altitudinal: 1000-2500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Senecio gnidioides* Phil. var. *gnidioides

Subarbusto. Nativo.

Distribución: RME, LBO, NUB, BIO, ARA, MAG.

Rango altitudinal: 1000-2500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Senecio grandjotii* Cabrera**

Subarbusto. Nativo.

Distribución: RME.

Rango altitudinal: 3200-3800 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Senecio grindeliifolius* DC.**

Subarbusto. Nativo.

Distribución: RME.

Rango altitudinal: 2700-3000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Senecio guatulamensis* Muñoz-Schick, Moreira &**

Trenqualye

Subarbusto. Endémico.

Distribución: COQ.

Rango altitudinal: 775-930 m.

***Senecio gunckelii* Cabrera**

Arbusto. Endémico.

Distribución: RME, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 1500 m.

***Senecio haenkeanus* Cuatrec.**

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP.

Rango altitudinal: 4500-5000 m.

Países limítrofes: Perú.

Nombre vulgar: Chukuchuku.

***Senecio haenkei* DC.**

Sinónimos: *Senecio chionotus* Phil.

Subarbusto. Nativo.

Distribución: ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 800-3500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Senecio hakeifolius* Bertero ex DC. var.**

hakeifolius

Sinónimos: *Senecio hakeifolius* Bertero ex DC. var. *ochroleucus* (Phil.) Reiche, *Senecio leptophyllum* Hook. & Arn., *Senecio ochroleucus* Phil., hom. illeg., *Senecio valparadisiensis* J. Remy, *Senecio platycodon* Baker, p.p., *Senecio linearilobus* Bong. var. *beta* Hook. & Arn. Subarbusto. Endémico.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO.

Rango altitudinal: 100-3000 m.

Nombre vulgar: Pie de pajarito.

Senecio hakeifolius* Bertero ex DC. var. *vidalii

(Phil.) Reiche

Sinónimos: *Senecio vidalii* Phil.

Subarbusto. Endémico.

Distribución: ATA, COQ.

Rango altitudinal: 200 m.

Senecio haloragis* J. Remy var. *glandulosus

Cabrera

Subarbusto. Endémico.

Distribución: MAU.

Rango altitudinal: 0-100 m.

Senecio haloragis* J. Remy var. *haloragis

Sinónimos: *Senecio germainii* Phil.

Subarbusto. Endémico.

Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO.

Rango altitudinal: 0-100 m.

***Senecio helgae* Cabrera**

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ANT.

Rango altitudinal: 4000-4600 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Senecio hickenii* Hauman**

Subarbusto. Nativo.

Distribución: COQ, VAL.

Rango altitudinal: 3500-4000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Senecio hieracium* J. Remy**

Sinónimos: *Senecio pearcei* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 1200-2500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Senecio hirsutulus* Phil.**

Arbusto o subarbusto. Endémico.

Distribución: ATA, COQ, VAL.

Rango altitudinal: 0-100 m.

***Senecio hirtus* Cabrera**

Sinónimos: *Senecio crispus* Phil., hom. illeg.

Arbusto. Endémico.

Distribución: ANT, ATA.

Rango altitudinal: 3500-4000 m.

Nombre vulgar: Chachacom.

***Senecio humifusus* (Hook.f.) Cabrera**

Sinónimos: *Senecio darwinii* Hook. & Arn. var. *eradiatus* A. Gray

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 900-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Senecio humillimus* Sch. Bip. ex Wedd.**

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP.

Rango altitudinal: 3500-4800 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Pasto, k'jota.

***Senecio illapelinus* Phil.**

Subarbusto. Nativo.

Distribución: COQ, VAL.

Rango altitudinal: 3100-3600 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Senecio illinitus* Phil.**

Sinónimos: *Senecio cervicornis* Phil.

Subarbusto. Endémico.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, MAU.

Rango altitudinal: 0-2000 m.

***Senecio invalidus* C. Jeffrey**

Sinónimos: *Senecio debilis* Phil., hom. illeg.

Subarbusto. Endémico.

Distribución: LBO.

Rango altitudinal: 1100-1500 m.

***Senecio isernii* Phil.**

Arbusto o subarbusto. Endémico.

Distribución: ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-100 m.

***Senecio jacobeiformis* J. Remy**

Hierba o subarbusto. Perenne. Endémica.

Distribución: ANT, COQ.

Rango altitudinal: 0-2600 m.

***Senecio jaffuelii* Cabrera**

Subarbusto. Nativo.

Distribución: RME.

Rango altitudinal: 1700-4500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Senecio jarae* Phil.**

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT.

Rango altitudinal: 2400-5000 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Romerillo.

***Senecio jilesii* Cabrera**

Arbusto. Endémico.

Distribución: COQ.

Rango altitudinal: 2000 m.

***Senecio johnstonianus* Cabrera**

Subarbusto. Endémico.

Distribución: ATA.

Rango altitudinal: 2000-2700 m.

***Senecio jorquerae* Phil.**

Subarbusto. Endémico.

Distribución: ATA.

Rango altitudinal: 3000-3500 m.

***Senecio jungei* Phil.**

Arbusto. Endémico.

Distribución: COQ.

Rango altitudinal: 945-2000 m.

***Senecio kingii* Hook.f.**

Sinónimos: *Senecio gymnoaulos* Phil., *Senecio subdiscoideus* Sch. Bip. ex Wedd., *Metazanthon grandiflorus* Meyen, *Senecio breviculus* Phil., *Senecio caespitosus* Phil., *Senecio kingii* Hook.f. fma.

subdiscoideus (Sch. Bip. ex Wedd.) Hosseus, *Senecio purpuratus* Phil., *Senecio purpuratus* Phil. var. *subdiscoideus* (Sch. Bip. ex Wedd.) Reiche, *Senecio kingii* Hook.f. var. *paradoxus* (Albov ex Kurtz) Cabrera

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 100-3800 m.

Países limítrofes: Argentina.

Senecio laetevirens Phil.

Subarbusto. Nativo.

Distribución: VAL, RME.

Rango altitudinal: 2000-3200 m.

Países limítrofes: Argentina.

Senecio laevicaulis DC.

Sinónimos: *Senecio holophyllus* J. Remy

Subarbusto. Endémico.

Distribución: RME, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 2500 m.

Senecio landbeckii Phil.

Subarbusto. Endémico.

Distribución: LBO, MAU.

Rango altitudinal: 1500-2500 m.

Senecio laseguei Hombr. & Jacquinot

Sinónimos: *Senecio danyausii* Hombr. & Jacquinot var. *intermedius* Sch. Bip., *Senecio magellanicus* Phil., hom. illeg., *Senecio philippii* De Wild.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 100-300 m.

Países limítrofes: Argentina.

Senecio lastarrianus J. Remy

Sinónimos: *Senecio baccharidifolius* DC. var. *angustifolius* DC., *Senecio nitidus* Phil.

Subarbusto. Endémico.

Distribución: LBO, MAU, NUB.

Rango altitudinal: 900-2000 m.

Senecio laukanus Ricardi & Martic.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: AYP.

Rango altitudinal: 4200-4300 m.

Senecio leptocaulos Phil.

Subarbusto. Endémico.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO.

Rango altitudinal: 800-1600 m.

Senecio leucomallus A. Gray var. *incisus* A. Gray

Arbusto o subarbusto. Nativo.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 0-1500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Senecio leucomallus A. Gray var. *leucomallus*

Arbusto o subarbusto. Nativo.

Distribución: AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Senecio leucophyton Phil.

Subarbusto. Nativo.

Distribución: MAU.

Rango altitudinal: 1500-1800 m.

Países limítrofes: Argentina.

Senecio leucus Phil.

Arbusto. Nativo.

Distribución: ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 2500-3500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Senecio linaresensis Soldano

Sinónimos: *Senecio subdentatus* Phil., hom. illeg.

Subarbusto. Endémico.

Distribución: MAU.

Rango altitudinal: 900-2000 m.

Senecio linariifolius Poepp. ex DC. var. *aclonetus*

(Phil.) Cabrera

Sinónimos: *Senecio aclonetus* Phil., *Senecio encelia* J. Remy, *Senecio microcephalus* Phil. var. *aclonetus* (Phil.) Kuntze

Subarbusto. Endémico.

Distribución: MAU, NUB, BIO.

Rango altitudinal: 0-2200 m.

Senecio linariifolius Poepp. ex DC. var.

heliphytoides (Phil.) Reiche

Sinónimos: *Senecio heliphytoides* Phil.

Subarbusto. Nativo.

Distribución: RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 1200-2500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Senecio linariifolius Poepp. ex DC. var.

linariifolius

Sinónimos: *Senecio promaucanus* Phil.

Subarbusto. Nativo.

Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, AIS.

Rango altitudinal: 1000-2900 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Senecio lithostaurus* Cabrera**

Sinónimos: *Senecio remyanus* Phil. fma. *eradiatus* Kuntze

Subarbusto. Nativo.

Distribución: RME.

Rango altitudinal: 1500-3500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Senecio looseri* Cabrera**

Subarbusto. Nativo.

Distribución: COQ, VAL, RME.

Rango altitudinal: 3000-5000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Senecio lorentziella* Hicken**

Subarbusto. Nativo.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME.

Rango altitudinal: 2900-3500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Senecio luridus* Phil.**

Arbusto. Endémico.

Distribución: ATA.

Rango altitudinal: 2400 m.

***Senecio madagascariensis* Poir.**

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: COQ.

***Senecio madariagae* Phil.**

Arbusto. Endémico.

Distribución: TAR, ANT.

Rango altitudinal: 0-3400 m.

***Senecio magellanicus* Hook. & Arn.**

Sinónimos: *Senecio culcitenellus* Cuatrec., *Senecio vaginifolius* Sch. Bip., *Culcitium magellanicum* (Hook. & Arn.) Hombr. & Jacquinot

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AIS, MAG.

Rango altitudinal: 200-1600 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Senecio mapuche* Cabrera**

Subarbusto. Endémico.

Distribución: VAL, RME.

Rango altitudinal: 1800-2200 m.

***Senecio martinensis* Dusén**

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AIS, MAG.

Rango altitudinal: 600-1200 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Senecio masafuerae* (Skottsb.) Pelser**

Sinónimos: *Robinsonia masafuerae* (Skottsb.) Pelser

Arbusto. Endémico.

Distribución: JFE.

Rango altitudinal: 0-500 m.

***Senecio masatierrae* Pelser**

Sinónimos: *Robinsonia macrocephala* Decne.,

Sympyochaeta macrocephala (Decne.) Skottsb.

Arbusto o árbol pequeño. Endémico.

Distribución: JFE.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Nombre vulgar: Incienso.

Nota: Extinta.

***Senecio maulinus* Reiche**

Sinónimos: *Senecio leucomallus* Phil., hom. illeg.

Subarbusto. Endémico.

Distribución: LBO, MAU.

Rango altitudinal: 200-2800 m.

***Senecio mesembrynus* Cabrera**

Sinónimos: *Senecio bakeri* Reiche

Subarbusto. Endémico.

Distribución: AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-100 m.

Senecio microcephalus* Phil. var. *angustifolius

Cabrera

Arbusto. Nativo.

Distribución: LLA.

Rango altitudinal: 300-800 m.

Países limítrofes: Argentina.

Senecio microcephalus* Phil. var. *microcephalus

Arbusto. Nativo.

Distribución: NUB, LRI.

Rango altitudinal: 300-800 m.

Países limítrofes: Argentina.

Rango altitudinal: 0-100 m.

***Senecio murinus* Phil.**

Subarbusto. Endémico.

Distribución: ATA, COQ, VAL.

Rango altitudinal: 400-1400 m.

Nombre vulgar: Hierba de los ratones, hierba zonza.

***Senecio micropphyllus* Phil.**

Sinónimos: *Senecio hakeifolius* Hook. & Arn. var.

adenophyllus Hook. & Arn., *Senecio gypsophilus* Phil.,

Senecio bowenkampi Phil., *Senecio alfalfalis* Phil.

Arbusto. Nativo.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 1500-2300 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Senecio murorum* J. Remy**

Arbusto. Endémico.

Distribución: COQ, RME.

Rango altitudinal: 100-200 m.

Nombre vulgar: Monte azulillo.

***Senecio micropifolius* DC.**

Sinónimos: *Senecio pelolepis* Johnst.

Subarbusto. Endémico.

Distribución: ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 1900-4300 m.

***Senecio myriophyllum* Phil.**

Arbusto o subarbusto. Endémico.

Distribución: ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-1200 m.

***Senecio microtis* Phil.**

Arbusto. Endémico.

Distribución: ATA.

Rango altitudinal: 0-3200 m.

***Senecio neaei* DC. var. *incisus* DC.**

Sinónimos: *Senecio sericeus* Kuntze var. *incisus* (DC.)

Kuntze

Arbusto o subarbusto. Nativo.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 0-2600 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Senecio minutifolius* Phil.**

Arbusto. Endémico.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME.

Rango altitudinal: 1600-3200 m.

Senecio neaei* DC. var. *neaei

Sinónimos: *Senecio sericeus* Kuntze var. *neaei* (DC.)

Kuntze

Arbusto o subarbusto. Nativo.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, AIS.

Rango altitudinal: 300-1800 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Senecio miser* Hook.f.**

Sinónimos: *Senecio ericoides* Reiche, *Senecio fueginus*

Phil.

Subarbusto. Nativo.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 100-1500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Senecio nigrescens* Hook. & Arn.**

Sinónimos: *Senecio chamaedryfolius* Less.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: MAU, NUB, BIO.

Rango altitudinal: 0-100 m.

Nombre vulgar: Nilhue.

***Senecio monttianus* J. Remy**

Subarbusto. Endémico.

Distribución: AYP, COQ, RME, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 2400-3000 m.

***Senecio nublensis* Soldano**

Sinónimos: *Senecio carnosus* Phil., hom. illeg.

Subarbusto. Endémico.

Distribución: NUB, ARA, LLA.

Rango altitudinal: 0-1800 m.

***Senecio munnozii* Cabrera**

Subarbusto. Endémico.

Distribución: COQ.

***Senecio nutans* Sch. Bip.**

Sinónimos: *Senecio graveolens* Wedd.

Arbusto. Nativo.

Distribución: AYP, TAR, ANT.

Rango altitudinal: 3500-5000 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Tola hembra, chachacoma, chachakoma macho.

***Senecio obtectus* Kuntze**

Subarbusto. Nativo.

Distribución: VAL, RME, LBO.

Rango altitudinal: 2200-2600 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Senecio oreinus* Cabrera**

Sinónimos: *Senecio andicola* Phil., hom. illeg., *Senecio monticola* Phil., hom. illeg.

Subarbusto. Nativo.

Distribución: ATA, COQ.

Rango altitudinal: 1700-3000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Senecio oreophyton* J. Remy**

Sinónimos: *Senecio medicinalis* Phil.

Arbusto. Nativo.

Distribución: ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 3100-4000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Hierba del incordio, chachacoma.

***Senecio otaeguianus* Phil.**

Subarbusto. Endémico.

Distribución: VAL.

Rango altitudinal: 0-100 m.

***Senecio otites* Kunze ex DC.**

Sinónimos: *Senecio chiloensis* Phil., *Senecio otophorus* Phil., nom. illeg.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 600-1100 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Trompetilla, tutuco, trompón.

***Senecio pachyphylllos* J. Remy**

Sinónimos: *Senecio domeykoanus* Phil., *Senecio sedifolius* Phil.

Subarbusto. Nativo.

Distribución: RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 1200-3200 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Senecio pappii* Ricardi & Martic.**

Subarbusto. Endémico.

Distribución: AYP, ANT.

Rango altitudinal: 3200-3600 m.

Nombre vulgar: Kopa de cóndor, chachakoma blanca, pupusa.

***Senecio parodii* Cabrera**

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: BIO, ARA, LLA.

Rango altitudinal: 300-1200 m.

Países limítrofes: Argentina.

Senecio patagonicus* Hook. & Arn. var. *alyssoides

(Sch. Bip.) Cabrera

Sinónimos: *Senecio danyausii* Hombr. & Jacquinot var. *alyssoides* Sch. Bip., *Senecio exilis* Hombr. & Jacquinot, *Senecio floccidus* Hombr. & Jacquinot

Subarbusto. Nativo.

Distribución: AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Senecio patagonicus* Hook. & Arn. var. *andersonii

(Hook.f.) Cabrera

Sinónimos: *Senecio andersonii* Hook.f., *Senecio andersonii* Hook.f. var. β Hook.f., *Senecio forsteri* Phil.

Subarbusto. Nativo.

Distribución: AIS, MAG.

Rango altitudinal: 100-900 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Senecio patagonicus* Hook. & Arn. var.**

***lobatifolius* (Hombr. & Jacquinot) Cabrera**

Sinónimos: *Senecio danyausii* Hombr. & Jacquinot var. β J. Remy, nom. illeg., *Senecio danyausii* Hombr. & Jacquinot var. *lobatifolia* Hombr. & Jacquinot, *Senecio danyausii* Hombr. & Jacquinot var. *trifurcatus* Sch. Bip.

Subarbusto. Nativo.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 0-500 m.
Países limítrofes: Argentina.

***Senecio patagonicus* Hook. & Arn. var.
*patagonicus***

Sinónimos: *Senecio lechleri* Phil., *Senecio palenae* Phil.
Subarbusto. Nativo.
Distribución: AIS, MAG.
Rango altitudinal: 200-1300 m.
Países limítrofes: Argentina.

Senecio paucidentatus* DC. var. *limbardiooides
(Hook. & Arn.) Cabrera
Sinónimos: *Senecio limbardiooides* Hook. & Arn.,
Senecio olivaceus Phil.
Subarbusto. Endémico.
Distribución: VAL.
Rango altitudinal: 0-100 m.

Senecio paucidentatus* DC. var. *paucidentatus
Subarbusto. Endémico.
Distribución: COQ, VAL.
Rango altitudinal: 0-200 m.

***Senecio pemehuensis* Soldano**
Sinónimos: *Senecio scoparius* Phil., hom. illeg.
Subarbusto. Endémico.
Distribución: BIO, ARA.
Rango altitudinal: 1400 m.

***Senecio pentaphyllus* Phil.**
Sinónimos: *Senecio laciniosus* Phil., *Senecio navarri* Phil., *Senecio pentaphyllus* Phil. var. *navarri* (Phil.) Reiche, *Senecio schoenleini* Meigen
Subarbusto. Endémico.
Distribución: VAL, RME, LBO.
Rango altitudinal: 2300-2500 m.

***Senecio peripotamus* C. Jeffrey**
Sinónimos: *Senecio rivularis* J. Remy, hom. illeg.
Subarbusto. Endémico.
Distribución: COQ.
Rango altitudinal: 300-2700 m.

***Senecio pteroanlus* Phil.**
Subarbusto. Nativo.
Distribución: MAU, ARA.

Rango altitudinal: 1600-2100 m.
Países limítrofes: Argentina.

***Senecio petrophyus* Pelser**
Sinónimos: *Robinsonia saxatilis* Danton
Arbusto. Endémico.
Distribución: JFE.
Rango altitudinal: 300 m.

#REF!

#REF!

***Senecio philippicus* Regel & Körn.**
Sinónimos: *Senecio paposanus* Phil.
Arbusto. Endémico.
Distribución: ANT.
Rango altitudinal: 200-900 m.

***Senecio philippii* Sch. Bip. ex Wedd.**
Sinónimos: *Senecio ammophilus* Phil., *Senecio hirthii* Phil.
Subarbusto. Nativo.
Distribución: LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 500-1000 m.
Países limítrofes: Argentina.

***Senecio phylloleptus* Cuatrec.**
Arbusto. Nativo.
Distribución: AYP.
Rango altitudinal: 3500 m.
Países limítrofes: Bolivia y Perú.
Nombre vulgar: Flor amarilla.

***Senecio pilquensis* H. Buek**
Sinónimos: *Senecio heterophyllus* DC., hom. illeg.,
Senecio phylmomorphus Steud., *Senecio porophylloides* J. Remy
Subarbusto. Nativo.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.

Rango altitudinal: 900-1700 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Senecio pissisi* Phil.**

Subarbusto. Nativo.

Distribución: ATA, COQ.

Rango altitudinal: 3000-4100 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Senecio planiflorus* Kunze ex Cabrera**

Sinónimos: *Senecio littoralis* Poepp. ex DC., nom. illeg., *Senecio sinuatilobus* DC. var. *littoralis* DC.

Arbusto. Endémico.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 0-700 m.

***Senecio poeppigii* Hook. & Arn.**

Sinónimos: *Senecio dealbatus* Phil., *Senecio micropifolius* DC. var. β . *monocephalus* DC., *Senecio williamsii* Phil.

Subarbusto. Nativo.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, MAG.

Rango altitudinal: 1300-2000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Senecio polygaloides* Phil.**

Sinónimos: *Senecio linariifolius* Poepp. ex DC. var. *tenuifolius* DC., *Senecio multibracteatus* Phil., hom. illeg., *Senecio linariifolius* Poepp. ex DC. var.

discoideus Kuntze

Subarbusto. Nativo.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, AIS.

Rango altitudinal: 2000-3100 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Senecio polyphyllus* Kunze ex DC.**

Sinónimos: *Senecio tristis* Phil. var. *comberi* Greenm.

Subarbusto. Nativo.

Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 1700-2600 m.

Países limítrofes: Argentina y Perú.

***Senecio portalesianus* J. Remy var. *lanuginosus* (Phil.) Cabrera**

Sinónimos: *Senecio antucensis* Phil. var. *lanuginosa* Phil.

Subarbusto. Endémico.

Distribución: NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 1400-2500 m.

Senecio portalesianus* J. Remy var. *portalesianus

Sinónimos: *Senecio antucensis* Phil., *Senecio polyphyllus* Kunze ex DC. var. *antucensis* (Phil.) Reiche, *Senecio ceratophyllum* D. Don ex Hook. & Arn. var. β nana D. Don ex Hook. & Arn.

Subarbusto. Nativo.

Distribución: NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 1500-2800 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Senecio portulacoides* J. Remy**

Sinónimos: *Senecio macer* Phil.

Arbusto. Endémico.

Distribución: COQ.

Rango altitudinal: 1200-2800 m.

***Senecio prenanthifolius* Phil.**

Sinónimos: *Senecio ranconensis* Sch. Bip. ex Phil., nom. nud., *Senecio helianthoides* Phil., *Senecio ranconensis* Sch. Bip. ex Lechl., nom. nud.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: LBO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 1000-1500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Senecio proteus* J. Remy var. *geissei* (Phil.)**

Cabrera

Sinónimos: *Senecio geissei* Phil.

Arbusto. Endémico.

Distribución: ATA, COQ.

Rango altitudinal: 1200-1800 m.

Senecio proteus* J. Remy var. *proteus

Sinónimos: *Senecio bracteolatus* Phil., *Senecio foliolosus* Reiche, *Senecio pinnatifidus* Phil., *Senecio stenophyllum* Phil.

Arbusto. Endémico.

Distribución: ATA, COQ.

Rango altitudinal: 800-3000 m.

NOMBRE VULGAR: Pajarito, palito blanco.

Senecio pseudalmeidae Cabrera

Arbusto. Endémico.

Distribución: ANT.

Rango altitudinal: 300 m.

Senecio pseuderuroides Cabrera

Arbusto. Endémico.

Distribución: RME.

Rango altitudinal: 1900 m.

Senecio pubescens Phil.

Arbusto o subarbusto. Endémico.

Distribución: COQ.

Rango altitudinal: 1500-1600 m.

Senecio puchii Phil.

Subarbusto. Nativo.

Distribución: AYP, TAR, ANT.

Rango altitudinal: 4200-4800 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Nombre vulgar: Chachakoma, leña de tola, tola de piedra.

Senecio pycnanthus Phil.

Sinónimos: *Senecio pycnanthus* Phil. var. *brevifolia* Phil.

Subarbusto. Endémico.

Distribución: MAU, NUB.

Rango altitudinal: 0-1200 m.

Senecio rahmeri Phil.

Subarbusto. Nativo.

Distribución: ANT, ATA.

Rango altitudinal: 4100-4300 m.

Países limítrofes: Argentina.

Senecio reicheanus Cabrera

Subarbusto. Nativo.

Distribución: AYP, TAR, ANT.

Rango altitudinal: 3600 m.

Países limítrofes: Bolivia.

Senecio renjifoanus Phil.

Subarbusto. Nativo.

Distribución: RME.

Rango altitudinal: 1600-3300 m.

Países limítrofes: Argentina.

Senecio ricardii Martic. & Quezada

Arbusto. Endémico.

Distribución: AYP, ATA.

Rango altitudinal: 3100-3400 m.

Senecio santelisii Phil.

Sinónimos: *Senecio crispus* Phil. var. *santelisis* (Phil.)

Reiche

Arbusto. Nativo.

Distribución: ANT, ATA.

Rango altitudinal: 3500-4600 m.

Países limítrofes: Argentina.

Senecio santiagoensis Kuntze

Sinónimos: *Senecio leucanthemifolius* Phil.

Subarbusto. Endémico.

Distribución: RME.

Rango altitudinal: 2300-2500 m.

Senecio saxicola Wedd.

Subarbusto. Nativo.

Distribución: ATA.

Rango altitudinal: 200-300 m.

Países limítrofes: Perú.

Senecio schoenemannii Phil.

Subarbusto. Endémico.

Distribución: MAU.

Rango altitudinal: 1300 m.

Senecio scopulorum Poepp.

Hierba o subarbusto. Perenne. Endémica.

Distribución: BIO.

Rango altitudinal: 900-1500 m.

Senecio scorzonerifolius Meyen & Walp.

Sinónimos: *Senecio armeriifolius* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA.

Rango altitudinal: 4400-4600 m.

Países limítrofes: Argentina y Perú.

Nombre vulgar: Romerillo chico.

Senecio segethii Phil.

Sinónimos: *Senecio peraltae* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ATA, COQ.
Rango altitudinal: 2000-4100 m.
Países limítrofes: Argentina.

Senecio sericeonitens Speg.
Sinónimos: *Senecio patagonicus* Phil., hom. illeg.
Arbusto. Nativo.
Distribución: ARA, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 700-2000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Senecio serratifolius (Meyen & Walp.) Cuatrec.
Sinónimos: *Senecio cernuus* Phil., hom. illeg.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT.
Rango altitudinal: 4000-5000 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Senecio sinuatifolius DC.
Sinónimos: *Senecio mollis* Poepp. ex DC.
Arbusto. Endémico.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU.
Rango altitudinal: 0-1500 m.

Senecio skottsbergii Cabrera var. *anomalus*
Cabrera
Subarbusto. Endémico.
Distribución: AIS.
Rango altitudinal: 0-100 m.

Senecio skottsbergii Cabrera var. *skottsbergii*
Subarbusto. Nativo.
Distribución: AIS, MAG.
Rango altitudinal: 600-1800 m.
Países limítrofes: Argentina.

Senecio smithii DC.
Sinónimos: *Brachypappus smithii* (DC.) Sch. Bip.,
Senecio verbascifolius Hombr. & Jacquinot ex Decne,
Senecio kurtzii Phil., *Senecio punctarenicus* Krause,
Cineraria leucanthema Banks & Sol. ex Walp.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-2100 m.
Países limítrofes: Argentina.

Senecio socompae Cabrera
Subarbusto. Nativo.
Distribución: ANT.
Rango altitudinal: 3500-4000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Senecio spinosus DC.
Arbusto. Nativo.
Distribución: AYP, TAR.
Rango altitudinal: 3400-4600 m.
Países limítrofes: Perú.
Nombre vulgar: Añawaya, kaylla, espina, tola de espino,
té del cuerno.

Senecio subauritus Phil.
Subarbusto. Endémico.
Distribución: BIO, ARA.
Rango altitudinal: 900-1500 m.

Senecio subpubescens Cabrera
Subarbusto. Nativo.
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA,
MAG.
Rango altitudinal: 1000-1700 m.
Países limítrofes: Argentina.

Senecio subulatus D. Don ex Hook. & Arn. var.
salsus (Griseb.) Cabrera
Sinónimos: *Senecio diversifolius* Phil., hom. illeg.,
Senecio salsus Griseb., *Senecio subulatus* D. Don ex
Hook. & Arn. var. *diversifolius* (Phil.) Cabrera
Arbusto. Nativo.
Distribución: AYP, TAR, ANT.
Rango altitudinal: 2500-4000 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.
Nombre vulgar: Chachakoma macho.

Senecio subumbellatus Phil.
Sinónimos: *Senecio thermarum* Phil., *Senecio antirhinifolius* Phil., *Senecio linariifolius* Poepp. ex DC.
var. *subdiscoideus* DC., *Senecio multicaulis* Poepp.,
hom. illeg.
Subarbusto. Nativo.
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO,
ARA, LRI.
Rango altitudinal: 1500-3600 m.
Países limítrofes: Argentina.

***Senecio sundtii* Phil.**

Subarbusto. Nativo.

Distribución: ANT, ATA.

Rango altitudinal: 3600-4700 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

***Senecio sylvaticus* L.**

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: VAL, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.

***Senecio tacorensis* Cabrera**

Sinónimos: *Senecio olivaceobracteatus* Ricardi & Martic.

Subarbusto. Nativo.

Distribución: AYP, TAR, ANT.

Rango altitudinal: 3500-4200 m.

Países limítrofes: Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Koya blanca, monte blanco, payakoa, kpa de cóndor.

***Senecio talquinus* Phil.**

Subarbusto. Endémico.

Distribución: MAU.

Rango altitudinal: 2100 m.

***Senecio tehuelches* (Speg.) Cabrera**

Sinónimos: *Senecio miser* Hook.f. var. *tehuelches* Speg.

Subarbusto. Nativo.

Distribución: AIS.

Rango altitudinal: 400-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Senecio thurifer* (Decne.) Pelser**

Sinónimos: *Robinsonia thurifera* Decne.

Arbusto. Endémico.

Distribución: JFE.

Rango altitudinal: 0-500 m.

***Senecio tinctolobus* I.M. Johnst.**

Subarbusto. Endémico.

Distribución: ATA, COQ.

Rango altitudinal: 3000-4300 m.

Senecio tricuspidatus* Hook. & Arn. var. *dentatus

(Sch. Bip.) Cabrera

Sinónimos: *Senecio ibari* Phil., *Senecio longipes*

Hook.f., *Senecio longipes* Hook.f. var. *dentatus* Sch.

Bip., *Senecio longipes* Hook.f. var. *integrifolius* Sch.

Bip.

Arbusto. Nativo.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 0-1200 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Senecio tricuspidatus* Hook. & Arn. var.
*tricuspidatus***

Sinónimos: *Senecio nordenskjöldii* O. Hoffm., *Senecio nordenskjöldii* O. Hoffm. var. *simplicior* O. Hoffm. ex Dusén

Arbusto. Nativo.

Distribución: AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-1200 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Senecio trifidus* Hook. & Arn.**

Sinónimos: *Senecio demissus* Phil.

Subarbusto. Nativo.

Distribución: RME.

Rango altitudinal: 2700-4000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Senecio trifurcatus* (G. Forst.) Less.**

Sinónimos: *Cineraria trifurcata* (G. Forst.) Spreng., *Senecio trifurcatus* (G. Forst.) Less. var. *pentadactylus* (Phil.) Speg., *Senecio trifurcatus* (G. Forst.) Less. var. *pisensis* Sch. Bip. ex Wedd., *Senecio pentadactylus* Phil., *Tussilago trifurcata* G. Forst.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ARA, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 800-1600 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Senecio trifurcifolius* Hieron.**

Subarbusto. Nativo.

Distribución: AYP.

Rango altitudinal: 4200-5100 m.

Países limítrofes: Bolivia y Perú.

***Senecio triodon* Phil.**

Sinónimos: *Senecio baccharidifolius* DC. var. *subradiatus* DC.

Subarbusto. Nativo.

Distribución: VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 900-2000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Senecio tripinnatifidus* Reiche**

Subarbusto. Endémico.

Distribución: COQ, VAL.

Rango altitudinal: 1100-1300 m.

***Senecio tristis* Phil.**

Sinónimos: *Senecio consanguineus* Phil., *Senecio setulosus* Phil.

Subarbusto. Nativo.

Distribución: RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 1200-2100 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Senecio troncosii* Phil.**

Sinónimos: *Senecio thinophilus* Phil.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: ANT, ATA.

Rango altitudinal: 0-1800 m.

***Senecio viridis* Phil. var. *radiatus* R.E. Fr.**

Arbusto. Nativo.

Distribución: TAR, ANT.

Rango altitudinal: 2500-3700 m.

Países limítrofes: Argentina.

Senecio viridis* Phil. var. *viridis

Arbusto. Nativo.

Distribución: AYP, TAR, ANT.

Rango altitudinal: 3000-4400 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Nombre vulgar: Mocora, mocoraca.

***Senecio viscosissimus* Colla**

Sinónimos: *Senecio hakeaeifolius* Hook. & Arn.,

Cineraria humilis Poepp.

Subarbusto. Endémico.

Distribución: ANT, COQ, VAL, LBO.

Rango altitudinal: 0-400 m.

***Senecio volckmannii* Phil.**

Sinónimos: *Senecio rosmarinus* Phil. var. *ascotanensis*

(Phil.) Cabrera, *Senecio rosmarinus* Phil., *Senecio ascotanensis* Phil., *Senecio doñae-annae* Phil.

Subarbusto. Nativo.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 3300-4500 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Nombre vulgar: Romero, pukachaki, pata colorada, kopa de cóndor, viravira.

***Senecio vulgaris* L.**

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG, JFE.

***Senecio websteri* Hook.f.**

Sinónimos: *Senecio websteri* Hook.f. var. *subdiscoideus* A. Gray

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 0-600 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Senecio werdermannii* Greenm.**

Sinónimos: *Senecio modestus* Phil., hom. illeg.

Subarbusto. Nativo.

Distribución: VAL, RME.

Rango altitudinal: 2000-3000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Senecio xerophilus* Phil. var. *deserticola* (Cabrera)**

Cabrera

Sinónimos: *Senecio deserticola* Cabrera, *Senecio cremophilus* Phil., hom. illeg., *Senecio eremophilus* Phil.

Subarbusto. Endémico.

Distribución: ANT.

Rango altitudinal: 4500 m.

Senecio xerophilus* Phil. var. *xerophilus

Subarbusto. Nativo.

Distribución: AYP, TAR, ANT.

Rango altitudinal: 3700-4700 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Romerillo, romerillo blanco.

***Senecio zapahuirensis* Martic. & Quezada**

Arbusto. Endémico.

Distribución: AYP, TAR.
Rango altitudinal: 2100-3000 m.

Senecio zoellneri Martic. & Quezada
Sinónimos: *Culcitium albifolium* Zoellner
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP.
Rango altitudinal: 4000-5000 m.
Países limítrofes: Bolivia.
Nombre vulgar: Chukuchuku.

Senecio zosterifolius Hook. & Arn.
Sinónimos: *Senecio uliginosus* Phil., *Haplostichia stolonifera* Phil., *Senecio cotuloides* Reiche, *Senecio graminifolius* Phil., *Senecio potamogetonifolius* Sch. Bip. ex Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: VAL, NUB, BIO, ARA, LRI.
Rango altitudinal: 600-1500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Sigesbeckia

Sigesbeckia serrata DC.
Sinónimos: *Sigesbeckia jorullensis* auct. non Kunth
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: VAL, RME, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.
Rango altitudinal: 1300-2900 m.
Países limítrofes: Argentina y Perú.

Silybum

Silybum marianum (L.) Gaertn.
Hierba. Anual o bienal. Introducida.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE.

Smallanthus

Smallanthus connatus (Spreng.) H. Rob.
Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: VAL.

Solidago

Solidago argentinensis López Laph. & Semple
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: VAL.
Rango altitudinal: 1000-4000 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Solidago chilensis Meyen
Sinónimos: *Solidago linearifolia* DC., *Solidago microglossa* DC. var. *linearifolia* (DC.) Baker, *Aster sagei* Phil., *Solidago coquimbana* Phil., *Solidago floribunda* Phil., *Solidago laxiflora* Phil., *Solidago parviflora* Phil., *Solidago recta* Phil., *Solidago valdiviana* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: TAR, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, JFE.
Rango altitudinal: 0-2500 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Fulel, huellen.
Nota: Introducida en el Archipiélago de Juan Fernández.

Solidago patagonica Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: AIS.
Rango altitudinal: 0-500 m.

Soliva

Soliva sessilis Ruiz & Pav.
Sinónimos: *Soliva microlooma* Phil., *Soliva valdiviana* Phil., *Gymnostyles chilensis* Spreng.
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.
Rango altitudinal: 0-1500 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Dicha.

Soliva stolonifera (Brot.) R. Br. ex Sweet
Sinónimos: *Soliva urbica* Phil.
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: RME, MAU, JFE.
Rango altitudinal: 0-500 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.
Nota: Introducida en el Archipiélago de Juan Fernández.

Sonchus

Sonchus arvensis L.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: MAG.

Sonchus asper (L.) Hill

Hierba. Anual o bienal. Introducida.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE, IPA, IDE.

Sonchus oleraceus L.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE, IPA.

Sonchus tenerimus L.

Hierba. Anual o bienal. Introducida.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG, JFE.

Spilanthes

Spilanthes leiocarpa DC.

Sinónimos: *Ceratocephalus leiocarpus* (DC.) Kuntze

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP.

Rango altitudinal: 200-300 m.

Países limítrofes: Perú.

Spinoliva

Spinoliva ilicifolia (Hook. & Arn.) G.Sancho

subsp. *baccharoides* (D.Don ex Hook. & Arn.)

G.Sancho

Sinónimos: *Proustia baccharoides* D. Don ex Hook. & Arn., *Proustia ilicifolia* Hook. & Arn. fma. *baccharoides* (D. Don ex Hook. & Arn.) Fabris

Arbusto. Endémico.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO.

Rango altitudinal: 15-2000 m.

Nombre vulgar: Huañil, olivillo.

Spinoliva ilicifolia (Hook. & Arn.) G.Sancho

subsp. *ilicifolia*

Sinónimos: *Proustia pungens* Poepp. ex Less. var. *ilicifolia* (Hook. & Arn.) DC., *Proustia olivillo* Phil., *Proustia reticulata* Phil., *Proustia ilicifolia* Hook. & Arn. fma. *ilicifolia*

Arbusto. Endémico.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME.

Rango altitudinal: 900-2000 m.

Nombre vulgar: Huañil, olivillo.

Stevia

Stevia philippiana Hieron.

Sinónimos: *Stevia hyssopifolia* Phil., hom. illeg., *Stevia menthaefolia* Phil., hom. illeg., *Stevia hyssopifolia* Phil. var. *panulensis* B.L. Rob. Ex I.M. Johnston, *Porophyllum tarapacanum* Zoellner

Subarbusto. Endémico.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA.

Rango altitudinal: 1600-1800 m.

Nombre vulgar: Mulumulu.

Symphyotrichum

Symphyotrichum glabrefolium (DC.) G.L. Nesom

Sinónimos: *Aster vahlii* (Gaudich.) Hook. & Arn. var. *australis* (Phil.) Reiche, *Erigeron australis* Phil.,

Erigeron glabrefolius DC., *Erigeron scorzoneraefolium* J. Remy, *Aster glabrefolius* (DC.) Reiche

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 1500-2400 m.

Países limítrofes: Argentina.

Symphyotrichum patagonicum (Cabrera) G.L.

Nesom

Sinónimos: *Aster patagonicus* Cabrera

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 250-350 m.

Países limítrofes: Argentina.

Symphyotrichum peteroanum (Phil.) G.L. Nesom

Sinónimos: *Aster peteroanus* Phil., *Aster vahlii* (Gaudich.) Hook. & Arn. var. *latifolius* Cabrera

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.

Rango altitudinal: 1000-2200 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Symphyotrichum squamatum* (Spreng.) G.L.**

Nesom

Sinónimos: *Aster exilis* Elliott var. *australis* A. Gray, *Aster moelleri* (Phil.) Reiche, *Baccharis asterooides* Bertero ex Colla, *Conyza berteroana* Phil., *Conyza squamata* Spreng., *Conyzanthus squamatus* (Spreng.) Tamamsch., *Erigeron depilis* Phil., *Erigeron semiamplexicaule* Meyen, *Aster squamatus* (Spreng.) Hieron., *Tripolium oliganthum* Phil., *Tripolium moelleri* Phil., *Tripolium conspicuum* J. Remy, *Aster asterooides* (Bertero ex Colla) Rusby, comb. illeg., *Symphyotrichum subulatum* (Michx.) G.L. Nesom var. *squamatum* (Spreng.) S.D. Sundb.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 0-2500 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

***Symphyotrichum vahlii* (Gaudich.) G.L. Nesom**

Sinónimos: *Aster vahlii* (Gaudich.) Hook. & Arn. var. *tenuifolius* (Phil.) Cabrera, *Aster vahlii* (Gaudich.) Hook. & Arn., *Aster zosterifolius* Reiche, *Erigeron graminifolius* Phil., *Erigeron pugae* Phil., *Erigeron vahlii* Gaudich., *Symphyotrichum vahlii* (Gaudich.) G.L. Nesom var. *tenuifolium* (Phil.) G.L. Nesom, *Tripolium humile* Phil., *Tripolium tenuifolium* Phil., *Astradelphus calbucanus* Phil., *Erigeron tripolioides* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-1200 m.

Países limítrofes: Argentina.

Tagetes

***Tagetes biflora* Cabrera**

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: ATA.

Rango altitudinal: 0-2500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Tagetes minuta* L.**

Sinónimos: *Tagetes bonariensis* Pers.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB.

Rango altitudinal: 0-2500 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Nombre vulgar: Quinchihue, soyko, suyko blanco.

***Tagetes multiflora* Kunth**

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA.

Rango altitudinal: 1000-4500 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Soyko, sayko, té de burro.

Tanacetum

***Tanacetum parthenium* (L.) Sch. Bip.**

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.

***Tanacetum vulgare* L.**

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: RME, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Taraxacum

***Taraxacum fernandezianum* Dahlst. ex Skottsb.**

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: JFE.

Rango altitudinal: 0-4000 m.

Nota: La cita de Richards (1976) de su presencia en la Región Metropolitana de Santiago se considera dudosa.

***Taraxacum gilliesii* Hook. & Arn.**

Sinónimos: *Taraxacum ibari* Phil., *Taraxacum laevigatum* (Willd.) DC. var. *magellanicum* (Comm. ex Sch. Bip.) Reiche, *Taraxacum magellanicum* Comm. ex Sch. Bip., *Taraxacum magellanicum* Comm. ex Sch. Bip. var. *lobatum* Dahlst.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Taraxacum officinale* F.H. Wigg.**

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE, IPA.

Tessaria

***Tessaria absinthioides* (Hook. & Arn.) DC.**

Sinónimos: *Baccharis absinthioides* Hook. & Arn., *Gynheteria incana* Spreng., p.p., *Pluchea absinthioides* (Hook. & Arn.) H. Rob. & Cuatrec.

Arbusto. Nativo.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO.

Rango altitudinal: 0-3000 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Brea, chilquilla, sorona, péril, callacozo, hierba de la zorra.

Thamnoseris

Thamnoseris lacerata* (Phil.) F. Phil. fma. *lacerata

Sinónimos: *Rea lacerata* Phil.

Arbusto. Endémico.

Distribución: IDE.

Rango altitudinal: 183 m.

***Thamnoseris lacerata* (Phil.) F. Phil. fma.**

***obtusifolia* Skottsb.**

Arbusto. Endémico.

Distribución: IDE.

Tolpis

***Tolpis barbata* (L.) Gaertn.**

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Tragopogon

***Tragopogon dubius* Scop.**

Hierba. Anual o bienal. Introducida.

Distribución: MAU.

***Tragopogon porrifolius* L.**

Hierba. Anual o bienal. Introducida.

Distribución: ANT, COQ, VAL, RME, LBO, BIO, AIS.

Trichocline

***Trichocline aurea* (D. Don) Reiche**

Sinónimos: *Bichenia aurea* D. Don, *Chaetanthera berteriana* Less., *Trichocline pedicularifolia* Walp.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 0-1400 m.

Nombre vulgar: Hierba de la yesca, yerguilla.

***Trichocline caulescens* Phil.**

Sinónimos: *Onoseris lanata* Phil., *Trichocline nivea* Phil., *Trichocline stuebelii* Phil., *Chaetanthera crispa* Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: AYP, TAR, ANT.

Rango altitudinal: 1800-3500 m.

Nombre vulgar: Wanti, garra de león, bailabaila.

***Trichocline cineraria* (D. Don) Hook. & Arn.**

Sinónimos: *Chaetanthera crenata* J. Remy, *Gerbera cineraria* (D. Don) Kuntze, *Leuceria contrayerba* Kurtz, *Trichocline contrayerba* (Kurtz) Hauman, *Trichocline crenata* (J. Remy) Reiche, *Bichenia cineraria* D. Don, *Bichenia crenata* (J. Remy) Wedd.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL.

Rango altitudinal: 1700-3400 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Trichocline dealbata* (Hook. & Arn.) Benth. &**

Hook.f. ex Griseb.

Sinónimos: *Chaetanthera dealbata* Hook. & Arn., *Chaetanthera parviflora* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: RME, LBO.

Rango altitudinal: 2000-3800 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Trichocline deserticola* Zardini**

Sinónimos: *Trichocline spathulata* (Phil.) Zardini, comb. illeg., *Onoseris spathulata* Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: TAR, ANT.
Rango altitudinal: 3500-4000 m.
Nombre vulgar: Pastito plomo, botón.

Tripleurospermum

Tripleurospermum inodorum (L.) Sch. Bip.
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: RME, MAG.

Triptilion

Triptilion achilleae DC.
Sinónimos: *Triptilion chilense* Bertero ex DC., nom. nud., *Triptilion dusenii* O. Hoffm., *Triptilion euphrasiooides* DC., *Triptilion tenuifolium* Phil.
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: RME, LBO, BIO, ARA, LLA.
Rango altitudinal: 0-1500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Triptilion benaventei J. Remy
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: BIO, ARA.
Rango altitudinal: 1000-1300 m.

Triptilion berteroii Phil.
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: RME, LBO, MAU, BIO.
Rango altitudinal: 1200-1600 m.

Triptilion capillatum (D. Don) Hook. & Arn.
Sinónimos: *Triptilion capillatum* (D. Don) Hook. & Arn. var. *andinum* (Phil.) Reiche, *Triptilion capillatum* (D. Don) Hook. & Arn. var. *laxum* (Phil.) Reiche, *Nassauvia capillata* D. Don, *Triptilion andinum* Phil., *Triptilion laxum* Phil.
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO.
Rango altitudinal: 300-2200 m.
Países limítrofes: Argentina.

Triptilion cordifolium Lag. ex Lindl.
Sinónimos: *Nassauvia cordifolia* (Lag. ex Lindl.) D. Don, comb. illeg., *Triptilion maritimum* Poepp. ex DC., nom. nud.
Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO.
Rango altitudinal: 0-500 m.
Nombre vulgar: Siempreviva del cerro.

Triptilion gibbosum J. Remy

Sinónimos: *Triptilion compactum* Phil., *Triptilion pusillum* Phil.
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: ATA, COQ.
Rango altitudinal: 0-500 m.

Triptilion spinosum Ruiz & Pav.

Sinónimos: *Triptilion bulbosum* J. Remy, *Triptilion diffusum* D. Don, *Triptilion digitatum* Phil., *Triptilion pectinatum* Phil. var. *millefolium* (Phil.) Reiche, *Triptilion pectinatum* Phil., *Triptilion ramulosum* Phil., *Triptilion spinosum* Ruiz & Pav. var. *eriochlaenum* DC., *Triptilion spinosum* Ruiz & Pav. var. *integrifolium* (Phil.) Reiche, *Triptilion spinosum* Ruiz & Pav. var. *remyanum* (Phil.) Reiche, *Nassauvia spinosa* (Ruiz & Pav.) D. Don, *Nassauvia diffusa* D. Don, nom. illeg., *Triptilion humile* Phil., *Triptilion integrifolium* Phil., *Triptilion laciniatum* Willd., *Triptilion millefolium* Phil., *Triptilion remyanum* Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.
Rango altitudinal: 0-1500 m.
Nombre vulgar: Siempreviva.

Trixis

Trixis cacalioides (Kunth) D. Don
Sinónimos: *Perdicium cacalioides* Kunth
Arbusto. Nativo.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA.
Rango altitudinal: 0-3000 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Urmenetea

Urmenetea atacamensis Phil.
Sinónimos: *Onoseris atacamensis* (Phil.) Hoffm.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ANT, ATA.
Rango altitudinal: 2400-4000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Kótar, koka del desierto, coquilla, oreja de ratón.

Distribución: AYP, TAR.
Rango altitudinal: 2800-3800 m.

Urospermum

***Urospermum picroides* (L.) F.W. Schmidt**

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: COQ, VAL, RME.

Verbesina

***Verbesina aurita* Phil.**

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: ANT, ATA.

Rango altitudinal: 2000-2500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Verbesina encelioides* (Cav.) Benth. & Hook.f. ex A. Gray**

Sinónimos: *Verbesina scabra* Phil., hom. illeg.,

Ximenesia encelioides Cav., *Verbesina encelioides* (Cav.) Echegaray, comb. illeg.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: ANT, ATA.

Rango altitudinal: 0-2500 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Nombre vulgar: Maravilla, flor amarilla, mirasol, mirasol chico.

***Verbesina saubinetia* Klatt**

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ.

Rango altitudinal: 500-700 m.

Villanova

***Villanova oppositifolia* Lag.**

Sinónimos: *Vasquezia biternata* Phil., *Vasquezia oppositifolia* (Lag.) S.F. Blake

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: ANT.

Rango altitudinal: 0-300 m.

Países limítrofes: Bolivia y Perú.

***Villanova robusta* Phil.**

Hierba. Perenne. Endémica.

Volutaria

***Volutaria tubuliflora* (Murb.) Sennen**

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: ATA, COQ.

Werneria

***Werneria aretioides* Wedd.**

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT.

Rango altitudinal: 4000-5000 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Werneria cochlearis* Griseb.**

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ANT.

Rango altitudinal: 4500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Werneria glaberrima* Phil.**

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT.

Rango altitudinal: 4200-4600 m.

Países limítrofes: Bolivia.

Nombre vulgar: Maransel, comida de vizcacha.

***Werneria heteroloba* Wedd.**

Sinónimos: *Werneria heteroloba* Wedd. fma.

microcephala Rockh.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 3500-5000 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Tequerere, pasto de bofedal.

***Werneria pinnatifida* J. Remy**

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 3400-4450 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Werneria pygmaea* Gillies ex Hook. & Arn.**

Sinónimos: *Werneria denticulata* S.F. Blake, *Werneria brachypappa* Phil., hom. illeg., *Werneria rhizoma* J. Remy, *Werneria brachypappa* Sch. Bip.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME.
Rango altitudinal: 2200-5000 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.
Nombre vulgar: Mamañika, qatari, anojarpsike, vega.

Werneria solivifolia Sch. Bip.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP.
Rango altitudinal: 4000-4500 m.
Países limítrofes: Bolivia y Perú.

Werneria spathulata Wedd.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT.
Rango altitudinal: 4000-4500 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.
Nombre vulgar: Pupusa, pupusa de agua.

Xanthium

Xanthium spinosum L.
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE.

Xanthium strumarium L.
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: ATA, COQ, RME, LBO, NUB, BIO.

Xenophyllum

Xenophyllum ciliolatum (A. Gray) V.A. Funk
Sinónimos: *Werneria ciliolata* A. Gray
Subarbusto. Nativo.
Distribución: AYP, TAR, ANT.
Rango altitudinal: 4000-5200 m.
Países limítrofes: Bolivia y Perú.
Nombre vulgar: Pupusa, poposa, yaretilla.

Xenophyllum esquilachense (Cuatrecasas) V.A. Funk

Sinónimos: *Werneria esquilachensis* Cuatrecasas, *Senecio pfisteri* Ricardi & Martic.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP.
Rango altitudinal: 3700-4830 m.
Países limítrofes: Bolivia y Perú.

Xenophyllum incisum (Phil.) V.A. Funk
Sinónimos: *Werneria incisa* Phil.
Subarbusto. Nativo.
Distribución: AYP, TAR, ANT.
Rango altitudinal: 4300-4400 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Pupusa del agua, pupusa del campo.

Xenophyllum juniperinum (Hieron.) J. Calvo
Sinónimos: *Werneria juniperina* Hieron.
Subarbusto. Nativo.
Distribución: AYP.
Rango altitudinal: 4100-5200 m.
Países limítrofes: Bolivia y Perú.

Xenophyllum poposum (Phil.) V.A. Funk
Sinónimos: *Werneria poposa* Phil.
Subarbusto. Nativo.
Distribución: AYP, TAR, ANT.
Rango altitudinal: 3500-5300 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.
Nombre vulgar: Poposa, pupusa, jasuaso, asoaso, yareta.

Xenophyllum pseudodigitatum (Rockh.) V.A. Funk
Sinónimos: *Werneria pseudodigitata* Rockh.
Subarbusto. Nativo.
Distribución: AYP, TAR, ANT.
Rango altitudinal: 4000-5000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Xenophyllum weddellii (Phil.) V.A. Funk
Sinónimos: *Werneria weddellii* Phil.
Subarbusto. Nativo.
Distribución: AYP, TAR, ANT.
Rango altitudinal: 4000-5000 m.
Países limítrofes: Bolivia y Perú.
Nombre vulgar: Poposa, pupusa, purapura.

Yunquea

***Yunquea tenzii* Skottsb.**

Arbusto o árbol pequeño. Endémico.

Distribución: JFE.

Rango altitudinal: 0-500 m.

ATHEROSPERMATACEAE

Laurelia

***Laurelia sempervirens* (Ruiz & Pav.) Tul.**

Sinónimos: *Pavonia sempervirens* Ruiz & Pav., *Laurelia serrata* Bertero, *Laurelia aromatica* Juss. ex Poir., *Atherosperma sempervirens* (Ruiz & Pav.) Baill., *Thiga chilensis* Molina

Árbol. Endémico.

Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Nombre vulgar: Laurel.

Laureliopsis

***Laureliopsis philippiana* (Looser) Schodde**

Sinónimos: *Laurelia philippiana* Looser

Árbol. Nativo.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Tepa, huahuán, laurela.

BALANOPHORACEAE

Omphophytum

***Omphophytum subterraneum* (Aspl.) B. Hansen**

Sinónimos: *Juelia subterranea* Aspl., *Juelia lilloana*

Sleumer, *Juelia meyeri* Sleumer, *Omphophytum peruvianum* auct. non Poepp. & Endl.

Hierba parásita. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT.

Rango altitudinal: 500-4000 m.

Países limítrofes: Argentina y Perú.

Nombre vulgar: Maíz del monte, sicha, pora.

BASELLACEAE

Anredera

***Anredera cordifolia* (Ten.) Steenis**

Arbusto trepador. Introducido.

Distribución: VAL, IPA.

BERBERIDACEAE

Berberis

***Berberis actinacantha* Mart.**

Sinónimos: *Berberis brachyacantha* Phil. ex Reiche, *Berberis coquimbensis* Muñoz, *Berberis crispa* Gay, *Berberis florida* Phil., *Berberis hakeoides* (Hook.f.) C.K. Schneid., *Berberis variiflora* C.K. Schneid., *Berberis actinacantha* Mart. var. *crispa* (Gay) Reiche, *Berberis congestiflora* Gay var. *hakeoides* Hook.f.

Árbusto. Endémico.

Distribución: ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.

Rango altitudinal: 100-1900 m.

Nombre vulgar: Michay.

***Berberis chilensis* Gillies ex Hook. & Arn. var.**

***brachybotria* (Gay) Landrum**

Sinónimos: *Berberis brachybotria* Gay, *Berberis brachybotria* Gay var. *brevispina* Reiche

Árbusto. Endémico.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO.

Rango altitudinal: 0-1500 m.

Berberis chilensis* Gillies ex Hook. & Arn. var. *chilensis

Sinónimos: *Berberis diffusa* Gay, *Berberis ferox* Gay, *Berberis fragrans* Phil. ex Reiche, *Berberis chilensis* Gillies ex Hook. var. *diffusa* (Gay) Reiche, *Berberis chilensis* Gillies ex Hook. var. *ferox* (Gay) Reiche, *Berberis gayi* K. Koch

Árbusto. Endémico.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 300-1600 m.

Nombre vulgar: Michay.

Berberis congestiflora Gay

Arbusto. Endémico.

Distribución: RME, ARA, LRI.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Nombre vulgar: Michay.

Berberis corymbosa Hook. & Arn.

Sinónimos: *Berberis paniculata* Phil., *Berberis*

corymbosa Hook. & Arn. var. *paniculata* (Phil.) Reiche

Arbusto o árbol pequeño. Endémico.

Distribución: JFE.

Rango altitudinal: 300-600 m.

Berberis darwinii Hook.

Sinónimos: *Berberis costulata* Gand., *Berberis knightii* (Lindl.) K. Koch, *Mahonia knightii* Lindl.

Arbusto. Nativo.

Distribución: RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 0-1500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Michay, quelung.

Berberis empetrifolia Lam.

Sinónimos: *Berberis mutabilis* Phil., *Berberis wawrana* C.K. Schneid., *Berberis empetrifolia* Lam. var. *magellanica* C.K. Schneid.

Subarbusto. Nativo.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-3500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Zarcilla, monte negro, uva de la cordillera.

Berberis glomerata Hook. & Arn.

Sinónimos: *Berberis glomerata* Hook. & Arn. var. *zahlbrückneriana* (C.K. Schneid.) Ahrendt, *Berberis zahlbrückneriana* C.K. Schneid.

Arbusto. Endémico.

Distribución: COQ, VAL.

Rango altitudinal: 500-1000 m.

Berberis horrida Gay

Sinónimos: *Berberis pilosifolia* Ahrendt, *Berberis actinacantha* Mart. var. *mollis* Reiche, *Berberis actinacantha* Mart. var. *horrida* (Gay) Reiche

Arbusto. Endémico.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO.

Rango altitudinal: 800-1000 m.

Nombre vulgar: Michay.

Berberis ilicifolia L.f.

Sinónimos: *Berberis subantarctica* Gand., *Berberis lagenaria* Poir.

Arbusto o árbol pequeño. Nativo.

Distribución: LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Chelia.

Berberis litoralis Phil.

Arbusto o árbol pequeño. Endémico.

Distribución: ANT.

Rango altitudinal: 500-1000 m.

Nombre vulgar: Michay de Paposo.

Berberis masafuerana Skottsb.

Arbusto o árbol pequeño. Endémico.

Distribución: JFE.

Rango altitudinal: 200-1100 m.

Berberis microphylla G. Forst.

Sinónimos: *Berberis buxifolia* Lam. var. *antucoana* (C.K. Schneid.) Orsi, *Berberis buxifolia* Lam., *Berberis heterophylla* Juss. ex Poir., *Berberis inermis* Pers., *Berberis antucoana* C.K. Schneid., *Berberis buxifolia* Lam. var. *nuda* C.K. Schneid., *Berberis marginata* Gay, *Berberis spinosissima* (Reiche) Ahrendt, *Berberis buxifolia* Lam. var. *spinosissima* Reiche, *Berberis buxifolia* Lam. var. *papillosa* C.K. Schneid., *Berberis dulcis* Sweet, *Berberis buxifolia* Lam. var. *antarctica* C.K. Schneid.

Arbusto. Nativo.

Distribución: RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-2500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Calafate, michay, mulun.

Berberis montana Gay

Sinónimos: *Berberis chillanensis* (C.K. Schneid.) Sprague ex Bean, *Berberis chillanensis* (C.K. Schneid.) Sprague ex Bean var. *hirsutipes* Sprague, *Berberis coletioides* Lechl., *Berberis polypetala* Phil., *Berberis montana* Gay var. *gracilis* C.K. Schneid., *Berberis montana* Gay var. *chillanensis* C.K. Schneid., *Berberis montana* Gay var. *coletioides* (Lechl.) C.K. Schneid., *Berberis buxifolia* Lam. var. *montana* (Gay) Reiche, *Berberis coletioides* Lechl. var. *gracilis* (C.K. Schneid.) Ahrendt
Arbusto. Nativo.
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.
Rango altitudinal: 500-2700 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Palo amarillo.

Berberis negeriana Tischler
Arbusto. Endémico.
Distribución: BIO.
Rango altitudinal: 200-300 m.

Berberis rotundifolia Poepp. & Endl.
Sinónimos: *Berberis philippii* Ahrendt, *Berberis polymorpha* Phil.
Arbusto. Endémico.
Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.
Rango altitudinal: 200-2300 m.

Berberis serratodentata Lechl.
Sinónimos: *Berberis pearcei* Phil.
Arbusto. Nativo.
Distribución: NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.
Rango altitudinal: 500-2000 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Saloll.

Berberis trigona Kunze ex Poepp. & Endl.
Sinónimos: *Berberis linearifolia* Phil., *Berberis linearifolia* Phil. var. *longifolia* (Reiche) Ahrendt, *Berberis grisebachii* Lechl., *Berberis trigona* Kunze ex Poepp. & Endl. var. *longifolia* Reiche
Arbusto. Nativo.
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG.
Rango altitudinal: 500-1800 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Calafate, michay.

Berberis valdiviana Phil.
Sinónimos: *Berberis valdiviana* Phil. var. *gracilifolia* Ahrendt
Arbusto o árbol pequeño. Endémico.
Distribución: RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.
Rango altitudinal: 0-1000 m.
Nombre vulgar: Clen, espina en cruz.

BERBERIDOPSISIDACEAE

Berberidopsis

Berberidopsis corallina Hook.f.
Arbusto. Endémico.
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.
Rango altitudinal: 100-600 m.
Nombre vulgar: Michay rojo.

BETULACEAE

Alnus

Alnus glutinosa (L.) Gaertn.
Árbol. Introducido.
Distribución: COQ, RME, BIO, LLA.
Nombre vulgar: Aliso.

BIGNONIACEAE

Argylia

Argylia ascendens DC. var. *ascendens*
Sinónimos: *Argylia huidobriana* Clos, *Argylia lutea* Phil., *Argylia viridis* Phil. var. *lutea* (Phil.) Reiche
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO.
Rango altitudinal: 900-3200 m.
Nombre vulgar: Triaca.

Argylia ascendens DC. var. *viridis* (Phil.) Gleisner & Ricardi

Sinónimos: *Argylia viridis* Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, RME.

Rango altitudinal: 1800-2500 m.

***Argylia bifrons* Phil.**

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ATA.

Rango altitudinal: 3000-3500 m.

***Argylia bustillosii* Phil.**

Sinónimos: *Argylia australis* Phil., *Argylia potentillifolia* DC. var. *australis* (Phil.) Macloskie, comb. illeg., *Argylia potentillifolia* DC. var. *australis* (Phil.) Speg.

Subarbusto. Nativo.

Distribución: LBO, BIO.

Rango altitudinal: 800-2500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Argylia checoensis* (Meyen) I.M. Johnst.**

Sinónimos: *Oxalis checoensis* Meyen, *Argylia incana* Phil., *Argylia sitiens* I.M. Johnst.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ANT, ATA.

Rango altitudinal: 1000-3000 m.

***Argylia farnesiana* Gleisner & Ricardi**

Subarbusto. Endémico.

Distribución: ATA, COQ.

Rango altitudinal: 900-1000 m.

***Argylia geranioides* DC.**

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ATA, COQ.

Rango altitudinal: 900-1400 m.

***Argylia glutinosa* Phil.**

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ANT, ATA.

Rango altitudinal: 1400-2900 m.

***Argylia potentillifolia* DC.**

Sinónimos: *Argylia potentillaefolia* DC. var. *beta* Clos

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ATA, COQ.

Rango altitudinal: 200-3500 m.

***Argylia radiata* (L.) D. Don**

Sinónimos: *Bignonia radiata* L., *Argylia canescens* D.

Don, *Argylia puberula* DC., *Argylia feuillie* DC., *Argylia tenuifolia* C. Presl, *Oxymitus argylioides* C. Presl, *Argylia chrysantha* Phil., *Argylia eremophila* Phil., *Argylia glabriuscula* Phil., *Argylia villosa* Phil., *Argylia digitalina* Phil., *Argylia viridis* Phil. var. *digitalina* (Phil.) Reiche

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME.

Rango altitudinal: 0-800 m.

Países limítrofes: Perú.

Nombre vulgar: Flor del jote, cartucho, terciopelo.

***Argylia tomentosa* Phil.**

Sinónimos: *Argylia tomentosa* Phil. var. *tenella* (Phil.)

Reiche, *Argylia tenella* Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ANT, ATA.

Rango altitudinal: 2400-2900 m.

***Argylia uspallatensis* DC.**

Sinónimos: *Argylia trifoliata* DC., *Tecoma uspallatensis* Mart. ex DC.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ANT, VAL.

Rango altitudinal: 1700-4100 m.

Países limítrofes: Argentina.

Campsidium

***Campsidium valdivianum* (Phil.) Skottsb.**

Sinónimos: *Campsidium chilense* Reissek & Seem., *Tecoma valdiviana* Phil.

Arbusto trepador. Nativo.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-800 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Pilpilvoqui blanco, voqui bejuco, voqui de canasta.

Eccremocarpus

***Eccremocarpus scaber* Ruiz & Pav.**

Sinónimos: *Calampelis scaber* (Ruiz & Pav.) D. Don, comb. illeg., *Calampelis scaber* (Ruiz & Pav.) Sweet, *Eccremocarpus scaber* Ruiz & Pav. var. *sepium* Bertero ex A.DC., *Eccremocarpus sepium* Bertero
Arbusto trepador. Nativo.
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.
Rango altitudinal: 200-2400 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Chupa-chupa, chupapoto.

Tecoma

***Tecoma fulva* (Cav.) D. Don**
Sinónimos: *Bignonia fulva* Cav., *Tecomaria fulvum* (Cav.) Seem., *Bignonia meyeniana* Schauer, *Stenolobium fulvum* (Cav.) Sprague
Arbusto. Nativo.
Distribución: AYP, TAR.
Rango altitudinal: 200-2300 m.
Países limítrofes: Bolivia y Perú.
Nombre vulgar: Chuvé.

BORAGINACEAE

Amsinckia

***Amsinckia calycina* (Moris) Chater**
Sinónimos: *Lithospermum calycinum* Moris, *Amsinckia angustifolia* Lehm., *Amsinckia angustifolia* Lehm. var. *pseudolycopsioides* Clos, *Lithospermum chilense* Colla
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: TAR, ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-4500 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.
Nombre vulgar: Hierba rocilla.

***Amsinckia tessellata* A. Gray**
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: RME.
Rango altitudinal: 0-500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Asperugo

***Asperugo procumbens* L.**
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: MAG.

Borago

***Borago officinalis* L.**
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Buglossoides

***Buglossoides arvensis* (L.) I.M. Johnst.**
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: AIS.

Cordia

***Cordia decandra* Hook. & Arn.**
Arbusto o árbol pequeño. Endémico.
Distribución: ANT, ATA, COQ.
Rango altitudinal: 0-1200 m.
Nombre vulgar: Carbón, carbonillo.

Cryptantha

***Cryptantha alfalfalis* (Phil.) I.M. Johnst.**
Sinónimos: *Eritrichium alfalfalis* Phil., *Eritrichium rigidum* Phil.
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: RME, LBO.
Rango altitudinal: 700-1100 m.

***Cryptantha alyssoides* (A. DC.) Reiche**
Sinónimos: *Eritrichium alyssoides* A. DC., *Eritrichium gilliesii* Phil., *Eritrichium talquinum* Phil., *Cryptantha talquina* (Phil.) Brand
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU.
Rango altitudinal: 1000-2700 m.

Cryptantha aprica (Phil.) Reiche

Sinónimos: *Eritrichium apricum* Phil., *Eritrichium bridgesii* Phil., *Eritrichium lignosum* Phil., *Eritrichium*

denudatum Phil., *Eritrichium closii* Phil., *Eritrichium rengifoanum* Phil., *Cryptantha candelabrum* Brand
Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO.
Rango altitudinal: 400-2400 m.

***Cryptantha argentea* I.M. Johnst.**

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ANT, ATA.

Rango altitudinal: 0-500 m.

***Cryptantha aspera* (Phil.) Grau**

Sinónimos: *Eritrichium asperum* Phil.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-600 m.

***Cryptantha calycina* (Phil.) Reiche**

Sinónimos: *Eritrichium calycinum* Phil.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 3100-3800 m.

***Cryptantha calycotricha* I.M. Johnst.**

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, RME.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

***Cryptantha capituliflora* (Clos) Reiche**

Sinónimos: *Eritrichium capituliflorum* Clos, *Eritrichium cephalanthum* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME.

Rango altitudinal: 2000-3500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Cryptantha chaetocalyx* (Phil.) I.M. Johnst.**

Sinónimos: *Eritrichium chaetocalyx* Phil., *Cryptantha divaricata* Reiche, *Eritrichium pustulosum* Phil., *Eritrichium divaricatum* Phil.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: ANT, ATA.

Rango altitudinal: 0-800 m.

***Cryptantha chispa* Grau**

Sinónimos: *Eritrichium affine* Phil.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: COQ.

Rango altitudinal: 0-500 m.

***Cryptantha clandestina* (Trevir.) I.M. Johnst.**

Sinónimos: *Lithospermum clandestinum* Trevir., *Cryptantha philippiana* Brand

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 995-2050 m.

***Cryptantha cynoglossoides* (Phil.) I.M. Johnst.**

Sinónimos: *Eritrichium cynoglossoides* Phil., *Eritrichium uspallatense* Phil., *Cryptantha phaceloides* auct. non (Clos) Reiche

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: COQ.

Rango altitudinal: 700-4000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Cryptantha dichita* (Phil.) I.M. Johnst.**

Sinónimos: *Eritrichium dichita* Phil.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: ATA.

Rango altitudinal: 2400 m.

NOMBRE vulgar: Papur.

***Cryptantha diffusa* (Phil.) I.M. Johnst.**

Sinónimos: *Eritrichium diffusum* Phil., *Eritrichium debile* Phil., *Cryptantha debilis* (Phil.) Reiche, *Cryptantha famatinae* Brand, *Cryptantha borchersii* (Phil.) Hauman, *Eritrichium borchersii* Phil., *Eritrichium micranthum* Phil.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 2000-4100 m.

Países limítrofes: Argentina.

NOMBRE vulgar: Chapinchora macho.

***Cryptantha dimorpha* (Phil.) Greene**

Sinónimos: *Eritrichium dimorphum* Phil.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME.

Rango altitudinal: 600-2000 m.

***Cryptantha diplotricha* (Phil.) Reiche**

Sinónimos: *Eritrichium diplotrichum* Phil., *Eritrichium diplotrichum* Phil. var. *humilis* Phil., *Eritrichium axillare*

Phil., *Cryptantha hossei* Brand, *Cryptantha modesta* Brand, *Cryptantha capituliflora* (Clos) Reiche var. *compacta* Brand, *Cryptantha axillaris* (Phil.) Reiche, *Cryptantha diplotricha* (Phil.) Reiche var. *humilis* (Phil.) Reiche
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: AYP.
Rango altitudinal: 2000-4500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Cryptantha dolichophylla (Phil.) Reiche
Sinónimos: *Eritrichium dolichophyllum* Phil.
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: ATA, COQ.
Rango altitudinal: 100-1200 m.

Cryptantha filaginea (Phil.) Reiche
Sinónimos: *Eritrichium filagineum* Phil.
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: ANT, ATA, COQ.
Rango altitudinal: 0-2600 m.
Países limítrofes: Perú.

Cryptantha filiformis (Phil.) Reiche
Sinónimos: *Eritrichium filiforme* Phil., *Eritrichium mite* Phil.
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: TAR, ANT, COQ.
Rango altitudinal: 0-700 m.

Cryptantha gayi I.M. Johnst.
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: ATA, COQ.
Rango altitudinal: 0-900 m.

Cryptantha globulifera (Clos) Reiche
Sinónimos: *Eritrichium globuliferum* Clos, *Eritrichium floribundum* Phil., *Cryptantha floribunda* (Phil.) Reiche, *Eritrichium carriazalense* Phil., *Eritrichium glareosum* Phil., *Eritrichium oliganthum* Phil., *Eritrichium parvulum* Phil., *Eritrichium sphaerophorum* Phil.
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ATA, COQ, VAL, RME.
Rango altitudinal: 0-1500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Cryptantha glomerata Lehm. ex Fisch. & C.A. Mey. subsp. ***glomerata***
Sinónimos: *Eritrichium strictum* Phil., *Eritrichium longisetum* Phil., *Eritrichium diplasianthum* Phil., *Eritrichium foliosum* Phil., *Cryptantha candelleana* Brand
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: TAR, ANT, COQ, VAL, RME, LBO, NUB, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 0-2800 m.

Cryptantha glomerata Lehm. ex Fisch. & C.A. Mey. subsp. ***quadrinuculata*** Grau
Sinónimos: *Eritrichium vidali* Phil., *Cryptantha vidali* (Phil.) Reiche
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: COQ, VAL.
Rango altitudinal: 0-600 m.

Cryptantha glomerulifera (Phil.) I.M. Johnst.
Sinónimos: *Eritrichium glomeruliferum* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ATA, COQ, VAL, RME.
Rango altitudinal: 2000-3500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Cryptantha gnaphaloides (A. DC.) Reiche
Sinónimos: *Eritrichium gnaphaloides* A. DC., *Eritrichium fruticosum* Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ANT, ATA, COQ.
Rango altitudinal: 0-2900 m.
Nombre vulgar: Té de burro.

Cryptantha haplostachya (Phil.) I.M. Johnst.
Sinónimos: *Eritrichium haplostachyum* Phil.
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: ATA.
Rango altitudinal: 200 m.

Cryptantha hispida (Phil.) Reiche
Sinónimos: *Eritrichium hispidum* Phil.
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: ANT, ATA.
Rango altitudinal: 2700-3800 m.
Nombre vulgar: Itallapa.

Cryptantha involucrata (Phil.) Reiche
Sinónimos: *Eritrichium involucratum* Phil.
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: ATA, COQ, RME.
Rango altitudinal: 1300-3500 m.

Cryptantha kingii (Phil.) Reiche
Sinónimos: *Eritrichium kingii* Phil., *Eritrichium virens* Phil., *Eritrichium macrocalyx* Phil., *Cryptantha virens* (Phil.) Reiche, *Cryptantha macrocalyx* (Phil.) Reiche
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: ATA, COQ.
Rango altitudinal: 0-600 m.

Cryptantha limensis (A. DC.) I.M. Johnst.
Sinónimos: *Eritrichium limense* A. DC.
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: ANT.
Rango altitudinal: 3800 m.
Países limítrofes: Perú.

Cryptantha linearis (Colla) Greene
Sinónimos: *Eritrichium lineare* (Colla) DC., *Myosotis linearis* Colla, *Eritrichium minutiflorum* Phil., *Cryptantha minutiflora* (Phil.) Brand, *Eritrichium gracile* Phil., *Cryptantha gracilis* (Phil.) Reiche, *Eritrichium fallax* Phil., *Cryptantha fallax* (Phil.) Reiche
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU.
Rango altitudinal: 0-1200 m.
Nombre vulgar: Sobaquillo.

Cryptantha longifolia (Phil.) Reiche
Sinónimos: *Eritrichium longifolium* Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ.

Cryptantha marioricardiana Teillier
Subarbusto. Endémico.
Distribución: ATA.
Rango altitudinal: 0-100 m.

Cryptantha marticorenae Grau
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: ATA, COQ.
Rango altitudinal: 300-900 m.

Cryptantha phaceloides (Clos) Reiche
Sinónimos: *Eritrichium phaceloides* Clos
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: ANT, ATA.
Rango altitudinal: 3300 m.

Cryptantha romanii I.M. Johnst.
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: ANT, ATA.
Rango altitudinal: 500 m.

Cryptantha spathulata (Phil.) Reiche
Sinónimos: *Eritrichium spathulatum* Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: LBO.

Cryptantha subamplexicaulis (Phil.) Reiche
Sinónimos: *Eritrichium subamplexicaule* Phil.
Hierba. Anual o perenne. Endémica.
Distribución: TAR, ANT.
Rango altitudinal: 0-500 m.

Cryptantha talatalensis I.M. Johnst.
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: ANT, ATA, COQ.
Rango altitudinal: 0-400 m.

Cryptantha volckmannii (Phil.) I.M. Johnst.
Sinónimos: *Eritrichium volckmannii* Phil., *Eritrichium chrysanthum* Phil., *Cryptantha chrysantha* (Phil.) Reiche
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: COQ.
Rango altitudinal: 600-2900 m.

Cryptantha werdermanniana I.M. Johnst.
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: ANT.
Rango altitudinal: 2300 m.

Cynoglossum

Cynoglossum creticum Mill.
Hierba. Bienal. Introducida.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE.

Cynoglossum zeylanicum (Vahl ex Hornem.)
Thunb. ex Lehm.
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: MAU, ARA, LLA.

Echium

Echium plantagineum L.
Hierba. Anual o bienal. Introducida.
Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Echium vulgare L.
Hierba. Bienal. Introducida.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Johnstonella

Johnstonella parviflora (Phil.) Hasenstab & M.G. Simpson
Sinónimos: *Cryptantha parviflora* (Phil.) Reiche, *Eritrichium parviflorum* Phil., *Eritrichium microphyllum* Phil., *Cryptantha microphylla* (Phil.) Reiche
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA.
Rango altitudinal: 20-3600 m.
Países limítrofes: Perú.

Lappula

Lappula redowskii (Hornem.) Greene
Sinónimos: *Myosotis redowskii* Hornem.
Hierba. Anual o bienal. Nativa.
Distribución: MAG.
Rango altitudinal: 100-150 m.
Países limítrofes: Argentina.

Myosotis

Myosotis albiflora Banks & Sol. ex Hook.f.
Sinónimos: *Eritrichium albiflorum* Griseb.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-200 m.
Países limítrofes: Argentina.

Myosotis antarctica Hook. f.
Hierba. Anual o perenne. Endémica.
Distribución: MAG.
Rango altitudinal: 0-500 m.

Myosotis arvensis (L.) Hill
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG, JFE.

Myosotis azorica H.C. Watson ex Hook.
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: LLA.

Myosotis discolor Pers. subsp. *canariensis* (Pit.) Grau
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: AIS, MAG.

Myosotis discolor Pers. subsp. *discolor*
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: MAU, ARA, LRI, MAG.

Myosotis latifolia Poir.
Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: ATA, RME, NUB, BIO, LRI.

Myosotis laxa Lehm.
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, JFE.

Myosotis ramosissima Rochel
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: MAG.

Myosotis scorpioides L.
Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: RME, ARA, LLA, AIS, MAG.

Myosotis stricta Link ex Roem. & Schult.
Hierba. Anual o perenne. Introducida.
Distribución: AIS, MAG.

Myosotis sylvatica Ehrh. ex Hoffm.
Hierba. Bienal. Introducida.

Distribución: JFE.

Nama

Nama dichotomum (Ruiz & Pav.) Choisy
Sinónimos: *Nama stricta* Phil., *Nama dichotomum* (Ruiz & Pav.) Choisy fma. *amplifolia* Brand, *Nama dichotomum* (Ruiz & Pav.) Choisy var. *amplifolia* (Brand) C.L. Hitchc., *Nama dichotomum* (Ruiz & Pav.) Choisy var. *stricta* (Phil.) Brand, *Hydrolea dichotoma* Ruiz & Pav., *Marylaunidium dichotomum* (Ruiz & Pav.) Kuntze
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT, RME.
Rango altitudinal: 1000-4000 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Nama undulatum Kunth var. *australe* C.L. Hitchc.
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: ATA.
Rango altitudinal: 1000-3000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Nesocaryum

Nesocaryum stylosum (Phil.) I.M. Johnst.
Sinónimos: *Heliotropium stylosum* Phil.
Arbusto. Endémico.
Distribución: IDE.
Rango altitudinal: 0-200 m.

Omphalodes

Omphalodes linifolia (L.) Moench
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: ARA.

Pectocarya

Pectocarya anomala I.M. Johnst.
Hierba. Anual o bienal. Nativa.
Distribución: AYP, TAR.
Rango altitudinal: 2300-2600 m.
Países limítrofes: Perú.

Pectocarya dimorpha (I.M. Johnst.) I.M. Johnst.

Sinónimos: *Pectocarya gracilis* (Ruiz & Pav.) I.M. Johnst. var. *dimorpha* I.M. Johnst.
Hierba. Anual o bienal. Endémica.
Distribución: ANT, ATA, COQ.
Rango altitudinal: 0-1500 m.

Pectocarya linearis (Ruiz & Pav.) DC.
Sinónimos: *Cynoglossum lineare* Ruiz & Pav.
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, BIO, AIS.
Rango altitudinal: 10-3700 m.

Pectocarya pusilla (A. DC.) A. Gray
Sinónimos: *Gruvelia pusilla* A. DC.
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: VAL, LBO.
Rango altitudinal: 0-500 m.

Phacelia

Phacelia brachyantha Benth.
Sinónimos: *Phacelia brachyantha* Benth. var. *paniculata* A.DC., *Phacelia clinopodioides* Bertero ex Brand, *Phacelia simplicifolia* Colla
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAG.
Rango altitudinal: 1500-4500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Phacelia cumingii (Benth.) A. Gray
Sinónimos: *Eutoca cumingii* Benth., *Microgenetes cumingii* A.DC., *Phacelia cumingii* (Benth.) A. Gray var. *pusilla* (Phil.) Reiche, *Phacelia cumingii* (Benth.) A. Gray var. *litoralis* (Phil.) Reiche, *Phacelia cumingii* (Benth.) A. Gray var. *grandis* (Phil.) Reiche, *Phacelia cumingii* (Benth.) A. Gray var. *frigida* (Phil.) Brand, *Eutoca frigida* Phil., *Eutoca peraltae* Phil., *Phacelia frigida* (Phil.) Reiche, *Eutoca litoralis* Phil., *Eutoca grandis* Phil., *Eutoca pinnatifida* Phil., *Eutoca pusilla* Phil.
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO.
Rango altitudinal: 3200-3800 m.
Países limítrofes: Argentina.

Phacelia nana Wedd.

Sinónimos: *Eutoca lomarifolia* Phil.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: TAR, ANT.

Rango altitudinal: 3500-4700 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

***Phacelia pinnatifida* Griseb. ex Wedd.**

Sinónimos: *Phacelia boliviensis* Brand, *Phacelia pinnatifida* Griseb. ex Wedd. var. *lobulata* Hicken, *Phacelia pinnatifida* Griseb. ex Wedd. var. *decumbens* Brand, *Phacelia pinnatifida* Griseb. ex Wedd. var. *elatior* Griseb., *Phacelia pinnatifida* Griseb. ex Wedd. var. *foliosa* Reiche, *Phacelia pinnatifida* Griseb. ex Wedd. var. *robusta* Wedd., *Phacelia viscosa* Phil., *Phacelia foliosa* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 1000-4600 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Phacelia secunda* J.F. Gmel. var. *pinnata* (Vahl)**

Deginani

Sinónimos: *Heliotropium pinnatum* Vahl, *Phacelia magellanica* (Lam.) Coville fma. *robusta* Brand, *Phacelia pinnata* (Ruiz & Pav.) J.F. Macbr. var. *robusta* (Brand) J.F. Macbr., *Phacelia secunda* J.F. Gmel. subsp. *pinnata* (Ruiz & Pav.) Constance, *Phacelia magellanica* (Lam.) Coville fma. *amoena* Brand, *Phacelia pinnata* (Ruiz & Pav.) J.F. Macbr., *Aldea pinnata* Ruiz & Pav., *Phacelia magellanica* (Lam.) Coville fma. *pinnata* (Vahl) Brand

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAU, MAG.

Rango altitudinal: 1500-3500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Phacelia secunda* J.F. Gmel. var. *secunda

Sinónimos: *Phacelia magellanica* (Lam.) Coville fma. *plantaginea* Brand, *Phacelia magellanica* (Lam.) Coville fma. *andina* Brand, *Phacelia magellanica* (Lam.) Coville fma. *genuina* Brand, nom. illeg., *Aldea circinata* Willd., *Phacelia parviflora* Phil., *Phacelia circinata* (Willd.) Jacq., *Phacelia circinata* (Willd.) Jacq. var. *acutiloba* DC., *Phacelia circinata* (Willd.) Jacq. var. *paniculata* DC., *Phacelia circinata* (Willd.) Jacq. var. *obtusiloba* DC., *Phacelia secunda* J.F. Gmel. subsp. *plantaginea* (Brand) Constance, *Phacelia secunda* J.F. Gmel. subsp. *parviflora* (Phil.) Constance,

Hydrophyllum magellanicum Lam., *Phacelia magellanica* (Lam.) Coville

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-4000 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Phacelia setigera* Phil.**

Sinónimos: *Phacelia pinnatifida* Griseb. var. *setigera* (Phil.) Reiche

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA.

Rango altitudinal: 4000-4800 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Phacelia sinuata* Phil.**

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: TAR, ANT, COQ.

Rango altitudinal: 1000-4000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Plagiobothrys

***Plagiobothrys armeriifolius* (Phil.) I.M. Johnst.**

Sinónimos: *Eritrichium armeriifolius* Phil.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: LBO.

Rango altitudinal: 400 m.

***Plagiobothrys calandrinioides* (Phil.) I.M. Johnst.**

Sinónimos: *Eritrichium calandrinioides* Phil., *Eritrichium albiflorus* Griseb., *Eritrichium uliginosum* auct. non Phil., *Plagiobothrys lechleri* I.M. Johnst., *Allocarya alternifolia* Brand, *Allocarya humilis* Brand, *Plagiobothrys albiflorus* (Griseb.) R.L. Pérez-Mor. ex D.M. Moore, *Eritrichium nubigenum* Phil. ex F. Meigen Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: VAL, RME, MAG.

Rango altitudinal: 2000-2500 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

***Plagiobothrys collinus* (Phil.) I.M. Johnst.**

Sinónimos: *Eritrichium collinum* Phil., *Cryptantha collina* (Phil.) Reiche, *Eritrichium inconspicuum* Phil., *Cryptantha inconspicua* (Phil.) Reiche

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ.

Rango altitudinal: 100-500 m.

***Plagiobothrys corymbosus* (Ruiz & Pav.) I.M. Johnst.**

Sinónimos: *Myosotis corymbosa* Ruiz & Pav., *Allocarya sessilifolia* Greene, *Allocarya sessiliflora* Reiche, *Allocarya corymbosa* (Ruiz & Pav.) Brand, *Eritrichium sessiliflorum* A.DC., *Cryptantha corymbosa* (Ruiz & Pav.) I.M. Johnst., *Allocarya tenuifolia* (Schlecht. ex Phil.) Greene, *Allocarya tenuifolia* (Schlecht. ex Phil.) Greene var. *pulchella* (Phil.) Reiche, *Eritrichium tenuifolium* Schlecht. ex Phil., *Eritrichium tenuifolium* Schlecht. ex Phil. var. *pulchellum* Phil., *Plagiobothrys tenuifolius* (Schlecht. ex Phil.) I.M.Johnst.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 0-1500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Plagiobothrys foliosus* I.M. Johnst.**

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: NUB, ARA.

Rango altitudinal: 220-460 m.

***Plagiobothrys fulvus* (Hook. & Arn.) I.M. Johnst.**

Sinónimos: *Myosotis fulva* Hook. & Arn., *Eritrichium laxiflorum* Phil., *Eritrichium fulvum* Hook. & Arn. var. *pinguis* Phil.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

***Plagiobothrys germainii* (Phil.) I.M. Johnst.**

Sinónimos: *Eritrichium germainii* Phil., *Allocarya germainii* (Phil.) Reiche

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: BIO, ARA.

Rango altitudinal: 200-300 m.

***Plagiobothrys gracilis* (Ruiz & Pav.) I.M. Johnst.**

Sinónimos: *Myosotis gracilis* Ruiz & Pav., *Echinospermum gracile* (Ruiz & Pav.) Lehm., *Rochelia gracilis* (Ruiz & Pav. ex G. Don) J.F. Macbr.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: COQ, RME, MAU, BIO.

***Plagiobothrys myosotoides* (Lehm.) Brand**

Sinónimos: *Plagiobothrys tinctorius* (Ruiz & Pav.) A. Gray, *Eritrichium tinctorium* A. DC., *Eritrichium pugae* Phil.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: AYP, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 0-3500 m.

Países limítrofes: Bolivia y Perú.

***Plagiobothrys oppositifolius* (Phil.) I.M. Johnst.**

Sinónimos: *Eritrichium oppositifolius* Phil., *Eritrichium limonium* Phil., *Eritrichium cinereum* Phil.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: ARA.

Rango altitudinal: 325 m.

***Plagiobothrys pedicellaris* (Phil.) I.M. Johnst.**

Sinónimos: *Allocarya capitata* (Clos) Brand var.

longipes (Phil. ex Reiche) Brand, *Allocarya tenuifolia* (Schlecht. ex Phil.) Greene var. *longipes* Phil. ex Reiche, *Eritrichium tenuifolium* Schlecht. ex Phil. var. *longipes* Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ARA.

***Plagiobothrys polycaulis* (Phil.) I.M. Johnst.**

Sinónimos: *Eritrichium polycaulle* Phil., *Eritrichium delicatulum* Phil., *Eritrichium graminifolium* Phil., *Eritrichium bracteatum* Phil., *Eritrichium vernum* Phil., *Eritrichium flavicans* Phil.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.

Rango altitudinal: 0-300 m.

***Plagiobothrys pratensis* (Phil.) I.M. Johnst.**

Sinónimos: *Eritrichium pratense* Phil.

Hierba. Anual o perenne. Endémica.

Distribución: ARA, LLA.

Rango altitudinal: 100-300 m.

***Plagiobothrys procumbens* (Colla) A. Gray**

Sinónimos: *Allocarya procumbens* (Colla) Greene, *Myosotis procumbens* Colla, *Eritrichium illapelinum* Phil., *Eritrichium tenuicaule* Phil.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 0-1200 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Plagiobothrys pulchellus* (Phil.) I.M. Johnst.**

Sinónimos: *Eritrichium pulchellum* Phil.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: BIO, ARA.

Rango altitudinal: 0-200 m.

***Plagiobothrys uliginosus* (Phil.) I.M. Johnst.**

Sinónimos: *Eritrichium uliginosum* Phil., *Allocarya uliginosa* (Phil.) Greene, *Eritrichium pedicellare* Phil., *Allocarya pedicellaris* (Phil.) Reiche

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: NUB, ARA.

Rango altitudinal: 0-100 m.

***Plagiobothrys verrucosus* (Phil.) I.M. Johnst.**

Sinónimos: *Eritrichium verrucosum* Phil., *Plagiobothrys patagonicus* I.M. Johnst., *Plagiobothrys myosotoides* (Lehm.) Brand var. *patagonicus* (I.M. Johnst.) Brand

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, AIS.

Rango altitudinal: 500-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Selkirkia

***Selkirkia berteroii* (Colla) Hemsl.**

Sinónimos: *Cynoglossum berteroii* Colla

Arbusto. Endémico.

Distribución: JFE.

Rango altitudinal: 0-600 m.

***Selkirkia limense* (Willd.) Holstein & Weigend**

Sinónimos: *Cynoglossum limense* Willd., *Cynoglossum decurrens* var. *limense* (Willd.) DC., *Cynoglossum decurrens* Ruiz & Pav., *Cynoglossum alatum* Molina
Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: MAU, BIO, ARA, LRI.

Rango altitudinal: 10-485 m.

***Selkirkia pauciflora* (Ruiz & Pav.) Holstein & Weigend**

Sinónimos: *Cynoglossum pauciflorum* Ruiz & Pav., *Cynoglossum paniculatum* Hook. & Arn., *Mapuchea paniculata* (Hook. & Arn.) M. Serrano, R. Carbajal & S.

Ortiz, *Cynoglossum azocartii* Phil., *Cynoglossum paniculatum* var. *azocartii* (Phil.) Reiche, *Cynoglossum paniculatum* fma. *azocartii* (Phil.) Brand, *Cynoglossum paniculatum* fma. *philippianum* Brand

Subarbusto. Endémico.

Distribución: VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.

Rango altitudinal: 100-1100 m.

Nombre vulgar: No me olvides.

Tiquilia

***Tiquilia atacamensis* (Phil.) A.T. Richardson**

Sinónimos: *Coldenia atacamensis* Phil.

Subarbusto. Endémico.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA.

Rango altitudinal: 0-3500 m.

Nombre vulgar: Káuchal.

***Tiquilia grandiflora* (Phil.) A.T. Richardson**

Sinónimos: *Coldenia grandiflora* Phil.

Subarbusto. Nativo.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA.

Rango altitudinal: 1400 m.

Países limítrofes: Perú.

***Tiquilia litoralis* (Phil.) A.T. Richardson**

Sinónimos: *Coldenia littoralis* Phil.

Subarbusto. Nativo.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA.

Rango altitudinal: 0-1300 m.

Países limítrofes: Perú.

***Tiquilia paronychioides* (Phil.) A.T. Richardson**

Sinónimos: *Coldenia paronychioides* Phil.

Subarbusto. Nativo.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA.

Rango altitudinal: 0-3300 m.

Países limítrofes: Bolivia y Perú.

***Tiquilia tacnensis* A.T. Richardson**

Subarbusto. Nativo.

Distribución: AYP, TAR, ANT.

Rango altitudinal: 1900-2000 m.

Países limítrofes: Perú.

BRASSICACEAE

Aimara

Aimara rollinsii (Al-Shehzad & Martic.) Salariato & Al-Shehzad
Sinónimos: *Menonvillea rollinsii* Al-Shehzad & Martic.
Subarbusto. Endémico.
Distribución: TAR, ANT, ATA.
Rango altitudinal: 2600-3400 m.

Alshehbazia

Alshehbazia hauthalii (Gilg & Muschl.) Salariato & Zuloaga
Sinónimos: *Eudema hauthalii* Gilg & Muschl., *Onuris hauthalii* (Gilg & Muschl.) Al-Shehzad, *Brayopsis hauthalii* (Gilg & Muschl.) Skottsb., *Brayopsis skottsbergii* Gilg ex Skottsb.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAG.
Rango altitudinal: 300-4000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Alyssum

Alyssum alyssoides (L.) L.
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: BIO, MAG.

Arabidopsis

Arabidopsis thaliana (L.) Heynh.
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: BIO, ARA, LLA, AIS.

Atacama

Atacama nivea (Phil.) Toro, Mort & Al-Shehzad
Sinónimos: *Sisymbrium niveum* Phil., *Mathewsia nivea* (Phil.) O.E. Schulz
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ANT, ATA.
Rango altitudinal: 2500-3500 m.

Barbarea

Barbarea verna (Mill.) Asch.

Hierba. Bienal. Introducida.
Distribución: RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Brassica

Brassica napus L.

Hierba. Anual o bienal. Introducida.
Distribución: ATA, COQ, RME, LBO, NUB, BIO, ARA, LLA, MAG, JFE.

Brassica nigra (L.) W.D.J. Koch

Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, BIO, JFE.

Brassica oleracea L.

Hierba. Bienal. Introducida.
Distribución: LLA, MAG, JFE, IPA.

Brassica rapa L.

Hierba. Anual o bienal. Introducida.
Distribución: AYP, ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.

Brassica tournefortii Gouan

Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: VAL.

Camelina

Camelina microcarpa Andrz. ex DC.

Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: RME.

Capsella

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.

Hierba. Anual o bienal. Introducida.
Distribución: AYP, ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, IPA.

Cardamine

Cardamine africana L.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: LLA, AIS.

***Cardamine bonariensis* Pers.**

Sinónimos: *Cardamine alsophila* Phil. var. *pusilla* (Phil.) Reiche, *Cardamine nasturtioides* Bertero ex Barnéoud, *Cardamine andicola* Phil., *Cardamine nemophila* Phil., *Cardamine pusilla* Phil., *Cardamine ramosissima* Steud., *Cardamine tridens* Phil., *Cardamine bracteata* Phil., *Cardamine caespitosa* Phil., *Cardamine alsophila* Phil., *Cardamine alsophila* Phil. var. *bracteata* (Phil.) Reiche, *Cardamine alsophila* Phil. var. *caespitosa* (Phil.) Reiche, *Cardamine alsophila* Phil. var. *tridens* (Phil.) Reiche, *Cardamine flaccida* Cham. & Schltdl.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.

Rango altitudinal: 0-4500 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Berro picante.

***Cardamine chenopodiifolia* Pers.**

Sinónimos: *Arabis commersonii* DC., *Arabis spathulata* (Poir.) DC., *Sisymbrium bellidifolium* Poir., *Sisymbrium spathulatum* Poir., *Heterocarpus fernandezianus* Phil., *Cardamine fernandeziana* (Phil.) Johow

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: JFE.

Rango altitudinal: 0-800 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

***Cardamine chilensis* DC.**

Sinónimos: *Cardamine valdiviana* Phil., *Cardamine chilensis* DC. var. *angustifolia* O.E. Schulz, *Cardamine solisii* Phil., *Cardamine valdiviana* Phil. var. *callitrichoides* (Speg.) O.E. Schulz, *Cardamine vulgaris* Phil. var. *micropetala* (Phil.) O.E. Schulz, *Cardamine chilensis* DC. var. *valdiviana* (Phil.) Reiche, *Cardamine nana* Barnéoud, *Cardamine micropetala* Phil., *Cardamine ramosissima* Steud. var. *micropetala* (Phil.) Reiche, *Cardamine chilensis* DC. var. *nana* (Barnéoud) O.E. Schulz

Hierba. Anual o perenne. Nativa.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Cardamine cordata* Barnéoud**

Sinónimos: *Cardamine cordata* Barnéoud var. *decumbens* (Barnéoud) O.E. Schulz, *Cardamine nivalis* Gillies ex Hook. & Arn. subsp. *andina* (Phil.) O.E. Schulz, *Cardamine calbucana* Phil., *Cardamine monticosa* Phil., *Cardamine decumbens* Barnéoud, *Cardamine ptereoana* Phil., *Cardamine andina* Phil. Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 700-2900 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Cardamine geraniifolia* (Poir.) DC.**

Sinónimos: *Dentaria geraniifolia* (Poir.) Reiche, *Sisymbrium geraniifolium* Poir.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-600 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Cardamine glacialis* (G. Forst.) DC.**

Sinónimos: *Cardamine glacialis* (G. Forst.) DC. var. *pubescens* Phil. ex O.E. Schulz, *Cardamine antiscorbutica* Banks & Sol. ex Griseb., *Cardamine strictula* Steud., *Sisymbrium glaciale* G. Forst., *Cardamine ciliata* Phil., *Cardamine gongyloides* Phil., *Cardamine litoralis* Phil., *Cardamine magellanica* Phil., *Cardamine palenae* Phil., *Cardamine soehrensii* Phil., *Cardamine pratensis* L. var. *minor* Barnéoud, *Cardamine glacialis* (G. Forst.) DC. var. *pumila* A. Gray, *Cardamine glacialis* (G. Forst.) DC. var. *elatior* A. Gray, *Cardamine hirsuta* L. var. *antiscorbutica* (Banks & Sol. ex Griseb.) Reiche, *Cardamine glacialis* (G. Forst.) DC. subsp. *litoralis* (Phil.) O.E. Schulz, *Cardamine hirsuta* L. var. *magellanica* (Phil.) Reiche, *Cardamine hirsuta* L. var. *soehrensii* (Phil.) Reiche, *Cardamine glacialis* (G. Forst.) DC. var. *soehrensii* (Phil.) O.E. Schulz, *Sisymbrium grandiflorum* Molina Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ATA, RME, MAU, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-1500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Cardamine hirsuta* L.**

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, MAG, JFE.

***Cardamine hispidula* Phil.**

Sinónimos: *Cardamine alsophila* Phil. var. *hispidula* (Phil.) Reiche

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: NUB.

***Cardamine kruesselii* Johow ex Reiche**

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: JFE.

***Cardamine marginata* Phil.**

Sinónimos: *Cardamine vulgaris* Phil. var. *marginata* (Phil.) O.E. Schulz

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: NUB, ARA.

Rango altitudinal: 100-190 m.

***Cardamine rostrata* Griseb.**

Sinónimos: *Cardamine rostrata* Griseb. var. *reniformis* (Phil.) O.E. Schulz, *Cardamine reniformis* Phil., *Cardamine lechleriana* Steud.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 0-1600 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Cardamine tenuirostris* Hook. & Arn.**

Sinónimos: *Cardamine tenuirostris* Hook. & Arn. subsp. *affinis* (Hook. & Arn.) O.E. Schulz, *Cardamine tenuirostris* Hook. & Arn. subsp. *reicheana* O.E. Schulz, *Cardamine flavescentia* Phil., *Cardamine affinis* Hook. & Arn., *Cardamine pentaphylla* Phil., *Nasturtium stenophyllum* F. Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 0-1700 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Cardamine tuberosa* DC.**

Sinónimos: *Cardamine tuberosa* DC. subsp. *cognata* (Steud.) O.E. Schulz, *Cardamine granulata* Phil., *Cardamine cognata* Steud., *Cardamine tuberosa* DC. var. *granulata* (Phil.) Reiche, *Cardamine thyrsoides* O.E. Schulz

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, AIS.

Rango altitudinal: 0-2700 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Cardamine variabilis* Phil.**

Sinónimos: *Cardamine integrifolia* Phil. var. *diversifolia* O.E. Schulz, *Cardamine variabilis* Phil. var. *pinnatisecta* O.E. Schulz, *Cardamine thermarum* Martic., *Cardamine triphylla* Phil., *Sisymbrium simpsonii* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 0-1800 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Cardamine volckmannii* Phil.**

Sinónimos: *Cardamine nivalis* Gillies ex Hook. & Arn., *Cardamine petiolulata* Phil. ex O.E. Schulz, *Cardamine stricta* Phil., *Cardamine hirsuta* L. var. *nivalis* (Gillies ex Hook. & Arn.) Hook.f.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO.

Rango altitudinal: 2000-3800 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Cardamine vulgaris* Phil.**

Sinónimos: *Cardamine garaventae* O.E. Schulz, *Cardamine grandjotii* O.E. Schulz, *Cardamine macrostachya* Phil., *Cardamine vulgaris* Phil. var. *oligozyga* O.E. Schulz, *Cardamine hirsuta* L. var. *vulgaris* (Phil.) Reiche, *Cardamine intermedia* Steud.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.

Rango altitudinal: 0-1600 m.

Países limítrofes: Argentina.

Chorispora

***Chorispora tenella* (Pall.) DC.**

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: RME.

Cremolobus

***Cremolobus chilensis* (Lag. ex DC.) DC.**

Sinónimos: *Urbanodoxa tarapacana* Ricardi & Martic., *Biscutella chilensis* Lag. ex DC., *Cremolobus sinuatus* Hook., *Cremolobus pinnatifidus* Hook.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: AYP.

Rango altitudinal: 0-4400 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Descurainia

***Descurainia antarctica* (E. Fourn.) O.E. Schulz**

Sinónimos: *Hesperis antarctica* (E. Fourn.) Kuntze

Hierba. Anual o bienal. Nativa.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 0-600 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Descurainia athrocarpa* (A. Gray) O.E. Schulz**

Sinónimos: *Sisymbrium athrocarpum* A. Gray

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP.

Rango altitudinal: 4250-4500 m.

Países limítrofes: Bolivia y Perú.

***Descurainia canoensis* Al-Shehbaz**

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: AYP.

Rango altitudinal: 3600 m.

Países limítrofes: Perú.

***Descurainia depressa* (Phil.) Prantl ex Reiche**

Sinónimos: *Descurainia brachycarpa* (Phil.) Prantl ex

Reiche, *Sisymbrium brachycarpum* Phil., nom. illeg.,

Sisymbrium depressum Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA.

Rango altitudinal: 3500-5000 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Descurainia erodiifolia* (Phil.) Prantl ex Reiche**

Sinónimos: *Sisymbrium erodiifolium* Phil.

Hierba. Bienal. Nativa.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, MAU.

Rango altitudinal: 200-3200 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

***Descurainia myriophylla* (Willd. ex DC.) R.E. Fr.**

Sinónimos: *Sisymbrium myriophyllum* Willd. ex DC.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA.

Rango altitudinal: 1900-4600 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Qasabe.

***Descurainia nuttallii* (Colla) O.E. Schulz**

Sinónimos: *Descurainia cumingiana* (Fisch. & C.A.

Mey.) Prantl var. *elegantula* (Phil.) O.E. Schulz,

Descurainia cumingiana (Fisch. & C.A. Mey.) Prantl

var. *tenuissima* (Phil.) Reiche, *Sisymbrium tenuissimum*

Phil., *Sophia tenuissima* (Phil.) Macloskie, *Sisymbrium*

elegantulum Phil., *Sisymbrium nuttallii* Colla,

Sisymbrium macrophyllum Barnéoud, *Descurainia*

sophia (L.) Webb ex Prantl var. *macrophylla* (Barnéoud)

Prantl ex Reiche

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO,

MAU, LLA, MAG.

Rango altitudinal: 0-3200 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Descurainia pimpinellifolia* (Barnéoud) O.E. Schulz**

Sinónimos: *Descurainia glaucescens* (Phil.) Prantl ex

Reiche, *Descurainia stricta* (Phil.) Prantl ex Reiche fma.

umbellifera (Phil.) O.E. Schulz, *Descurainia*

pimpinellifolia (Barnéoud) O.E. Schulz var. *glaucescens*

(Phil.) O.E. Schulz, *Sisymbrium pimpinellifolium*

Barnéoud, *Sisymbrium umbelliferum* Phil., *Descurainia*

canescens (Nutt.) Prantl var. *pimpinellifolium*

(Barnéoud) Reiche, *Sophia glaucescens* (Phil.)

Macloskie

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO,

MAU.

Rango altitudinal: 1500-4000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Descurainia sophia* (L.) Webb ex Prantl**

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: RME, MAG.

***Descurainia stricta* (Phil.) Prantl ex Reiche**

Sinónimos: *Descurainia stricta* (Phil.) Prantl ex Reiche

var. *minutiflora* (Prantl ex Reiche) O.E. Schulz,

Descurainia stricta (Phil.) Prantl ex Reiche var.

rubescens (Phil.) O.E. Schulz, *Descurainia stricta* (Phil.)

Prantl ex Reiche var. *florida* (Phil.) O.E. Schulz,
Descurainia minutiflora Prantl ex Reiche var. *florida*
(Phil.) Reiche, *Sisymbrium rubescens* Phil., *Descurainia*
rubescens (Phil.) Reiche, *Sisymbrium strictum* Phil.,
Sisymbrium floridum Phil., *Hesperis florida* (Phil.)
Kuntze, *Descurainia minutiflora* Prantl ex Reiche
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ.
Rango altitudinal: 3200-4700 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.
Nombre vulgar: Kasawi.

Dipotaxis

***Dipotaxis muralis* (L.) DC.**
Hierba. Anual o perenne. Introducida.
Distribución: ATA, COQ, RME.

Draba

***Draba funiculosa* Hook.f.**
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAG.
Rango altitudinal: 0-1100 m.
Países limítrofes: Argentina.

***Draba gilliesii* Hook. & Arn.**
Sinónimos: *Draba davilae* Phil., *Draba gilliesii* Hook. & Arn. var. *davilae* (Phil.) O.E. Schulz, *Draba gilliesii* Hook. & Arn. var. *rosulata* (Phil.) Reiche, *Draba gilliesii* Hook. & Arn. var. *stolonifera* (Barnéoud) Reiche, *Draba rosulata* Phil., *Draba stolonifera* Barnéoud, *Draba araucana* Phil., *Draba colchaguensis* Phil., *Draba gilliesii* Hook. & Arn. fma. *araucana* (Phil.) O.E. Schulz, *Draba gilliesii* Hook. & Arn. var. *rosulata* (Phil.) Reiche, *Draba azorellicola* O.E. Schulz Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 400-4000 m.
Países limítrofes: Argentina.

***Draba macleanii* Hook.f.**
Sinónimos: *Draba atacamensis* Gilg
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP.
Rango altitudinal: 3900-4900 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Draba magellanica* Lam.**

Sinónimos: *Draba magellanica* Lam. var. *saffordii* (Phil.) O.E. Schulz, *Draba saffordii* Phil., *Draba incana* L. var. *magellanica* (Lam.) Hook.f.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-3400 m.
Países limítrofes: Argentina.

***Draba pusilla* F. Phil.**

Sinónimos: *Draba schoenleinii* F. Meigen
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ, RME, LBO, MAU, MAG.
Rango altitudinal: 500-3400 m.
Países limítrofes: Argentina.

***Draba thlaspiiformis* (Phil.) Al-Shehbaz**

Sinónimos: *Draba philippii* O.E. Schulz, *Eudema thlaspiiforme* Phil., *Lesquerella thlaspiiformis* (Phil.) Gilg & Muschl.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: RME.
Rango altitudinal: 780-1900 m.

***Draba verna* L.**

Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: RME, BIO, AIS, MAG.

Eruca

***Eruca vesicaria* (L.) Cav. subsp. *sativa* (Mill.) Thell.**
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: VAL.

Hesperis

***Hesperis matronalis* L.**
Hierba. Bienal. Introducida.
Distribución: MAG.

Hirschfeldia

***Hirschfeldia incana* (L.) Lagr.-Fossat**
Hierba. Anual o bienal. Introducida.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, BIO, ARA, JFE, IPA.

Hollermayera

***Hollermayera valdiviana* (Phil.) Ravenna**

Sinónimos: *Hollermayera sylvatica* O.E. Schulz, *Armoracia valdiviana* Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ARA, LLA.

Rango altitudinal: 600-700 m.

Hornungia

***Hornungia procumbens* (L.) Hayek**

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: AYP, TAR, ATA, COQ, MAG.

Isatis

***Isatis tinctoria* L.**

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU.

Ivania

***Ivania cremnophila* (I.M. Johnst.) O.E. Schulz**

Sinónimos: *Cardamine cremnophila* I.M. Johnst.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ATA.

Rango altitudinal: 2700-3300 m.

Nombre vulgar: Hierba del gato.

***Ivania juncaleensis* Al-Shehbaz**

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: VAL.

Rango altitudinal: 2400-2600 m.

Lepidium

***Lepidium angustissimum* Phil.**

Sinónimos: *Lepidium tayloriae* Al-Shehbaz

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: ATA, COQ.

Rango altitudinal: 1900-2400 m.

***Lepidium auriculatum* Regel & Körn.**

Sinónimos: *Lepidium araucanum* Phil., *Lepidium bipinnatifidum* Desv. var. *araucanum* (Phil.) Reiche, *Lepidium aletes* J.F. Macbr.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-2000 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

***Lepidium bonariense* L.**

Sinónimos: *Thlaspi multifidum* Poir., *Lepidium mendocinum* Phil.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, BIO, JFE, IPA.

Rango altitudinal: 0-3300 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Nombre vulgar: Hierba del tapón.

Nota: Introducida en el Archipiélago de Juan Fernández y en Rapa Nui (Isla de Pascua).

***Lepidium brevicaule* Barnéoud**

Sinónimos: *Nasturtium brevicaule* (Barnéoud) Kuntze, *Lepidium reichei* Phil. ex Reiche, *Lepidium morrisonii* C.L. Hitchc.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME.

Rango altitudinal: 2500-3600 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Lepidium campestre* (L.) W.T. Aiton**

Hierba. Anual. Introducida.

Nota: Al-Shehbaz (2010) señala su presencia en Chile, sin mencionar región.

***Lepidium chichicara* Desv.**

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-700 m.

Países limítrofes: Perú.

***Lepidium coronopus* (L.) Al-Shehbaz**

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: LLA.

Lepidium cumingianum Fisch. & C.A. Mey.

Sinónimos: *Lepidium cumingianum* Fisch. & C.A. Mey. subsp. *berteroanum* Thell., *Lepidium cumingianum* Fisch. & C.A. Mey. subsp. *orbiculatum* Thell., *Lepidium cumingianum* Fisch. & C.A. Mey. var. *canescens* Thell., *Lepidium cumingianum* Fisch. & C.A. Mey. var. *subsagittatum* Thell.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: TAR, VAL, RME, LBO, BIO.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Lepidium didymum L.

Sinónimos: *Coronopus didymus* (L.) Sm., *Senebiera didyma* (L.) Pers.

Hierba. Anual o bienal. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG, IPA.

Rango altitudinal: 0-2900 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nota: Introducida en Rapa Nui (Isla de Pascua).

Lepidium draba L.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: TAR, ATA, COQ, VAL, RME, AIS, MAG.

Lepidium filisegmentum C.L. Hitchc.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: MAG.

Países limítrofes: Argentina.

Lepidium heterophyllum Benth.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: ARA.

Lepidium horstii Johow ex Skottsb.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: IDE.

Rango altitudinal: 300 m.

Lepidium johnstonii C.L. Hitchc.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: ANT.

Rango altitudinal: 700-1500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Lepidium latifolium L.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: ANT, COQ, MAU.

Lepidium myrianthum Phil.

Sinónimos: *Lepidium ruderale* L. var. *myrianthum* (Phil.) Reiche

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: ANT.

Rango altitudinal: 200-3400 m.

Países limítrofes: Argentina.

Lepidium nitidum Nutt. ex Torr. & A. Gray

Sinónimos: *Lepidium curicoanum* Phil., *Lepidium chilense* Kunze, *Lepidium bipinnatifidum* Desv. var. *curicoanum* (Phil.) Reiche, *Lepidium tenuifolium* Phil., *Lepidium bipinnatifidum* Desv. var. *tenuifolium* (Phil.) Reiche, *Lepidium tenuissimum* Steud., *Lepidium chilense* Kunze ex Walp.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: VAL, LBO, MAU, NUB.

Rango altitudinal: 0-200 m.

Nota: Segundo Al-Shehbaz (2010), esta especie se distribuye en Chile y disyunto en California, Norte América.

Lepidium philippianum (Kuntze) Thell.

Sinónimos: *Nasturtium philippianum* Kuntze, *Lepidium philippianum* (Kuntze) Thell. var. *brachystylum* Thell., *Onuris reichei* Gilg & Muschl., *Lepidium suffruticosum* Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: RME.

Rango altitudinal: 2400-3000 m.

Lepidium pseudodidymum Thell. ex Druce

Sinónimos: *Coronopus pinnatifidus* (DC.) Gaertn. var. *australis* (Hook.f.) Reiche, *Senebiera australis* Hook.f., *Coronopus australis* (Hook.f.) Speg., *Coronopus didymus* (L.) Sm. subsp. *australis* (Hook.f.) Gilg & Muschl.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-400 m.

Países limítrofes: Argentina.

Lepidium pubescens Desv.

Sinónimos: *Lepidium raimondii* O.E. Schulz

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ATA.

Rango altitudinal: 3000-4500 m.

Países limítrofes: Bolivia y Perú.

Distribución: AYP.

Rango altitudinal: 3350-3860 m.

Países limítrofes: Perú.

***Lepidium rahmeri* Phil.**

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, VAL.

Rango altitudinal: 2600-4200 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Kolka.

Lobularia

***Lobularia maritima* (L.)**

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: TAR, ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA.

Mancoa

***Mancoa hispida* Wedd.**

Sinónimos: *Mancoa minima* Rollins, *Radicula scabra* Rusby

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT.

Rango altitudinal: 3400-4800 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Mathewisia

***Mathewisia auriculata* Phil.**

Subarbusto. Endémico.

Distribución: TAR, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 100-2700 m.

***Mathewisia foliosa* Hook. & Arn.**

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME.

Rango altitudinal: 0-1500 m.

***Mathewisia incana* Phil.**

Subarbusto. Endémico.

Distribución: ANT, ATA.

Rango altitudinal: 0-1300 m.

***Mathewisia linearifolia* Turcz.**

Sinónimos: *Mathewisia collina* I.M. Johnst., *Mathewisia laciinata* Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-300 m.

Matthiola

***Lepidium strictum* (S. Watson) Rattan ex B.L.**

Rob.

Sinónimos: *Lepidium oxycarpum* Torr. & A. Gray var. *strictum* S. Watson

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, MAG.

Rango altitudinal: 0-3800 m.

Nota: Segundo Al-Shehbaz (2010), esta especie se distribuye en Chile y disyunto en California, Norte América.

***Lepidium werffii* Al-Shehbaz**

Hierba. Perenne. Nativa.

***Matthiola incana* (L.) R.Br.**

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: ANT, JFE.

***Matthiola longipetala* (Vent.) DC.**

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: COQ.

Menonvillea

***Menonvillea chilensis* (Turcz.) B.D. Jacks.**

Sinónimos: *Menonvillea chilensis* (Turcz.) B.D. Jacks. var. *aptera* (Phil.) Rollins, *Menonvillea parviflora* Phil., *Menonvillea orbiculata* Phil. var. *parviflora* (Phil.) Reiche, *Menonvillea parvula* Phil., *Cymatoptera chilensis* Turcz., *Menonvillea aptera* Phil., *Menonvillea media* Turcz., *Menonvillea parviflora* Phil. var. *aptera* (Phil.) I.M. Johnst., *Menonvillea pinnatifida* Barnéoud var. *parvula* (Phil.) Gilg & Muschl., *Menonvillea orbiculata* Phil. fma. *glabra* Gilg & Muschl.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL.

Rango altitudinal: 0-800 m.

***Menonvillea cicatricosa* (Phil.) Rollins**

Sinónimos: *Hexaptera cicatricosa* Phil.

Subarbusto. Nativo.

Distribución: LBO, MAU.

Rango altitudinal: 1800-2800 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Menonvillea comberi* Sandwith**

Sinónimos: *Menonvillea scapigera* (Phil.) Rollins subsp. *hirsuta* (Rollins) Prina, *Menonvillea hirsuta* Rollins

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: ARA.

Rango altitudinal: 1000-1700 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Menonvillea constitutionis* (F. Phil.) Rollins**

Sinónimos: *Hexaptera constitutionis* F. Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: VAL, RME, MAU.

Rango altitudinal: 0-200 m.

***Menonvillea cuneata* (Gillies & Hook.) Rollins**

Sinónimos: *Hexaptera cuneata* Gillies & Hook., *Hexaptera cuneata* Gillies & Hook. var. *violacea* (Phil.) Reiche, *Hexaptera jussiaei* Barnéoud, *Hexaptera violacea* Phil., *Hexaptera jussiaei* Barnéoud var. *tridens* (Phil.) Reiche, *Hexaptera tridens* Phil., *Decaptera trifida* Turcz.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO.

Rango altitudinal: 1700-4600 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Menonvillea filifolia* Fisch. & C.A. Mey.**

Sinónimos: *Menonvillea linearis* DC. var. *filifolia* (Fisch. & C.A. Mey.) Rollins, *Menonvillea angustifolia* C. Presl

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO.

Rango altitudinal: 0-1200 m.

***Menonvillea flexuosa* Phil.**

Sinónimos: *Menonvillea crassa* Rollins, *Menonvillea falcata* Reiche, *Menonvillea flexuosa* Phil. fma. *tomentosa* Gilg & Muschl.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME.

Rango altitudinal: 0-3700 m.

***Menonvillea frigida* (Phil.) Rollins**

Sinónimos: *Hexaptera frigida* Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ANT.

Rango altitudinal: 3900-4700 m.

***Menonvillea linearis* DC.**

Sinónimos: *Menonvillea robustula* Steud., *Menonvillea trifida* Phil., *Menonvillea linearis* DC. var. *trifida* (Phil.) Reiche, *Menonvillea virgata* Phil., *Menonvillea linearis* DC. var. *virgata* (Phil.) Reiche, *Dispeltophorus crassifolius* Lehm.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, BIO.

Rango altitudinal: 0-2000 m.

***Menonvillea litoralis* (Barnéoud) Rollins**

Sinónimos: *Menonvillea gayi* Phil., *Hexaptera litoralis* Barnéoud, *Menonvillea arachnoidea* O.E. Schulz

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: ATA, COQ.

Rango altitudinal: 200-1100 m.

***Menonvillea macrocarpa* (I.M. Johnst.) Rollins**

Sinónimos: *Hexaptera macrocarpa* I.M. Johnst.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ATA.

Rango altitudinal: 3700 m.

***Menonvillea marticorenae* (Al-Shehbaz) Salariato & Al-Shehbaz**

Sinónimos: *Menonvillea filifolia* Fisch. & C.A. Mey.

subsp. *marticorenae* Al-Shehbaz

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL.

Rango altitudinal: 0-900 m.

***Menonvillea minima* Rollins**

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-200 m.

***Menonvillea nordenskjoeldii* (Dusén) Rollins**

Sinónimos: *Hexaptera cuneata* Gillies & Hook. var. *nordenskjoeldii* (Dusén) Gilg & Muschl., *Hexaptera nordenskjoeldii* Dusén

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AIS, MAG.

Rango altitudinal: 500-2100 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Menonvillea orbiculata* Phil.**

Sinónimos: *Menonvillea orbiculata* Phil. var. *perplexa* Rollins, *Menonvillea alata* Rollins

Hierba. Bienal. Endémica.

Distribución: ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-1300 m.

***Menonvillea pinnatifida* Barnéoud**

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ANT, ATA, COQ, RME.

Rango altitudinal: 800-3000 m.

***Menonvillea purpurea* (Hastings) Rollins**

Sinónimos: *Hexaptera purpurea* Hastings, *Hexaptera linearis* Barnéoud

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 0-2800 m.

***Menonvillea scapigera* (Phil.) Rollins subsp.**

***longipes* (Rollins) Prina**

Sinónimos: *Menonvillea hookeri* Rollins, *Menonvillea perstylosa* Rollins, *Menonvillea longipes* Rollins, *Hexaptera pinnatifida* Gillies & Hook.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ATA, COQ, RME, LBO, MAU, NUB.

Rango altitudinal: 1100-3300 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Menonvillea spathulata* (Gillies & Hook.) Rollins**

Sinónimos: *Hexaptera pusilla* Phil., *Hexaptera spathulata* Gillies & Hook., *Hexaptera spathulata* Gillies & Hook. subsp. *pusilla* (Phil.) Gilg & Muschl., *Hexaptera spathulata* Gillies & Hook. var. *pusilla* (Phil.) Reiche, *Hexaptera cuneata* (Gillies & Hook.) Rollins var. *edentata* Kuntze

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL, RME.

Rango altitudinal: 2200-4100 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Menonvillea virens* (Phil.) Rollins**

Sinónimos: *Hexaptera virens* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: TAR, ANT, ATA.

Rango altitudinal: 2000-5000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Mostacillastrum

***Mostacillastrum andinum* (Phil.) Al-Shehbaz**

Sinónimos: *Sisymbrium corymbosum* Phil., *Sisymbrium corymbosum* Phil. var. *consanguineum* (Phil. ex Reiche) O.E. Schulz, *Hesperis andina* (Phil.) Kuntze, *Sisymbrium andinum* Phil. fma. *dolichocarpum* Hauman,

Sisymbrium andinum Phil. var. *latifolium* Phil.,

Sisymbrium andinum Phil. var. *morenoanum* (Chodat & Wilczek) O.E. Schulz, *Sisymbrium sagittatum* Hook. & Arn. var. *andinum* (Phil.) Speg., *Sisymbrium sagittatum* Hook. & Arn. var. *latifolium* (Phil.) Speg., *Sisymbrium andinum* Phil., *Sisymbrium amplexicaule* Phil. var.

corymbosum (Phil.) Reiche, *Hesperis corymbosa* (Phil.) Kuntze, *Sisymbrium consanguineum* Phil. ex Reiche

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, MAU.

Rango altitudinal: 1800-3300 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Mostacillastrum commune* (Speg.) Al-Shehbaz**

Sinónimos: *Sisymbrium sagittatum* var. *commune* Speg.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME.

Rango altitudinal: 100-3300 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Mostacillastrum dianthoides* (Phil.) Al-Shehbaz**

Sinónimos: *Sisymbrium dianthoides* Phil., *Sisymbrium arequipanum* Al-Shehbaz

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: TAR, ANT.

Rango altitudinal: 3200-4400 m.

Países limítrofes: Argentina y Perú.

***Mostacillastrum ferreyrae* (Förther & Weigend)**

Al-Shehbaz

Sinónimos: *Sisymbrium ferreyrae* Förther & Weigend

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: TAR.

Rango altitudinal: 300-1000 m.

Países limítrofes: Perú.

***Mostacillastrum gracile* (Wedd.) Al-Shehbaz**

Sinónimos: *Heterothrix gracilis* (Wedd.) O.E. Schulz, *Pennellia gracilis* (Wedd.) O.E. Schulz, *Sisymbrium gracile* Wedd.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, COQ.

Rango altitudinal: 1800-3900 m.

Países limítrofes: Perú.

***Mostacillastrum leptocarpum* (Hook. & Arn.) Al-Shehbaz**

Sinónimos: *Sisymbrium andinum* Phil. var. *hastatum* (Phil.) O.E. Schulz, *Sisymbrium andinum* Phil. var. *juncalense* O.E. Schulz, *Hesperis leptocarpa* (Hook. & Arn.) Kuntze, *Sisymbrium hastatum* Phil., *Sisymbrium leptocarpum* Hook. & Arn., *Sisymbrium gayanum* Barnéoud, *Nasturtium hastatum* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME.

Rango altitudinal: 1800-3200 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Mostacillastrum pectinifolium* (Al-Shehbaz) Al-Shehbaz**

Sinónimos: *Sisymbrium pectinitifolium* Al-Shehbaz

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT.

Rango altitudinal: 2300-3800 m.

Países limítrofes: Perú.

***Mostacillastrum volckmanni* (Hook. & Arn.) D.A. German & Al-Shehbaz**

Sinónimos: *Sisymbrium volckmannii* Phil., *Sisymbrium sagittatum* Hook. & Arn. var. *ciliatum* (Phil.) Speg., *Sisymbrium sagittatum* Hook. & Arn., *Mostacillastrum sagittatum* (Hook. & Arn.) Al-Shehbaz, *Hesperis sagittata* (Hook. & Arn.) Kuntze, *Sophia sagittata* (Hook. & Arn.) Macloskie, *Sisymbrium ciliatum* Phil., *Sisymbrium fruticosum* Reiche

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME.

Rango altitudinal: 100-3700 m.

Nasturtium

***Nasturtium microphyllum* Boenn. ex Rchb.**

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: VAL, LBO.

***Nasturtium officinale* R. Br.**

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: AYP, TAR, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, JFE.

Neuontobotrys

***Neuontobotrys berningeri* O.E. Schulz**

Sinónimos: *Sisymbrium berningeri* (O.E. Schulz) Baehni & J.F. Macbr.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR.

Rango altitudinal: 0-3200 m.

Países limítrofes: Perú.

***Neuontobotrys elloanensis* Al-Shehbaz**

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ANT.

Rango altitudinal: 3500 m.

Neuontobotrys intricatissima (Phil.) Al-Shehbaz
Sinónimos: *Draba intricatissima* Phil., *Sisymbrium intricatissimum* (Phil.) Reiche, *Hesperis intricatissima* (Phil.) Kuntze, *Eremodraba intricatissima* (Phil.) O.E. Schulz
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: TAR.
Rango altitudinal: 1400-2900 m.
Países limítrofes: Perú.

Neuontobotrys lanata (Walp.) Al-Shehbaz
Sinónimos: *Arabis lanata* Walp., *Hesperis foliosa* (Phil.) Kuntze, *Sisymbrium andinum* Phil. var. *pubescens* Phil. ex Reiche, *Sisymbrium foliosum* Phil., nom. illeg., *Sisymbrium lanatum* (Walp.) O.E. Schulz, *Sisymbrium pubescens* (Phil. ex Reiche) O.E. Schulz, *Sisymbrium pubescens* (Phil. ex Reiche) O.E. Schulz var. *glabrescens* O.E. Schulz
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, RME.
Rango altitudinal: 2400-4100 m.
Países limítrofes: Perú.
Nombre vulgar: Chuchar.

Neuontobotrys linearifolia (Kuntze) Al-Shehbaz
Sinónimos: *Neuontobotrys linifolia* O.E. Schulz, *Hesperis linearifolia* Kuntze
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: AYP, TAR, ATA.
Rango altitudinal: 100-3800 m.

Neuontobotrys mendocina (Romanczuk) Al-Shehbaz
Sinónimos: *Sisymbrium mendocinum* Romanczuk
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: RME.
Rango altitudinal: 2200-3000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Neuontobotrys polyphylla (Phil.) Al-Shehbaz
Sinónimos: *Sisymbrium polyphyllum* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ANT.
Rango altitudinal: 3500-4500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Neuontobotrys tarapacana (Phil.) Al-Shehbaz
Sinónimos: *Sisymbrium philippianum* I.M. Johnst., *Sisymbrium tarapacanum* Phil., *Cardamine deserticola* Phil., *Neuontobotrys desericola* (Phil.) Al-Shehbaz, *Arabis tarapacana* Phil., *Sisymbrium donnarosae* Martic., *Sisymbrium amplexicaule* Phil., *Sisymbrium foliosum* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA.
Rango altitudinal: 1700-4600 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.
Nombre vulgar: Kamatokamata.

Noccaea

Noccaea magellanica (Comm. ex Poir.) Holub
Sinónimos: *Thlaspi alpestre* L. var. *gracile* (Phil.) Gilg & Muschl., *Thlaspi andicola* Hook. & Arn., *Thlaspi glaucophyllum* Barnéoud, *Thlaspi gracile* Phil., *Thlaspi magellanicum* Comm. ex Poir. var. *andicola* (Hook. & Arn.) O.E. Schulz, *Thlaspi magellanicum* Comm. ex Poir., *Draba depilis* Phil., *Thlaspi exile* Phil., *Thlaspi commutatum* Reiche
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: VAL, RME, MAU, NUB, BIO, ARA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-4000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Onuris

Onuris alismatifolia Gilg ex Skottsb.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAG.
Rango altitudinal: 500-1100 m.
Países limítrofes: Argentina.

Onuris graminifolia Phil.
Sinónimos: *Onuris oligosperma* (Speg.) Gilg & Muschl., *Draba oligosperma* Speg., *Onuris oligosperma* (Speg.) Gilg & Muschl., *Onuris graminifolia* Phil., *austroamericana* Boelcke
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAG.
Rango altitudinal: 1100-2300 m.
Países limítrofes: Argentina.

Onuris hatcheriana (Gilg ex Macloskie) Gilg & Muschl.

Sinónimos: *Draba hatcheriana* Gilg ex Macloskie
Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 900-1800 m.

Países limítrofes: Argentina.

Onuris papillosa O.E. Schulz

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 100-1200 m.

Países limítrofes: Argentina.

Onuris spegazziniana Gilg & Muschl.

Sinónimos: *Draba graminifolia* Speg.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 600-1800 m.

Países limítrofes: Argentina.

Petroravenia

Petroravenia friesii (O.E. Schulz) Al-Shehbaz

Sinónimos: *Eudema friesii* O.E. Schulz

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT.

Rango altitudinal: 2800-5000 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Petroravenia werdermannii (O.E. Schulz) Al-Shehbaz

Sinónimos: *Eudema werdermannii* O.E. Schulz

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ATA.

Rango altitudinal: 3800-4700 m.

Países limítrofes: Argentina.

Polypsecadium

Polypsecadium litorale (Phil.) Al-Shehbaz

Sinónimos: *Sisymbrium litorale* Phil., *Sisymbrium litorale* Phil. var. *virgatum* O.E. Schulz, *Hesperis litoralis* (Phil.) Kuntze

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: VAL, BIO.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Polypsecadium magellanicum (Juss. ex Pers.) Al-Shehbaz

Sinónimos: *Brassica antarctica* Molina, *Brassica magellanica* Juss. ex Pers., *Sisymbrium magellanicum* (Juss. ex Pers.) Hook.f., *Arabis magellanica* (Juss. ex Pers.) Dusén, *Schizopetalon fuegianum* Speg., *Sisymbrium fuegianum* (Speg.) Speg.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 0-1100 m.

Países limítrofes: Argentina.

Polypsecadium zoellneri Al-Shehbaz

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ATA.

Rango altitudinal: 2500 m.

Raphanus

Raphanus raphanistrum L.

Hierba. Anual o bienal. Introducida.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.

Raphanus sativus L.

Hierba. Anual o bienal. Introducida.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG, JFE.

Rapistrum

Rapistrum rugosum (L.) All.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, IPA.

Rorippa

Rorippa austroamericana Mart.-Laborde

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL, RME, LLA.

Rango altitudinal: 2000-4300 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Rorippa bonariensis* (Poir.) Macloskie**

Sinónimos: *Nasturtium bonariense* (Poir.) DC., *Sisymbrium bonariense* Poir., *Cardamine indica* (L.) Kuntze var. *bonariensis* (Poir.) Kuntze, *Nasturtium indicum* (L.) DC. subsp. *bonariense* (Poir.) Kuntze & Muschl., *Nasturtium tweediei* O.E. Schulz, *Nasturtium macrorrhizum* Steud.

Hierba. Anual o bienal. Nativa.

Distribución: RME.

Rango altitudinal: 0-2400 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Rorippa coxii* (F. Phil. ex Phil.) L.E. Navas**

Sinónimos: *Nasturtium coxi* F. Phil. ex Phil., *Sisymbrium laciniosum* Phil., *Nasturtium patens* Phil., *Turritis chilensis* Phil. ex Reiche

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL, RME, ARA.

Rango altitudinal: 100-300 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Rorippa hilariana* (Walp.) Cabrera**

Sinónimos: *Cardamine hilariana* Walp., *Nasturtium hilarianum* (Walp.) Hauman

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: VAL.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

***Rorippa mandonii* (E. Fourn.) Mart.-Laborde**

Sinónimos: *Sisymbrium mandonii* E. Fourn., *Diplotaxis vernalis* Phil., *Hesperis mandonii* (E. Fourn.) Kuntze, *Nasturtium eggersii* O.E. Schulz

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: VAL, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 100-3000 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Rorippa palustris* (L.) Besser**

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: BIO, ARA, LRI, LLA.

***Rorippa philippiana* Macloskie**

Sinónimos: *Nasturtium bonariense* (Poir.) DC. var. *micranthum* (Phil.) Reiche, *Nasturtium philippianum* Speg., *Nasturtium micranthum* Phil.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 0-2900 m.

Países limítrofes: Argentina y Perú.

***Rorippa sarmentosa* (Sol. ex G. Forst.) J.F. Macbr.**

Hierba. Anual o perenne. Introducida.

Distribución: IPA.

***Rorippa sylvestris* (L.) Besser**

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.

Sarcodraba***Sarcodraba dusenii* (O.E. Schulz) Al-Shehbaz**

Sinónimos: *Grammosperma dusenii* O.E. Schulz

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 500-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Schizopetalon***Schizopetalon arcuatum* Al-Shehbaz**

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: ATA.

Rango altitudinal: 200-400 m.

***Schizopetalon bipinnatifidum* Phil.**

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: ATA, COQ.

Rango altitudinal: 300-2400 m.

***Schizopetalon biseriatum* Phil.**

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: ATA, COQ, VAL.

Rango altitudinal: 0-600 m.

***Schizopetalon brachycarpum* Al-Shehbaz**

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: RME.

Rango altitudinal: 2100-2300 m.

***Schizopetalon corymbosum* Al-Shehbaz**

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: COQ, VAL.

Rango altitudinal: 230-450 m.

Schizopetalon dentatum (Barnéoud) Gilg & Muschl.

Sinónimos: *Diplotaxis chilensis* Barnéoud, *Perreymondia dentata* Barnéoud, *Perreymondia multifida* Barnéoud, *Perreymondia viridis* Phil., *Schizopetalon viride* (Phil.) Reiche
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME.
Rango altitudinal: 600-2300 m.

Schizopetalon maritimum Barnéoud

Sinónimos: *Schizopetalon gayanum* Barnéoud
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: ATA, COQ.
Rango altitudinal: 0-200 m.

Schizopetalon rupestre (Barnéoud) Reiche

Sinónimos: *Perreymondia rupestris* Barnéoud, *Perreymondia bronniartii* Barnéoud, *Schizopetalon bronniartii* (Barnéoud) Reiche, *Schizopetalon walkeri* Sims var. *bronniartii* (Barnéoud) Gilg & Muschl., *Schizopetalon san-romanii* Phil., *Schizopetalon dentatum* (Barnéoud) Gilg & Muschl. var. *san-romanii* (Phil.) Gilg & Muschl.
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: ATA, COQ, VAL.
Rango altitudinal: 1900-4000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Schizopetalon tenuifolium Phil.

Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: ATA.
Rango altitudinal: 0-500 m.

Schizopetalon walkeri Sims

Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: COQ, VAL.
Rango altitudinal: 0-1500 m.

Sibara

Sibara anethifolia (Phil.) Al-Shehbaz

Sinónimos: *Werdermannia anethifolia* (Phil.) I.M. Johnst., *Nasturtium anethifolium* Phil., *Heterothrix anethifolia* (Phil.) O.E. Schulz, *Sisymbrium carnosulum* Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: TAR, ANT, ATA.
Rango altitudinal: 0-800 m.

Sibara dilloniorum Al-Shehbaz

Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: ANT.
Rango altitudinal: 0-800 m.

Sibara macrostachya (Phil.) Al-Shehbaz

Sinónimos: *Sisymbrium macrostachyum* Phil., *Werdermannia macrostachya* (Phil.) O.E. Schulz, *Nasturtium macrostachyum* Phil., *Sisymbrium pectinatum* Reiche, *Sisymbrium larranagae* Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ANT.
Rango altitudinal: 0-100 m.

Sibara pinnata (Barnéoud) Al-Shehbaz

Sinónimos: *Werdermannia pinnata* (Barnéoud) O.E. Schulz, *Sisymbrium pinnatum* Barnéoud, *Sisymbrium pinnatum* Barnéoud var. *pubescens* Barnéoud, *Nasturtium deserticola* Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ANT, ATA.
Rango altitudinal: 2800 m.

Sinapis

Sinapis arvensis L.

Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: COQ.

Sisymbrium

Sisymbrium altissimum L.

Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: BIO.

Sisymbrium austriacum Jacq.

Hierba. Bienal. Introducida.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, ARA, LLA.

Sisymbrium irio L.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: AYP, ANT, ATA, VAL, RME, LBO, MAU, MAG.

***Sisymbrium officinale* (L.) Scop.**

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE.

***Sisymbrium orientale* L.**

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, MAG.

Stenodraba

***Stenodraba chillanensis* (Phil.) O.E. Schulz**

Sinónimos: *Draba chillanensis* Phil., *Weberbauera chillanensis* (Phil.) Al-Shehbaz

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 2000-2900 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Stenodraba colchaguensis* (Barnéoud) O.E. Schulz**

Sinónimos: *Cardamine colchaguensis* Barnéoud, *Weberbauera colchaguensis* (Barnéoud) Al-Shehbaz, *Draba andina* Phil., *Draba patagonica* Phil., *Sisymbrium colchaguensis* (Barnéoud) Wedd. ex E. Fourn., *Stenodraba andina* (Phil.) O.E. Schulz,

Stenodraba andina (Phil.) O.E. Schulz var. *hirticaulis*

O.E. Schulz, *Stenodraba patagonica* (Phil.) Ravenna,

Arabis drabaeformis Schlechl., *Arabis colchaguensis* (Barnéoud) Turcz., *Hesperis colchaguensis* (Barnéoud) Kuntze, *Braya pusilla* A. Gray, *Hesperis pusilla* (A. Gray) Kuntze, *Weberbauera pusilla* (A. Gray) O.E. Schulz

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, MAU, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 500-3700 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Stenodraba imbricatifolia* (Barnéoud) O.E. Schulz**

Sinónimos: *Draba imbricatifolia* Barnéoud, *Sisymbrium imbricatifolium* (Barnéoud) Wedd., *Hesperis imbricatifolia* (Barnéoud) Kuntze, *Weberbauera imbricatifolia* (Barnéoud) Al-Shehbaz, *Stenodraba*

imbricatifolia (Barnéoud) O.E. Schulz var. *glabrata* O.E. Schulz, *Braya imbricatifolia* (Barnéoud) A. Gray

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO.

Rango altitudinal: 2800-4200 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Stenodraba lagunae* (O.E. Schulz) Salariato & Al-Shehbaz**

Sinónimos: *Stenodraba suffruticosa* (Barnéoud) O.E. Schulz var. *lagunae* O.E. Schulz, *Weberbauera lagunae* (O.E. Schulz) Al-Shehbaz

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ATA.

Rango altitudinal: 3800-4000 m.

***Stenodraba lechleri* (E. Fourn.) Ravenna**

Sinónimos: *Pennellia lechleri* (E. Fourn.) Al-Shehbaz & C.D. Bailey, *Pennellia petraea* (Kuntze) O.E. Schulz, *Sisymbrium petraeum* Phil., nom. illeg., *Stenodraba glareosa* Ravenna, *Heterothrix petraea* (Kuntze) O.E. Schulz, *Sisymbrium caespitosum* Phil., *Sisymbrium fastigiatum* Phil., *Stenodraba fastigiata* (Phil.) Ravenna, *Sisymbrium lechleri* E. Fourn., *Weberbauera lechleri* (E. Fourn.) Al-Shehbaz, *Hesperis lechleri* (E. Fourn.)

Kuntze, *Hesperis petraea* Kuntze

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: RME, LBO, NUB, ARA.

Rango altitudinal: 300-2100 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Stenodraba parvifolia* (Phil.) O.E. Schulz**

Sinónimos: *Sisymbrium parvifolium* Phil., *Pennellia parvifolia* (Phil.) Al-Shehbaz & C.D. Bailey, *Sisymbrium vestitum* (Ravenna) Al-Shehbaz, *Stenodraba vestita* Ravenna, *Weberbauera parvifolia* (Phil.) Al-Shehbaz

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: RME, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 1500-2300 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Stenodraba stenophylla* (Leyb.) O.E. Schulz**

Sinónimos: *Draba stenophylla* Leyb., *Draba cauquensis* Phil., *Draba leyboldii* Phil., *Stenodraba stenophylla* (Leyb.) O.E. Schulz var. *leyboldii* (Phil.) O.E. Schulz, *Weberbauera stenophylla* (Leyb.) Al-Shehbaz

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: RME, MAU.

Rango altitudinal: 2000-4000 m.

***Stenodraba suffruticosa* (Barnéoud) O.E. Schulz**

Sinónimos: *Draba suffruticosa* Barnéoud, *Sisymbrium suffruticosum* (Barnéoud) E. Fourn., *Hesperis suffruticosa* (Barnéoud) Kuntze, *Draba imbricatifolia* Barnéoud var. *suffruticosa* (Barnéoud) Reiche, *Weberbauera suffruticosa* (Barnéoud) Al-Shehbaz

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ.

Rango altitudinal: 3300-4100 m.

Teesdalia

***Teesdalia nudicaulis* (L.) W.T. Aiton**

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: MAG.

Thlaspi

***Thlaspi arvense* L.**

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: ANT, MAG.

Tomostima

***Tomostima australis* (R. Br.) Al-Shehbaz, M. Koch & Jordon-Thaden**

Sinónimos: *Draba australis* R. Br.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: COQ, MAG.

Rango altitudinal: 0-1800 m.

Países limítrofes: Argentina.

Tropidocarpum

***Tropidocarpum lanatum* (Barnéoud) Al-Shehbaz & R.A. Price**

Sinónimos: *Agallis montana* Phil., *Agallis lanata* (Barnéoud) Gilg & Muschl. ex O.E. Schulz, *Lepidium lanatum* Barnéoud

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, RME.

Rango altitudinal: 200-900 m.

Weberbauera

***Weberbauera spathulifolia* (A. Gray) O.E. Schulz**

Sinónimos: *Sisymbrium spathulifolium* A. Gray, *Sisymbrium oliganthum* Wedd., *Sisymbrium orophilum* Wedd., *Sisymbrium septaceum* Wedd., *Braya densiflora* Muschl., *Weberbauera densiflora* (Muschl.) Gilg & Muschl.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: TAR.

Rango altitudinal: 4400-4690 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Xerodraba

***Xerodraba lycopodioides* (Speg.) Skottsb.**

Sinónimos: *Braya lycopodioides* Speg., *Xerodraba pectinata* (Speg.) Skottsb., *Eudema lycopodioides* (Speg.) Gilg & Muschl., *Eudema pectinata* (Speg.) Gilg & Muschl., *Braya pectinata* Speg.

Subarbusto. Nativo.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 0-1400 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Xerodraba patagonica* (Speg.) Skottsb.**

Sinónimos: *Braya patagonica* Speg., *Eudema patagonica* (Speg.) Gilg & Muschl.

Subarbusto. Nativo.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 0-1100 m.

Países limítrofes: Argentina.

CACTACEAE

Austrocactus

***Austrocactus patagonicus* (F.A.C. Weber) Backeb.**

Sinónimos: *Cereus patagonicus* F.A.C. Weber, *Echinocactus intertextus* Phil.

Subarbusto. Nativo.

Distribución: ARA, AIS.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Austrocactus philippii* (Regel & E. Schmidt) Buxb.**

Sinónimos: *Austrocactus hibernus* F. Ritter, *Erdisia philippii* (Regel & E. Schmidt) Britton & Rose, *Cereus philippii* Regel & Schmidt, *Echinocactus philippii* (Regel & E. Schmidt) K. Schum., *Echinopsis philippii* (Regel & E. Schmidt) G. Nicholson
Subarbusto suculento. Nativo.
Distribución: MAU.
Rango altitudinal: 2000 m.
Países limítrofes: Argentina.

***Austrocactus spiniflorus* (Phil.) F. Ritter**
Sinónimos: *Erdisia spiniflora* (Phil.) Britton & Rose, *Opuntia spiniflora* Phil., *Corryocactus spiniflorus* (Phil.) Hutchison, *Opuntia bicolor* Phil., *Opuntia clavata* Phil., *Cereus hypogaeus* F.A.C. Weber ex Regel, *Echinocereus hypogaeus* Rümpler, *Eulychnia clavata* Phil., *Echinocereus clavata* K. Schum.
Subarbusto suculento. Endémico.
Distribución: RME, LBO.
Rango altitudinal: 1500-2500 m.

Browningia

***Browningia candelaris* (Meyen) Britton & Rose**
Sinónimos: *Cereus candelaris* Meyen, *Cactus candelaris* (Meyen) Meyen
Árbol suculento. Nativo.
Distribución: AYP, TAR.
Rango altitudinal: 2000-3000 m.
Países limítrofes: Perú.
Nombre vulgar: Candelabro, cardón, sabaya.

Copiapo

***Copiapoahremephiana* N.P. Taylor & G.J. Charles**
Arbusto suculento. Endémico.
Distribución: ANT.
Rango altitudinal: 0-100 m.

***Copiapoaboliviiana* (Pfeiff.) F. Ritter**
Sinónimos: *Copiapoatacamensis* Middled., *Echinocactus boliviianus* Pfeiff., *Copiapoacalderana* F. Ritter subsp. *atacamensis* (Middled.) D.R. Hunt
Subarbusto suculento. Endémico.
Distribución: ANT.
Rango altitudinal: 0-1000 m.

***Copiapoacalderana* F. Ritter**
Sinónimos: *Copiapoatacamensis* Middled. var. *calderana* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Copiapoacalderana* F. Ritter var. *spinosior* F. Ritter, *Copiapoalembcke* Backeb., nom. illeg.
Subarbusto suculento. Endémico.
Distribución: ATA.
Rango altitudinal: 0-200 m.

***Copiapoacinerascens* (Salm-Dyck) Britton & Rose**
Sinónimos: *Copiapoaplanata* Backeb., nom. illeg., *Copiapoacinerascens* (Salm-Dyck) Britton & Rose var. *intermedia* F. Ritter, *Echinocactuscinerascens* Salm-Dyck, *Copiapoacinerascens* (Salm-Dyck) Britton & Rose var. *aplanata* F. Ritter, *Echinocactusambiguus* Hildm. ex K. Schum.
Arbusto suculento. Endémico.
Distribución: ANT, ATA.
Rango altitudinal: 0-200 m.

Copiapoacinerea* (Phil.) Britton & Rose var. *cinerea
Sinónimos: *Copiapoatenebrosa* F. Ritter, *Copiapoacinerea* (Phil.) Britton & Rose var. *tenebrosa* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Echinocactuscinereus* Phil.
Arbusto suculento. Endémico.
Distribución: ANT.
Rango altitudinal: 0-1000 m.

***Copiapoacinerea* (Phil.) Britton & Rose var. *columna-alba* (F. Ritter) Backeb.**
Sinónimos: *Copiapoacolumna-alba* F. Ritter var. *nuda* F. Ritter, *Copiapoacolumna-alba* F. Ritter, *Copiapoamelanohystrix* F. Ritter
Subarbusto suculento. Endémico.
Distribución: ANT, ATA.
Rango altitudinal: 0-1000 m.

***Copiapoacinerea* (Phil.) Britton & Rose var. *gigantea* (Backeb.) N.P. Taylor**
Sinónimos: *Copiapoagigantea* Backeb. var. *haseltoniana* (Backeb.) F. Ritter, *Copiapoagigantea* Backeb., *Copiapoahaseltoniana* Backeb., *Copiapoalibispina* Backeb., nom. nud., *Copiapoacinerea* (Phil.) Britton & Rose var. *haseltoniana* (Backeb.) N.P. Taylor
Arbusto suculento. Endémico.

Distribución: ANT.

Rango altitudinal: 700-1000 m.

***Copiapoa coquimbana* (Rümpler) Britton & Rose
var. *coquimbana***

Sinónimos: *Copiapoa alticostata* F. Ritter, *Copiapoa coquimbana* (Rümpler) Britton & Rose var. *alticostata* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Copiapoa coquimbana* (Rümpler) Britton & Rose var. *armata* F. Ritter, *Copiapoa coquimbana* (Rümpler) Britton & Rose var. *pendulina* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Copiapoa coquimbana* (Rümpler) Britton & Rose var. *pseudocoquimbana* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Copiapoa coquimbana* (Rümpler) Britton & Rose var. *vallenarensis* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Copiapoa coquimbana* (Rümpler) Britton & Rose var. *wagenknechtii* F. Ritter, *Copiapoa pendulina* F. Ritter, *Copiapoa pseudocoquimbana* F. Ritter, *Copiapoa pseudocoquimbana* F. Ritter var. *chaniarensis* F. Ritter, *Copiapoa pseudocoquimbana* F. Ritter var. *domeykoensis* F. Ritter, *Copiapoa pseudocoquimbana* F. Ritter var. *vulgata* F. Ritter, *Copiapoa vallenarensis* F. Ritter, *Copiapoa serenana* Voldan, *Echinocactus coquimbanus* Rümpler, *Copiapoa wagenknechtii* F. Ritter
Arbusto suculento. Endémico.
Distribución: ATA, COQ.
Rango altitudinal: 0-1000 m.

***Copiapoa coquimbana* (Rümpler) Britton & Rose
var. *fiedleriana* (K. Schum.) A.E. Hoffm.**

Sinónimos: *Copiapoa fiedleriana* (K. Schum.) Backeb., *Copiapoa pepiniana* (K. Schum.) Backeb. var. *fiedleriana* Backeb., *Echinocactus fieldlerianum* K. Schum.

Subarbusto suculento. Endémico.
Distribución: ATA.
Rango altitudinal: 0-200 m.

***Copiapoa dealbata* F. Ritter**

Sinónimos: *Copiapoa carizalensis* F. Ritter, *Copiapoa carizalensis* F. Ritter var. *gigantea* F. Ritter, *Copiapoa dealbata* F. Ritter var. *carizalensis* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Copiapoa dealbata* F. Ritter fma. *gigantea* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Copiapoa cinerea* (Phil.) Britton & Rose var. *dealbata* (F. Ritter) Backeb.
Arbusto suculento. Endémico.
Distribución: ATA.
Rango altitudinal: 0-200 m.

***Copiapoa decorticans* N.P. Taylor & G.J. Charles**

Subarbusto suculento. Endémico.

Distribución: ANT.
Rango altitudinal: 0-200 m.

***Copiapoa echinata* F. Ritter**

Sinónimos: *Copiapoa echinata* F. Ritter fma. *pulla* F. Ritter, *Copiapoa echinata* F. Ritter var. *borealis* F. Ritter, *Copiapoa megarhiza* Britton & Rose var. *echinata* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Copiapoa totoralensis* F. Ritter
Subarbusto suculento. Endémico.
Distribución: ATA.
Rango altitudinal: 0-200 m.

***Copiapoa echinoides* (Lem. ex Salm-Dyck) Britton & Rose**

Sinónimos: *Copiapoa cuprea* F. Ritter, *Copiapoa dura* F. Ritter, *Copiapoa echinoides* (Lem. ex Salm-Dyck) Britton & Rose var. *cuprea* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Echinocactus echinoides* Lem. ex Salm-Dyck
Subarbusto suculento. Endémico.

Distribución: ATA.

***Copiapoa eremophila* F. Ritter**

Sinónimos: *Copiapoa cinerea* (Phil.) Britton & Rose var. *eremophila* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Copiapoa cinerea* (Phil.) Britton & Rose fma. *albispina* F. Ritter
Arbusto suculento. Endémico.
Distribución: TAR.
Rango altitudinal: 400-1000 m.

***Copiapoa grandiflora* F. Ritter**

Sinónimos: *Copiapoa cinerascens* (Salm-Dyck) Britton & Rose var. *grandiflora* (F. Ritter) A.E. Hoffm.
Subarbusto suculento. Endémico.
Distribución: ANT, ATA.

***Copiapoa humilis* (Phil.) Hutchison var. *esmeraldana* (F. Ritter) A.E. Hoffm.**

Sinónimos: *Copiapoa esmeraldana* F. Ritter
Subarbusto suculento. Endémico.
Distribución: ANT.
Rango altitudinal: 200-500 m.

Copiapoa humilis* (Phil.) Hutchison var. *humilis

Sinónimos: *Copiapoa humilis* (Phil.) Hutchison var. *paposoensis* (F. Ritter) A. Hoffm., nom. illeg., *Copiapoa paposoensis* F. Ritter, nom. illeg., *Echinocactus humilis* Phil.
Subarbusto suculento. Endémico.
Distribución: ANT.
Rango altitudinal: 200-1000 m.

Copiapoa humilis* (Phil.) Hutchison var. *longispina
(F. Ritter) A.E. Hoffm.
Sinónimos: *Copiapoa longispina* F. Ritter
Subarbusto suculento. Endémico.
Distribución: ATA.

Copiapoa humilis* (Phil.) Hutchison var. *taltalensis
(Werderm.) A.E. Hoffm.
Sinónimos: *Copiapoa chaniaralensis* F. Ritter, *Copiapoa taltalensis* (Werderm.) Looser, *Echinocactus taltalensis* Werderm.
Subarbusto suculento. Endémico.
Distribución: ANT.

Copiapoa humilis* (Phil.) Hutchison var. *tenuissima (F. Ritter) G. Charles
Sinónimos: *Copiapoa tenuissima* F. Ritter
Subarbusto suculento. Endémico.
Distribución: ANT.
Rango altitudinal: 600-800 m.

Copiapoa humilis* (Phil.) Hutchison var. *tocopillana (F. Ritter) G. Charles
Sinónimos: *Copiapoa tocopillana* F. Ritter
Subarbusto suculento. Endémico.
Distribución: ANT.

Copiapoa humilis* (Phil.) Hutchison var. *varispinata (F. Ritter) G. Charles
Sinónimos: *Copiapoa varispinata* F. Ritter
Subarbusto suculento. Endémico.
Distribución: ANT.

Copiapoa hypogaea* F. Ritter var. *hypogaea
Sinónimos: *Copiapoa hypogaea* F. Ritter var. *barquitensis* F. Ritter, *Copiapoa mollicula* F. Ritter
Subarbusto suculento. Endémico.
Distribución: ANT, ATA.
Rango altitudinal: 400-500 m.

Copiapoa hypogaea* F. Ritter var. *montana (F. Ritter) G. Charles
Sinónimos: *Copiapoa olivana* F. Ritter, *Copiapoa montana* F. Ritter
Subarbusto suculento. Endémico.
Distribución: ANT.

***Copiapoa krainziana* F. Ritter**
Sinónimos: *Copiapoa krainziana* F. Ritter var. *scopulina* F. Ritter, *Copiapoa cinerea* (Phil.) Britton & Rose var. *krainziana* (F. Ritter) Slaba
Subarbusto suculento. Endémico.
Distribución: ANT.
Rango altitudinal: 300-900 m.

***Copiapoa laui* L. Diers**
Sinónimos: *Copiapoa hypogaea* F. Ritter var. *laui* (L. Diers) A. Hoffm.
Subarbusto suculento. Endémico.
Distribución: ANT, ATA.
Rango altitudinal: 100-700 m.

***Copiapoa longistaminea* F. Ritter**
Sinónimos: *Copiapoa cinerea* (Phil.) Britton & Rose var. *longistaminea* (F. Ritter) Slaba
Arbusto suculento. Endémico.
Distribución: ANT.
Rango altitudinal: 0-200 m.

Copiapoa marginata* (Salm-Dyck) Britton & Rose var. *bridgesii (Pfeiff.) A.E. Hoffm.
Sinónimos: *Echinocactus bridgesii* Pfeiff., *Copiapoa bridgesii* (Pfeiff.) Backeb.
Subarbusto suculento. Endémico.
Distribución: ANT, ATA.
Rango altitudinal: 200-700 m.

Copiapoa marginata* (Salm-Dyck) Britton & Rose var. *marginata
Sinónimos: *Echinocactus marginatus* Salm-Dyck, *Echinocactus columnaris* Pfeiff., *Echinocactus streptocaulon* Hook., *Copiapoa streptocaulon* (Hook.) Oosten
Subarbusto suculento. Endémico.
Distribución: ATA.
Rango altitudinal: 0-700 m.

***Copiapoa megarhiza* Britton & Rose**

Sinónimos: *Copiapoa megarhiza* Britton & Rose var. *microrhiza* F. Ritter
Subarbusto suculento. Endémico.
Distribución: ATA.
Rango altitudinal: 200-800 m.

***Copiapoa rarissima* F. Ritter**

Subarbusto suculento. Endémico.
Distribución: ANT.

***Copiapoa rupestris* F. Ritter**

Sinónimos: *Copiapoa desertorum* F. Ritter var. *hornilloensis* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Copiapoa desertorum* F. Ritter var. *rupestris* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Copiapoa desertorum* F. Ritter, *Copiapoa desertorum* F. Ritter var. *rubriflora* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Copiapoa hornilloensis* F. Ritter, *Copiapoa rubriflora* F. Ritter
Arbusto suculento. Endémico.
Distribución: ANT.
Rango altitudinal: 0-500 m.

***Copiapoa serpentisulcata* F. Ritter**

Sinónimos: *Copiapoa serpentisulcata* F. Ritter var. *castanea* F. Ritter
Arbusto suculento. Endémico.
Distribución: ATA.
Rango altitudinal: 0-300 m.

***Copiapoa solaris* (F. Ritter) F. Ritter**

Sinónimos: *Copiapoa conglomerata* (Phil.) Lembcke, *Copiapoa ferox* Lembcke & Backeb., nom. illeg., *Echinocactus conglomeratus* Phil., *Pilocopiapoa solaris* F. Ritter
Arbusto suculento. Endémico.
Distribución: ANT.
Rango altitudinal: 0-1000 m.

Corryocactus

***Corryocactus brevistylus* (K. Schum. ex Vaupel) Britton & Rose**

Sinónimos: *Corryocactus krausii* Backeb., *Cereus brevistylus* K. Schum.
Arbusto suculento. Nativo.

Distribución: AYP, TAR.
Rango altitudinal: 2000-3500 m.
Países limítrofes: Perú.
Nombre vulgar: Guacalla.

Cumulopuntia

***Cumulopuntia dactylifera* (Vaupel) E.F. Anderson**

Sinónimos: *Cumulopuntia pentlandii* (Salm-Dyck) F. Ritter var. *dactylifera* (Vaupel) F. Ritter, *Opuntia dactylifera* Vaupel
Subarbusto suculento. Nativo.
Distribución: ANT.
Países limítrofes: Perú.

***Cumulopuntia echinacea* (Ritter) Ritter**

Sinónimos: *Tephrocactus echinaceus* F. Ritter, *Opuntia echinacea* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Cumulopuntia boliviiana* (Salm-Dyck) F. Ritter subsp. *echinacea* (F. Ritter) D.R. Hunt, *Maihueniopsis boliviiana* (Salm-Dyck) R. Kiesling subsp. *echinacea* (Ritter) Faúndez & R. Kiesling
Arbusto suculento. Nativo.
Distribución: TAR.
Rango altitudinal: 2600-4000 m.
Países limítrofes: Perú.

***Cumulopuntia ignescens* (Vaup.) Ritter**

Sinónimos: *Tephrocactus ignescens* (Vaupel) Backeb., *Opuntia ignescens* Vaupel, *Cumulopuntia boliviiana* (Salm-Dyck) F. Ritter subsp. *ignescens* (Vaupel) D.R. Hunt, *Maihueniopsis boliviiana* (Salm-Dyck) R. Kiesling subsp. *ignescens* (Vaup.) Faúndez & R. Kiesling
Arbusto suculento. Nativo.
Distribución: TAR, ANT.
Rango altitudinal: 3300-4500 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.
Nombre vulgar: Piskayu.

***Cumulopuntia sphaerica* (C.F. Först.) E.F. Anderson**

Sinónimos: *Opuntia leucophaea* Phil., *Cumulopuntia tubercularis* F. Ritter, *Opuntia sphaerica* C.F. Först., *Echinocactus berteri* auct. non (Colla) Gay
Subarbusto suculento. Nativo.
Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ, VAL.
Rango altitudinal: 0-3500 m.
Países limítrofes: Perú.

Nombre vulgar: Jalajala, puskaye.

Cylindropuntia

Cylindropuntia tunicata (Lehm.) F.M. Knuth

Arbusto suculento. Introducido.

Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ.

Echinopsis

Echinopsis atacamensis (Phil.) Friedrich & G.D.

Rowley

Sinónimos: *Cereus atacamensis* Phil., *Trichocereus atacamensis* (Phil.) Beckeb., *Helianthocereus atacamensis* (Phil.) Beckeb.

Árbol suculento. Nativo.

Distribución: ANT.

Rango altitudinal: 2000-3800 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Nombre vulgar: Pasakana.

Echinopsis chiloensis (Colla) Friedrich & G.D.

Rowley subsp. *chiloensis*

Sinónimos: *Trichocereus chiloensis* (Colla) Britton & Rose, *Trichocereus chiloensis* (Colla) Britton & Rose var. *australis* F. Ritter, *Trichocereus chiloensis* (Colla) Britton & Rose var. *borealis* F. Ritter, *Trichocereus chiloensis* (Colla) Britton & Rose var. *conjungens* F. Ritter, *Trichocereus chiloensis* (Colla) Britton & Rose var. *eburneus* F. Ritter, nom. illeg., *Trichocereus chiloensis* (Colla) Britton & Rose var. *panhoplites* (K. Schum.) F. Ritter, nom. illeg., *Cactus chiloensis* Colla, *Cereus chiloensis* (Colla) DC., *Cereus quisco* J. Remy ex Gay

Árbusto suculento. Endémico.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 0-1700 m.

Echinopsis chiloensis (Colla) Friedrich & G.D.

Rowley subsp. *litoralis* (Johow) Lowry

Sinónimos: *Echinopsis litoralis* (Johow) Friedrich & G.D. Rowley, *Trichocereus chiloensis* (Colla) Britton & Rose subsp. *litoralis* (Johow) Lowry, *Cereus litoralis* Johow, *Trichocereus litoralis* (Johow) Looser, *Echinopsis bolligeriana* Mächler & H.E. Walter

Árbusto suculento. Endémico.

Distribución: COQ, VAL, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 0-200 m.

Echinopsis coquimbana (Molina) Friedrich & G.D. Rowley

Sinónimos: *Trichocereus coquimbana* (Molina) Britton & Rose, *Cactus coquimbanus* Molina, *Cereus coquimbanus* (Molina) K. Schum.

Árbusto suculento. Endémico.

Distribución: ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Echinopsis deserticola (Werderm.) Friedrich & G.D. Rowley

Sinónimos: *Echinopsis deserticola* (Werderm.) Friedrich & G.D. Rowley var. *fulvilana* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Echinopsis spinibarbis* (Pfeiff.) A.E. Hoffm., *Trichocereus deserticola* (Werderm.) Looser, *Trichocereus fulvilanus* F. Ritter, *Eulychnia spinibarbis* (Pfeiff.) Britton & Rose, *Cereus deserticola* Werderm., *Trichocereus spinibarbis* (Pfeiff.) F. Ritter, *Cereus spinibarbis* Pfeiff.

Árbusto suculento. Endémico.

Distribución: ANT, ATA.

Rango altitudinal: 400-800 m.

Echinopsis ferox (Britton & Rose) Backeb.

Sinónimos: *Lobivia ferox* Britton & Rose, *Pseudolobivia ferox* (Britton & Rose) Backeb.

Subarbusto suculento. Nativo.

Distribución: TAR.

Rango altitudinal: 2000-3800 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Echinopsis formosa (Pfeiff.) Jacobi ex Salm-Dyck

Sinónimos: *Echinocactus formosa* Pfeiff.,

Acanthocalycium formosum (Pfeiff.) Backeb.,

Soehrenia formosa (Pfeiff.) Backeb., *Trichocereus formosus* (Pfeiff.) F. Ritter, *Lobivia longispina* Britton & Rose

Árbusto suculento. Nativo.

Distribución: ANT.

Países limítrofes: Argentina.

Echinopsis glauca (F. Ritter) Friedrich & G.D.

Rowley fma. *pendens* (F. Ritter) Friedrich & G.D. Rowley

Sinónimos: *Trichocereus glaucus* F. Ritter fma. *pendens* F. Ritter

Arbusto suculento. Endémico.

Distribución: TAR.

Rango altitudinal: 400-600 m.

***Echinopsis nigripilis* (Phil.) Friedrich & G.D.**

Rowley

Sinónimos: *Cereus nigripilis* Phil., *Trichocereus nigripilis* (Phil.) Baker, *Trichocereus coquimbanus* (Molina) Britton & Rose var. *nigripilis* (Phil.) Borg

Arbusto suculento. Endémico.

Distribución: COQ.

Rango altitudinal: 0-500 m.

***Echinopsis skottsbergii* (Backeb.) Friedrich & G.D.**

Rowley

Sinónimos: *Trichocereus skottsbergii* Backeb.

Arbusto suculento. Endémico.

Distribución: COQ.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Eriosyce

***Eriosyce aspillacae* (Söhrens) Katt.**

Sinónimos: *Pyrrhocactus aspillacae* (Söhrens) F. Ritter, *Neoporteria horrida* (Gay) D.R. Hunt var. *aspillacae* (Söhrens) A.E. Hoffm., *Neoporteria aspillacae* (Söhrens) Backeb., *Echinocactus aspillacae* Söhrens, *Eriosyce aspillacae* (Söhrens) Katt. subsp. *maechleri* H.E. Walter

Subarbusto suculento. Endémico.

Distribución: LBO, MAU.

Rango altitudinal: 0-200 m.

Eriosyce aurata* (Pfeiff.) Backeb. var. *aurata

Sinónimos: *Eriosyce algarrobensis* F. Ritter, *Eriosyce ceratistes* Britton & Rose, *Eriosyce ihotzkyana* F. Ritter var. *ausseliana* (F. Ritter) F. Ritter, *Eriosyce sandillon* (Gay) Phil., *Eriosyce sandillon* (Gay) Phil. var. *algarrobensis* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Eriosyce sandillon* (Gay) Phil. var. *mollensis* (Backeb.) A.E. Hoffm., *Eriosyce sandillon* (Gay) Phil. var. *vallenarensis* (Backeb.) A.E. Hoffm., *Echinocactus auratus* Pfeiff., *Echinocactus ceratistes* Otto ex Pfeiff., *Echinocactus sandillon* Gay

Arbusto suculento. Endémico.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME.

Rango altitudinal: 1500-2500 m.

Eriosyce aurata* (Pfeiff.) Backeb. var. *spinibarbis

(F. Ritter) Katt.

Sinónimos: *Eriosyce spinibarbis* F. Ritter

Arbusto suculento. Endémico.

Distribución: ATA.

Rango altitudinal: 2000-2500 m.

***Eriosyce caligophila* R. Pinto**

Sinónimos: *Islaya caligophila* (R. Pinto) Faúndez & R.

Kiesling

Subarbusto suculento. Endémico.

Distribución: TAR.

Rango altitudinal: 600-700 m.

Eriosyce chilensis* (Hildm. ex K. Schum.) Katt. var. *albidiflorus

(F. Ritter) Katt.

Sinónimos: *Pyrrhocactus chilensis* (Hildm. ex K.

Schum.) Katt. var. *albidiflorus* F. Ritter

Arbusto suculento. Endémico.

Distribución: COQ.

Rango altitudinal: 0-100 m.

Eriosyce chilensis* (Hildm. ex K. Schum.) Katt. var. *chilensis

Sinónimos: *Pyrrhocactus chilensis* (Hildm. ex K. Schum.) F. Ritter, *Pyrrhocactus krausii* F. Ritter, *Neoporteria chilensis* (Hildm. ex K. Schum.) Britton & Rose, *Echinocactus chilensis* Hildm. ex K. Schum., *Neochilenia chilensis* (Hildm. ex K. Schum.) Backeb.

Arbusto suculento. Endémico.

Distribución: COQ, VAL.

Rango altitudinal: 0-100 m.

***Eriosyce confinis* (F. Ritter) Katt.**

Sinónimos: *Pyrrhocactus confinis* F. Ritter, *Neoporteria confinis* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley, *Neoporteria kunzei* (C.F. Först.) Backeb. var. *confinis* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neochilenia confinis* (F. Ritter) Backeb.

Subarbusto suculento. Endémico.

Distribución: ATA.

Rango altitudinal: 0-500 m.

***Eriosyce crispa* (F. Ritter) Katt.**

Sinónimos: *Pyrrhocactus crispus* F. Ritter, *Neoporteria crispa* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley, *Neoporteria vallenarensis* (F. Ritter) A.E. Hoffm. var. *crispa* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Horridocactus crispus* (F. Ritter) Backeb.

Arbusto suculento. Endémico.

Distribución: ATA.

Rango altitudinal: 0-300 m.

Eriosyce curvispina* (Bertero ex Colla) Katt. subsp. *curvispina* var. *curvispina

Sinónimos: *Pyrrhocactus curvispinus* (Bertero ex Colla) A. Berger ex Backeb., *Pyrrhocactus andicola* (F. Ritter) F. Ritter, *Pyrrhocactus andicola* (F. Ritter) F. Ritter var. *descendens* (F. Ritter) F. Ritter, *Pyrrhocactus andicola* (F. Ritter) F. Ritter var. *mollensis* (F. Ritter) F. Ritter, *Pyrrhocactus andicola* (F. Ritter) F. Ritter var. *robustus* (F. Ritter) F. Ritter, *Pyrrhocactus coliguayensis* F. Ritter, *Pyrrhocactus grandiflorus* F. Ritter, *Pyrrhocactus horridus* (Gay) Backeb. var. *aconcaguensis* (F. Ritter) F. Ritter, *Pyrrhocactus horridus* (Gay) Backeb. var. *orientalis* (F. Ritter) F. Ritter, *Pyrrhocactus limariensis* F. Ritter, *Pyrrhocactus lissocarpus* F. Ritter, *Pyrrhocactus pamaensis* F. Ritter, *Neoporteria choapensis* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley, *Neoporteria curvispina* (Bertero ex Colla) Donald & G.D. Rowley, *Neoporteria horrida* (Gay) D.R. Hunt var. *coliguayensis* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria horrida* (Gay) D.R. Hunt var. *limariensis* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria litoralis* F. Ritter, *Eriosyce curvispina* (Bertero ex Colla) Katt. var. *aconcaguensis* (F. Ritter) Katt., *Eriosyce curvispina* (Bertero ex Colla) Katt. var. *choapensis* (F. Ritter) Katt., *Eriosyce limariensis* (F. Ritter) Katt., *Eriosyce marksiana* (F. Ritter) Katt. var. *gracilis* (F. Ritter) Katt., *Eriosyce marksiana* (F. Ritter) Katt. var. *lissocarpa* (F. Ritter) Katt., *Cactus curvispinus* Bertero ex Colla, *Horridocactus curvispinus* (Bertero ex Colla) Backeb., *Pyrrhocactus choapensis* F. Ritter, *Horridocactus aconcahuensis* (F. Ritter) Backeb., *Neoporteria curvispina* (Bertero ex Colla) Donald & G.D. Rowley var. *aconcaguensis* (F. Ritter & Eriosyce curvispina (Bertero ex Colla) Katt. var. *limariensis* (F. Ritter) A. Hoffm. & H., *Pyrrhocactus lissocarpus* F. Ritter var. *gracilis* F. Ritter Arbusto suculento. Endémico. Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU. Rango altitudinal: 200-2000 m.

***Eriosyce curvispina* (Bertero ex Colla) Katt. subsp. *curvispina* var. *tuberisulcata* (Jacobi) Katt.**

Sinónimos: *Pyrrhocactus tuberisulcatus* (Jacobi) A. Berger, *Pyrrhocactus armatus* F. Ritter, *Pyrrhocactus horridus* Backeb., nom. illeg., *Pyrrhocactus horridus*

(Gay) Backeb. fma. *vegasanus* (F. Ritter) F. Ritter, *Pyrrhocactus horridus* (Gay) Backeb. var. *mutabilis* F. Ritter, *Pyrrhocactus horridus* (Gay) Backeb. var. *robustus* (F. Ritter) F. Ritter, *Pyrrhocactus odoriflorus* F. Ritter, *Neoporteria horrida* (Gay) D.R. Hunt, *Neoporteria horrida* (Gay) D.R. Hunt var. *armata* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria horrida* (Gay) D.R. Hunt var. *odoriflora* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria tuberisulcata* (Jacobi) Donald & G.D. Rowley, *Eriosyce curvispina* (Bertero ex Colla) Katt. var. *armata* (F. Ritter) Katt., *Echinocactus tuberisulcatus* Jacobi, *Eriosyce curvispina* (Bertero ex Colla) Katt. var. *robusta* (F. Ritter) Katt., *Cactus horridus* Bertero ex Colla, nom. illeg., *Eriosyce curvispina* (Bertero ex Colla) Katt. var. *mutabilis* (F. Ritter) Katt., *Pyrrhocactus robustus* F. Ritter, *Echinocactus horridus* (Bertero ex Colla) J. Remy ex Gay

Arbusto suculento. Endémico.

Distribución: RME, LBO.

Rango altitudinal: 0-600 m.

***Eriosyce curvispina* (Bertero ex Colla) Katt. subsp. *marksiana* (Ritter) R. Ferryman**

Sinónimos: *Pyrrhocactus marksianus* F. Ritter, *Pyrrhocactus marksianus* F. Ritter var. *tunensis* F. Ritter, *Pyrrhocactus truncatipetalus* F. Ritter, *Neoporteria curvispina* (Bertero ex Colla) Donald & G.D. Rowley var. *lissocarpa* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria curvispina* (Bertero ex Colla) Donald & G.D. Rowley var. *marksiana* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria marksiana* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley, *Eriosyce marksiana* (F. Ritter) Katt.

Arbusto suculento. Endémico.

Distribución: LBO, MAU.

Rango altitudinal: 200-500 m.

***Eriosyce engleri* (F. Ritter) Katt.**

Sinónimos: *Pyrrhocactus engleri* (F. Ritter) F. Ritter, *Neoporteria curvispina* (Bertero ex Colla) Donald & G.D. Rowley var. *engleri* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria engleri* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley, *Horridocactus engleri* F. Ritter

Arbusto suculento. Endémico.

Distribución: VAL, RME.

Rango altitudinal: 1900 m.

***Eriosyce eriosyzoides* (F. Ritter) Ferryman**

Sinónimos: *Pyrrhocactus eriosyzoides* (F. Ritter) F. Ritter, *Pyrrhocactus atroviridis* F. Ritter, *Pyrrhocactus*

eriosyzoides (F. Ritter) F. Ritter var. *domeykoensis* F. Ritter, *Pyrrhocactus transiens* F. Ritter, *Neopoteria carrizalensis* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neopoteria carrizalensis* (F. Ritter) A.E. Hoffm. var. *totoralensis* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neopoteria eriosyzoides* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley, *Neopoteria huascensis* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley, *Neopoteria jussieui* (Monv. ex Salm-Dyck) Britton & Rose var. *huascensis* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neopoteria kunzei* (C.F. Först.) Backeb., *Neopoteria totoralensis* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley, *Neopoteria vallenarensis* (F. Ritter) A.E. Hoffm. var. *domeykoensis* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neopoteria vallenarensis* (F. Ritter) A.E. Hoffm. var. *transitensis* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neopoteria vallenarensis* (F. Ritter) A. Hoffm., comb. illeg., *Neochilenia transitensis* (F. Ritter) Backeb., *Eriosyce crispa* (F. Ritter) Katt. subsp. *atroviridis* (F. Ritter) Katt., *Eriosyce crispa* (F. Ritter) Katt. var. *carrizalensis* (F. Ritter) Katt., *Eriosyce crispa* (F. Ritter) Katt. var. *huascensis* (F. Ritter) Katt., *Eriosyce crispa* (F. Ritter) Katt. var. *totoralensis* (F. Ritter) Katt., *Eriosyce kunzei* (C.F. Först.) Katt. var. *transitensis* (F. Ritter) Katt., *Eriosyce eriosyzoides* (F. Ritter) Ferryman, *Horridocactus eriosyzoides* F. Ritter, *Eriosyce kunzei* auct. non (C.F. Först.) Katt., *Eriosyce eriosyzoides* (F. Ritter) Ferryman var. *transitensis* (F. Ritter) A. Hoffm. & H. Walter, *Eriosyce eriosyzoides* (F. Ritter) Ferryman subsp. *atroviridis* (F. Ritter) Ferryman, *Horridocactus atroviridis* (F. Ritter) Backeb., *Neopoteria vallenarensis* (F. Ritter) A.E. Hoffm. var. *atroviridis* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neopoteria atroviridis* (F. Ritter) Ferryman, *Eriosyce eriosyzoides* (F. Ritter) Ferryman var. *carrizalensis* (F. Ritter) A. Hoffm. & H. Walter, *Pyrrhocactus carrizalensis* F. Ritter, *Horridocactus carrizalensis* (F. Ritter) Backeb., *Neopoteria totoralensis* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley var. *carrizalensis* (F. Ritter) Ferryman, *Eriosyce eriosyzoides* (F. Ritter) Ferryman var. *huascensis* (F. Ritter) A. Hoffm. & H. Walter, *Pyrrhocactus huascensis* F. Ritter, *Neochilenia huascensis* (F. Ritter) Backeb., *Eriosyce eriosyzoides* (F. Ritter) Ferryman var. *totoralensis* (F. Ritter) A. Hoffm. & H. Walter, *Pyrrhocactus totoralensis* F. Ritter, *Neochilenia totoralensis* (F. Ritter) Backeb., *Pyrrhocactus kunzei* (C.F. Först.) Y. Ito Arbusto suculento. Endémico. Distribución: ATA, COQ. Rango altitudinal: 0-1800 m.

Eriosyce esmeraldana (F. Ritter) Katt.

Sinónimos: *Neopoteria esmeraldana* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley, *Thelocephalia esmeraldana* (F. Ritter)

F. Ritter, *Chileorebutia esmeraldana* F. Ritter, *Neochilenia esmeraldana* (F. Ritter) Backeb. Subarbusto suculento. Endémico. Distribución: ANT, ATA. Rango altitudinal: 100-200 m.

Eriosyce garaventae (F. Ritter) Katt.

Sinónimos: *Pyrrhocactus garaventai* (F. Ritter) F. Ritter, *Horridocactus garaventai* F. Ritter, *Neopoteria subaiana* (Backeb.) Donald & G.D. Rowley, *Neopoteria garaventae* (F. Ritter) Ferryman, *Neopoteria curvispina* (Bertero ex Colla) Donald & G.D. Rowley var. *garaventae* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley Arbusto suculento. Endémico. Distribución: VAL. Rango altitudinal: 1000-3000 m.

Eriosyce heinrichiana (Backeb.) Katt.

Sinónimos: *Pyrrhocactus heinrichianus* (Backeb.) F. Ritter, *Pyrrhocactus chaniarensis* F. Ritter, *Pyrrhocactus jussieui* (Monv. ex Salm-Dyck) Britton & Rose var. *australis* F. Ritter, *Pyrrhocactus jussieui* (Monv. ex Salm-Dyck) Britton & Rose var. *spinosior* F. Ritter, *Pyrrhocactus setosiflorus* F. Ritter var. *intermedius* F. Ritter, *Pyrrhocactus trapichensis* F. Ritter, *Pyrrhocactus wagenknechtii* F. Ritter, *Neopoteria chorosensis* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley, *Neopoteria deherdtiana* (Backeb.) Donald & G.D. Rowley, nom. illeg., *Neopoteria dimorpha* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley, *Neopoteria jussieui* (Monv. ex Salm-Dyck) Britton & Rose, *Neopoteria jussieui* (Monv. ex Salm-Dyck) Britton & Rose var. *chaniarensis* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neopoteria jussieui* (Monv. ex Salm-Dyck) Britton & Rose var. *chorosensis* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neopoteria jussieui* (Monv. ex Salm-Dyck) Britton & Rose var. *dimorpha* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neopoteria jussieui* (Monv. ex Salm-Dyck) Britton & Rose var. *setosiflora* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neopoteria jussieui* (Monv. ex Salm-Dyck) Britton & Rose var. *trapichensis* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neopoteria jussieui* (Monv. ex Salm-Dyck) Britton & Rose var. *wagenknechtii* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neopoteria occulta* (Phil.) Britton & Rose, *Neopoteria ritteri* Donald & G.D. Rowley, *Neopoteria setosiflora* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley, *Eriosyce heinrichiana* (Backeb.) Katt. subsp. *intermedia* (F. Ritter) Katt., *Eriosyce heinrichiana* (Backeb.) Katt. var. *setosiflora* (F. Ritter) Katt., *Pyrrhocactus setosiflorus* F. Ritter, *Eriosyce heinrichiana* (Backeb.) Katt., *Chilenia*

occulta (Phil.) Backeb., *Echinocactus occultus* Phil.,
Chilenia jussieui (Monv. ex Salm-Dyck) Backeb.
Subarbusto suculento. Endémico.
Distribución: ATA, COQ.
Rango altitudinal: 0-500 m.

Eriosyce ihotzkyana F. Ritter
Arbusto suculento. Endémico.
Distribución: COQ.
Rango altitudinal: 0-1500 m.

Eriosyce iquiquensis (F. Ritter) Ferryman
Sinónimos: *Pyrrhocactus saxifragus* F. Ritter,
Neopoteria aricensis (F. Ritter) Donald & G.D.
Rowley, *Neopoteria aricensis* (F. Ritter) Donald &
G.D. Rowley var. *floribunda* (Backeb.) A.E. Hoffm.,
Neopoteria aricensis (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley
var. *saxifraga* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neopoteria*
iquiquensis (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley,
Neopoteria recondita (F. Ritter) Donald & G.D.
Rowley var. *residua* (F. Ritter) A.E. Hoffm.,
Neopoteria residua (F. Ritter & Buining) Donald &
G.D. Rowley, *Islaya iquiquensis* (F. Ritter) Faúndez &
R. Kiesling, *Neochilenia iquiquensis* (F. Ritter) Backeb.,
Pyrrhocactus aricensis (F. Ritter) Backeb., *Pyrrhocactus*
residuus F. Ritter & Buining, *Eriosyce recondita* (F.
Ritter) Katt. subsp. *iquiquensis* (F. Ritter) Katt.
Arbusto suculento. Endémico.
Distribución: TAR, ANT.
Rango altitudinal: 600-1000 m.

Eriosyce islayensis (C.F. Först.) Katt.
Sinónimos: *Islaya islayensis* (C.F. Först.) Backeb.,
Echinocactus islayensis C.F. Först.
Arbusto suculento. Nativo.
Distribución: TAR.
Rango altitudinal: 100 m.
Países limítrofes: Perú.

Eriosyce krausii (F. Ritter) Katt.
Sinónimos: *Neopoteria esmeraldana* (F. Ritter) Donald
& G.D. Rowley var. *malleolata* (F. Ritter) A.E. Hoffm.,
Theloccephala krausii (F. Ritter) F. Ritter, *Theloccephala*
longirapa F. Ritter, *Theloccephala malleolata* (F. Ritter)
F. Ritter, *Theloccephala malleolata* (F. Ritter) F. Ritter
var. *solitaria* (F. Ritter) F. Ritter, *Chileorebutia kraussii*
Ritter, *Neochilenia kraussii* (Ritter) Backeb.,
Neopoteria odieri (Lem. ex Salm-Dyck) Backeb. var.
kraussii (Ritter) Hoffman, *Eriosyce odieri* (Lem. ex

Salm-Dyck) Katt. subsp. *malleolata* Hoffman & Walter,
Chileorebutia malleolata Ritter, *Neochilenia malleolata*
(Ritter) Backeb., *Theloccephala malleolata* (Ritter) Ritter,
Neopoteria odieri (Lem. ex Salm-Dyck) Backeb. (Lem.
ex Salm-Dyck) Backeb. var. *malleolata*, *Eriosyce odieri*
(Lem. ex Salm-Dyck) Katt. subsp. *malleolata* Hoffman
& Walter var. *weisserii* Hoffman & Walter,
Theloccephala weisserii (Hoffman & Walter) Faúndez &
Saldivia
Arbusto suculento. Endémico.
Distribución: TAR, ANT, ATA.
Rango altitudinal: 0-200 m.

Eriosyce lapampaensis F. Ritter
Subarbusto suculento. Endémico.
Distribución: ATA.
Rango altitudinal: 200-2500 m.

Eriosyce laui Luthy
Sinónimos: *Islaya laui* (Luthy) Faúndez & R. Kiesling,
Rimacactus laui (Luthy) Mottram
Arbusto suculento. Endémico.
Distribución: ANT.
Rango altitudinal: 500-700 m.

Eriosyce megacarpa F. Ritter
Subarbusto suculento. Endémico.
Distribución: ATA.
Rango altitudinal: 0-100 m.

Eriosyce napina (Phil.) Katt.
Sinónimos: *Neopoteria napina* (Phil.) Backeb.,
Neopoteria napina (Phil.) Backeb. fma. *nuda* (F. Ritter)
A.E. Hoffm., *Neopoteria napina* (Phil.) Backeb. var.
duripulpa (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neopoteria napina*
(Phil.) Backeb. var. *lembckeii* (Backeb.) A.E. Hoffm.,
Neopoteria napina (Phil.) Backeb. var. *glabrescens* (F.
Ritter) A.E. Hoffm., *Neochilenia lembckeii* Backeb.,
Eriosyce aerocarpa (F. Ritter) Katt., *Eriosyce napina*
(Phil.) Katt. var. *duripulpa* (F. Ritter) Katt., *Eriosyce*
napina (Phil.) Katt. subsp. *lembckeii* Katt., *Eriosyce*
odieri (Lem. ex Salm-Dyck) Katt. subsp. *fulva* (F. Ritter)
Katt., *Theloccephala aerocarpa* (F. Ritter) F. Ritter,
Theloccephala duripulpa (F. Ritter) F. Ritter,
Theloccephala fulva F. Ritter, *Theloccephala nuda* F.
Ritter, *Echinocactus napinus* Phil., *Theloccephala napina*
(Phil.) Y. Ito, *Chileorebutia napina* (Phil.) F. Ritter,
Neochilenia napina (Phil.) Backeb., *Neochilenia napina*
(Phil.) Backeb. var. *mitis* (Phil.) Backeb., *Eriosyce*

napina (Phil.) Katt. subsp. *aerocarpa* (F. Ritter) Ferryman, *Chileorebutia aerocarpa* F. Ritter, *Neochilenia aerocarpa* (F. Ritter) Backeb., *Neopoteria napina* (Phil.) Backeb. var. *aerocarpa* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Thelocephalia lembckeana* (Backeb.) F. Ritter, *Chileorebutia duripulpa* F. Ritter, *Neochilenia duripulpa* (F. Ritter) Backeb., *Eriosyce napina* (Phil.) Katt. subsp. *challensis* R. Keim & I. Schaub, *Eriosyce spectabilis* A.E. Hoffm. & H.E. Walter, nom. nud.
Subarbusto suculento. Endémico.
Distribución: ATA.
Rango altitudinal: 100-600 m.

Eriosyce occulta Katt.
Sinónimos: *Pyrrhocactus philippianus* Faúndez,
Pyrrhocactus occultus F. Ritter, nom. illeg.,
Pyrrhocactus occultus F. Ritter var. *spinosior* F. Ritter, nom. illeg.
Subarbusto suculento. Endémico.
Distribución: ANT.
Rango altitudinal: 0-500 m.

Eriosyce odieri (Lem. ex Salm-Dyck) Katt. subsp. *glabrescens* (F. Ritter) Katt.
Sinónimos: *Thelocephalia glabrescens* (F. Ritter) F. Ritter
Subarbusto suculento. Endémico.
Distribución: ATA.
Rango altitudinal: 0-200 m.

Eriosyce odieri (Lem. ex Salm-Dyck) Katt. subsp. *malleolata* (F. Ritter) A.E. Hoffm. & H. Walter var. *weisseri* A.E. Hoffm. & H. Walter
Sinónimos: *Thelocephalia weisseri* (A. Hoffmman & H. Walter) Faúndez & Saldivia
Subarbusto suculento. Endémico.
Distribución: ANT.

Eriosyce odieri (Lem. ex Salm-Dyck) Katt. subsp. *odieri*
Sinónimos: *Neopoteria monte-amargensis* (Backeb.) Donald & G.D. Rowley, nom. illeg., *Neopoteria odieri* (Lem. ex Salm-Dyck) Backeb., *Neopoteria reichei* (K. Schum.) Backeb., *Eriosyce odieri* (Lem. ex Salm-Dyck) Katt. var. *monte-amargensis* Katt., *Thelocephalia odieri* (Lem. ex Salm-Dyck) F. Ritter, *Neochilenia odieri* (Lem. ex Salm-Dyck) Backeb., *Chileorebutia odieri* (Lem. ex Salm-Dyck) F. Ritter, *Echinocactus odieri* Lem. ex Salm-Dyck

Subarbusto suculento. Endémico.
Distribución: ATA.
Rango altitudinal: 0-400 m.

Eriosyce paucicostata (F. Ritter) Ferryman subsp. *echinus* (Ritter) R. Ferryman
Sinónimos: *Pyrrhocactus echinus* F. Ritter, *Eriosyce taltalensis* (Hutchison) Katt. subsp. *echinus* (F. Ritter) Katt., *Neopoteria paucicostata* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley var. *echinus* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neopoteria paucicostata* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley var. *glaucescens* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Pyrrhocactus glaucescens* F. Ritter
Arbusto suculento. Endémico.
Distribución: ANT.
Rango altitudinal: 400-800 m.

Eriosyce paucicostata (F. Ritter) Ferryman subsp. *floccosa* (Ritter) R. Ferryman
Sinónimos: *Pyrrhocactus floccosus* F. Ritter, *Eriosyce taltalensis* (Hutchison) Katt. var. *floccosa* (F. Ritter) Katt., *Pyrrhocactus floccosus* F. Ritter var. *minor* (F. Ritter) F. Ritter, *Neopoteria eriocephala* (Backeb.) Donald & G.D. Rowley, nom. illeg., *Neopoteria paucicostata* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley var. *floccosa* (F. Ritter) A.E. Hoffm.
Arbusto suculento. Endémico.
Distribución: ANT.
Rango altitudinal: 200-600 m.

Eriosyce paucicostata (F. Ritter) Ferryman subsp. *paucicostata*
Sinónimos: *Pyrrhocactus paucicostatus* (F. Ritter) F. Ritter, *Pyrrhocactus neohankeanus* F. Ritter, *Pyrrhocactus neohankeanus* F. Ritter var. *densispinus* F. Ritter, *Pyrrhocactus neohankeanus* F. Ritter var. *elongatus* F. Ritter, *Pyrrhocactus neohankeanus* F. Ritter var. *flaviflorus* F. Ritter, *Pyrrhocactus paucicostatus* (F. Ritter) F. Ritter var. *viridis* (F. Ritter) F. Ritter, *Neopoteria fusca* (Muehlenpf.) Britton & Rose, *Neopoteria haenkeana* (C.F. Först.) Donald & G.D. Rowley, *Neopoteria paucicostata* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley, *Neopoteria paucicostata* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley var. *neohankeana* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neopoteria paucicostata* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley var. *viridis* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neopoteria woutersiana* (Backeb.) Donald & G.D. Rowley, nom. illeg., *Delaetia woutersiana* Backeb., nom. illeg., *Eriosyce taltalensis* (Hutchinson)

Katt. subsp. *paucicostata* (F. Ritter) Katt., *Horridocactus paucicostatus* F. Ritter, *Neopoteria neohankeana* (F. Ritter) Ferryman, *Neochilenia paucicostata* (F. Ritter) Backeb.
Arbusto suculento. Perenne. Endémica.
Distribución: ANT.
Rango altitudinal: 0-600 m.

***Eriosyce recondita* (F. Ritter) Katt.**
Sinónimos: *Pyrrhocactus reconditus* F. Ritter, *Pyrrhocactus vexatus* F. Ritter, *Neopoteria recondita* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley, *Neopoteria recondita* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley var. *vexata* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neochilenia recondita* (F. Ritter) Backeb.
Subarbusto suculento. Endémico.
Distribución: ANT.
Rango altitudinal: 400-1000 m.

***Eriosyce rodentiophila* F. Ritter**
Sinónimos: *Eriosyce rodentiophila* F. Ritter var. *lanata* F. Ritter
Arbusto suculento. Endémico.
Distribución: ANT, ATA.
Rango altitudinal: 100-600 m.

***Eriosyce senilis* (Backeb.) Katt.**
Sinónimos: *Neopoteria nidus* (Söhrens ex K. Schum.) Britton & Rose, *Neopoteria coimasensis* F. Ritter, *Neopoteria coimasensis* F. Ritter fma. *crassispina* F. Ritter, *Neopoteria coimasensis* F. Ritter fma. *tenuispina* F. Ritter, *Neopoteria coimasensis* F. Ritter var. *robusta* (F. Ritter) F. Ritter, *Neopoteria multicolor* F. Ritter, *Neopoteria nidus* (Söhrens) Britton & Rose var. *coimasensis* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neopoteria nidus* (Söhrens) Britton & Rose var. *gerocephala* (Y. Ito) F. Ritter, *Neopoteria nidus* (Söhrens) Britton & Rose var. *matancillana* F. Ritter, *Neopoteria nidus* (Söhrens) Britton & Rose var. *multicolor* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neopoteria robusta* F. Ritter, *Neopoteria subgibbosa* (Haw.) Britton & Rose var. *robusta* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Eriosyce senilis* (Backeb.) Katt. subsp. *coimasensis* (F. Ritter) Katt., *Eriosyce senilis* (Backeb.) Katt. subsp. *elquiensis* Katt., *Echinocactus senilis* Phil., nom. illeg., *Neopoteria gerocephala* Y. Ito, *Neopoteria senilis* Backeb., *Echinocactus nidus* Söhrens ex K. Schum.
Arbusto suculento. Endémico.
Distribución: COQ.

Rango altitudinal: 200-500 m.
Nombre vulgar: Viejito.

***Eriosyce simulans* (F. Ritter) Katt.**
Sinónimos: *Pyrrhocactus simulans* F. Ritter, *Neopoteria simulans* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley, *Eriosyce heinrichiana* (Backeb.) Katt. subsp. *simulans* (F. Ritter) Katt., *Neochilenia simulans* (F. Ritter) Backeb.
Arbusto suculento. Endémico.
Distribución: COQ.
Rango altitudinal: 100-400 m.

***Eriosyce sociabilis* (F. Ritter) Katt.**
Sinónimos: *Neopoteria sociabilis* F. Ritter, *Neopoteria sociabilis* F. Ritter var. *napina* F. Ritter
Arbusto suculento. Endémico.
Distribución: ATA.

Eriosyce subgibbosa* (Haw.) Katt. subsp. *clavata
(Söhrens ex K. Schum.) Katt.
Sinónimos: *Neopoteria clavata* (Söhrens ex K. Schum.) Werderm., *Neopoteria clavata* (Söhrens ex K. Schum.) Werderm. fma. *grandiflora* F. Ritter, *Neopoteria clavata* (Söhrens ex K. Schum.) Werderm. var. *nigrihorrida* (Backeb.) A.E. Hoffm., *Neopoteria clavata* (Söhrens ex K. Schum.) Werderm. var. *parviflora* F. Ritter, *Neopoteria clavata* (Söhrens ex K. Schum.) Werderm. var. *procera* F. Ritter, *Neopoteria microsperma* F. Ritter var. *graciana* F. Ritter, *Neopoteria microsperma* F. Ritter var. *serenana* F. Ritter, *Neopoteria nigrihorrida* Backeb., *Neopoteria nigrihorrida* (Backeb.) Backeb. fma. *crassispina* F. Ritter, *Neopoteria wagenknechtii* F. Ritter, *Neopoteria wagenknechtii* F. Ritter var. *microsperma* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neopoteria wagenknechtii* F. Ritter var. *napina* F. Ritter, *Neopoteria wagenknechtii* F. Ritter var. *vallenarensis* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Eriosyce subgibbosa* (Haw.) Katt. var. *nigrihorrida* (Backeb.) Katt., *Eriosyce subgibbosa* (Haw.) Katt. var. *vallenarensis* (F. Ritter) Katt., *Eriosyce subgibbosa* (Haw.) Katt. var. *wagenknechtii* (F. Ritter) Katt., *Eriosyce subgibbosa* (Haw.) Katt. subsp. *clavata* (Söhrens ex K. Schum.) Katt.
Arbusto suculento. Endémico.
Distribución: COQ.
Rango altitudinal: 0-800 m.

Eriosyce subgibbosa (Haw.) Katt. subsp. ***subgibbosa***
var. ***castanea*** (F. Ritter) Katt.
Sinónimos: *Neopoteria castanea* F. Ritter
Arbusto suculento. Endémico.
Distribución: LBO, MAU.

Eriosyce subgibbosa (Haw.) Katt. subsp. ***subgibbosa***
var. ***subgibbosa***
Sinónimos: *Neopoteria subgibbosa* (Haw.) Britton & Rose, *Neopoteria castanea* F. Ritter var. *tunensis* F. Ritter, *Neopoteria litoralis* F. Ritter var. *intermedia* F. Ritter, *Neopoteria subgibbosa* (Haw.) Britton & Rose var. *intermedia* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neopoteria subgibbosa* (Haw.) Britton & Rose var. *litoralis* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neopoteria subgibbosa* (Haw.) Britton & Rose var. *orientalis* F. Ritter, *Eriosyce subgibbosa* (Haw.) Katt. var. *litoralis* (F. Ritter) Katt., *Echinocactus subgibbosus* Haw., *Cereus dichroacanthus* Mart. ex Pfeiff., *Echinocactus acutissima* Otto & Dietr., *Echinocactus castaneoides* Cels ex Salm-Dyck, *Cactus berteri* Colla
Arbusto suculento. Endémico.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, BIO.
Rango altitudinal: 0-500 m.

Eriosyce taltalensis (Hutchison) Katt. subsp. ***pilispina*** (F. Ritter) Katt.
Sinónimos: *Pyrrhocactus pilispina* Ritter, *Neoporteria intermedia* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley var. *pilispina* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria pilispina* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley
Arbusto suculento. Endémico.
Distribución: ATA.
Rango altitudinal: 0-600 m.

Eriosyce taltalensis (Hutchison) Katt. subsp. ***pygmaea*** R. Ferryman
Sinónimos: *Pyrrhocactus pygmaeus* F. Ritter, *Pyrrhocactus gracilis* F. Ritter, *Pyrrhocactus pulchellus* F. Ritter, *Neoporteria calderana* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley, *Neoporteria intermedia* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley, *Neoporteria intermedia* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley fma. *gracilis* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria intermedia* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley fma. *pygmaea* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria intermedia* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley var. *calderana* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria intermedia* (F. Ritter) Donald & G.D.

Rowley var. *pulchella* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria intermedia* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley var. *scoparia* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria scoparia* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley, *Neoporteria taltalensis* Hutchison var. *transiens* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Eriosyce taltalensis* (Hutchison) Katt. var. *pygmaea* (F. Ritter) Katt.
Subarbusto suculento. Endémico.
Distribución: ANT, ATA.
Rango altitudinal: 0-400 m.

Eriosyce taltalensis (Hutchison) Katt. subsp. ***taltalensis***
Sinónimos: *Pyrrhocactus taltalensis* (Hutchison) F. Ritter, *Eriosyce taltalensis* (Hutchison) Katt., *Pyrrhocactus tenuis* F. Ritter, *Neoporteria rupicola* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley, *Neoporteria taltalensis* Hutchison, *Neochilenia taltalensis* (Hutchison) Backeb., *Pyrrhocactus rupiculus* F. Ritter
Arbusto suculento. Endémico.
Distribución: ANT, ATA.
Rango altitudinal: 500-700 m.

Eriosyce tenebrica (F. Ritter) Katt.
Sinónimos: *Neoporteria napina* (Phil.) Backeb. var. *fankhauseri* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Thelocephalia fankhauseri* F. Ritter, *Thelocephalia tenebrica* F. Ritter
Subarbusto suculento. Endémico.
Distribución: ATA, COQ.
Rango altitudinal: 100-600 m.

Eriosyce villosa (Monv.) Katt.
Sinónimos: *Neoporteria villosa* (Monv.) A. Berger, *Neoporteria laniceps* F. Ritter, *Neoporteria villosa* (Monv.) A. Berger var. *laniceps* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Cactus villosus* Monv., *Neoporteria atrispinosa* Backeb., *Echinocactus villosus* (Monv.) Labour.
Arbusto suculento. Endémico.
Distribución: ATA, COQ.
Rango altitudinal: 0-900 m.
Nombre vulgar: Quisco.

Eulychnia

Eulychnia acida Phil.
Sinónimos: *Eulychnia acida* Phil. var. *elata* F. Ritter, *Eulychnia acida* Phil. var. *procumbens* F. Ritter
Árbol suculento. Endémico.

Distribución: ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-1300 m.

Nombre vulgar: Copao.

***Eulychnia aricensis* F. Ritter**

Árbol suculento. Endémico.

Distribución: TAR.

Rango altitudinal: 400-700 m.

***Eulychnia breviflora* Phil.**

Sinónimos: *Eulychnia barquitensis* F. Ritter, *Eulychnia breviflora* Phil. var. *taltalensis* F. Ritter, *Eulychnia breviflora* Phil. var. *tenuis* F. Ritter, *Eulychnia saint-pieana* F. Ritter var. *barquitensis* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Cereus panoplaeatus* Monv.

Árbol suculento. Endémico.

Distribución: ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-200 m.

Nombre vulgar: Copao.

***Eulychnia castanea* Phil.**

Sinónimos: *Cereus castaneus* (Phil.) K. Schum., *Philippicereus castaneus* (Phil.) Backeb.

Arbusto suculento. Endémico.

Distribución: COQ, VAL.

Rango altitudinal: 0-200 m.

***Eulychnia iquiquensis* (K. Schum.) Britton & Rose**

Sinónimos: *Eulychnia iquiquensis* (K. Schum.) Britton & Rose var. *pullilana* F. Ritter, *Cereus iquiquensis* K. Schum., *Eulychnia breviflora* Phil. subsp. *iquiquensis* (K. Schum.) D.R. Hunt

Árbol suculento. Endémico.

Distribución: TAR, ANT, ATA.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Nombre vulgar: Copao.

***Eulychnia saint-pieana* F. Ritter**

Árbol suculento. Endémico.

Distribución: ANT, ATA.

Rango altitudinal: 0-700 m.

Haageocereus

***Haageocereus australis* Backeb.**

Sinónimos: *Haageocereus australis* Backeb. fma.

subtilispinus F. Ritter, *Haageocereus multicolorspinus*

Buining

Arbusto suculento. Nativo.

Distribución: TAR.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Países limítrofes: Perú.

***Haageocereus fascicularis* (Meyen) F. Ritter**

Sinónimos: *Cereus fascicularis* Meyen, *Trichocereus fascicularis* (Meyen) Britton & Rose, *Weberbauercereus fascicularis* (Meyen) Backeb.

Arbusto suculento. Endémico.

Distribución: AYP, TAR.

Rango altitudinal: 2000-3000 m.

Nombre vulgar: Chikachika.

Maihuenia

***Maihuenia patagonica* (Phil.) Britton & Rose**

Sinónimos: *Opuntia patagonica* Phil.

Subarbusto suculento. Nativo.

Distribución: LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Maihuenia poeppigii* (Otto ex Pfeiff.) K. Schum.**

Sinónimos: *Opuntia poeppigii* Otto & Pfeiff., *Maihuenia philippii* (F.A.C. Weber) K. Schum., *Pereskia philippii* F.A.C. Weber, *Pereskia poeppigii* Salm-Dyck, *Opuntia maihuensis* J. Remy

Subarbusto suculento. Nativo.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 500-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Maihuén.

Maihueniopsis

***Maihueniopsis archiconoidea* F. Ritter**

Sinónimos: *Opuntia archiconoidea* (F. Ritter) D.R. Hunt

Subarbusto suculento. Endémico.

Distribución: ATA.

Rango altitudinal: 1200-1800 m.

***Maihueniopsis atacamensis* (Phil.) F. Ritter**

Sinónimos: *Opuntia atacamensis* Phil., *Tephrocactus atacamensis* (Phil.) F. Ritter
Subarbusto suculento. Endémico.
Distribución: ANT.
Rango altitudinal: 4100 m.
Nombre vulgar: Chuchampe.

Maihueniopsis camachoi (Espinosa) F. Ritter
Sinónimos: *Tephrocactus camachoi* (Espinosa) Backeb.,
Opuntia camachoi Espinosa, *Tephrocactus chilensis*
Backeb.
Subarbusto suculento. Endémico.
Distribución: ANT.
Rango altitudinal: 3900 m.
Nombre vulgar: Kume.

Maihueniopsis colorea (F. Ritter) F. Ritter
Sinónimos: *Tephrocactus coloreus* F. Ritter, *Opuntia colorea* (F. Ritter) D.R. Hunt
Subarbusto suculento. Endémico.
Distribución: ATA.
Rango altitudinal: 1300-3500 m.

Maihueniopsis crassispina F. Ritter
Sinónimos: *Opuntia crassispina* (F. Ritter) D.R. Hunt
Subarbusto suculento. Endémico.
Distribución: ATA.
Rango altitudinal: 200 m.

Maihueniopsis darwini (Hensl.) F. Ritter
Sinónimos: *Opuntia darwini* Hensl., *Tephrocactus darwini* (Hensl.) Backeb. ex Fric
Subarbusto suculento. Nativo.
Distribución: AIS.
Rango altitudinal: 0-500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Maihueniopsis domeykoensis F. Ritter
Sinónimos: *Opuntia domeykoensis* (F. Ritter) D.R. Hunt
Subarbusto suculento. Endémico.
Distribución: ATA.
Rango altitudinal: 0-500 m.

Maihueniopsis glomerata (Haw.) R. Kiesling
Sinónimos: *Opuntia glomerata* Haw., *Maihueniopsis tarapacana* (Phil.) F. Ritter, *Tephrocactus glomeratus* (Haw.) Backeb., *Opuntia conoidea* (F. Ritter ex

Backeb.) G.D. Rowley, *Tephrocactus conoideus* F. Ritter ex Backeb., *Tephrocactus reicheanus* (Espinosa) Backeb., *Maihueniopsis conoidea* (F. Ritter ex Backeb.) F. Ritter, *Opuntia ovallei* Gay, *Opuntia tarapacana* Phil., *Tephrocactus tarapacanus* (Phil.) Backeb.
Subarbusto suculento. Nativo.
Distribución: ANT, ATA, COQ.
Rango altitudinal: 2000-4000 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Maihueniopsis grandiflora F. Ritter
Subarbusto suculento. Endémico.
Distribución: COQ.
Rango altitudinal: 1700 m.

Maihueniopsis nigrispina (K. Schum.) R. Kiesling
Sinónimos: *Opuntia nigrispina* K. Schum., *Tephrocactus nigrispinus* (K. Schum.) Backb.
Subarbusto suculento. Nativo.
Distribución: TAR.
Rango altitudinal: 2500-3500 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Maihueniopsis ovata (Pfeiff.) F. Ritter
Sinónimos: *Opuntia ovata* Pfeiff., *Tephrocactus ovatus* (Pfeiff.) Backeb.
Subarbusto suculento. Nativo.
Distribución: VAL, RME.
Rango altitudinal: 1000-2000 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Gatito, perrito.

Maihueniopsis rahmeri (Phil.) F. Ritter
Sinónimos: *Opuntia rahmerii* Phil.
Subarbusto suculento. Endémico.
Distribución: TAR.

Maihueniopsis wagenknechtii F. Ritter
Sinónimos: *Opuntia wagenknechtii* (F. Ritter) D.R. Hunt
Subarbusto suculento. Endémico.
Distribución: COQ.
Rango altitudinal: 2000 m.

Miqueliopuntia

Miqueliopuntia miquelii (Monv.) F. Ritter

Sinónimos: *Opuntia miquelii* Monv., *Cylindropuntia miquelii* (Monv.) Backeb., *Opuntia geissei* Phil., *Austrocylindropuntia miquelii* (Monv.) Backeb.

Arbusto suculento. Endémico.

Distribución: ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Neowerdermannia

***Neowerdermannia chilensis* Backeb.**

Sinónimos: *Weingartia chilensis* (Backeb.) Backeb., *Sulcorebutia chilensis* (Backeb.) F.H. Brandt

Subarbusto suculento. Endémico.

Distribución: AYP, TAR.

Rango altitudinal: 3000-3500 m.

Oreocereus

***Oreocereus hemepelianus* (Gürke) D.R. Hunt**

Sinónimos: *Arequipa australis* F. Ritter, *Arequipa hemepeliana* (Gürke) Kreuz. & Buining, *Echinopsis hemepelianus* Gürke, *Oreocereus australis* (F. Ritter) A.E. Hoffm.

Arbusto suculento. Nativo.

Distribución: AYP.

Rango altitudinal: 2400-3700 m.

Países limítrofes: Perú.

Nombre vulgar: Achacaño.

***Oreocereus leucotrichus* (Phil.) Wagenkn. ex F. Ritter**

Sinónimos: *Oreocereus variicolor* Backeb., *Arequipa leucotricha* (Phil.) Britton & Rose, *Echinocactus leucotrichus* Phil., *Borzicactus leucotrichus* (Phil.) Kimnach

Arbusto suculento. Nativo.

Distribución: AYP, TAR, ANT.

Rango altitudinal: 2400-3500 m.

Países limítrofes: Perú.

Nombre vulgar: Pichaja, chastudo.

Pterocactus

***Pterocactus australis* (F.A.C. Weber) Backeb.**

Sinónimos: *Opuntia australis* F.A.C. Weber

Subarbusto suculento. Nativo.

Distribución: AIS.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Pterocactus hickenii* Britton & Rose**

Sinónimos: *Opuntia skottsbergii* Britton & Rose, *Pterocactus skottsbergii* (Britton & Rose) Backeb.

Subarbusto suculento. Nativo.

Distribución: AIS.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Tunilla

***Tunilla soehrensi* (Britton & Rose) Hunt & Iliff**

Sinónimos: *Platyopuntia chilensis* Ritt., *Tunilla chilensis* (Ritt.) D. Hunt & J. Iliff, *Airampo chilensis* (Ritt.) Doweld.

Arbusto suculento. Nativo.

Distribución: TAR.

Rango altitudinal: 3500 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

CALCEOLARIACEAE

Calceolaria

***Calceolaria aiseniana* Ehrh.**

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: AIS.

Rango altitudinal: 0-500 m.

***Calceolaria alba* Ruiz & Pav.**

Subarbusto. Endémico.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 0-1200 m.

***Calceolaria andina* Benth.**

Sinónimos: *Calceolaria secunda* Witasek

Subarbusto. Endémico.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 800-3000 m.

***Calceolaria angustifolia* (Lindl.) Sweet**

Sinónimos: *Calceolaria berteri* Colla, *Calceolaria salicarifolia* Phil., *Calceolaria integrifolia* L. var. *angustifolia* Lindl.

Arbusto o subarbusto. Endémico.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 0-2600 m.

Calceolaria arachnoidea* Graham subsp. *arachnoidea

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: RME, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 1900-2600 m.

Nombre vulgar: Relbún de la cordillera.

***Calceolaria arachnoidea* Graham subsp. *nubigena* (Poepp.) C. Ehrh.**

Sinónimos: *Calceolaria nubigena* Poepp., *Calceolaria arachnoidea* Graham var. *lanata* Meyen ex Walp. & Schauer, *Calceolaria arachnoidea* Graham var. *viridis* Benth.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 2000-3000 m.

Nombre vulgar: Relbún de la cordillera.

Calceolaria ascendens* Lindl. subsp. *ascendens

Sinónimos: *Calceolaria uspallatensis* Kraenzl.

Subarbusto. Endémico.

Distribución: COQ, VAL, RME.

Rango altitudinal: 0-1900 m.

***Calceolaria ascendens* Lindl. subsp. *exigua* (Witasek) Nic.García**

Sinónimos: *Calceolaria exigua* Witasek, *Calceolaria miserrima* Kraenzl., *Calceolaria parvifolia* Phil., nom. illeg.

Subarbusto. Endémico.

Distribución: VAL, RME.

Rango altitudinal: 1600-2100 m.

***Calceolaria ascendens* Lindl. subsp. *glandulifera* (Witasek) C. Ehrh.**

Sinónimos: *Calceolaria bipartita* Phil., *Calceolaria glandulifera* Witasek

Subarbusto. Endémico.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 800-2000 m.

***Calceolaria ascendens* Lindl. subsp. *pristiphylla* (Phil.) C. Ehrh.**

Sinónimos: *Calceolaria pristiphylla* Phil., *Calceolaria ascendens* Lindl. var. *pristiphylla* (Phil.) Kraenzl.

Subarbusto. Endémico.

Distribución: COQ, RME.

Rango altitudinal: 500-1800 m.

***Calceolaria asperula* Phil.**

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: RME, LBO.

Rango altitudinal: 900-2000 m.

***Calceolaria auriculata* Phil.**

Subarbusto. Endémico.

Distribución: LBO, MAU.

Rango altitudinal: 200 m.

***Calceolaria biflora* Lam.**

Sinónimos: *Calceolaria plantaginea* Sm., *Calceolaria falklandica* (S. Moore) Kraenzl., *Fagelia falklandica* S. Moore

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Calceolaria caleuana* Muñoz-Schick & Moreira**

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: VAL, RME.

Rango altitudinal: 2100-2300 m.

***Calceolaria campanae* Phil.**

Sinónimos: *Calceolaria gnaphaliifolia* Kraenzl.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: VAL.

Rango altitudinal: 1500-2000 m.

***Calceolaria cana* Cav.**

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 600-2500 m.

***Calceolaria cavanillesii* Phil.**

Sinónimos: *Calceolaria recta* Witasek

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 500-2100 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Calceolaria chelidoniooides* Kunth**

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: VAL.

Rango altitudinal: 5-900 m.

Calceolaria collina* Phil. subsp. *collina

Sinónimos: *Calceolaria coquimbensis* (Benth.) Kraenzl.,

Calceolaria ascendens Lindl. var. *coquimbensis* Benth.

Arbusto o subarbusto. Endémico.

Distribución: ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-500 m.

***Calceolaria collina* Phil. subsp. *conferta* (Witasek) C. Ehrh.**

Sinónimos: *Calceolaria conferta* Witasek, *Calceolaria fulva* Witasek fma. *viscosa* Witasek

Arbusto o subarbusto. Endémico.

Distribución: COQ.

Rango altitudinal: 400-1600 m.

***Calceolaria collina* Phil. subsp. *subincisa* (Benth.) C. Ehrh.**

Sinónimos: *Calceolaria abscondita* Witasek,

Calceolaria dentata Ruiz & Pav. var. *subincisa* Benth.,

Calceolaria quadriradiata Phil.

Arbusto o subarbusto. Endémico.

Distribución: ATA, COQ.

Rango altitudinal: 200-800 m.

Calceolaria corymbosa* Ruiz & Pav. subsp. *corymbosa

Sinónimos: *Calceolaria herbertiana* Lindl., *Calceolaria cordata* Phil., *Calceolaria herbertiana* Lindl. var. *parviflora* Lindl.

Subarbusto. Endémico.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.

Rango altitudinal: 0-1300 m.

Nombre vulgar: Arguenita del cerro.

***Calceolaria corymbosa* Ruiz & Pav. subsp.**

***floccosa* (Witasek) C. Ehrh.**

Sinónimos: *Calceolaria floccosa* Witasek

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAU.

Rango altitudinal: 2200-2700 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Calceolaria corymbosa* Ruiz & Pav. subsp. *mimuloides* (Clos) C. Ehrh.**

Sinónimos: *Calceolaria mimuloides* Clos, *Calceolaria oligantha* Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, RME.

Rango altitudinal: 2200-3500 m.

***Calceolaria corymbosa* Ruiz & Pav. subsp. *montana* (Cav.) C. Ehrh.**

Sinónimos: *Calceolaria montana* Cav., *Calceolaria villosa* Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: LBO, MAU.

Rango altitudinal: 2200-3100 m.

***Calceolaria corymbosa* Ruiz & Pav. subsp. *santiagina* C. Ehrh.**

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: VAL, RME, LBO.

Rango altitudinal: 700-2300 m.

***Calceolaria corymbosa* Ruiz & Pav. subsp. *tetraphylla* (Phil.) C. Ehrh.**

Sinónimos: *Calceolaria tetraphylla* Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 700-1600 m.

***Calceolaria crenatiflora* Cav.**

Sinónimos: *Calceolaria hollermayeri* Kraenzl., *Calceolaria cunninghamii* Vatke, *Calceolaria pendula* Sweet

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: LBO, ARA, LRI, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Calceolaria densifolia* Phil. subsp. *densifolia

Subarbusto. Endémico.
Distribución: COQ, VAL.
Rango altitudinal: 1200-1300 m.

Calceolaria densifolia Phil. subsp. *laxa* C. Ehrh.
Subarbusto. Endémico.
Distribución: VAL, RME.
Rango altitudinal: 1300-1700 m.

Calceolaria dentata Ruiz & Pav. subsp. *araucana*
(Phil.) C. Ehrh.
Sinónimos: *Calceolaria araucana* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: BIO, ARA, LLA.
Rango altitudinal: 200-1000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Calceolaria dentata Ruiz & Pav. subsp.
cumingiana (Witasek) C. Ehrh.
Sinónimos: *Calceolaria dentata* Ruiz & Pav. var.
cumingiana (Witasek) Reiche, *Calceolaria cummingiana*
Witasek
Arbusto o subarbusto. Endémico.
Distribución: LBO, MAU.
Rango altitudinal: 0-600 m.

Calceolaria dentata Ruiz & Pav. subsp. *dentata*
Sinónimos: *Calceolaria dentata* Ruiz & Pav. var.
compacta (Phil.) Reiche, *Calceolaria laetevirens*
Kraenzl., *Calceolaria compacta* Phil., *Calceolaria*
chiloensis Lindl., *Calceolaria ascendens* Lindl. var.
chiloensis (Lindl.) Kraenzl.
Arbusto o subarbusto. Nativo.
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO,
ARA, LRI, LLA.
Rango altitudinal: 0-2000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Calceolaria filicaulis Clos subsp. *filicaulis*
Sinónimos: *Calceolaria flabellifolia* Kraenzl.,
Calceolaria palenae Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.
Rango altitudinal: 1400-2700 m.
Países limítrofes: Argentina.

Calceolaria filicaulis Clos subsp. *luxurians*
(Witasek) C. Ehrh.
Sinónimos: *Calceolaria luxurians* Witasek, *Calceolaria*
cana Cav. var. *pannosa* (Phil.) Reiche, *Calceolaria*
pannosa Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU.
Rango altitudinal: 2200-3100 m.
Países limítrofes: Argentina.

Calceolaria flavovirens C. Ehrh.
Arbusto o subarbusto. Endémico.
Distribución: ATA, COQ.
Rango altitudinal: 2200-3000 m.

Calceolaria georgiana F. Phil.
Arbusto o subarbusto. Endémico.
Distribución: COQ.
Rango altitudinal: 400-700 m.

Calceolaria germainii Witasek
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAU.
Rango altitudinal: 600-2000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Calceolaria glandulosa Poepp. ex Benth. subsp.
alicahuensis (Muñoz-Schick) C. Ehrh.
Sinónimos: *Calceolaria alicahuensis* Muñoz-Schick,
Calceolaria dumetorum Phil., *Calceolaria glutinosa*
Meigen, nom. illeg.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ, VAL.
Rango altitudinal: 700-2100 m.

Calceolaria glandulosa Poepp. ex Benth. subsp.
glandulosa
Sinónimos: *Calceolaria kingii* Phil., *Calceolaria*
atrovirens Witasek
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU.
Rango altitudinal: 0-1500 m.

Calceolaria hypericina Poepp. ex Benth.
Arbusto o subarbusto. Endémico.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO.
Rango altitudinal: 1800-3000 m.

***Calceolaria inamoena* Kraenzl.**

Sinónimos: *Calceolaria aberrans* Kraenzl.

Arbusto o subarbusto. Nativo.

Distribución: AYP, TAR.

Rango altitudinal: 3500-3800 m.

Países limítrofes: Perú.

Nombre vulgar: Kukumelo.

Rango altitudinal: 500 m.

Calceolaria meyeniana* Phil. subsp. *glabrata

(Phil.) C. Ehrh.

Sinónimos: *Calceolaria glabrata* Phil.

Arbusto o subarbusto. Endémico.

Distribución: MAU, NUB, BIO.

Rango altitudinal: 1000-2000 m.

***Calceolaria integrifolia* L.**

Sinónimos: *Calceolaria rugosa* Ruiz & Pav.

Arbusto o subarbusto. Nativo.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 0-1500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Calceolaria meyeniana* Phil. subsp. *meyeniana

Sinónimos: *Calceolaria glabrata* Phil. var. *meyeniana* (Phil.) Reiche, *Calceolaria landbecki* Phil., *Calceolaria andicola* Witasek, *Calceolaria crocea* Phil.

Arbusto o subarbusto. Endémico.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, ARA.

Rango altitudinal: 600-2300 m.

***Calceolaria laguna-blancae* Kraenzl.**

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AIS.

Rango altitudinal: 750 m.

Países limítrofes: Argentina.

Calceolaria meyeniana* Phil. subsp. *nahuelbutae

(Phil.) C. Ehrh.

Sinónimos: *Calceolaria vernicosa* Phil., *Calceolaria nahuelbutae* Phil.

Arbusto o subarbusto. Endémico.

Distribución: BIO, ARA.

Rango altitudinal: 800-1300 m.

***Calceolaria lanigera* Phil.**

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: LBO, MAU.

Rango altitudinal: 900-1500 m.

Sinónimos: *Calceolaria polyphylla* Kraenzl., *Calceolaria hypoleuca* Kuntze, nom. nud., *Calceolaria wettsteiniana* Witasek, *Calceolaria salviaefolia* Colla, nom. illeg.

Arbusto o subarbusto. Endémico.

Distribución: COQ, VAL, RME, MAU.

Rango altitudinal: 0-500 m.

***Calceolaria latifolia* Benth.**

Sinónimos: *Calceolaria latifolia* Benth. var.

longepetiolata (Phil.) Reiche, *Calceolaria longepetiolata* Phil., *Calceolaria stachydifolia* Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, LBO.

Rango altitudinal: 500-1100 m.

***Calceolaria nitida* Colla**

Sinónimos: *Calceolaria pseudoglandulosa* Clos

Subarbusto. Endémico.

Distribución: RME, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 400-500 m.

***Calceolaria lepida* Phil.**

Subarbusto. Endémico.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME.

Rango altitudinal: 1800 m.

***Calceolaria nudicaulis* Benth.**

Sinónimos: *Calceolaria pratensis* Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: VAL, RME, LBO.

Rango altitudinal: 500-1800 m.

Nombre vulgar: Topatopa.

Calceolaria meyeniana* Phil. subsp. *cheiranthoides

(Witasek) C. Ehrh.

Sinónimos: *Calceolaria cheiranthoides* Reiche ex Witasek

Arbusto o subarbusto. Endémico.

Distribución: MAU.

***Calceolaria pallida* Phil.**

Arbusto o subarbusto. Endémico.
Distribución: LBO, MAU.
Rango altitudinal: 1600-2200 m.

***Calceolaria paposana* Phil.**

Subarbusto. Endémico.
Distribución: ANT, ATA, COQ.
Rango altitudinal: 200-600 m.

***Calceolaria paralia* Cav.**

Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: LBO, MAU.
Rango altitudinal: 600-2300 m.

***Calceolaria petioalaris* Cav.**

Sinónimos: *Calceolaria petioalaris* Cav. var. *cuspidata* (Phil.) Reiche, *Calceolaria cuspidata* Phil., *Calceolaria effusa* Phil., *Calceolaria connata* Hook. ex Graham, *Calceolaria petioalaris* Cav. var. *oblongifolia* Clos, *Calceolaria petioalaris* Cav. var. *latifolia* Clos
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU.
Rango altitudinal: 0-1800 m.

***Calceolaria philippii* Eyz.**

Subarbusto. Endémico.
Distribución: RME, LBO.
Rango altitudinal: 1300 m.

***Calceolaria picta* Phil.**

Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ.
Rango altitudinal: 0-500 m.

***Calceolaria pinifolia* Cav.**

Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ATA, COQ, VAL.
Rango altitudinal: 2600-4300 m.
Países limítrofes: Argentina.

***Calceolaria pinnata* L.**

Sinónimos: *Calceolaria bipinnatifida* Phil.
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: ANT.
Rango altitudinal: 0-500 m.
Países limítrofes: Bolivia y Perú.

***Calceolaria poikilanthes* Sandwith**

Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ARA.
Rango altitudinal: 1300-2000 m.
Países limítrofes: Argentina.

***Calceolaria polifolia* Hook.**

Sinónimos: *Calceolaria spatellifolia* Kraenzl.
Arbusto o subarbusto. Endémico.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO.
Rango altitudinal: 0-2300 m.
Nombre vulgar: Té de burro.

***Calceolaria polyrrhiza* Cav.**

Sinónimos: *Calceolaria lanceolata* Cav., *Calceolaria prichardii* (Rendle) Kraenzl., *Fagelia prichardii* Rendle, *Calceolaria acutifolia* Witasek, *Calceolaria chubutensis* Skottsb., *Calceolaria mendocina* Phil., *Calceolaria cymbiflora* Sandwith, *Calceolaria lanceolata* Cav. var. *acutifolia* (Witasek) Reiche, *Calceolaria lanceolata* Cav. var. *pusilla* (Witasek) Reiche, *Calceolaria pusilla* Witasek, *Calceolaria lanceolata* Cav. fma. *acutifolia* (Witasek) W. Bowden, *Calceolaria patagonica* Kraenzl.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 500-2000 m.
Países limítrofes: Argentina.

***Calceolaria purpurea* Graham**

Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU.
Rango altitudinal: 900-2300 m.

***Calceolaria rinconada* Ehrh.**

Subarbusto. Endémico.
Distribución: ANT.
Rango altitudinal: 200-600 m.

***Calceolaria rubiginosa* C. Ehrh.**

Subarbusto. Endémico.
Distribución: COQ, VAL.
Rango altitudinal: 400-700 m.

***Calceolaria segethii* Phil.**

Subarbusto. Endémico.
Distribución: COQ, VAL, RME.

Rango altitudinal: 800-2200 m.

***Calceolaria spathulata* Witasek**

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: BIO, ARA.

Rango altitudinal: 1900-2000 m.

***Calceolaria stellarifolia* Phil.**

Sinónimos: *Calceolaria rupicola* F. Meigen

Subarbusto. Endémico.

Distribución: AYP, TAR, ANT, RME.

Rango altitudinal: 2700-4300 m.

Nombre vulgar: Zapatilla, willjaya.

***Calceolaria talcana* Grau & C. Ehrh.**

Arbusto o subarbusto. Endémico.

Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 500-1300 m.

***Calceolaria tenella* Poepp. & Endl.**

Sinónimos: *Calceolaria skottsbergii* Gand.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-1500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Calceolaria thyrsiflora* Graham**

Sinónimos: *Calceolaria thyrsiflora* Graham var. *alliacea*

Phil., *Calceolaria bridgesii* Kunze

Arbusto o subarbusto. Endémico.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, BIO.

Rango altitudinal: 0-2000 m.

Nombre vulgar: Hierba dulce, palqui, palo dulce.

***Calceolaria tripartita* Ruiz & Pav.**

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: COQ, VAL.

Rango altitudinal: 15-180 m.

Países limítrofes: Argentina y Perú.

***Calceolaria undulata* Benth.**

Sinónimos: *Calceolaria foliosa* Phil., *Calceolaria brevistyla* Clos

Arbusto o subarbusto. Nativo.

Distribución: MAU, BIO.

Rango altitudinal: 1300-2200 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Calceolaria uniflora* Lam.**

Sinónimos: *Calceolaria nana* Sm., *Calceolaria darwinii*

Benth., *Calceolaria uniflora* Lam. var. *darwinii*

(Kuntze) Witasek ex Reiche, *Fagelia darwini* Kuntze,

Calceolaria minima Witasek

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: RME, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Calceolaria valdiviana* Phil. subsp. *crassifolia

(Phil.) C. Ehrh.

Sinónimos: *Calceolaria crassifolia* Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: BIO, ARA, LRI.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Calceolaria valdiviana* Phil. subsp. *valdiviana

Sinónimos: *Calceolaria llaimae* Kraenzl., *Calceolaria*

plantaginea Sm. var. *obtusifolia* Clos, *Calceolaria*

obtusifolia (Clos) Witasek, *Calceolaria tenera* Phil.,

Calceolaria werdermannii Kraenzl., *Calceolaria*

tenerifolia Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.

Rango altitudinal: 600-1800 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Calceolaria verbascifolia* Bertero ex Phil.**

Sinónimos: *Calceolaria borchersi* Phil., *Calceolaria*

oreas Phil.

Arbusto o subarbusto. Endémico.

Distribución: VAL, LBO.

Rango altitudinal: 500-1300 m.

***Calceolaria viscosissima* (Hook.) Lindl.**

Sinónimos: *Calceolaria pubescens* Phil., *Calceolaria*

robusta A. Dietr., *Calceolaria integrifolia* L. var.

viscosissima Hook., *Calceolaria gmelinii* Phil.

Subarbusto. Endémico.

Distribución: COQ, VAL, LBO.

Rango altitudinal: 0-500 m.

***Calceolaria volckmannii* Phil.**

Sinónimos: *Calceolaria benthami* Phil., *Calceolaria*

bigemina Phil., *Calceolaria poeppigiana* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAU, NUB, BIO.
Rango altitudinal: 1000-2500 m.
Países limítrofes: Argentina.

***Calceolaria williamsii* Phil.**
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: MAU, BIO.
Rango altitudinal: 2400-2700 m.

#REF!

#REF!

***Jovellana punctata* Ruiz & Pav.**
Sinónimos: *Calceolaria puncticulata* Phil.
Arbusto. Endémico.
Distribución: VAL, RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.
Rango altitudinal: 0-2000 m.

***Jovellana violacea* (Cav.) G. Don**
Sinónimos: *Calceolaria violacea* Cav., *Jovellana guentheri* Kraenzl.
Arbusto. Endémico.
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.
Rango altitudinal: 0-600 m.

CALYCERACEAE

Boopis

***Boopis filifolia* Speg.**
Sinónimos: *Boopis prichardii* S. Moore
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAG.
Rango altitudinal: 0-1000 m.
Países limítrofes: Argentina.

***Boopis gracilis* Phil.**
Sinónimos: *Boopis pozoaformis* Phil., *Boopis gracilis* Phil. var. *decumbens* Chodat & Wilczek, *Boopis gracilis* Phil. var. *pozoaformis* (Phil.) Hicken, *Boopis bicolor* Phil.
Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: RME, MAU.
Rango altitudinal: 0-2000 m.
Países limítrofes: Argentina.

***Boopis pusilla* Phil.**
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: RME.
Rango altitudinal: 1600 m.

Calycera

***Calycera eryngioides* J. Remy**
Sinónimos: *Anomocarpus eryngioides* (J. Remy) Miers
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: COQ, RME, LBO.
Rango altitudinal: 1500-2500 m.
Nombre vulgar: Repollito de cordillera.

Calycera herbacea* Cav. var. *herbacea
Sinónimos: *Calycera herbacea* Cav. var. *viridiflora* (Phil.) Pontiroli, *Calycera viridiflora* (Phil.) Miers, *Calycera nudicaulis* Phil., *Boopis viridiflora* Miers, *Chodat & Hassl.*, *Calycera viridiflora* (Phil.) Miers fma. *squarrosa* (Miers) Hicken, *Gymnocalyx viridiflorus* Phil., *Boopis australis* Decne. var. *squarrosa* (Miers) Reiche, *Boopis squarrosa* Miers
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ, VAL, RME, MAU, ARA.
Rango altitudinal: 2200-3000 m.
Países limítrofes: Argentina.

***Calycera herbacea* Cav. var. *sinuata* (Miers)**
Pontiroli
Sinónimos: *Calycera sinuata* Miers, *Calycera viridiflora* (Phil.) Miers fma. *sinuata* (Miers) Hicken, *Calycera intermedia* Phil., *Calycera involucrata* Phil., *Calycera crenata* R.E. Fr.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ANT.
Rango altitudinal: 2500-4900 m.
Países limítrofes: Argentina.

***Calycera leucanthema* (Poepp. ex Less.) Kuntze**
Sinónimos: *Calycera integrifolia* (Phil.) Reiche, *Boopis integrifolia* Phil., *Boopis leucanthema* Poepp. ex Less., *Acicarpha lanata* Lag., *Anomocarpus leucanthemus* (Poepp. ex Less.) Miers, *Anomocarpus tenuifolius* Miers,

Anomocarpus tenuis Miers, *Leucocera annua* Turcz.,
Calycera lanata Benth. & Hook.f.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.

Rango altitudinal: 300-700 m.

***Calycera pulvinata* J. Remy**

Sinónimos: *Anomocarpus pulvinatus* (J. Remy) Miers

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ANT.

Rango altitudinal: 4200-4800 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

***Calycera sessiliflora* Phil.**

Sinónimos: *Calycera sessiliflora* Phil. var. *axillaris* (Miers) Reiche, *Anomocarpus axillaris* Miers, *Anomocarpus subsessiliflorus* Miers, nom. illeg.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, RME.

Rango altitudinal: 700-1900 m.

***Calycera sympaganthera* (Ruiz & Pav.) Kuntze**

Sinónimos: *Calycera balsamitaefolia* (Juss.) Rich., nom. illeg., *Calycera sympaganthera* (Ruiz & Pav.) Martic. & Quezada, comb. illeg., *Scabiosa sympaganthera* Ruiz & Pav., *Boopis balsamitaefolia* Juss., nom. illeg.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: BIO, ARA.

Rango altitudinal: 1300 m.

Gamocarpha

***Gamocarpha alpina* (Poepp. ex Less.) H.V.**

Hansen subsp. *alpina*

Sinónimos: *Boopis alpina* Poepp. ex Less., *Gamocarpha poeppigii* DC. var. *angustifolia* (Phil.) Reiche, *Boopis angustifolia* Phil., *Gamocarpha ligulata* Miers

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 1500-3000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Gamocarpha alpina* (Poepp. ex Less.) H.V.**

Hansen subsp. *gilliesii* Miers (Miers) S. Denham & Pozner

Sinónimos: *Gamocarpha breviscapa* Phil., *Boopis gilliesi* (Miers) Hauman, *Boopis breviscapa* Phil., *Gamocarpha gilliesii* Miers

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: TAR, VAL, LBO.

Rango altitudinal: 200-2500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Gamocarpha australis* (Decne.) S. Denham & Pozner**

Sinónimos: *Acarpha australis* (Decne.) Griseb., *Boopis australis* Decne.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Gamocarpha caespitosa* (Phil.) S. Denham & Pozner**

Sinónimos: *Boopis caespitosa* Phil., *Nastanthus caespitosus* (Phil.) Reiche

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ANT, ATA, MAU.

Rango altitudinal: 500-4300 m.

Nombre vulgar: Chicorea.

***Gamocarpha compacta* (Phil.) S. Denham & Pozner**

Sinónimos: *Nastanthus diazi* (Phil.) Phil. ex Reiche, *Boopis diazi* Phil., *Boopis compacta* Phil., *Nastanthus compactus* (Phil.) Miers, *Gamocarpha pumila* Miers

Hierba. Bienal o perenne. Nativa.

Distribución: ANT, ATA, COQ, RME, MAU.

Rango altitudinal: 3000-3700 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Gamocarpha dentata* Phil.**

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: BIO, ARA.

Rango altitudinal: 1500-2500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Gamocarpha graminea* (Phil.) S. Denham & Pozner**

Sinónimos: *Boopis graminea* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 1500-2000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Gamocarpha multicaulis* (Phil.) S. Denham & Pozner**

Sinónimos: *Boopis multicaulis* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAU, ARA.

Países limítrofes: Argentina.

***Gamocarpha patagonica* (Speg.) S. Denham & Pozner**

Sinónimos: *Boopis patagonica* Speg., *Nastanthus patagonicus* Speg.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Gamocarpha polycephala* Phil.**

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: NUB.

***Gamocarpha scapigera* (J. Remy) S. Denham & Pozner**

Sinónimos: *Nastanthus laciniatus* Miers, *Boopis laciniata* (Miers) Ball, *Boopis scapigera* J. Remy, *Boopis miersii* Phil., *Nastanthus spathulatus* (Phil.) Miers var. *spathulatus*, *Boopis spathulata* Phil., *Boopis bellidifolia* Phil., *Nastanthus bellidifolius* (Phil.) Reiche, *Boopis dubia* Phil., *Boopis reichei* Phil., *Boopis araucana* Phil., *Nastanthus araucanus* (Phil.) Reiche, *Nastanthus scapiger* Miers, *Nastanthus scapigerus* (J. Remy) Miers

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, MAG.

Rango altitudinal: 500-3000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Gamocarpha selliana* Reiche**

Sinónimos: *Gamocarpha patagonica* Speg.,

Gamocarpha selliana Reiche var. *multicaulis* Dusén

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 500-1500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Gamocarpha ventosa* (Meyen) S. Denham & Pozner**

Sinónimos: *Calycera andina* Miers, nom. nud.,

Nastanthus agglomeratus Miers var. *pinnatifidus* (Miers)

Reiche, *Nastanthus pinnatifidus* Miers, *Nastanthus agglomeratus* Miers var. *laciniatus* (Miers) Reiche,

Calycera ventosa Meyen, *Boopis ventosa* (Meyen)

Kuntze, *Boopis scapigera* J. Remy var. *ventosa* (Meyen)

Wedd., *Nastanthus caespitosus* (Phil.) Reiche var.

ventosus (Meyen) Pontiroli, *Nastanthus agglomeratus* Miers var. *agglomeratus*, *Nastanthus agglomeratus*

Miers var. *breviflorus* (Phil.) Reiche, *Nastanthus agglomeratus* Miers var. *gayanus* (Phil.) Reiche,

Nastanthus agglomeratus Miers var. *gilliesii* (Miers)

Reiche, *Boopis breviflora* Phil., *Boopis gayana* Phil., *Nastanthus gilliesii* Miers, *Nastanthus gayanus* (Phil.)

Miers, *Nastanthus ventosus* (Meyen) Miers

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, MAU, BIO.

Rango altitudinal: 1500-3200 m.

Países limítrofes: Argentina.

Moschopsis

***Moschopsis leyboldii* Phil.**

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: RME.

Rango altitudinal: 3000-4500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Moschopsis monocephala* (Phil.) Reiche**

Sinónimos: *Boopis monocephala* Phil.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA.

Rango altitudinal: 4000-5000 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Waje, anukaylla.

***Moschopsis rosulata* (N.E. Br.) Dusén**

Sinónimos: *Acicarpa rosulata* N.E. Br., *Moschopsis spathulata* Dusén, *Gamocarpha rosulata* (N.E. Br.)

Skottsb.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 700-2500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Moschopsis subandina* (Speg.) Dusén**

Sinónimos: *Gamocarpha subandina* Speg.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ARA, LRI.
Rango altitudinal: 1500-2500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Moschopsis trilobata Dusén
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAG.
Rango altitudinal: 500-1500 m.
Países limítrofes: Argentina.

CAMPANULACEAE

Campanula

Campanula rapunculoides L.
Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: JFE.

Cyphocarpus

Cyphocarpus innocuus Sandwith
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: COQ.
Rango altitudinal: 1000 m.

Cyphocarpus psammophilus Ricardi
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: ATA, COQ.
Rango altitudinal: 800 m.

Cyphocarpus rigescens Miers
Sinónimos: *Cyphocarpus rigescens* Miers fma. *glabratus* Phil. ex E. Wimm.
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: ATA, COQ.
Rango altitudinal: 500-1000 m.
Nombre vulgar: Pata de pajarito.

Downingia

Downingia pusilla (G. Don ex A. DC.) Torr.

Sinónimos: *Bolelia humilis* Greene, *Clintonia pusilla* G. Don ex A. DC., *Downingia humilis* (Greene) Greene, *Lobelia pusilla* Poepp., *Bolelia pusilla* (Poepp.) Greene
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 0-3200 m.
Países limítrofes: Argentina.

Legenere

Legenere valdiviana (Phil.) E. Wimm.
Sinónimos: *Howellia limosa* Greene, *Howellia valdiviana* (Phil.) E. Wimm., *Legenere limosa* (Greene) McVaugh, *Lobelia valdiviana* (Phil.) Vatke, *Mezleria valdiviana* Phil., *Dortmannia valdiviana* (Phil.) Kuntze
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: LLA.
Rango altitudinal: 0-200 m.
Países limítrofes: Argentina.

Lobelia

Lobelia anceps L.f.
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: ANT, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE.

Lobelia bridgesii Hook. & Arn.
Sinónimos: *Tupa bridgesii* (Hook. & Arn.) A. DC., *Rapantium bridgesii* (Hook. & Arn.) C. Presl, *Dortmannia bridgesii* (Hook. & Arn.) Kuntze, *Lobelia blanda* (D. Don) Heynh., *Tupa blanda* D. Don, *Rapantium blandum* (D. Don) C. Presl, *Rapantium lucaeana* C. Presl, *Lobelia lucaeana* (C. Presl) A. DC., *Dortmannia blanda* (D. Don) Kuntze, *Dortmannia lucaeana* (C. Presl) Kuntze
Subarbusto. Endémico.
Distribución: LRI.
Rango altitudinal: 0-200 m.
Nombre vulgar: Tupa rosada.

Lobelia excelsa Bonpl.

Sinónimos: *Lobelia salicifolia* Sweet, *Tupa salicifolia* (Sweet) G. Don, *Tupa glaucescens* Phil., *Rapantium excelsum* (Bonpl.) C. Presl, *Dortmannia excelsa* (Bonpl.) Kuntze, *Lobelia gigantea* auct. non Cav., *Lobelia arguta* Lindl., *Tupa arguta* (Lindl.) G. Don, *Dortmannia arguta*

(Lindl.) Kuntze, *Lobelia nerifolia* Moris, *Tupa kingi* Phil.

Arbusto. Endémico.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 0-1200 m.

Nombre vulgar: Tupa.

***Lobelia oligophylla* (Wedd.) Lammers**

Sinónimos: *Pratia repens* Gaudich., *Hypsela reniformis* (Kunth) C. Presl, *Pratia longiflora* Hook.f., *Hypsela oligophylla* (Wedd.) Benth. & Hook.f. ex Zahlbr., *Lobelia pratiana* Gaudich. ex Lammer, *Lysipomia reniformis* Kunth, *Pratia atacamensis* Phil., *Pratia oligophylla* Wedd., *Pratia pencana* Phil., *Pratia subsessilis* Wedd., *Hypsela longiflora* (Hook.f.) F. Phil., *Hypsela subsessilis* (Wedd.) Benth. & Hook.f. ex Zahlbr., *Hypsela atacamensis* (Phil.) F. Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-4000 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Nombre vulgar: Qatari.

***Lobelia polyphylla* Hook. & Arn.**

Sinónimos: *Lobelia ovata* Reiche, *Tupa polyphylla* (Hook. & Arn.) G. Don, *Rapantium polyphyllum* (Hook. & Arn.) C. Presl, *Dortmanna polyphylla* (Hook. & Arn.) Kuntze, *Tupa ovata* Phil., *Rapantium subdentatum* C. Presl, *Lobelia polyphylla* Hook. & Arn. fma. *subdentata* (C. Presl) E. Wimm., *Tupa subdentata* (C. Presl) A. DC., *Dortmanna subdentata* (C. Presl) Kuntze, *Lobelia polyphylla* Hook. & Arn. var. *besseriana* (C. Presl) Reiche, *Tupa polyphylla* (Hook. & Arn.) G. Don var. *besseriana* (C. Presl) Vatke, *Tupa besseriana* (C. Presl) A. DC., *Tupa purpurea* G. Don, *Tupa serrata* Phil., *Rapantium besserianum* C. Presl, *Rapantium purpureum* (G. Don) C. Presl, *Dortmanna besseriana* (C. Presl) Kuntze, *Dortmanna purpurea* (G. Don) Kuntze, *Rapantium bracteosum* C. Presl, *Lobelia polyphylla* Hook. & Arn. fma. *bracteosa* (C. Presl) E. Wimm., *Lobelia polyphylla* Hook. & Arn. var. *bracteosa* (C. Presl) Reiche, *Tupa bracteosa* (C. Presl) A. DC., *Dortmanna bracteosa* (C. Presl) Kuntze, *Lobelia polyphylla* Hook. & Arn. var. *angustifolia* Hook. & Arn. ex A. DC., *Tupa polyphylla* (Hook. & Arn.) G. Don var. *angustifolia* (Hook. & Arn.) A. DC., *Lobelia polyphylla* Hook. & Arn. var. *coquimbana* (Vatke) Reiche, *Tupa coquimbana* Phil., *Lobelia polyphylla* Hook. & Arn. fma. *linearifolia* (Phil.) E. Wimm., *Tupa linearifolia*

Phil., *Tupa axilliflora* Phil., *Lobelia axilliflora* (Phil.) Reiche, *Lobelia polyphylla* Hook. & Arn. fma.

hyssopifolia (C. Presl) E. Wimm., *Rapantium hyssopifolium* C. Presl, *Tupa hyssopifolia* (C. Presl) A. DC., *Dortmanna hyssopifolia* (C. Presl) Kuntze, *Tupa gayana* Phil., *Lobelia polyphylla* Hook. & Arn. var. *latifolia* (A. DC.) Heynh., *Tupa polyphylla* (Hook. & Arn.) G. Don var. *latifolia* A. DC., *Lobelia poeppigiana* Kunze ex A. DC., *Rapantium poeppigianum* (Kunze ex A. DC.) C. Presl, *Tupa polyphylla* (Hook. & Arn.) G. Don var. *bracteosa* (C. Presl) Vatke, *Lobelia hyssopifolia* (C. Presl) Gay, *Lobelia polyphylla* Hook. & Arn. var. *angustifolia* (Hook. & Arn. ex A. DC.) Heynh., *Tupa atropurpurea* Vis., *Tupa polyphylla* (Hook. & Arn.) G. Don var. *coquimbana* Vatke, *Tupa poeppigiana* Phil.

Arbusto. Endémico.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO.

Rango altitudinal: 0-1200 m.

Nombre vulgar: Tupa.

***Lobelia tupa* L.**

Sinónimos: *Lobelia mucronata* Cav. var. *berteroii* (A. DC.) E. Wimm., *Lobelia mucronata* Cav. fma. *hookeri* (A. DC.) E. Wimm., *Lobelia mucronata* Cav., *Lobelia mucronata* Cav. fma. *ovalifolia* E. Wimm., *Lobelia tupa* L. var. *bicalcarata* (Kuntze) E. Wimm., *Lobelia tupa* L. var. *montana* Reiche, *Lobelia tupa* L. var. *pavonii* E. Wimm., *Lobelia serrata* Meyen, *Tupa feuillei* G. Don, *Tupa feuillei* G. Don var. *macrophylla* Vatke, *Rapantium tupa* (L.) C. Presl, *Dortmanna tupa* (L.) Kuntze, *Dortmanna philippiana* Kuntze, *Lobelia bicalcarata* (Kuntze) Zahlbr. ex K. Schum., *Dortmanna bicalcarata* Kuntze, *Lobelia tupa* L. var. *mucronata* (Cav.) Reiche, *Tupa mucronata* (Cav.) A. DC., *Tupa cavanillesiana* G. Don, nom. illeg., *Tupa feuillei* G. Don var. *mucronata* (Cav.) Vatke, *Rapantium mucronatum* (Cav.) C. Presl, *Tupa mucronata* (Cav.) A. DC. var. *hookeri* A. DC., *Tupa berteroii* A. DC., *Tupa feuillei* G. Don var. *berteroii* (A. DC.) Vatke, *Dortmanna berteroii* (A. DC.) Kuntze, *Lobelia tupa* L. var. *berteroii* (A. DC.) Reiche, *Lobelia feuillei* (G. Don) Voss, nom. illeg., *Dortmanna mucronata* (Cav.) Kuntze

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Nombre vulgar: Tupa, tabaco del diablo.

Nota: Introducida en el Archipiélago de Juan Fernández.

Triodanis

Triodanis perfoliata* (L.) Nieuwl. subsp. *biflora

(Ruiz & Pav.) Lammers

Sinónimos: *Triodanis biflora* (Ruiz & Pav.) Greene, *Campanula biflora* Ruiz & Pav., *Pentagonia biflora* (Ruiz & Pav.) Kuntze, *Specularia biflora* (Ruiz & Pav.) Fisch. & A. Gray, *Triodanis perfoliata* (L.) Nieuwl. var. *biflora* (Ruiz & Pav.) T.R. Bradley

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: ANT, VAL, RME, LLA.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Wahlenbergia

***Wahlenbergia berteroii* Hook. & Arn.**

Subarbusto. Endémico.

Distribución: JFE.

Rango altitudinal: 0-600 m.

***Wahlenbergia fernandeziana* A. DC.**

Arbusto o subarbusto. Endémico.

Distribución: JFE.

Rango altitudinal: 0-600 m.

***Wahlenbergia grahamae* Hemsl.**

Subarbusto. Endémico.

Distribución: JFE.

Rango altitudinal: 400-600 m.

***Wahlenbergia linarioides* (Lam.) A. DC.**

Sinónimos: *Campanula arida* Kunth, *Campanula chilensis* Molina, *Campanula linarioides* Lam., *Wahlenbergia arida* (Kunth) Griseb., *Wahlenbergia linarioides* (Lam.) A. DC. var. *arida* (Kunth) A. DC., *Wahlenbergia linarioides* (Lam.) A. DC. var. *micrantha* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Uño-perquén.

***Wahlenbergia masafuerae* (Phil.) Skottsb.**

Sinónimos: *Euphorbia masafuerae* Phil.

Subarbusto. Endémico.

Distribución: JFE.

Rango altitudinal: 0-1100 m.

***Wahlenbergia tuberosa* Hook.f.**

Subarbusto. Nativo.

Distribución: JFE.

Rango altitudinal: 0-300 m.

Países limítrofes: Perú.

CAPRIFOLIACEAE

Centranthus

***Centranthus ruber* (L.) DC.**

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: JFE.

Dipsacus

***Dipsacus sativus* (L.) Honck.**

Hierba. Bienal. Introducida.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, JFE.

Knautia

***Knautia integrifolia* Bertol.**

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: ARA.

Sambucus

***Sambucus nigra* L.**

Arbusto o árbol pequeño. Introducido.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG.

Scabiosa

***Scabiosa atropurpurea* L.**

Hierba o subarbusto. Perenne. Introducida.

Distribución: ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, JFE.

Stangea

Stangea paulae Graebn.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: TAR.

Rango altitudinal: 4700-5200 m.

Países limítrofes: Perú.

Rango altitudinal: 0-2700 m.

Países limítrofes: Argentina.

Valeriana

Valeriana aequiloba Clos

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: COQ.

Rango altitudinal: 0-200 m.

Valeriana castellanosii Borsini

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ANT.

Rango altitudinal: 4200-5000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Valeriana atacamensis Borsini

Sinónimos: *Valeriana pubescens* Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Valeriana chilensis Borsini

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAU.

Rango altitudinal: 1000-2000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Valeriana boelckei Rossow

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAU, ARA.

Rango altitudinal: 1500-2000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Valeriana clarionifolia Phil.

Sinónimos: *Valeriana spegazzini* Skottsb., *Valeriana sarcophylla* Stuck. & Briq., *Phyllactis clarionifolia* (Phil.) Speg.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAU, AIS.

Rango altitudinal: 0-2000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Valeriana bracteosa Phil.

Sinónimos: *Valeriana rupestris* Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: VAL, RME, LBO, NUB.

Rango altitudinal: 1000-1600 m.

Valeriana crispa Ruiz & Pav.

Sinónimos: *Valeriana oreocharis* Phil., *Valeriana floribunda* Phil., *Valeriana lobata* (Hook. & Arn.) Höck, *Astrephia lobata* Hook. & Arn., *Valeriana excelsa* Reiche

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 1000-2500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Valeriana bridgesii Hook. & Arn.

Sinónimos: *Valeriana regularis* Clos, *Valeriana simplex* Clos, *Valeriana phellocarpa* Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO.

Rango altitudinal: 200-900 m.

Valeriana fonckii Phil.

Sinónimos: *Valeriana crenata* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 1000-2500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Valeriana carnosa Sm.

Sinónimos: *Valeriana magellanica* Lam.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS,

MAG.

Valeriana fragilis Clos

Sinónimos: *Betckea heterophylla* Phil., *Valeriana heterophylla* Phil., *Valeriana integrifolia* Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

***Valeriana graciliceps* Clos**

Sinónimos: *Valeriana lutescens* Phil.

Arbusto. Endémico.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 2000-2500 m.

***Valeriana grandifolia* Phil.**

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: VAL, RME, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 0-2000 m.

***Valeriana hebecarpa* DC.**

Sinónimos: *Valeriana columbaria* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 1000-2000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Valeriana hornschuchiana* Walp.**

Sinónimos: *Valeriana glauca* auct. non DC., *Valeriana rotundiloba* Clos, *Valeriana bustillosii* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 2500-3000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Valeriana hyalinorrhiza* Ruiz & Pav.**

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, BIO.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Países limítrofes: Bolivia.

***Valeriana interrupta* Ruiz & Pav.**

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP.

Rango altitudinal: 3500-4000 m.

Países limítrofes: Perú.

***Valeriana lapathifolia* Vahl**

Sinónimos: *Valeriana cordata* Griseb., *Valeriana cordata* Griseb. var. *dentata* Phil., *Valeriana andonaegui* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-1500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Hualhuilque, gualhuilque.

***Valeriana laxiflora* DC.**

Sinónimos: *Valeriana laxa* Phil., *Valeriana rupicola* Poepp. & Endl., *Valeriana sparsiflora* Clos, *Valeriana foliosa* Phil., *Valeriana lyrata* Phil., *Valeriana pearcei* Phil., *Valeriana laxiflora* DC. var. *cardaminifolia* Poepp. & Endl.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL, RME, LBO, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 100-2000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Valeriana lepidota* Clos**

Sinónimos: *Valeriana colchaguensis* Phil., *Valeriana maipoana* Ravenna

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: VAL, RME, LBO.

Rango altitudinal: 1000-2300 m.

***Valeriana leucocarpa* DC.**

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, MAG.

Rango altitudinal: 900-2000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Valeriana macrorhiza* DC.**

Sinónimos: *Phyllactis macrorhiza* (DC.) Wedd., *Phyllactis gilliesii* (Hook. & Arn.) Wedd., *Valeriana gilliesii* (Hook. & Arn.) Stuck. & Briq., *Betckea gilliesii* Hook. & Arn.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.

Rango altitudinal: 1500-2700 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Triaca del cerro.

***Valeriana moyanoi* Speg.**

Sinónimos: *Valeriana fonckii* Phil. var. *spiciformis* Dusén, *Valeriana radicalis* Clos var. *patagonica* Hicken

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AIS.

Rango altitudinal: 1000-2500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Valeriana nivalis* Wedd.**

Sinónimos: *Valeriana altoandina* Cabrera

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA.

Rango altitudinal: 3600-4800 m.

Países limítrofes: Argentina y Perú.

Nombre vulgar: Waji.

***Valeriana obtusifolia* DC.**

Sinónimos: *Valeriana obovata* Clos, *Valeriana aegilitis*

Phil., *Valeriana araucana* Phil., *Valeriana crassicaulis*

Phil., *Valeriana compacta* Phil., nom. illeg.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: VAL, NUB, BIO, ARA, LRI.

Rango altitudinal: 0-1100 m.

***Valeriana papilla* Bertero ex DC.**

Sinónimos: *Valeriana berterii* Colla, *Valeriana papilla*

Bertero ex DC. var. *andicola* Clos

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO.

Rango altitudinal: 200-2000 m.

Nombre vulgar: Papilla.

***Valeriana peltata* Clos**

Sinónimos: *Valeriana pterocarpa* Hook. & Arn.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME.

Rango altitudinal: 0-500 m.

***Valeriana petersenii* Weberling & Reese**

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP.

Rango altitudinal: 3000-5000 m.

Países limítrofes: Bolivia.

***Valeriana philippiana* Briq.**

Sinónimos: *Valeriana pulchella* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 1000-2400 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Valeriana polemoniifolia* Phil.**

Sinónimos: *Valeriana pugae* Phil., *Valeriana caudata*

Phil., *Valeriana germainii* Briq.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: COQ, RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 0-1500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Valeriana pycnantha* A. Gray**

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT.

Rango altitudinal: 4000-4900 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Valeriana radicalis* Clos**

Sinónimos: *Valeriana andina* F. Meigen

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: RME.

Rango altitudinal: 2000-3400 m.

***Valeriana samolifolia* (DC.) Colla**

Sinónimos: *Plectritis congesta* (Lindl.) DC., *Betckea samolifolia* DC., *Valerianella samolifolia* (DC.) A. Gray, *Plectritis samolifolia* (DC.) Höck

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 500-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Valeriana sedifolia* d'Urv.**

Sinónimos: *Phyllactis sedifolia* (d'Urv.) Wedd., *Valeriana sedoides* Hombr. & Jacq., *Aretiastrum sedifolium* (d'Urv.) Graebn., Macloskie, *Valeriana magellanica* Hombr. & Jacquinot ex Decne

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 500-1500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Valeriana senecioidea* Phil.**

Arbusto. Endémico.

Distribución: ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

***Valeriana sphaerocarpa* Phil.**

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: VAL.

Rango altitudinal: 220 m.

***Valeriana stricta* Clos**

Sinónimos: *Valeriana glauca* DC., *Valeriana glauca* DC. var. *elegans* (Clos) Reiche, *Valeriana elegans* Clos
Subarbusto. Nativo.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 1000-3300 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Valeriana urbanii* Phil.**

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT.

Rango altitudinal: 3500-5000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Waje.

***Valeriana vaga* Clos**

Sinónimos: *Valeriana muriculata* Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME.

Rango altitudinal: 1000-2800 m.

***Valeriana valdiviana* Phil.**

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: VAL, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.

Rango altitudinal: 0-700 m.

***Valeriana velutina* Clos**

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL.

Rango altitudinal: 1500-2200 m.

***Valeriana verticillata* Clos**

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 1500-2000 m.

***Valeriana virescens* Clos**

Sinónimos: *Valeriana montteana* Phil., *Valeriana virescens* Clos var. *montteana* (Phil.) Reiche

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Valerianella***Valerianella eriocarpa* Desv.**

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: BIO, ARA, LRI.

***Valerianella locusta* (L.) Laterr.**

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

***Valerianella rimosa* Bast**

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: ARA.

CARIOPTERIDACEAE**Citronella*****Citronella mucronata* (Ruiz & Pav.) D. Don**

Sinónimos: *Villaresia mucronata* Ruiz & Pav.,

Villaresia gongonha (Mart.) Miers var. *pungens* (Miers)

Engl., *Villaresia chilensis* Stuntz, *Villaresia pungens*

Miers, *Villaresia mucronata* Ruiz & Pav. var. *laeta*

Miers, *Patagua chilensis* Poepp. ex Neger

Árbol. Endémico.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.

Rango altitudinal: 0-700 m.

Nombre vulgar: Huillipatagua, naranjillo.

CARICACEAE**Carica*****Carica chilensis* (Planch. ex A. DC.) Solms**

Sinónimos: *Vasconcellea chilensis* Planch. ex A. DC., *Papaya chilensis* (Planch. ex A. DC.) Kuntze, *Carica pyriformis* Hook. & Arn.

Arbusto. Endémico.

Distribución: ATA, COQ, VAL.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Nombre vulgar: Palo gordo, monte gordo.

CARYOPHYLLACEAE

Agrostemma

***Agrostemma githago* L.**

Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: BIO, ARA.

(Phil.) Speg., *Arenaria serpyloides* Naudin var.

andicola (Gillies) Reiche

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 3000-4500 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Arenaria

***Arenaria digyna* D.K.F. Schltdl.**

Sinónimos: *Arenaria serpyloides* Gay

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 500-4200 m.

Países limítrofes: Bolivia y Perú.

***Arenaria serpyllifolia* L.**

Hierba. Anual o bienal. Introducida.

Distribución: COQ, RME, LBO, MAU, BIO, AIS, MAG.

***Arenaria fastigiata* Phil.**

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: MAU.

***Augastea coquimbensis* (Gereau & Martic.)**

Iamonico

Sinónimos: *Polycarpon coquimbense* Gereau & Martic.

Arbusto. Endémico.

Distribución: COQ.

Rango altitudinal: 1200-1700 m.

***Arenaria oligosperma* Naudin**

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: COQ.

***Augastea moreirana* (Muñoz-Schick) Iamonico & Montesinos**

Sinónimos: *Polycarpon moreiranum* Muñoz-Schick

Subarbusto. Endémico.

Distribución: COQ.

Rango altitudinal: 750-780 m.

***Arenaria pleurantha* Phil.**

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: LLA, AIS.

Rango altitudinal: 10-250 m.

Cardionema

***Cardionema andinum* (Phil.) A. Nelson & J.F.**

Macbr.

Sinónimos: *Pentacaena andina* Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: AYP, TAR.

Rango altitudinal: 3000-3500 m.

***Arenaria rivularis* Phil.**

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 3200-4700 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

***Cardionema kurtzii* Subils**

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ.

Rango altitudinal: 1500-2600 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Arenaria serpens* Kunth**

Sinónimos: *Arenaria microphylla* Phil., *Arenaria*

andicola Gillies, *Arenaria andicola* Gillies var.

caespitosa (Phil.) Hauman, *Arenaria caespitosa* Phil.,

Arenaria palustris Naudin, *Arenaria palustris* Naudin

var. *patagonica* (Phil.) Reiche, *Arenaria patagonica*

Phil., *Arenaria serpens* Kunth var. *andicola* (Gillies)

Rohrb., *Arenaria serpens* Kunth var. *caespitosa* (Phil.)

Hauman, *Arenaria serpens* Kunth var. *microphylla*

(Phil.) Speg., *Arenaria serpens* Kunth var. *palustris*

(Naudin) Speg., *Arenaria serpens* Kunth var. *patagonica*

Cardionema ramosissimum (Weinm.) A. Nelson & J.F. Macbr.

Sinónimos: *Acanthonychia ramosissima* (Weinm.) A. Nelson & J.F. Macbr., *Loeflingia ramosissima* Weinm., *Paronychia ramosissima* (Weinm.) DC., *Pentacaena ramosissima* (Weinm.) Hook. & Arn.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 500-3600 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Jaramilla.

Cerastium

Cerastium arvense L.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Cerastium fontanum Baumg. subsp. ***vulgare*** (Hartmann) Greuter & Burdet

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.

Cerastium glomeratum Thuill.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE, IPA.

Cerastium humifusum Cambess.

Sinónimos: *Cerastium montioides* Naudin

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ANT, COQ, VAL, RME, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-3800 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Cerastium mucronatum Wedd.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP.

Rango altitudinal: 4300-4400 m.

Países limítrofes: Bolivia y Perú.

Colobanthus

Colobanthus lycopodioides Griseb.

Sinónimos: *Colobanthus lechleri* Phil., *Drudea lycopodioides* (Griseb.) Griseb.

Subarbusto. Nativo.

Distribución: RME, MAG.

Rango altitudinal: 0-2300 m.

Países limítrofes: Argentina.

Colobanthus quitensis (Kunth) Bartl.

Sinónimos: *Colobanthus cherleroides* Hook.f., *Colobanthus crassifolius* (d'Urv.) Hook.f., *Colobanthus meigeni* Phil., *Sagina crassifolia* d'Urv., *Sagina quitensis* Kunth, *Colobanthus saginoides* Bartl.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-3800 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Colobanthus subulatus (d'Urv.) Hook.f.

Sinónimos: *Colobanthus subulatus* (d'Urv.) Hook.f. var. *darwinii* Hook.f., *Sagina subulata* d'Urv.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: RME, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-3700 m.

Países limítrofes: Argentina.

Corrigiola

Corrigiola crassifolia Chaudhri

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, RME.

Rango altitudinal: 1150 m.

Corrigiola propinqua Gay

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, LBO.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Corrigiola squamosa Hook. & Arn. var. ***latifolia***

(Gay) Skottsb.

Sinónimos: *Corrigiola latifolia* Gay

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Corrigiola squamosa Hook. & Arn. var. ***poeppigii***

Chaudhri

Sinónimos: *Corrigiola glomeruliflora* Steud.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, BIO.

Rango altitudinal: 0-700 m.

Corrigiola squamosa* Hook. & Arn. var. *squamosa

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, RME.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Dianthus

***Dianthus armeria* L.**

Hierba. Anual o bienal. Introducida.

Distribución: ARA.

Drymaria

***Drymaria cordata* (L.) Willd. ex Roem. & Schult.**

Sinónimos: *Drymaria cordata* (L.) Willd. ex Roem. & Schult. var. *pacifica* Mizush., *Holosteum cordatum* L.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: ANT.

Rango altitudinal: 0-2000 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Drymaria engleriana* (Muschl.) Baehni & J.F.**

Macbr. var. *devia* (Baehni & J.F. Macbr.) J.A.

Duke

Sinónimos: *Drymaria devia* Baehni & J.F. Macbr.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: AYP.

Rango altitudinal: 3500 m.

Países limítrofes: Perú.

***Drymaria paposana* Phil.**

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: ANT.

Rango altitudinal: 10 m.

Países limítrofes: Bolivia y Perú.

Herniaria

***Herniaria cinerea* DC.**

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: COQ.

Lychnis

***Lychnis coronaria* (L.) Desr.**

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: BIO, ARA.

Microphyes

***Microphyes litoralis* Phil.**

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-800 m.

Países limítrofes: Bolivia.

***Microphyes minima* (Miers ex Colla) Briq.**

Sinónimos: *Microphyes lanuginosus* Phil., *Talinum minimum* Miers ex Colla

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, RME, NUB, BIO.

Rango altitudinal: 0-2000 m.

***Microphyes robustus* Ricardi var. *pallidus* Ricardi**

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: ATA.

Rango altitudinal: 500-900 m.

Microphyes robustus* Ricardi var. *robustus

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: ATA, COQ.

Rango altitudinal: 800-1000 m.

Paronychia

Paronychia chilensis* DC. subsp. *chilensis* var. *chilensis

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, BIO, JFE.

Rango altitudinal: 0-200 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Paronychia chilensis* DC. subsp. *chilensis* var. *mutica* (Phil.) Reiche**

Sinónimos: *Paronychia mutica* Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, BIO.

Rango altitudinal: 10 m.

***Paronychia chilensis* DC. subsp. *subandina* (Phil.) Chaudhri**

Sinónimos: *Paronychia subandina* Phil., *Paronychia chilensis* DC. var. *subandina* (Phil.) Reiche

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ.

Rango altitudinal: 2200-2600 m.

***Paronychia coquimbensis* Gay var. *appressa* (Phil.) Chaudhri**

Sinónimos: *Paronychia appressa* Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ.

Rango altitudinal: 310-400 m.

Paronychia coquimbensis* Gay var. *coquimbensis

Sinónimos: *Paronychia chilensis* DC. var. *coquimbensis* (Gay) Reiche

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL.

Rango altitudinal: 500-1200 m.

***Paronychia franciscana* Eastw.**

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, JFE.

Rango altitudinal: 100-1500 m.

Nota: Introducida en el Archipiélago de Juan Fernández.

Paronychia johnstonii* Chaudhri var. *johnstonii

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ANT.

Rango altitudinal: 120-350 m.

Paronychia johnstonii* Chaudhri var. *scabrida

Chaudhri

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ANT.

Rango altitudinal: 160-310 m.

***Paronychia microphylla* Phil.**

Subarbusto. Nativo.

Distribución: AYP, TAR.

Rango altitudinal: 2200-3500 m.

Países limítrofes: Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Té de burro.

***Paronychia setigera* (Gillies ex Hook. & Arn.) F. Herm.**

Sinónimos: *Herniaria setigera* Gillies ex Hook. & Arn., *Paronychia chilensis* DC. var. *andina* (Phil.) Reiche, *Paronychia subandina* Gand., nom. illeg., *Paronychia andina* Phil., nom. illeg., *Paronychia australis* Gillies Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL, RME, MAU, BIO.

Rango altitudinal: 200-2500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Petrorhagia

***Petrorhagia dubia* (Raf.) G. López & Romo**

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, MAG.

***Petrorhagia prolifera* (L.) P.W. Ball & Heyw.**

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: LBO, NUB, BIO, ARA.

Philippiella

***Philippiella patagonica* Speg.**

Subarbusto. Nativo.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Polycarpon

***Polycarpon tetraphyllum* (L.) L.**

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE, IPA.

Pycnophyllopsis

***Pycnophyllopsis lanatum* (Phil.) M. E. Timaná**

Sinónimos: *Pycnophyllum lanatum* Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL.

Rango altitudinal: 1550-2600 m.

Pycnophyllum

Pycnophyllum bryoides (Phil.) Rohrb.

Sinónimos: *Stichophyllum bryoides* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT.

Rango altitudinal: 4100-4500 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Yaretilla.

Pycnophyllum glomeratum Mattf.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR.

Rango altitudinal: 4200-4500 m.

Países limítrofes: Perú.

Pycnophyllum macropetalum Mattf.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT.

Rango altitudinal: 4000-4800 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Ayro macho.

Pycnophyllum molle J. Remy

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT.

Rango altitudinal: 3500-4800 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Yaretilla.

Pycnophyllum spathulatum Mattf.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT.

Rango altitudinal: 4000-5000 m.

Países limítrofes: Bolivia.

Reicheella

Reicheella andicola (Phil.) Pax

Sinónimos: *Lyallia andicola* Phil., *Bryopsis andicola*

Reiche

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: AYP, TAR, ANT.

Rango altitudinal: 4150-4820 m.

Nombre vulgar: Yaretilla de agua.

Sabulina

Sabulina acutiflora (Fenzl ex Endl.) Dillenb. &

Kadereit

Sinónimos: *Minuartia acutiflora* (Fenzl ex Endl.) Mattf., *Alsine acutiflora* Fenzl ex Endl., *Alsine minuta* (Naudin) Rohrb., *Arenaria minuta* Naudin, *Minuartia minuta* (Naudin) Roquero

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Sagina

Sagina apetala Ard. var. *apetala*

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.

Sagina apetala Ard. var. *pachyrhiza* (Phil.)

Reiche

Sinónimos: *Sagina pachyrhiza* Phil.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: RME.

Sagina apetala Ard. var. *valdiviana* (Phil.) Reiche

Sinónimos: *Sagina valdiviana* Phil.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: LLA.

Rango altitudinal: 25 m.

Sagina chilensis Naudin

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: RME, LBO, JFE.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nota: Introducida en el Archipiélago de Juan Fernández.

Sagina procumbens L.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Saponaria

***Saponaria officinalis* L.**

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.

Scleranthus

***Scleranthus annuus* L.**

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Silene

***Silene andicola* Gillies ex Hook. & Arn.**

Sinónimos: *Melandrium andicolum* (Gillies ex Hook. & Arn.) Rohrb., *Melandrium chilense* (Naudin) Rohrb. var. *cucubalooides* (Fenzl) Hosseus, *Melandrium cucubalooides* Fenzl ex Rohrb., *Lychnis andicola* (Gillies ex Hook. & Arn.) Rusby

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: LBO, NUB, BIO, ARA, LLA, MAG.

Rango altitudinal: 1500-2000 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

***Silene antarctica* (Kuntze) Pedersen**

Sinónimos: *Lychnis antarctica* Kuntze

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 1000-1500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Silene armeria* L.**

Hierba. Anual o bienal. Introducida.

Distribución: BIO, ARA.

***Silene chilensis* (Naudin) Bocquet**

Sinónimos: *Lychnis chilensis* Naudin, *Lychnis terminalis* Naudin, *Melandrium andicolum* (Gillies ex Hook. & Arn.) Rohrb. var. *nubigenum* (Phil.) Reiche, *Melandrium chilense* (Naudin) Rohrb., *Silene nubigena* Phil., *Melandrium terminale* (Naudin) Reiche

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG.

Rango altitudinal: 2000-3000 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

***Silene chubutensis* (Speg.) Bocquet**

Sinónimos: *Lychnis chubutensis* Speg., *Melandrium chubutense* (Speg.) Speg.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AIS.

Rango altitudinal: 0-1500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Silene gallica* L.**

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE.

***Silene magellanica* (Desr.) Bocquet**

Sinónimos: *Lychnis magellanica* Desr., *Melandrium magellanicum* (Desr.) Fenzl ex Rohrb., *Lychnis graminea* Molina, nom. nud.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-1500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Silene mandonii* (Rohrb.) Bocquet**

Sinónimos: *Melandrium mandonii* Rohrb., *Melandrium rimbachii* Mattf.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT.

Rango altitudinal: 1500-4700 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Silene patagonica* (Speg.) Bocquet**

Sinónimos: *Silene densifolia* (Dusén) Bocquet, *Lychnis patagonica* Speg., *Melandrium densifolium* Dusén, *Melandrium patagonicum* (Speg.) Speg., *Lychnis patagonica* Speg. fma. *glabriuscula* H. Ross

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AIS, MAG.

Rango altitudinal: 1000-1500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Silene plutonica* Naudin**

Sinónimos: *Melandrium chilense* (Naudin) Rohrb. var. *plutonicum* (Naudin) Hosseus, *Melandrium plutonicum* (Naudin) Reiche, *Silene glutinosa* Walp., nom. nud.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: RME, LBO, ARA, LLA.

Rango altitudinal: 1000-2000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Silene vulgaris* (Moench) Garccke**

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: RME, ARA.

Spergula

***Spergula arvensis* L.**

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG.

***Spergula bocconii* (Scheele) Pedersen**

Hierba. Anual o bienal. Introducida.

Distribución: COQ, VAL, RME, NUB, BIO, ARA, LRI, MAG, JFE, IDE.

***Spergula cerviana* (Cham. & Schltdl.) D. Dietr.**

Sinónimos: *Arenaria cerviana* Cham. & Schltdl.,

Spergularia cerviana (Cham. & Schltdl.) G. Don,

Lepigonum purpureum Kindb. var. *firmum* Kindb.,

Spergularia firma (Kindb.) Rohrb., *Spergularia*

polyantha Phil., *Arenaria polyantha* Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ATA, RME, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 0-500 m.

***Spergula depauperata* (Naudin) Pedersen**

Sinónimos: *Spergularia depauperata* (Naudin) Rohrb.,

Arenaria depauperata Naudin, *Lepigonum*

depauperatum (Naudin) Kindb., *Spergularia*

depauperata (Naudin) Rohrb. var. *tenella* (Phil.)

Hauman & Irigoyen, *Spergularia tenella* Phil., *Tissa*

depauperata (Naudin) Reiche, *Tissa depauperata*

(Naudin) Reiche var. *tenella* (Phil.) Hauman, *Lepigonum*

grandiflorum Kindb., *Spergularia grandiflora* (Kindb.)

Rohrb., *Spergularia rengifo* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL, RME, NUB, ARA, LLA.

Rango altitudinal: 500-3800 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Spergula pissisi* (Phil.) Volponi**

Sinónimos: *Spergularia pissisii* (Phil.) I.M. Johnst.,

Arenaria pissisi Phil., *Tissa pissisi* (Phil.) Reiche

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ATA, COQ.

Rango altitudinal: 2500-4000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Spergula platensis* (Cambess.) Shinners**

Sinónimos: *Balardia platensis* Cambess.

Hierba. Anual o bienal. Nativa.

Distribución: RME, BIO, ARA.

Países limítrofes: Argentina.

***Spergula rubra* (L.) D. Dietr.**

Hierba. Anual o perenne. Introducida.

Distribución: COQ, RME, LBO, MAU, NUB, BIO,

ARA, JFE.

***Spergula villosa* Pers.**

Sinónimos: *Spergularia villosa* (Pers.) Cambess.,

Arenaria berteroana Phil., *Spergularia villosa* (Pers.)

Cambess. var. *berteroana* (Phil.) Rohrb.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, BIO, LLA.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Países limítrofes: Argentina y Perú.

Spergularia

***Spergularia aberrans* I.M. Johnst.**

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ANT.

Rango altitudinal: 750 m.

***Spergularia arbuscula* (Gay) I.M. Johnst.**

Sinónimos: *Paronychia arbuscula* Gay, *Arenaria*

teretifolia Phil., *Arenaria lignosa* Phil., *Spergularia*

lignosa (Phil.) Rohrb., *Spergularia fruticosa* Phil.,

Spergularia teretifolia (Phil.) Phil., *Tissa lignosa* (Phil.)

Reiche, *Tissa teretifolia* (Phil.) Reiche

Subarbusto. Endémico.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-100 m.

***Spergularia confertiflora* Steud.**

Sinónimos: *Spergularia confertiflora* Steud. var.

polyphylla (Phil.) Skottsb., *Spergularia polyphylla*

(Phil.) Rohrb., *Tissa polyphylla* (Phil.) Reiche, *Arenaria*

rubra L. var. *polyphylla* Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: JFE, IDE.

Rango altitudinal: 0-100 m.

***Spergularia cremnophila* I.M. Johnst.**

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ANT, ATA.

Rango altitudinal: 0-500 m.

***Spergularia denticulata* (Phil.) Phil.**

Sinónimos: *Arenaria denticulata* Phil., *Tissa denticulata* (Phil.) Reiche

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: ANT, ATA.

Rango altitudinal: 0-100 m.

***Spergularia dillenii* Lebel**

Hierba. Anual o bienal. Introducida.

Distribución: COQ, RME, MAU.

***Spergularia fasciculata* Phil.**

Sinónimos: *Tissa stuebellii* Hieron., *Tissa fasciculata* (Phil.) Reiche, *Spergularia stuebellii* (Hieron.) I.M. Johnst.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT.

Rango altitudinal: 3000-3800 m.

Países limítrofes: Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Alhucema.

***Spergularia floribunda* (Gay) Rohrb.**

Sinónimos: *Arenaria floribunda* Gay, *Spergularia coquimbensis* Phil., *Tissa floribunda* (Gay) Reiche, *Lepigonum floribundum* (Gay) Kindb.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-100 m.

***Spergularia manicata* (Skottsb.) Kool & Thulin**

Sinónimos: *Sanctambrosia manicata* (Skottsb.) Skottsb., *Paronychia manicata* Skottsb.

Arbusto. Endémico.

Distribución: IDE.

Rango altitudinal: 330 m.

***Spergularia marina* (L.) Griseb.**

Hierba. Anual o bienal. Introducida.

Distribución: COQ, VAL, RME, BIO, LLA, AIS, MAG.

***Spergularia masafuerana* Skottsb.**

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: JFE.

Rango altitudinal: 0-800 m.

***Spergularia media* (L.) C. Presl**

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

***Spergularia pycnantha* R. Rossbach**

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME.

Rango altitudinal: 0-500 m.

***Spergularia stenocarpa* (Phil.) I.M. Johnst.**

Sinónimos: *Arenaria stenocarpa* Phil., *Spergularia larrañagae* Phil., *Spergularia borchersi* Phil., *Tissa borchersi* (Phil.) Reiche

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Stellaria

***Stellaria alsine* Grimm**

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: AIS, MAG.

***Stellaria arvalis* Fenzl ex F. Phil.**

Sinónimos: *Stellaria cuspidata* Schleidl. var. *alsineformis* Naudin

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: TAR, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-1500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Stellaria chilensis* Pedersen**

Sinónimos: *Stellaria concinna* Ravenna, *Stellaria circinata* Ravenna, *Stellaria celsa* Ravenna

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: AYP, TAR, ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, JFE.

Rango altitudinal: 0-3400 m.

Nota: Introducida en el Archipiélago de Juan Fernández.

***Stellaria debilis* d'Urv.**

Sinónimos: *Alsine axillaris* (Phil.) Macloskie, *Alsine chubutensis* (Speg.) Macloskie, *Alsine debile* (d'Urv.) Macloskie, *Stellaria axillaris* Phil., *Stellaria chubutensis* Speg., *Stellaria debilis* d'Urv. var. *condensata* (A. Gray ex Macloskie) Hauman & Irigoyen, *Stellaria stenopetala* Phil., *Stellaria stenopetala* Phil. var. *axillaris* (Phil.) Hauman, *Stellaria stenopetala* Phil. var. *chubutensis* (Speg.) Hauman, *Stellaria stenopetala* Phil. var. *magellanica* Phil., *Stellaria stenopetala* Phil. var. *typica* Hauman, nom. illeg., *Stellaria xanthospora* Chodat & Wilczek
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ATA, COQ, MAG.
Rango altitudinal: 0-3500 m.
Países limítrofes: Argentina.

***Stellaria media* (L.) Vill.**

Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.

***Stellaria pallida* (Dumort.) Crép.**

Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: RME, MAG.

***Stellaria parviflora* Banks & Sol. ex Hook.f. subsp. *ignis* Pedersen**

Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAG.
Rango altitudinal: 0-500 m.
Países limítrofes: Argentina.

***Stellaria weddellii* Pedersen**

Sinónimos: *Stellaria cuspidata* Schldl. var. *sessilifolia* Wedd.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP.
Rango altitudinal: 3100-4500 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

CELASTRACEAE

Lepuropetalon

***Lepuropetalon spathulatum* Muhl. ex Elliott**

Sinónimos: *Pyxidanthera spathulata* Muhl., *Cryptopetalum pussillum* Hook. & Arn., *Lepuropetalon pussillum* (Hook. & Arn.) Gay
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.
Rango altitudinal: 0-500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Maytenus

***Maytenus boaria* Molina**

Sinónimos: *Maytenus boaria* Molina var. *angustifolia* Turcz., *Maytenus chilensis* DC., *Maytenus chilensis* DC. var. *angustifolius* DC., *Celastrus uncinatus* Ruiz & Pav., *Maytenus crenulatus* C. Presl, *Boaria molinae* A. DC., *Maytenus magellanica* auct. non (Lam.) Hook.f., *Maytenus uncinatus* (Ruiz & Pav.) G. Don, *Senacia maytenus* Lam., *Celastrum maytenus* Willd.
Árbol. Nativo.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-4000 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.
Nombre vulgar: Maitén.

***Maytenus chubutensis* (Speg.) Lourteig, O'Donell & Sleumer**

Sinónimos: *Pernettya chubutensis* Speg.
Arbusto o subarbusto. Nativo.
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS.
Rango altitudinal: 500-2000 m.
Países limítrofes: Argentina.

***Maytenus disticha* (Hook.f.) Urb.**

Sinónimos: *Myginda disticha* Hook.f., *Rhacomia disticha* (Hook.f.) Loes.
Arbusto o subarbusto. Nativo.
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-2000 m.
Países limítrofes: Argentina.

***Maytenus magellanica* (Lam.) Hook.f.**

Sinónimos: *Cassine magellanica* Lam., *Celastrus megellanicus* (Lam.) DC., *Maytenus andina* Phil., *Euthalis lucida* Banks & Sol. ex Hook.f.

Árbol. Nativo.

Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-2000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Leña dura.

CERATOPHYLLACEAE

Ceratophyllum

Ceratophyllum demersum L.

Sinónimos: *Ceratophyllum tricuspidatum* Dumort., *Ceratophyllum oxyacanthum* Cham., *Ceratophyllum tuberculatum* Cham., *Ceratophyllum apiculatum* Cham., *Ceratophyllum chilense* Leyb., *Ceratophyllum aquaticum* H.C. Watson, *Ceratophyllum australis* Griseb.

Hierba acuática. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL, RME, NUB.

Rango altitudinal: 0-1300 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Cola de zorro, lila de agua, pelo de agua, baba de sapo, hilo de agua.

CHENOPodiaceae

Atriplex

Atriplex atacamensis Phil.

Arbusto. Endémico.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA.

Rango altitudinal: 200-3000 m.

Nombre vulgar: Cachiyuyo.

Atriplex chapinii I.M. Johnst.

Arbusto. Endémico.

Distribución: IDE.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Atriplex chilensis Colla

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: VAL, LBO, BIO, ARA, LLA, MAG.

Rango altitudinal: 0-100 m.

Atriplex chizae Rosas

Arbusto. Endémico.

Distribución: AYP, TAR.

Rango altitudinal: 0-1100 m.

Atriplex clivicola I.M. Johnst.

Sinónimos: *Atriplex clivicola* I.M. Johnst. var. *lopholepis* I.M. Johnst., *Obione clivicola* (I.M. Johnst.) Ulbr.

Arbusto. Endémico.

Distribución: ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 200-700 m.

Atriplex coquimbana Phil.

Arbusto. Endémico.

Distribución: ATA, COQ.

Rango altitudinal: 300-500 m.

Atriplex costellata Phil.

Arbusto. Endémico.

Distribución: COQ, VAL.

Rango altitudinal: 0-200 m.

Atriplex deserticola Phil.

Sinónimos: *Atriplex podocarpa* Phil., *Atriplex retusa* Gay, *Obione retusa* (Gay) Ulbr.

Subarbusto. Nativo.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 1500-3000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Cachiyuyo.

Atriplex glaucescens Phil.

Sinónimos: *Atriplex polyphylla* Phil.

Arbusto. Endémico.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA.

Rango altitudinal: 1300-3700 m.

Nombre vulgar: Juirajuira.

Atriplex hortensis L.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: COQ, RME.

Atriplex hystrix Phil.

Sinónimos: *Atriplex mucronata* Phil., nom. illeg., *Obione hystrix* (Phil.) Ulbr., *Obione mucronata* (Phil.) Ulbr.
Arbusto. Endémico.
Distribución: ANT, ATA, COQ.
Rango altitudinal: 0-600 m.

Atriplex imbricata (Moq.) D. Dietr. var. *foliolosa* (Phil.) Rosas

Sinónimos: *Atriplex foliolosum* Phil., *Atriplex sanambrosiana* Sparre
Arbusto o subarbusto. Endémico.
Distribución: IDE.
Rango altitudinal: 0-100 m.

Atriplex imbricata (Moq.) D. Dietr. var. *imbricata*

Sinónimos: *Atriplex axillaris* Phil., *Atriplex microphylla* Phil., *Obione imbricata* Moq., *Atriplex salaris* Phil., *Obione axillaris* (Phil.) Ulbr.
Arbusto o subarbusto. Nativo.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA.
Rango altitudinal: 3500-3800 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.
Nombre vulgar: Cachiyuyo, chókel, ojalar, kopakopa macho, pilaya.

Atriplex leuca Phil.

Sinónimos: *Atriplex densifolia* Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ATA, COQ.
Rango altitudinal: 0-800 m.

Atriplex madariagae Phil.

Arbusto. Endémico.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA.
Rango altitudinal: 200-2700 m.
Nombre vulgar: Cachial, kachiyuyo, kórial, chókel, juirajira.

Atriplex myriophylla Phil.

Sinónimos: *Atriplex pusilla* (Wedd.) Phil., comb. illeg., *Obione pusilla* Wedd., hom. illeg., *Obione myriophylla* (Phil.) Ulbr.
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: AYP, TAR.
Rango altitudinal: 2000-4000 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Atriplex nummularia Lindl.

Arbusto. Introducido.
Distribución: ANT, COQ.

Atriplex oreophila Phil.

Sinónimos: *Atriplex humilis* Phil., hom. illeg., *Atriplex hypsophila* I.M. Johnst.
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: TAR, ATA, COQ.
Rango altitudinal: 3500-4000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Atriplex patula L.

Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: RME, BIO, ARA, LLA, MAG.

Atriplex peruviana Moq.

Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP.
Rango altitudinal: 0-1900 m.
Países limítrofes: Perú.

Atriplex philippii R.E. Fr.

Sinónimos: *Atriplex prostrata* Phil., hom. illeg.
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: RME.
Rango altitudinal: 100-1000 m.
Nombre vulgar: Pasto cenizo.

Atriplex prostrata Boucher ex DC.

Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: COQ, RME, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG.

Atriplex repanda Phil.

Sinónimos: *Atriplex angustifolia* Phil.
Arbusto. Endémico.
Distribución: ATA, COQ, RME.
Rango altitudinal: 0-1500 m.
Nombre vulgar: Sereno.

Atriplex rosea L.

Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: COQ.

***Atriplex semibaccata* R. Br.**

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME.

***Atriplex suberecta* I. Verd.**

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: ATA, COQ.

***Atriplex taltalensis* I.M. Johnst.**

Subarbusto. Endémico.

Distribución: TAR, ANT, ATA.

Rango altitudinal: 0-100 m.

***Atriplex tatarica* L.**

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: RME.

***Atriplex vallenarensis* Rosas**

Arbusto. Endémico.

Distribución: ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-600 m.

***Atriplex vulgarissima* Speg.**

Arbusto. Nativo.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Bassia

***Bassia hyssopifolia* (Pall.) Kuntze**

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: ANT, ATA, VAL, RME.

Beta

***Beta vulgaris* L. subsp. *maritima* (L.) Arcang.**

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: ATA, VAL, RME.

Beta vulgaris* L. subsp. *vulgaris

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: TAR, JFE.

Chenopodiastrum

***Chenopodiastrum murale* (L.) S. Fuentes, Uotila & Borsch**

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE, IDE.

Chenopodium

***Chenopodium album* L.**

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.

***Chenopodium antarcticum* (Hook.f.) Benth. & Hook.f.**

Sinónimos: *Blitum antarcticum* Hook.f., *Chenopodium antarcticum* (Hook.f.) Speg., comb. illeg.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Chenopodium carnosulum* Moq.**

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: VAL, LLA, AIS, MAG.

***Chenopodium crusoeanum* Skottsb.**

Subarbusto. Endémico.

Distribución: JFE.

Rango altitudinal: 0-500 m.

***Chenopodium ficifolium* Sm.**

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: VAL, LLA, MAG.

***Chenopodium frigidum* Phil.**

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, RME.

Rango altitudinal: 3200-4000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Chápir, yuyo, quínoa chica, illankoma.

***Chenopodium giganteum* L.**

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: VAL, RME.

***Chenopodium glaucum* L.**

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: IPA.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Huataru (Rapa Nui).

***Chenopodium hircinum* Schrad.**

Sinónimos: *Chenopodium hircinum* Schrad. var. *typicum*

A. Ludw. & Aellen, nom. illeg.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, NUB, LRI.

Rango altitudinal: 0-1400 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Yuyo, quinoa, illinkoma, ajara, quinoa de los abuelos.

***Chenopodium mandonii* (S. Watson) Aellen**

Sinónimos: *Teloxys mandonii* S. Watson

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: ANT, VAL.

Rango altitudinal: 2000-4000 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

***Chenopodium nesodendron* Skottsb.**

Arbusto. Endémico.

Distribución: JFE.

Rango altitudinal: 300-500 m.

***Chenopodium papulosum* Moq.**

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: ATA, COQ, VAL, BIO, LLA.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Chenopodium petiolare* Kunth**

Sinónimos: *Chenopodium sparsiflorum* Phil.,

Chenopodium hastatum Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL.

Rango altitudinal: 2000-3000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Yuyo, kañawe, juirajura, obleo, kantalo.

***Chenopodium philippianum* Aellen**

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 2000-2500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Chenopodium quinoa* Willd.**

Sinónimos: *Chenopodium quinoa* Willd. fma.

purpurascens Aellen

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: TAR, ANT, NUB, LLA.

Rango altitudinal: 0-3800 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Quínoa, quingua, quinua, chula, ch'iva, ch'ivaqhora.

***Chenopodium sanctae-clarae* Johow**

Arbusto. Endémico.

Distribución: JFE.

Rango altitudinal: 0-100 m.

***Chenopodium sancti-ambrosii* Skottsb.**

Arbusto. Endémico.

Distribución: IDE.

Rango altitudinal: 300-500 m.

***Chenopodium trifurcatum* Phil.**

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: ATA, COQ.

Rango altitudinal: 350-2900 m.

***Chenopodium vulvaria* L.**

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: TAR, ANT, VAL, RME, LBO, MAU.

Dysphania

***Dysphania ambrosioides* (L.) Mosyakin & Clements**

Sinónimos: *Ambrina parvula* Phil., *Ambrina ambrosioides* (L.) Spach, *Teloxys ambrosioides* (L.) W.A. Weber, *Chenopodium ambrosioides* L., *Ambrina incisa* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE, IDE.

Rango altitudinal: 0-2000 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Nombre vulgar: Paico, arka, toronjil dulce.

Nota: Introducida en el Archipiélago de Juan Fernández. Su presencia en Islas Desventuradas se presume de origen introducido.

***Dysphania chilensis* (Schrad.) Mosyakin & Clements**

Sinónimos: *Ambrina andicola* Phil., *Ambrina denudata* Phil., *Chenopodium ambrosioides* L. var. *euchilense* Aellen, *Chenopodium ambrosioides* L. fma. *denudatum* (Phil.) Aellen, *Chenopodium ambrosioides* L. var. *andicola* (Phil.) Aellen, *Chenopodium ambrosioides* L. var. *chilense* (Schrad.) Griseb., *Chenopodium anthelminticum* L. var. *chilense* (Schrad.) Griseb., *Chenopodium ambrosioides* L. subsp. *chilense* (Schrad.) Aellen, *Ambrina chilensis* (Schrad.) Spach, *Chenopodium vagans* Standl., *Chenopodium chilense* Schrad.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, LLA.

Rango altitudinal: 0-1500 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Nombre vulgar: Paico.

***Dysphania microcarpa* (Phil.) Mosyakin & Clements**

Sinónimos: *Roubieva microcarpa* Phil., *Chenopodium zoellneri* Aellen, *Chenopodium multifidum* L. var. *microcarpum* (Phil.) Reiche, *Chenopodium microcarpum* (Phil.) A. Troncoso

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: VAL, RME.

Rango altitudinal: 100-350 m.

***Dysphania multifida* L.**

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE.

Maireana

***Maireana brevifolia* (R. Br.) Paul G. Wilson**

Arbusto. Introducido.

Distribución: IDE.

Nitrophila

***Nitrophila atacamensis* (Phil.) Hieron. ex Ulbr.**

Sinónimos: *Glaux atacamensis* Phil.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: ANT.

Rango altitudinal: 2300-4000 m.

Oxybasis

***Oxybasis glauca* (L.) S. Fuentes, Uotila & Borsch**

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: VAL, LLA, AIS, MAG.

***Oxybasis macrosperma* (Hook.f.) S. Fuentes, Uotila & Borsch**

Sinónimos: *Chenopodium halophilum* Phil., *Chenopodium macrospermum* Hook.f. subsp. *macrospermum*, *Chenopodium macrospermum* Hook.f. subsp. *salsum* (Phil.) A. Troncoso, *Blitum salsum* Phil., *Chenopodium macrospermum* Hook.f. subsp. *halophilum* (Phil.) Aellen, *Chenopodium macrospermum* Hook.f. var. *halophilum* (Phil.) Standl.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: ANT, ATA, VAL, RME, LBO, MAU, BIO, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 0-100 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

***Oxybasis urbica* (L.) S. Fuentes, Uotila & Borsch**

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: JFE.

Salsola

***Salsola kali* L.**

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Sarcocornia

Sarcocornia andina (Phil.) Freitag, M.A. Alonso & M.B. Crespo

Sinónimos: *Salicornia andina* Phil., *Salicornia fruticosa* var. *andina* (Phil.) Gunckel, *Salicornia peruviana* var. *andina* (Phil.) Reiche

Arbusto. Nativo.

Distribución: ANT.

Rango altitudinal: 2300-4200 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Sarcocornia magellanica (Phil.) M.A. Alonso &

M.B. Crespo

Sinónimos: *Salicornia magellanica* Phil.

Arbusto. Nativo.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Sarcocornia neei (Lag.) M.A. Alonso & M.B.

Crespo

Sinónimos: *Salicornia peruviana* Kunth var. *corticosa* (Meyen) Reiche, *Salicornia peruviana* Kunth var. *doeringii* (Lorentz & Niederl.) Reiche, *Salicornia copiapina* Phil., *Salicornia neei* Lag.

Arbusto. Nativo.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, JFE.

Rango altitudinal: 0-2500 m.

Países limítrofes: Argentina y Perú.

Nombre vulgar: Sosa, hierba sosa, hierba del salitre.

Nota: Introducida en Archipiélago de Juan Fernández. Alonso & Crespo (2008) excluyen a *Sarcocornia fruticosa* de las Américas, creando la combinación *Sarcocornia neei*, sin ser su sinónimo.

Sarcocornia pulvinata (R.E. Fr.) A.J. Scott

Sinónimos: *Salicornia pulvinata* R.E. Fr.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: TAR, ANT.

Rango altitudinal: 3600-4200 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Janki, jankijanki, champa, yaretilla de la vega.

Suaeda

Suaeda argentinensis A. Soriano

Arbusto. Nativo.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Suaeda foliosa Moq.

Sinónimos: *Suaeda foliosa* Moq. var. *tenuifolia* (Phil.) Standl., *Suaeda brevifolia* Phil., *Suaeda divaricata* Moq. var. *brevifolia* (Phil.) Reiche, *Suaeda divaricata* Moq. var. *parvifolia* (Phil.) Reiche, *Suaeda divaricata* Moq. var. *tenuifolia* (Phil.) Reiche, *Suaeda tenuifolia* Phil., *Suaeda parvifolia* Phil.

Subarbusto. Nativo.

Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-700 m.

Países limítrofes: Bolivia.

Suaeda multiflora Phil.

Arbusto. Endémico.

Distribución: ATA.

Rango altitudinal: 0-900 m.

Suaeda nesophila I.M. Johnst.

Sinónimos: *Suaeda divaricata* Moq. var. *microphylla* F. Phil.

Arbusto. Endémico.

Distribución: IDE.

Rango altitudinal: 0-100 m.

Suaeda patagonica Speg.

Sinónimos: *Lerchea patagonica* (Speg.) Speg.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Países limítrofes: Argentina.

CLEOMACEAE

Cleome

Cleome chilensis DC.

Sinónimos: *Cleome chilensis* DC. var. *pubescens* DC.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: TAR, ANT, ATA.

Rango altitudinal: 300-700 m.

Países limítrofes: Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Hierba de los dedos, flor de la abeja, tacma.

COLUMELLIACEAE

Desfontainia

Desfontainia fulgens D. Don

Sinónimos: *Desfontainia chilensis* Gay, *Desfontainia novemdentata* Gand., *Desfontainia ilicifolia* Phil., *Desfontainia hookeri* Dunal, *Desfontainia spinosa* Ruiz & Pav. var. *hookeri* (Dunal) Reiche, *Desfontainia spinosa* Ruiz & Pav. var. *chilensis* (Gay) Reiche, *Desfontainia spinosa* Ruiz & Pav. var. *parvifolia* (D. Don) Hook., *Desfontainia acutangula* Dunal, *Desfontainia costaricensis* Wooson, *Desfontainia spinosa* Ruiz & Pavon, *Desfontainia obovata* Kraenzl., *Desfontainia parvofolia* D. Don, *Desfontainia pulchera* Mold., *Desfontainia splendens* Humb. & Bonpl., *Desfontainia steyemarkii* Mold., *Linkia peruviana* Pers., *Linkia spinosa* (Ruiz & Pav.) Poiret, *Linkia splandens* (Humb. & Bonpl.) Poiret

Arbusto o árbol pequeño. Nativo.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-1200 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Chapico, michai blanco, taique, trafrau.

CONVOLVULACEAE

Calystegia

Calystegia sepium (L.) R.Br.

Arbusto trepador. Introducido.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, JFE, IPA.

Calystegia soldanella (L.) Roem. & Schult.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 3-280 m.

Calystegia tuguriorum R. Br. ex Hook. f.

Hierba trepadora. Perenne. Nativa.
Distribución: LRI, AIS, JFE.
Rango altitudinal: 30-150 m.
Países limítrofes: Argentina.

Convolvulus

Convolvulus arvensis L.

Hierba trepadora. Perenne. Introducida.

Distribución: AYP, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG, JFE.

Convolvulus bonariensis Cav.

Sinónimos: *Aniseia diversifolia* Walp., *Convolvulus bonariensis* Cav. var. *multiflorus* Phil., *Convolvulus dissectus* Cav. var. *diversifolius* (Walp.) Reiche, *Convolvulus triflorus* Phil.

Hierba trepadora. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL, RME.

Rango altitudinal: 0-3000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Correhuela, bocina.

Convolvulus chilensis Pers.

Sinónimos: *Convolvulus dissectus* Cav., nom. illeg., *Convolvulus canescens* Phil., nom. illeg., *Convolvulus dissectus* Cav. var. *canescens* (Phil.) Reiche

Hierba trepadora. Perenne. Endémica.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB.

Rango altitudinal: 0-1800 m.

Nombre vulgar: Correhuela, bocina.

Convolvulus demissus Choisy

Sinónimos: *Convolvulus andinus* Phil., *Convolvulus demissus* Choisy var. *andinus* (Phil.) Reiche, *Convolvulus demissus* Choisy var. *ovatus* (Phil.) Reiche, *Convolvulus ovatus* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, RME, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 1500-3000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Convolvulus hermanniae L'Hér.

Sinónimos: *Aniseia costata* (Meyen) Walp., *Convolvulus costatus* Meyen, *Convolvulus crenatus* Jacq., *Convolvulus erosus* Desr., *Convolvulus hermanniae* L'Hér. var. *elongatus* Choisy, *Convolvulus hermanniae*

L'Hér. var. *viridis* Meisn., *Convolvulus incanus* Vahl,
Ipomoea hermanniae (L'Hér.) G. Don
Hierba trepadora. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ, VAL, MAU, NUB, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 0-2500 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Convolvulus laciniatus Desr. var. ***hirsutus*** Desr.
Sinónimos: *Convolvulus lasianthus* Cav.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ATA, COQ.
Rango altitudinal: 0-500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Convolvulus laciniatus Desr. var. ***laciniatus***
Sinónimos: *Convolvulus geranioides* Phil., *Ipomoea polymorpha* Riedel ex Meisn. var. *glabra* Griseb.,
Convolvulus laciniatus Desr. var. *peduncularis* Meisn.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ATA, COQ, VAL.
Rango altitudinal: 0-3000 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Cressa

Cressa truxillensis Kunth
Sinónimos: *Cressa australis* R. Br. var. *petiolata* Meisn.,
Cressa cretica L. var. *truxillensis* (Kunth) Choisy
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ, RME.
Rango altitudinal: 0-2000 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Cuscuta

Cuscuta andina Phil.
Sinónimos: *Cuscuta racemosa* Mart. var. *andina* (Phil.) Reiche
Hierba parásita. Anual. Nativa.
Distribución: MAU.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Cabello de ángel.

Cuscuta campestris Yunck.
Hierba parásita. Anual. Introducida.
Distribución: TAR, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.

Cuscuta chilensis Ker Gawl.
Sinónimos: *Cuscuta aurea* Phil.
Hierba parásita. Anual. Nativa.
Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.
Rango altitudinal: 1000-2300 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Cabello de ángel, cúscura.

Cuscuta epithymum (L.) Murray ex L. var. ***angustissima*** (Engelm.) Yunck.
Hierba parásita. Anual. Introducida.
Distribución: RME, ARA.

Cuscuta micrantha Choisy var. ***holwayi*** Yunck.
Hierba parásita. Anual. Endémica.
Distribución: MAU.
Nombre vulgar: Cabello de ángel.

Cuscuta micrantha Choisy var. ***latiflora*** Engelm.
Hierba parásita. Anual. Endémica.
Distribución: ATA.
Rango altitudinal: 10-200 m.
Nombre vulgar: Cabello de ángel.

Cuscuta micrantha Choisy var. ***micrantha***
Sinónimos: *Cuscuta micrantha* Choisy var. *typica* Yunck., nom. illeg.
Hierba parásita. Anual. Endémica.
Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, BIO.
Rango altitudinal: 3000 m.
Nombre vulgar: Cabello de ángel.

Cuscuta microstyla Engelm. var. ***bicolor*** (Hunz.) Hunz.
Sinónimos: *Cuscuta bicolor* Hunz.
Hierba parásita. Anual. Nativa.
Distribución: RME.
Rango altitudinal: 2000-2500 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Cabello de ángel.

Cuscuta microstyla Engelm. var. ***microstyla***
Sinónimos: *Cuscuta microstyla* Engelm. var. *typica* Hunz., nom. illeg.
Hierba parásita. Anual. Endémica.

Distribución: RME, BIO.
Rango altitudinal: 1600-3100 m.
Nombre vulgar: Cabello de ángel.

Cuscuta odorata Ruiz & Pav.
Hierba parásita. Anual. Nativa.
Distribución: ANT, ATA, COQ, LBO.
Rango altitudinal: 600-1500 m.
Países limítrofes: Bolivia y Perú.
Nombre vulgar: Cabello de ángel.

Cuscuta pauciflora Phil.
Hierba parásita. Anual. Nativa.
Distribución: MAU, LRI.
Rango altitudinal: 0-500 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Cabello de ángel.

Cuscuta purpurata Phil.
Hierba parásita. Anual. Endémica.
Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ.
Rango altitudinal: 0-300 m.
Nombre vulgar: Cabello de ángel.

Cuscuta pusilla Phil.
Hierba parásita. Anual. Endémica.
Distribución: LLA.
Nombre vulgar: Cabello de ángel.

Cuscuta rustica Hunz.
Hierba parásita. Anual. Endémica.
Distribución: COQ.
Rango altitudinal: 4000 m.
Nombre vulgar: Cabello de ángel.

Cuscuta suaveolens Ser.
Sinónimos: *Cuscuta racemosa* Mart. var. *chiliana* Engelm., *Cuscuta floribunda* Phil.
Hierba parásita. Anual. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.
Rango altitudinal: 0-2500 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Cabello de ángel.

Cuscuta werdermannii Hunz.
Hierba parásita. Anual. Endémica.

Distribución: COQ.
Rango altitudinal: 300 m.
Nombre vulgar: Cabello de ángel.

Dichondra

Dichondra microcalyx (Hallier f.) Fabris
Sinónimos: *Dichondra repens* J.R. Forst. & G. Forst.
var. *microcalyx* Hallier f., *Dichondra repens* auct. non
J.R. Forst. & G. Forst., *Dichondra sericea* Sw. var.
microcalyx (Hallier f.) H.T. Buck
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ, ARA.
Rango altitudinal: 0-900 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Dichondra sericea Sw. var. ***holosericea*** (O'Donell)
Fabris
Sinónimos: *Dichondra repens* J.R. Forst. & G. Forst.
var. *holosericea* O'Donell
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ, VAL, MAU, NUB, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 0-1000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Dichondra sericea Sw. var. ***sericea***
Sinónimos: *Dichondra repens* J.R. Forst. & G. Forst.
var. *sericea* (Sw.) Choisy, *Dichondra parviflora* Meisn.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO,
MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, JFE.
Rango altitudinal: 0-500 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Evolvulus

Evolvulus sericeus Sw. var. ***elongatus*** (Choisy)
O'Donell
Sinónimos: *Evolvulus incanus* Pers. var. *elongatus*
Choisy, *Leucomalla lanuginosa* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: RME.
Rango altitudinal: 0-2000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Evolvulus sericeus Sw. var. ***sericeus***
Sinónimos: *Evolvulus araucanus* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: BIO.
Rango altitudinal: 0-3500 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Ipomoea

Ipomoea dumetorum Willd. ex Roem. & Schult.
Sinónimos: *Convolvulus dumetorum* Kunth, *Convolvulus pauciflorus* Roem. & Schult., *Convolvulus pauciflorus* Roem. & Schult. var. *chilensis* (A. Braun & Bouché) Kuntze, *Ipomoea chilensis* A. Braun & Bouché, *Ipomoea paposana* Phil.
Hierba trepadora. Perenne. Nativa.
Distribución: ANT.
Rango altitudinal: 900-3000 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Ipomoea indica (Burm. f.) Merr.
Hierba trepadora. Perenne. Introducida.
Distribución: JFE.
Rango altitudinal: 0-1000 m.
Nota: Introducida en el Archipiélago de Juan Fernández.

Ipomoea pes-caprae (L.) R. Br.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: IPA.
Nombre vulgar: Tanoa, tano'a.

Ipomoea purpurea (L.) Roth
Sinónimos: *Convolvulus purpureus* L.
Hierba trepadora. Anual. Introducida.
Distribución: VAL, RME.
Rango altitudinal: 0-2000 m.

CORIARIACEAE

Coriaria

Coriaria ruscifolia L.
Arbusto. Nativo.
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.
Rango altitudinal: 500-1600 m.
Países limítrofes: Argentina y Perú.
Nombre vulgar: Deu, huique, huiqui, matarratones.

CRASSULACEAE

Crassula

Crassula closiana (Gay) Reiche
Sinónimos: *Tillaea closiana* Gay
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO.
Rango altitudinal: 0-700 m.
Países limítrofes: Bolivia y Perú.

Crassula connata (Ruiz & Pav.) A. Berger var. *connata*
Sinónimos: *Crassula erecta* (Hook. & Arn.) Berger, *Tillaea connata* Ruiz & Pav., *Tillaeae erecta* Hook. & Arn., *Tillaeae minima* Gay
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, LLA.
Rango altitudinal: 0-3300 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Crassula connata (Ruiz & Pav.) A. Berger var. *erectoides* M. Bywater & Wickens
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: VAL, RME, MAU.
Nota: Presente en Arizona, California y México.

Crassula connata (Ruiz & Pav.) A. Berger var. *muscooides* M. Bywater & Wickens
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: LLA.

Crassula decumbens Thunb.
Sinónimos: *Crassula ovallei* (Phil.) Reiche, *Crassula radicans* (Phil.) Reiche, *Tillaea ovallei* Phil., *Tillaea radicans* Phil., *Tillaea rencana* Phil.
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: VAL, RME, LBO.

Crassula drummondii (Torr. & A. Gray) Fedde
Sinónimos: *Tillaea drummondii* Torr. & A. Gray
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: RME, MAU.

Rango altitudinal: 0-3000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Crassula moschata* G. Forst.**

Sinónimos: *Bulliarda magellanica* DC., nom. nud., *Crassula magellanica* (Willd. ex Schult.) Macloskie, *Tillaea magellanica* Willd. ex Schult., *Tillaea moschata* (G. Forst.) DC., *Tillaea chiloensis* Gay

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-100 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Crassula peduncularis* (Sm.) F. Meigen**

Sinónimos: *Crassula paludosa* (Schltdl.) Reiche, *Tillaea paludosa* Schltdl. ex Lechl., nom. nud., *Tillaea peduncularis* Sm.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 0-2500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Crassula solieri* (Gay) F. Meigen**

Sinónimos: *Tillaea solieri* Gay, *Tillaea andicola* Phil., *Crassula andicola* (Phil.) Meigen

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: RME, MAU, NUB, BIO.

Rango altitudinal: 100-500 m.

Nota: También en Norteamérica.

***Crassula tillaea* Lest.-Garl.**

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO.

Sedum

***Sedum acre* L.**

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: ARA, LLA, AIS, MAG.

CUCURBITACEAE

Sicyos

Sicyos baderoa* Hook. & Arn. var. *ambrosianus

(Skottsb.) Martic. & Quezada

Sinónimos: *Sicyos bryoniaefolius* Moris var. *ambrosianus* Skottsb.

Hierba trepadora. Anual. Endémica.

Distribución: IDE.

Rango altitudinal: 400-500 m.

Sicyos baderoa* Hook. & Arn. var. *baderoa

Sinónimos: *Sicyos bryoniaefolius* Moris

Hierba trepadora. Anual. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, JFE.

Rango altitudinal: 0-900 m.

Países limítrofes: Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Brionia, calabacillo, tupac-llanco.

CUNONIACEAE

Caldcluvia

***Caldcluvia paniculata* (Cav.) D. Don**

Sinónimos: *Weinmannia paniculata* Cav., *Dieterica paniculata* (Cav.) Ser. ex A. DC., *Caldcluvia paniculata* (Cav.) D. Don var. *mochaena* Kunke, *Weinmannia corymbosa* Ruiz & Pav., *Weinmannia chilensis* DC.

Árbol. Nativo.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Tiaca, triaca, quiaca.

Eucryphia

***Eucryphia cordifolia* Cav.**

Sinónimos: *Pellinia cordifolia* (Cav.) Molina

Árbol. Nativo.

Distribución: BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Ulmo, muermo.

***Eucryphia glutinosa* (Poepp. & Endl.) Baill.**

Sinónimos: *Eucryphia pinnatifolia* Gay, *Fagus glutinosa* Poepp. & Endl., *Eucryphia glandulosa* Reiche
Arbusto o árbol pequeño. Endémico.
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 125-1400 m.
Nombre vulgar: Guindo santo.

Weinmannia

Weinmannia trichosperma Cav.
Sinónimos: *Weinmannia dentata* Ruiz & Pav.,
Windmannia trichosperma (Cav.) Kuntze
Árbol. Nativo.
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS,
MAG.
Rango altitudinal: 0-1000 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Tineo, palo santo, teñiu, tinel, maden.

DROSERACEAE

Drosera

Drosera uniflora Willd.
Sinónimos: *Drosera macloviana* Gand.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-600 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Atrapa-moscas.

ELAEOCARPACEAE

Aristotelia

Aristotelia chilensis (Molina) Stuntz
Sinónimos: *Aristotelia glandulosa* Ruiz & Pav., nom.
illeg., *Aristotelia macqui* L'Hér., *Aristotelia macqui* L'Hér. var. *alpestris* Reiche, *Aristotelia macqui* L'Hér.
var. *andina* Phil., *Cornus chilensis* Molina, *Aristotelia glabra* Miers
Arbusto o árbol pequeño. Nativo.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB,
BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, JFE.

Rango altitudinal: 0-1500 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Maqui, clon.
Nota: Introducida en el Archipiélago de Juan Fernández.

Crinodendron

Crinodendron hookerianum Gay
Sinónimos: *Tricuspidaria hookeriana* (Gay) A. Cunn.,
Tricuspidaria lanceolata Miq., *Crinodendron eriocladium* Gand.
Árbol. Endémico.
Distribución: ARA, LRI, LLA.
Rango altitudinal: 0-1100 m.
Nombre vulgar: Chaquihue, chequehue, polizón, olivillo.

Crinodendron patagua

Molina
Sinónimos: *Tricuspidaria dependens* Ruiz & Pav.,
Crinodendron dependens (Ruiz & Pav.) Kuntze,
Tricuspidaria hexapetala Turcz., *Tricuspidaria patagua* (Molina) Miers
Árbol. Endémico.
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, JFE.
Rango altitudinal: 0-1800 m.
Nombre vulgar: Patagua, patahua.
Nota: Introducida en el Archipiélago de Juan Fernández.

ELATINACEAE

Elatine

Elatine triandra Schkuhr
Sinónimos: *Elatine chilensis* Naudin, *Elatine nivalis* Speg., *Elatine hydropiper* L. var. *triandra* (Schkuhr) Fiori
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI,
LLA.
Rango altitudinal: 0-1000 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.
Nombre vulgar: Yerbilla, hierbilla.

ERICACEAE

Empetrum

***Empetrum rubrum* Vahl ex Willd.**

Sinónimos: *Empetrum nigrum* L. var. *andinum* DC., *Empetrum maclovianum* Gand.

Subarbusto. Nativo.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.

Rango altitudinal: 0-3650 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Brecillo, murtilla de Magallanes.

Gaultheria

***Gaultheria antarctica* Hook.f.**

Sinónimos: *Pernettya serpyllifolia* (Lam.) DC., *Arbutus serpyllifolia* Lam., *Gaultheria microphylla* Hook.f., *Gaultheria serpyllifolia* (Lam.) Skottsb., *Pernettya hookeri* Nied.

Subarbusto. Nativo.

Distribución: LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Gaultheria caespitosa* Poepp. & Endl.**

Sinónimos: *Pernettya minima* Phil., *Gaultheria minima* (Phil.) Sandwith

Arbusto o subarbusto. Nativo.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 1500-2500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Gaultheria insana* (Molina) D.J. Middleton**

Sinónimos: *Hippomanica insana* Molina, *Pernettya furiens* (Hook. & Arn.) Klotzsch, *Pernettya insana* (Molina) Gunckel, *Gaultheria furiens* (Hook. & Arn.) Hook. & Arn., *Arbutus furiens* Hook. & Arn., *Arbutus punctata* Hook. & Arn., *Gaultheria punctata* (Hook. & Arn.) Hook. & Arn., *Pernettya punctata* (Hook. & Arn.) Klotzsch, *Arbutus vernalis* Poepp. & Endl., *Gaultheria vernalis* (Poepp. & Endl.) Kunze, *Pernettya vernalis* (Poepp. & Endl.) Phil., *Pernettya melanocarpa* Phil.

Arbusto. Nativo.

Distribución: ANT, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-600 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Hued-hued.

***Gaultheria linifolia* (Phil.) Teillier & R.A. Rodr.**

Sinónimos: *Pernettya linifolia* Phil., *Pernettya mucronata* (L.f.) Gaudich. ex Spreng. var. *linifolia* (Phil.) Reiche, *Pernettya prostrata* (Cav.) DC. var. *linifolia* (Phil.) Sleumer, *Pernettya myrtilloides* Zucc. ex Steud. var. *linifolia* (Phil.) Kausel, *Pernettya poeppigii* (DC.) Klotzsch var. *linifolia* (Phil.) Sleumer, *Gaultheria poeppigii* DC. var. *linifolia* (Phil.) D.J. Middleton

Arbusto. Endémico.

Distribución: ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 65-1280 m.

***Gaultheria marticorenae* Teillier & P.W. Fritsch**

Sinónimos: *Pernettya angustifolia* Lindl., *Pernettya mucronata* (L.f.) Gaudich. ex Spreng. var. *angustifolia* (Lindl.) Reiche, *Gaultheria mucronata* (L.f.) Hook. var. *angustifolia* (Lindl.) D.J. Middleton, *Pernettya leucocarpa* DC. var. *linearis* Reiche, *Gaultheria angustifolia* (Lindl.) Teillier

Arbusto. Nativo.

Distribución: COQ, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 10-1300 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Chaura.

***Gaultheria mucronata* (L.f.) Hook. & Arn.**

Sinónimos: *Gaultheria mucronata* (L.f.) Hook. & Arn. var. *microphylla* (Hombr.) D.J. Middleton, *Pernettya mucronata* (L.f.) Gaudich. ex Spreng. var. *microphylla* Decne., *Pernettya mucronata* (L.f.) Gaudich. ex Spreng., *Pernettya mucronata* (L.f.) Gaudich. ex Spreng. var. *parvifolia* (Phil.) Skottsb., *Pernettya rupicola* Phil., *Arbutus mucronata* L.f., *Arbutus rigida* Banks & Sol. ex Hook.f., *Pernettya ovalifolia* Hombr. & Jacq., *Pernettya oblongifolia* Hombr. & Jacq., *Pernettya mucronata* DC. var. *rupicola* (Phil.) Reiche, *Pernettya litoralis* Phil., *Gaultheria myrtilloides* Hook. & Arn. var. *minor* Hook. & Arn., *Pernettya parvifolia* Phil.

Arbusto. Nativo.

Distribución: LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-1100 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Chaura.

***Gaultheria nubigena* (Phil.) B.L. Burtt & Sleumer**

Sinónimos: *Pernettya nubigena* Phil.

Arbusto. Nativo.

Distribución: ARA, LLA.

Rango altitudinal: 1000-1500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Gaultheria phillyreifolia* (Pers.) Sleumer**

Sinónimos: *Pernettya palenae* Phil., *Pernettya philippii* Gand., *Pernettya phillyreifolia* (Pers.) DC., *Arbutus phillyreifolia* Pers., *Gaultheria florida* Phil., *Gaultheria myrtilloides* Hook. & Arn., *Gaultheria phillyreifolia* (Pers.) Sleumer var. *florida* (Phil.) Kausel, *Gaultheria lanceolata* Phil., *Gaultheria myrtilloides* Hook. & Arn. var. *racemosa* Phil. ex Reiche

Arbusto. Nativo.

Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-1500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Chaura.

***Gaultheria poeppigii* DC.**

Sinónimos: *Gaultheria poeppigii* DC. var. *nana* (Sleumer) D.J. Middleton, *Pernettya myrtilloides* Zucc. ex Steud. var. *myrtilloides*, *Pernettya myrtilloides* Zucc. ex Steud. var. *nana* (Sleumer) Sleumer, *Pernettya poeppigii* (DC.) Klotzsch, *Gaultheria myrtilloides* Poepp. & Endl., nom. illeg., *Pernettya poeppigii* (DC.) Klotzsch var. *nana* Sleumer, *Pernettya buxifolia* Phil., *Pernettya leucocarpa* DC. var. *buxifolia* (Phil.) Reiche, *Pernettya phillyreifolia* (Pers.) DC. var. *araucana* Kuntze

Arbusto. Nativo.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 0-2500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Chaura, chal, cheúkk, gus, amain-ngush.

***Gaultheria pumila* (L.f.) D.J. Middleton var. *leucocarpa* (DC.) D.J. Middleton**

Sinónimos: *Gaultheria pumila* (L.f.) D.J. Middleton var. *crassifolia* (Phil.) D.J. Middleton, *Pernettya pumila* (L.f.) Hook. var. *crassifolia* (Phil.) Sleumer, *Pernettya pumila* (L.f.) Hook. var. *leucocarpa* (DC.) Kausel, *Pernettya breviflora* Phil., *Pernettya crassifolia* Phil., *Pernettya empetrifolia* (Lam.) Gaudich. var. *leucocarpa* (DC.) Wedd., *Pernettya leucocarpa* DC., *Pernettya trinervia* Gand., *Pernettya leucocarpa* DC. var. *gayana* DC., *Pernettya gayana* (DC.) Decne.

Arbusto. Nativo.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 600-3200 m.

Países limítrofes: Argentina.

Gaultheria pumila* (L.f.) D.J. Middleton var. *pumila

Sinónimos: *Pernettya pumila* (L.f.) Hook., *Arbutus pumila* L.f., *Arbutus empetrifolia* Lam., *Pernettya empetrifolia* (Lam.) Gaudich., *Pernettya pumila* (L.f.) Hook. var. *empetrifolia* (Lam.) Hook.f.

Arbusto. Nativo.

Distribución: LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Chaura, chal, chan ámain.

***Gaultheria racemulosa* (DC.) D.J. Middleton**

Sinónimos: *Pernettya rigida* (Bertero ex Colla) DC., *Pernettya mucronata* (L.f.) Gaudich. ex Spreng. var. *mutica* Hook. & Arn., *Pernettya bridgesii* Phil., *Pernettya racemulosa* DC.

Arbusto. Endémico.

Distribución: JFE.

Rango altitudinal: 100-1400 m.

Nombre vulgar: Murtillo de Juan Fernández.

***Gaultheria renjifoana* Phil.**

Arbusto. Endémico.

Distribución: BIO.

Rango altitudinal: 10-175 m.

Nombre vulgar: Chaura de Laraquete.

***Gaultheria tenuifolia* (Phil.) Sleumer**

Sinónimos: *Pernettya elegans* Phil., *Pernettya reticulata* Phil., *Pernettya tenuifolia* Phil., *Gaultheria tenuifolia* (Phil.) Sleumer var. *elegans* (Phil.) Kausel, *Pernettya promaucana* Phil., *Gaultheria elegans* (Phil.) Reiche, *Gaultheria salicifolia* Phil., *Gaultheria tenuifolia* (Phil.) Sleumer var. *promaucana* (Phil.) Kausel

Arbusto. Nativo.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.

Rango altitudinal: 500-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Lebetanthus

***Lebetanthus myrsinites* (Lam.) Dusén**

Sinónimos: *Prionotes americana* Hook., *Lebetanthus americanus* (Hook.) Endl., *Jacquinotia myrsinoides* Hombr. & Jacq., *Jacquinotia prostrata* Hombr. & Jacq., *Jacquinotia volubilis* Hombr. & Jacq., *Prionotes myrsinoides* (Lam.) Skottsb.
Subarbusto epífito o terrestre. Nativo.
Distribución: LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-735 m.
Países limítrofes: Argentina.

ESCALLONIACEAE

Escallonia

Escallonia alpina Poepp. ex DC. var. *alpina*
Sinónimos: *Escallonia araucana* Phil., *Escallonia fonckii* Phil., *Escallonia fonckii* Phil. var. *araucana* (Phil.) Reiche, *Escallonia alpina* Poepp. ex DC. var. *glaberrima* Phil., *Escallonia sparsiflora* Phil.
Arbusto. Nativo.
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 200-2300 m.
Países limítrofes: Argentina.

Escallonia alpina Poepp. ex DC. var. *carmelitana* (Meyen) Acevedo & Kausel
Sinónimos: *Escallonia carmelitana* Meyen, *Escallonia flavescentia* C. Presl
Arbusto. Nativo.
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, MAG.
Rango altitudinal: 0-3000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Escallonia alpina Poepp. ex DC. var. *glabrata* (Phil.) Sleumer
Sinónimos: *Escallonia glabrata* Phil.
Arbusto. Endémico.
Distribución: NUB, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 600-2000 m.

Escallonia angustifolia C. Presl
Sinónimos: *Escallonia coquimbensis* J. Remy, *Escallonia angustifolia* C. Presl var. *coquimbensis* (J. Remy) Acevedo & Kausel, *Escallonia coquimbensis* J. Remy var. *salicifolia* Reiche

Arbusto o árbol pequeño. Nativo.
Distribución: AYP, TAR, ATA, COQ, MAU.
Rango altitudinal: 0-3300 m.
Países limítrofes: Argentina y Perú.
Nombre vulgar: Ñipa, q'ero.

Escallonia callcottiae Hook. & Arn.

Sinónimos: *Escallonia callcottiae* Hook. & Arn. var. *fernandeziana* (Phil.) Engl., *Escallonia rubricaulis* Colla, *Escallonia fernandeziana* Phil.
Arbusto o árbol pequeño. Endémico.
Distribución: JFE.
Rango altitudinal: 0-800 m.

Escallonia florida Poepp. ex DC.

Arbusto. Endémico.
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 500-2000 m.
Nombre vulgar: Sauco cimarrón.

Escallonia gayana Acevedo & Kausel

Arbusto. Endémico.
Distribución: BIO, ARA, LLA.
Rango altitudinal: 0-400 m.

Escallonia illinita C. Presl var. *illinita*

Sinónimos: *Escallonia glandulosa* Lodd. non Sm., *Escallonia rubra* Bertero non Ruiz & Pav., *Escallonia grahamiana* Hook. & Arn., *Escallonia viscosa* Forbes
Arbusto. Endémico.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO.
Rango altitudinal: 0-3000 m.
Nombre vulgar: Corontillo, ñipa, barraco, siete camisas.

Escallonia illinita C. Presl var. *pubicalycina* Briq.

Sinónimos: *Escallonia illinita* C. Presl var. *stenopetala* (Kunze) Acevedo & Kausel, *Escallonia stenopetala* Kunze, *Escallonia illinita* C. Presl var. *beta* Hook. & Arn.
Arbusto. Endémico.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 100-3000 m.

Escallonia leucantha J. Remy

Sinónimos: *Escallonia bellidifolia* Phil., *Escallonia pycnantha* Briq., *Escallonia modesta* Briq.

Arbusto. Nativo.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 0-1500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Luncillo, siete camisas.

***Escallonia myrtoidea* Bertero ex DC.**

Sinónimos: *Escallonia arguta* C. Presl, *Escallonia reflexa* Gillies, *Escallonia andina* Phil., *Escallonia illinita* C. Presl var. *andina* (Phil.) Reiche, *Escallonia claudii* Killip, *Escallonia microcarpa* Gillies ex Hook. & Arn., nom. nud.

Arbusto o árbol pequeño. Nativo.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO.

Rango altitudinal: 100-3000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Luncalun.

***Escallonia pulverulenta* (Ruiz & Pav.) Pers. var. *glabra* Engl.**

Sinónimos: *Escallonia resinosa* auct. non Ruiz & Pav., *Escallonia berteriana* DC., *Escallonia resiniflua* Walp., *Escallonia pulverulenta* (Ruiz & Pav.) Pers. var. *berteriana* (DC.) Pamp., *Escallonia pulverulenta* (Ruiz & Pav.) Pers. var. *resiniflua* (Walp.) Pamp.

Arbusto o árbol pequeño. Endémico.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO.

Rango altitudinal: 0-1300 m.

Nombre vulgar: Corontillo, mardoño.

Escallonia pulverulenta* (Ruiz & Pav.) Pers. var. *pulverulenta

Sinónimos: *Stereoxylon pulverulentum* Ruiz & Pav., *Escallonia spinulosa* Kunth ex Engl., nom. nud.

Arbusto o árbol pequeño. Endémico.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 0-2000 m.

Nombre vulgar: Corontillo, mardoño.

***Escallonia revoluta* (Ruiz & Pav.) Pers.**

Sinónimos: *Stereoxylon revolutum* Ruiz & Pav., *Escallonia thyrsoides* Bertero, nom. nud., *Escallonia*

hirsuta C. Presl, *Escallonia affinis* Rupr. ex A. Gray, nom. nud.

Árbol. Endémico.

Distribución: COQ, VAL, RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.

Rango altitudinal: 0-1800 m.

Nombre vulgar: Lun, siete camisas.

***Escallonia rosea* Griseb.**

Sinónimos: *Escallonia pterocladi* Hook., *Escallonia rupestris* Phil., *Escallonia chonotica* Phil., *Escallonia montana* Phil., *Escallonia longidens* Phil., *Escallonia rosea* Griseb. var. *rupestris* (Phil.) Reiche

Arbusto. Nativo.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-1500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Siete camisas, siete camisas colorado.

***Escallonia rubra* (Ruiz & Pav.) Pers. var. *dumetorum* (Phil.) Acevedo & Kausel**

Sinónimos: *Escallonia berberifolia* auct. non (Humb. & Bonpl.) Kunth, *Escallonia dumetorum* Phil.

Arbusto. Nativo.

Distribución: ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 0-1300 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Escallonia rubra* (Ruiz & Pav.) Pers. var. *glutinosa* (Phil.) Reiche**

Sinónimos: *Escallonia glutinosa* Phil.
Arbusto. Endémico.

Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO.

Rango altitudinal: 100-2100 m.

***Escallonia rubra* (Ruiz & Pav.) Pers. var. *macrantha* (Hook. & Arn.) Reiche**

Sinónimos: *Escallonia macrantha* Hook. & Arn.
Arbusto. Endémico.

Distribución: NUB, ARA, LRI, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Escallonia rubra* (Ruiz & Pav.) Pers. var. *rubra

Sinónimos: *Stereoxylon rubrum* Ruiz & Pav., *Escallonia poeppigiana* DC., *Escallonia poeppigiana* DC. var. *longifolia* DC., *Escallonia punctata* DC., *Escallonia duplicato-serrata* J. Remy, *Escallonia littoralis* Phil.,

Escallonia littoralis Phil. var. *concinna* (Phil.) Reiche,
Escallonia concinna Phil., *Escallonia macrantha* Hook.
& Arn. var. *duplicato-serrata* (J. Remy) Engl.,
Escallonia rubra (Ruiz & Pav.) Pers. var. *punctata*
(DC.) Hook.f., *Escallonia rahmeri* Phil., *Escallonia
rubra* (Ruiz & Pav.) Pers. var. *glabriuscula* Hook. &
Arn., *Escallonia rubra* (Ruiz & Pav.) Pers. var. *uniflora*
Poepp. & Endl., *Escallonia rubra* (Ruiz & Pav.) Pers.
var. *multiflora* Poepp. & Endl., *Escallonia commutata*
Regel

Arbusto. Nativo.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB,
BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-2300 m.

Países limítrofes: Argentina.

NOMBRE vulgar: Ñipa, siete camisas colorado, möki,
müki.

Escallonia rubra (Ruiz & Pav.) Pers. var.

thalassica Kausel

Arbusto. Endémico.

Distribución: COQ, VAL, RME, MAU.

Rango altitudinal: 0-400 m.

Escallonia serrata Sm.

Sinónimos: *Celastrus venustus* Banks & Sol. ex Hook.f.,
Stereoxylon serratum (Sm.) Poir.

Arbusto. Nativo.

Distribución: LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-400 m.

Países limítrofes: Argentina.

Escallonia virgata (Ruiz & Pav.) Pers.

Sinónimos: *Stereoxylon virgatum* Ruiz & Pav.,
Escallonia stricta J. Remy, *Escallonia patagonica*
Gand., *Escallonia virgata* (Ruiz & Pav.) Pers. var.
philippiana Engl., *Escallonia virgata* (Ruiz & Pav.)
Pers. var. *pavoniana* Pamp., *Escallonia philippiana*
(Engl.) Mast., *Escallonia stenophylla* Phil., *Escallonia
angustifolia* Phil.

Arbusto. Nativo.

Distribución: RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA,
AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-3000 m.

Países limítrofes: Argentina.

NOMBRE vulgar: Mata negra, meki.

Tribeles

Tribeles australis Phil.

Sinónimos: *Chalepoa magellanica* Hook.f., *Tribeles
philippii* Macloskie

Subarbusto. Nativo.

Distribución: LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Valdivia

Valdivia gayana J. Remy

Sinónimos: *Valdivia gayana* Remy var. *hollermayeri*
Gunckel, *Valdivia gayana* Remy var. *robusta* Gunckel
Subarbusto. Endémico.

Distribución: LRI.

Rango altitudinal: 0-300 m.

EUPHORBIACEAE

Adenopeltis

Adenopeltis serrata (W.T. Aiton) I.M. Johnst.

Sinónimos: *Excoecaria marginata* (Baill.) Griseb.,
Adenopeltis colliguaya Bertero ex A. Juss., *Excoecaria
serrata* W.T. Aiton, *Excoecaria colliguaya* (Bertero ex
A. Juss.) Baill., *Stillingia glandulosa* Dombey ex Baill.
Arbusto. Endémico.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB,
BIO.

Rango altitudinal: 5-900 m.

NOMBRE vulgar: Colliguay macho, lechón.

Avellanita

Avellanita bustillosii Phil.

Arbusto. Endémico.

Distribución: VAL, RME, LBO.

Rango altitudinal: 300-800 m.

NOMBRE vulgar: Avellanita.

Chiropetalum

Chiropetalum berterianum Schltdl. var.
berterianum

Sinónimos: *Argythamnia berteriana* (Schltdl.) Müll.

Arg., *Chiropetalum berterianum* Schltdl. fma.

macrantha Skottsb.

Subarbusto. Endémico.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, ARA.

Rango altitudinal: 200-1800 m.

***Chiropetalum berterianum* Schltdl. var.**

psiladenium Skottsb.

Sinónimos: *Argythamnia berteriana* (Schltdl.) Müll.

Arg. var. *psiladenia* (Skottsb.) J.W. Ingram

Subarbusto. Endémico.

Distribución: ATA, COQ, VAL.

Rango altitudinal: 600 m.

***Chiropetalum canescens* Phil.**

Sinónimos: *Argythamnia canescens* (Phil.) F. Phil.,

Argythamnia sponiella Müll. Arg., *Chiropetalum gigouxi* Espinosa, *Chiropetalum sponiella* (Müll. Arg.) Pax

Subarbusto. Endémico.

Distribución: ANT, ATA.

Rango altitudinal: 0-200 m.

***Chiropetalum cremnophilum* I.M. Johnst.**

Sinónimos: *Argythamnia cremnophila* (I.M. Johnst.)

J.W. Ingram

Subarbusto. Endémico.

Distribución: ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 200 m.

***Chiropetalum tricuspidatum* (Lam.) A. Juss.**

Sinónimos: *Croton tricuspidatus* Lam., *Argythamnia tricuspidata* (Lam.) Müll. Arg. var. *lanceolata* (Cav.)

Müll. Arg., *Chiropetalum lanceolatum* (Cav.) A. Juss., *Croton lanceolatum* Cav., *Chiropetalum tricuspidatum* (Lam.) A. Juss. var. *lanceolatum* (Cav.) Pax & K.

Hoffm., *Chiropetalum ovatum* Phil., *Argythamnia tricuspidata* (Lam.) Müll. Arg.

Subarbusto. Nativo.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.

Rango altitudinal: 0-1500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Ventosilla.

Colliguaja

***Colliguaja dombeyana* A. Juss.**

Arbusto. Endémico.

Distribución: COQ, RME, LBO, MAU, NUB, BIO.

Rango altitudinal: 0-2700 m.

Nombre vulgar: Colliguay.

***Colliguaja integrerrima* Gillies & Hook.**

Arbusto. Nativo.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 500-1500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Colliguay.

***Colliguaja odorifera* Molina**

Sinónimos: *Colliguaja triquetra* Gillies & Hook.,

Colliguaja obtusa Regel, *Croton colliguay* Molina

Arbusto. Endémico.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, BIO.

Rango altitudinal: 0-1300 m.

Nombre vulgar: Colliguay.

***Colliguaja salicifolia* Gillies & Hook.**

Sinónimos: *Colliguaja dombeyana* Gay, nom. illeg.

Arbusto. Endémico.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, BIO.

Rango altitudinal: 200-1800 m.

Nombre vulgar: Colliguay.

Croton

***Croton chilensis* Müll. Arg.**

Arbusto. Endémico.

Distribución: ANT.

Rango altitudinal: 300-800 m.

Nombre vulgar: Higuerilla.

***Croton setiger* Hook.**

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: VAL, RME, MAU, BIO.

Dysopsis

***Dysopsis glechomoides* (A. Rich.) Müll. Arg.**

Sinónimos: *Hydrocotyle glechomoides* A. Rich.,
Dysopsis gayana Baill., *Dysopsis glechomoides* (A. Rich.) Müll. Arg. var. *genuina* Müll. Arg., *Molina chilensis* Gay
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-1300 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Dysopsis hirsuta (Müll. Arg.) Skottsb.
Sinónimos: *Dysopsis glechomoides* (A. Rich.) Müll. Arg. var. *hirsuta* Müll. Arg.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: JFE.
Rango altitudinal: 200-740 m.

Euphorbia

Euphorbia amandi Oudejans
Sinónimos: *Euphorbia ovalifolia* (Klotzsch & Garcke) Boiss. var. *dentata* R.E. Fr.
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT.
Rango altitudinal: 1500-4000 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: J'alpa.

Euphorbia araucana Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ARA.

Euphorbia besseri (Klotzsch & Garcke) Boiss.
Sinónimos: *Anisophyllum besseri* Klotzsch & Garcke
Hierba. Perenne. Endémica.
Nota: Distribución desconocida.

Euphorbia collina Phil. var. *andina* (Phil.) Subils
Sinónimos: *Euphorbia andina* Phil., *Euphorbia dasyclada* Dusén, *Euphorbia portulacoides* L. var. *andensis* Croizat
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAU, ARA, MAG.
Rango altitudinal: 500-1000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Euphorbia collina Phil. var. *collina*

Sinónimos: *Euphorbia portulacoides* L. subsp. *collina* (Phil.) Croizat
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, MAG.
Rango altitudinal: 0-3100 m.
Países limítrofes: Argentina.

Euphorbia collina Phil. var. *minor* (Hicken) Subils
Sinónimos: *Euphorbia portulacoides* L. var. *minor* Hicken
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAG.
Rango altitudinal: 2000-2500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Euphorbia collina Phil. var. *spathulata* (Chodat & Wilczek) Subils
Sinónimos: *Euphorbia portulacoides* L. var. *spathulata* Chodat & Wilczek
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AIS.
Rango altitudinal: 0-2500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Euphorbia copiapina Phil.
Sinónimos: *Euphorbia calderensis* Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ANT, ATA.
Rango altitudinal: 20-1200 m.

Euphorbia cyathophora Murray
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: ANT.

Euphorbia elquiensis Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ATA, COQ.
Rango altitudinal: 930-2230 m.

Euphorbia engelmannii Boiss.
Sinónimos: *Euphorbia rotundifolia* Hook. & Arn., nom. illeg., *Euphorbia hortensis* Engelm. ex Boiss., nom. nud., *Euphorbia engelmannii* Boiss. var. *depressa* Boiss., *Euphorbia inclinata* Boiss., nom. nud., *Chamaesaracha engelmannii* (Boiss.) Soják
Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO.
Rango altitudinal: 900-2000 m.

***Euphorbia falcata* L.**

Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: RME.

***Euphorbia germainii* Phil.**

Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: COQ, RME.
Rango altitudinal: 1600-3200 m.

***Euphorbia helioscopia* L.**

Hierba. Anual o bienal. Introducida.
Distribución: TAR, ATA, COQ, VAL, RME, BIO, ARA, LLA.

***Euphorbia hirta* L.**

Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: AYP, TAR, IPA.

***Euphorbia hypericifolia* L.**

Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: VAL, IPA.

***Euphorbia klotzschii* Oudejans var. *argentina*
(Müll. Arg. ex Griseb.) Oudejans**

Sinónimos: *Euphorbia ovalifolia* (Klotzsch & Garcke) Boiss. var. *argentina* Müll. Arg. ex Griseb.
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: MAU.
Rango altitudinal: 0-500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Euphorbia klotzschii* Oudejans var. *klotzschii

Sinónimos: *Anisophyllum ovalifolium* Klotzsch & Garcke, *Chamaesyce ovalifolia* (Klotzsch & Garcke) Croizat
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 0-1000 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

***Euphorbia klotzschii* Oudejans var. *schizosepala*
(Engelm. ex Boiss.) Oudejans**

Sinónimos: *Euphorbia ovalifolia* (Klotzsch & Garcke)

Boiss. var. *schizosepala* Engelm. ex Boiss.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Euphorbia lactiflua* Phil.**

Arbusto. Endémico.
Distribución: ANT, ATA.
Rango altitudinal: 0-700 m.
Nombre vulgar: Lechero.

***Euphorbia lathyris* L.**

Hierba. Anual o bienal. Introducida.
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE.

***Euphorbia macraulonia* Phil.**

Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: RME.
Rango altitudinal: 2000-3500 m.

***Euphorbia maculata* L.**

Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO.

***Euphorbia meyeniana* Klotzsch**

Sinónimos: *Chamaesyce meyeniana* (Klotzsch) Croizat
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ATA.
Rango altitudinal: 0-500 m.
Países limítrofes: Bolivia.

***Euphorbia ovaleana* Phil.**

Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ.
Rango altitudinal: 900 m.

***Euphorbia peplus* L.**

Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE, IPA.

***Euphorbia philippiana* (Klotzsch & Garcke) Boiss.**

Sinónimos: *Tithymalus philippianus* Klotzsch & Garcke
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: BIO.
Rango altitudinal: 900-2000 m.

***Euphorbia platyphyllos* L.**

Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO.

***Euphorbia porphyrantha* Phil.**

Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ANT, ATA.
Rango altitudinal: 100-265 m.
Países limítrofes: Perú.

***Euphorbia portulacoides* L.**

Sinónimos: *Euphorbia chilensis* Gay, *Euphorbia portulacoides* L. subsp. *normalis* (Kuntze) Croizat, *Euphorbia portulacoides* L. var. *normalis* Kuntze
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-1700 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

***Euphorbia raphilippii* Oudejans**

Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ.

***Euphorbia serpens* Kunth**

Sinónimos: *Chamaesyce serpens* (Kunth) Small
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT, COQ, VAL, RME, MAU, NUB, BIO, ARA, IPA.
Rango altitudinal: 0-900 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.
Nombre vulgar: Pato (Rapa Nui).
Nota: Introducida en Rapa Nui (Isla de Pascua).

***Euphorbia tarapacana* Phil.**

Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: AYP, TAR, ANT.
Rango altitudinal: 100-1300 m.

***Euphorbia terracina* L.**

Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: VAL.

***Euphorbia thinophila* Phil.**
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ANT, ATA, COQ.
Rango altitudinal: 0-300 m.

***Euphorbia verna* Phil.**
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: BIO.
Rango altitudinal: 0-500 m.

Ficus

***Ficus carica* L.**
Árbol. Introducido.
Distribución: ANT, JFE.
Nombre vulgar: Higuera.

Mercurialis

***Mercurialis annua* L.**
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: ANT, VAL.

Ricinus

***Ricinus communis* L.**
Hierba o subarbusto. Perenne. Introducida.
Distribución: AYP, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, BIO, LLA, JFE, IPA.

FABACEAE

Acacia

***Acacia aroma* Gillies ex Hook. & Arn.**
Arbusto o árbol pequeño. Introducido.
Distribución: AYP, TAR.

***Acacia caven* (Molina) Molina**
Sinónimos: *Acacia cavenia* (Molina) Hook. & Arn., *Acacia farnesiana* (L.) Willd. fma. *cavenia* (Molina) E.C. Clos, *Mimosa cavenia* Molina, *Mimosa caven* Molina, *Vachellia caven* (Molina) Seigler & Ebinger,

Vachellia caven (Molina) Seigler & Ebinger var. *caven* (Molina) Molina, *Vachellia caven* (Molina) Seigler & Ebinger var. *dehiscens* Ciald., *Acacia caven* (Molina) Molina var. *dehiscens* Burkart ex Ciald.

Árbol. Nativo.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.

Rango altitudinal: 0-3000 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Nombre vulgar: Espino.

***Acacia dealbata* Link**

Árbol. Introducido.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE.

Nombre vulgar: Aromo.

***Acacia horrida* (L.) Willd.**

Árbol. Introducido.

Distribución: ATA, RME.

***Acacia karroo* Hayne**

Arbusto o árbol pequeño. Introducido.

Distribución: TAR, RME.

***Acacia macracantha* Humb. & Bonpl. ex Willd.**

Arbusto o árbol pequeño. Nativo.

Distribución: AYP, TAR.

Rango altitudinal: 0-100 m.

Países limítrofes: Bolivia y Perú.

***Acacia melanoxylon* R. Br.**

Árbol. Introducido.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE.

Nombre vulgar: Aromo australiano.

***Acacia paradoxa* DC.**

Arbusto. Introducido.

Distribución: VAL.

***Acacia visco* Lorentz ex Griseb.**

Sinónimos: *Acacia concinna* Phil., hom. illeg.

Árbol. Nativo.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA.

Rango altitudinal: 0-2500 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Adesmia

***Adesmia aegiceras* Phil.**

Sinónimos: *Adesmia glanduligera* I.M. Johnst., *Adesmia remiana* Phil., *Adesmia subumbellata* Phil., *Adesmia trijuga* Gillies ex Hook. & Arn. var. *remiana* (Phil.) Burkart, *Adesmia trijuga* Gillies ex Hook. & Arn. var. *robustior* Hook. & Arn., *Patagonium aegiceras* (Phil.) Kuntze, *Patagonium aegiceras* (Phil.) Reiche, comb. illeg., *Patagonium trijugum* (Gillies ex Hook. & Arn.) Kuntze var. *remyanum* (Phil.) Reiche

Subarbusto. Nativo.

Distribución: TAR, ATA, COQ, VAL, RME.

Rango altitudinal: 1500-4000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Cuerno de cabra, jarilla.

***Adesmia aphylla* Clos**

Sinónimos: *Patagonium aphyllum* (Clos) Kuntze
Arbusto. Endémico.

Distribución: ATA, COQ.

Rango altitudinal: 1800-3000 m.

Nombre vulgar: Panza de burro.

***Adesmia arachnipes* Clos**

Sinónimos: *Adesmia oresigena* Phil., *Patagonium arachnipes* (Clos) Kuntze, *Patagonium oresigenum* (Phil.) Kuntze

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, RME.

Rango altitudinal: 1600-3500 m.

***Adesmia araucana* Phil.**

Sinónimos: *Patagonium araucanum* (Phil.) Kuntze
Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 800-1500 m.

***Adesmia argentea* Meyen**

Sinónimos: *Adesmia cinerea* Clos, *Patagonium argenteum* (Meyen) Kuntze, *Patagonium cinereum* (Clos) Kuntze

Arbusto. Endémico.

Distribución: TAR, ATA, COQ, VAL.

Rango altitudinal: 0-2000 m.

Nombre vulgar: Jarilla, varilla blanca, varilla mansa.

Adesmia argyrophylla Phil.

Sinónimos: *Adesmia kingii* Phil., *Adesmia sessiliflora* Phil., *Adesmia furcata* Phil., *Adesmia divaricata* (Phil. ex Reiche) Dyer, *Patagonium argyrophyllum* (Phil.) Kuntze, *Patagonium kingii* (Phil.) Kuntze, *Patagonium sessiliflorum* (Phil.) Kuntze
Arbusto. Endémico.
Distribución: ATA, COQ.
Rango altitudinal: 200-2800 m.

Adesmia aromatica Burkart

Arbusto. Endémico.
Distribución: COQ.
Rango altitudinal: 1100-1300 m.

Adesmia aspera Gillies ex Hook. & Arn.

Sinónimos: *Patagonium asperum* (Gillies ex Hook. & Arn.) Kuntze, *Patagonium mucronatum* (Hook. & Arn.) Kuntze var. *asperum* (Gillies ex Hook. & Arn.) Reiche
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, BIO.
Rango altitudinal: 1000-3000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Adesmia atacamensis Phil.

Sinónimos: *Adesmia glandulosa* Phil., *Patagonium atacamense* (Phil.) Kuntze, *Patagonium glandulosum* (Phil.) Kuntze
Arbusto. Endémico.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ.
Rango altitudinal: 2000-4000 m.
Nombre vulgar: Allaval, jarilla, pasto de huanaco.

Adesmia aurantiaca (Dusén) Burkart

Sinónimos: *Adesmia pumila* Hook.f. var. *aurantiaca* Dusén
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAG.
Rango altitudinal: 0-500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Adesmia balsamica Bertero ex Colla

Sinónimos: *Patagonium balsamicum* (Bertero ex Colla) Kuntze
Arbusto. Endémico.
Distribución: VAL, RME.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Nombre vulgar: Jarilla.

Adesmia bedwellii Skottsb.

Arbusto. Endémico.
Distribución: COQ, RME.
Rango altitudinal: 200-700 m.
Nombre vulgar: Varilla brava.

Adesmia bicolor (Poir.) DC.

Sinónimos: *Hedysarum bicolorum* Poir., *Hedysarum pendulum* Poir., *Adesmia glabriuscula* Vogel, *Adesmia pendula* Poir., *Adesmia radicans* Clos, *Patagonium glabriuscum* (Vogel) Kuntze, *Patagonium radicans* (Clos) Kuntze, *Patagonium bicolor* (Poir.) Kuntze
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: VAL, RME, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 0-2200 m.
Países limítrofes: Argentina.

Adesmia bijuga Phil.

Sinónimos: *Patagonium bijugum* (Phil.) Reiche
Arbusto. Endémico.
Distribución: MAU.
Rango altitudinal: 145-370 m.

Adesmia boronioides Hook.f.

Sinónimos: *Patagonium boronioides* (Hook.f.) Kuntze
Arbusto. Nativo.
Distribución: AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-1500 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Paramela.

Adesmia brachysemeon Phil.

Sinónimos: *Patagonium bracteatum* (Hook. & Arn.) Kuntze
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: RME, LBO, MAU, BIO.
Rango altitudinal: 0-2200 m.

Adesmia bracteata Hook. & Arn.

Arbusto. Endémico.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME.
Rango altitudinal: 1200-2600 m.

Adesmia brevivexillata Burkart

Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: VAL, RME, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 1500-2500 m.

Adesmia burkartii M.N. Correa
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAG.
Rango altitudinal: 1200-1500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Adesmia calycicoma Burkart
Arbusto. Endémico.
Distribución: COQ.
Rango altitudinal: 1100-1400 m.

Adesmia capitellata (Clos) Hauman
Sinónimos: *Adesmia oligophylla* Phil., *Lotus capitellatus* Clos, *Patagonium oligophyllum* (Phil.) Kuntze, *Hosackia capitellata* (Clos) Brand
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME.
Rango altitudinal: 2300-4200 m.
Países limítrofes: Argentina.

Adesmia colinensis (Phil. ex Reiche) Martic.
Sinónimos: *Patagonium colinense* Phil. ex Reiche
Arbusto. Endémico.
Distribución: COQ, VAL, RME.
Rango altitudinal: 1000-2000 m.

Adesmia concinna Phil.
Arbusto. Endémico.
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 200-1400 m.

Adesmia conferta Hook. & Arn.
Sinónimos: *Adesmia brachycarpa* Phil., *Adesmia izquierdi* Phil. ex Reiche, *Adesmia stipulacea* Clos, *Adesmia venosa* Phil., *Patagonium brachycarpum* (Phil.) Kuntze, *Patagonium confertum* (Hook. & Arn.) Kuntze, *Patagonium stipulaceum* (Clos) Kuntze, *Patagonium venosum* (Phil.) Reiche
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, BIO.
Rango altitudinal: 100-1800 m.

Adesmia confusa Ulibarri

Sinónimos: *Patagonium arboreum* (Bertero ex Clos) Kuntze, *Adesmia arborea* Bertero ex Clos, hom. illeg., *Adesmia berteroniana* Steud., nom. nud.

Arbusto. Endémico.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO.
Rango altitudinal: 0-1800 m.
Nombre vulgar: Palhuén, espinillo, varilla brava.

Adesmia coquimbensis Burkart
Arbusto. Endémico.
Distribución: ATA, COQ.
Rango altitudinal: 1900 m.

Adesmia coronilloides Gillies ex Hook. & Arn.
Sinónimos: *Adesmia codonocalyx* G.F. Grandjot & K. Grandjot, *Adesmia germainii* Phil., *Adesmia glauca* Phil., *Patagonium coronilloides* (Gillies ex Hook. & Arn.) Kuntze, *Patagonium coronilloides* (Gillies ex Hook. & Arn.) Reiche, comb. illeg., *Patagonium germainii* (Phil.) Reiche, comb. illeg., *Patagonium coronilloides* (Gillies ex Hook. & Arn.) Kuntze var. *glaucum* (Phil.) Reiche, comb. illeg., *Patagonium glaucum* (Phil.) Kuntze
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: RME, MAU.
Rango altitudinal: 2200-3000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Adesmia corymbosa Clos
Sinónimos: *Adesmia palenae* Phil., *Adesmia fernandezii* Phil., *Adesmia tenuis* Phil., *Adesmia vallis-pulchrae* Phil., nom. nud., *Patagonium vallis-pulchrae* Reiche, *Patagonium corymbosum* (Clos) Kuntze, *Patagonium palenae* (Phil.) Reiche
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 200-3500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Adesmia cuneata Meyen ex Vogel
Sinónimos: *Patagonium cuneatum* (Meyen ex Vogel) Kuntze
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: RME, LBO.
Rango altitudinal: 2100-2800 m.

Adesmia curvifolia Clos

Sinónimos: *Patagonium curvifolium* (Clos) Kuntze
Arbusto. Endémico.
Distribución: ATA, COQ.
Rango altitudinal: 1000-1500 m.

***Adesmia darapskyana* (Phil. ex Reiche) Martic.**
Sinónimos: *Patagonium darapskyanum* Phil. ex Reiche
Hierba o subarbusto. Perenne. Endémica.
Distribución: VAL, RME, LBO.
Rango altitudinal: 2300-2800 m.

***Adesmia davilae* Phil.**
Sinónimos: *Patagonium davilae* (Phil.) Kuntze
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: RME, MAU, NUB, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 2000 m.

***Adesmia denticulata* Clos**
Sinónimos: *Patagonium denticulatum* (Clos) Kuntze
Subarbusto. Endémico.
Distribución: COQ, MAU, NUB, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 0-1600 m.

***Adesmia denudata* Phil.**
Sinónimos: *Patagonium denudatum* (Phil.) Kuntze
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ATA, COQ.
Rango altitudinal: 2300 m.

***Adesmia dessaueri* (Phil. ex Reiche) Ulibarri**
Sinónimos: *Patagonium dessaueri* Phil. ex Reiche
Arbusto. Endémico.
Distribución: ATA, LBO.

***Adesmia dichotoma* Clos**
Sinónimos: *Patagonium dichotomum* (Clos) Kuntze,
Patagonium cinereum (Clos) Kuntze var. *dichotomum*
(Clos) Reiche
Arbusto. Endémico.
Distribución: ATA, COQ, VAL.
Rango altitudinal: 900-2800 m.

***Adesmia disperma* Phil.**
Sinónimos: *Patagonium dispermum* (Phil.) Reiche
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL.
Rango altitudinal: 200-300 m.

***Adesmia dumosa* Phil.**
Sinónimos: *Patagonium dumosum* (Phil.) Reiche
Arbusto. Endémico.
Distribución: ATA, COQ, RME.
Rango altitudinal: 590-900 m.

***Adesmia echinus* C. Presl**
Sinónimos: *Adesmia gayana* Phil., *Patagonium echinus*
(C. Presl) Kuntze, *Patagonium gayanum* (Phil.) Kuntze
Subarbusto. Nativo.
Distribución: ANT, ATA, COQ, MAU.
Rango altitudinal: 2800-4400 m.
Países limítrofes: Argentina.

***Adesmia elata* Clos**
Sinónimos: *Patagonium elatum* (Clos) Kuntze,
Patagonium leiocarpum (Hook. & Arn.) Kuntze var.
elatum (Clos) Reiche, *Patagonium leiocarpum* (Hook. &
Arn.) Kuntze var. *macrostachyum* Phil. ex Reiche
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ATA, COQ, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI,
AIS.
Rango altitudinal: 700-1300 m.

***Adesmia elegans* Clos**
Sinónimos: *Patagonium elegans* (Clos) Kuntze
Arbusto. Endémico.
Distribución: ANT, ATA, COQ, MAU.
Rango altitudinal: 330 m.

***Adesmia emarginata* Clos**
Sinónimos: *Patagonium emarginatum* (Clos) Kuntze
Subarbusto. Nativo.
Distribución: ATA, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS.
Rango altitudinal: 200-2700 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Paramela, paramilla.

***Adesmia eremophila* Phil.**
Sinónimos: *Adesmia latistipula* Phil. ex Reiche,
Patagonium eremophilum (Phil.) Kuntze, *Patagonium*
latistipula Phil. ex Reiche
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ.
Rango altitudinal: 0-1800 m.

***Adesmia erinacea* Phil.**

Sinónimos: *Adesmia senticula* Phil., *Patagonium erinaceum* (Phil.) Kuntze, *Patagonium erinaceum* (Phil.) Reiche, comb. illeg., *Patagonium senticulum* (Phil.) Reiche
Arbusto. Nativo.
Distribución: TAR, ANT, ATA, MAU.
Rango altitudinal: 2500-4400 m.
Países limítrofes: Argentina.

***Adesmia exilis* Clos**

Sinónimos: *Adesmia berteroii* Phil. ex Kuntze, nom. nud., *Adesmia decumbens* Phil., *Adesmia decumbens* Phil. var. *berteroii* Phil. ex G.F. Grandjot & K. Grandjot, *Adesmia humifusa* Phil., *Adesmia valdesia* Clos, *Patagonium decumbens* (Phil.) Kuntze, *Adesmia inconspicua* Phil., *Patagonium exile* (Clos) Kuntze, *Patagonium inconspicuum* (Phil.) Kuntze, *Patagonium valdesium* (Clos) Kuntze, *Patagonium humifusum* Kuntze
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU.
Rango altitudinal: 1400-3300 m.
Países limítrofes: Argentina.

***Adesmia filicaulis* Phil.**

Sinónimos: *Patagonium filicaule* (Phil.) Kuntze, *Patagonium radicans* (Clos) Kuntze var. *filicaule* (Phil.) Reiche
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: NUB, ARA.
Rango altitudinal: 500-1500 m.

***Adesmia filifolia* Clos**

Sinónimos: *Patagonium filifolium* (Clos) Kuntze
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO.
Rango altitudinal: 0-1800 m.

***Adesmia frigida* Phil.**

Sinónimos: *Adesmia adenophora* Phil., *Patagonium frigidum* (Phil.) Kuntze, *Patagonium adenophorum* (Phil.) Reiche
Subarbusto. Endémico.
Distribución: ANT, ATA.
Rango altitudinal: 1900-4500 m.

***Adesmia fuentesii* G.F. Grandjot**

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, RME.
Rango altitudinal: 2000-3500 m.

***Adesmia glaucescens* Phil.**

Sinónimos: *Patagonium araucanum* (Phil.) Kuntze var. *glaucescens* (Phil.) Reiche, *Patagonium glaucescens* (Phil.) Kuntze
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: BIO, ARA.
Rango altitudinal: 0-1000 m.

***Adesmia glomerula* Clos var. *australior* Burkart**

Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: RME, MAU, NUB, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 1700-2700 m.
Países limítrofes: Argentina.

Adesmia glomerula* Clos var. *glomerula

Sinónimos: *Adesmia compacta* Phil., *Adesmia humilis* Phil., *Patagonium compactum* (Phil.) Kuntze, *Patagonium glomerulum* (Clos) Kuntze, *Patagonium humile* (Phil.) Kuntze
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: RME, MAU, NUB, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 2000-4000 m.
Países limítrofes: Argentina.

***Adesmia glutinosa* Hook. & Arn.**

Sinónimos: *Patagonium glutinosum* (Hook. & Arn.) Kuntze
Arbusto. Endémico.
Distribución: ATA, COQ, VAL.
Rango altitudinal: 700-3000 m.

***Adesmia godoyae* (Phil. ex Reiche) Martic.**

Sinónimos: *Patagonium godoyae* Phil. ex Reiche
Arbusto. Endémico.
Distribución: ATA, RME.
Rango altitudinal: 700-1000 m.

***Adesmia gracilis* Meyen ex Vogel**

Sinónimos: *Patagonium gracile* (Meyen ex Vogel)
Kuntze
Arbusto. Nativo.
Distribución: COQ, RME, MAU.
Rango altitudinal: 200-3000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Adesmia gracillima* I.M. Johnst.**

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ANT, RME.

Rango altitudinal: 20-300 m.

***Adesmia hemisphaerica* Hauman**

Subarbusto. Nativo.

Distribución: TAR, ANT, COQ, RME.

Rango altitudinal: 3200-3600 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Adesmia hirsuta* Phil.**

Sinónimos: *Patagonium hirsutum* (Phil.) Kuntze

Arbusto. Endémico.

Distribución: ANT, ATA, COQ, RME.

Rango altitudinal: 1780 m.

***Adesmia horrida* Gillies ex Hook. & Arn.**

Sinónimos: *Adesmia leucopogon* Phil., *Patagonium horridum* (Gillies ex Hook. & Arn.) Kuntze, *Patagonium leucopogon* (Phil.) Kuntze, *Patagonium horridum* (Gillies ex Hook. & Arn.) Kuntze var. *minor* Reiche

Arbusto. Nativo.

Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 2800-4000 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Nombre vulgar: Cuerno de cabra.

***Adesmia hystrix* Phil.**

Sinónimos: *Adesmia sentis* Phil., *Adesmia villanuevae* Phil. ex Reiche, nom. nud., *Patagonium hystrix* (Phil.) Kuntze, *Patagonium sentis* (Phil.) Reiche, *Patagonium villanuevae* Reiche

Arbusto. Endémico.

Distribución: ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 2000-4100 m.

***Adesmia jilesiana* Burkart**

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ATA, COQ.

Rango altitudinal: 3000-4200 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Adesmia lanata* Hook.f.**

Sinónimos: *Patagonium lanatum* (Hook.f.) Kuntze

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ARA, MAG.

Rango altitudinal: 100-900 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Adesmia landbecki* Phil.**

Sinónimos: *Patagonium landbecki* (Phil.) Kuntze, *Patagonium longisetum* (DC.) Kuntze var. *landbeckii* (Phil.) Reiche

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 0-500 m.

***Adesmia laxa* Clos**

Sinónimos: *Patagonium laxum* (Clos) Kuntze

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, RME.

Rango altitudinal: 0-200 m.

***Adesmia leiocarpa* Hook. & Arn.**

Sinónimos: *Adesmia psilocarpa* Phil., *Patagonium psilocarpum* (Phil.) Kuntze, *Patagonium leiocarpum* (Hook. & Arn.) Kuntze

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME.

Rango altitudinal: 0-1300 m.

***Adesmia littoralis* Burkart**

Subarbusto. Endémico.

Distribución: ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-100 m.

***Adesmia longipes* Phil.**

Sinónimos: *Patagonium longipes* (Phil.) Kuntze

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 1300-3200 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Adesmia longiseta* DC.**

Sinónimos: *Patagonium longisetum* (DC.) Kuntze

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, RME, LBO, ARA.

Rango altitudinal: 2000-3200 m.

Adesmia lotoides Hook.f.

Sinónimos: *Adesmia lotoides* Hook.f. var. *vaginata* Hook.f., *Adesmia unifoliolata* Skottsb., *Patagonium lotoides* (Hook.f.) Kuntze, *Patagonium lotoides* (Hook.f.) Reiche, comb. illeg.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-1500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Adesmia loudonii Hook. & Arn.

Sinónimos: *Patagonium loudonii* (Hook. & Arn.) Kuntze, *Patagonium loudonii* (Hook. & Arn.) Reiche, comb. illeg.
Arbusto. Endémico.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO.
Rango altitudinal: 0-1200 m.

Adesmia medinae (Phil. ex Reiche) Ulibarri

Sinónimos: *Patagonium medinae* (Phil. ex Reiche) Reiche
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: RME, LBO, MAU.

Adesmia melanocaulos Phil.

Sinónimos: *Adesmia diaziana* I.M. Johnst., *Patagonium melanocaulon* (Phil.) Reiche
Arbusto. Endémico.
Distribución: ANT, ATA.
Rango altitudinal: 0-1100 m.

Adesmia melanthes Phil.

Sinónimos: *Patagonium melanthes* (Phil.) Reiche
Arbusto. Nativo.
Distribución: AYP, TAR, ANT.
Rango altitudinal: 3700-4200 m.
Países limítrofes: Perú.

Adesmia micrantha Phil.

Sinónimos: *Patagonium micranthum* (Phil.) Kuntze, *Patagonium parviflorum* (Clos) Kuntze var. *micranthum* (Phil.) Reiche
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: ATA.
Rango altitudinal: 1500 m.

Adesmia microcalyx Phil. var. *calvescens* Burkart

Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: NUB, ARA.
Rango altitudinal: 0-1100 m.

Adesmia microcalyx Phil. var. *microcalyx*

Sinónimos: *Patagonium microcalyx* (Phil.) Reiche
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: BIO, ARA.
Rango altitudinal: 0-1100 m.

Adesmia microphylla Hook. & Arn.

Sinónimos: *Adesmia spinosa* A. Lesson, *Patagonium microphyllum* (Hook. & Arn.) Kuntze
Arbusto. Endémico.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME.
Rango altitudinal: 0-1500 m.
Nombre vulgar: Palhuén.

Adesmia minor (Hook. & Arn.) Burkart var.
caespitosa (Phil.) Ulibarri & Burkart

Sinónimos: *Adesmia caespitosa* Phil., *Patagonium caespitosum* (Phil.) Reiche
Subarbusto. Nativo.
Distribución: ANT.
Rango altitudinal: 3800-4400 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Cuerno de cabra.

Adesmia monosperma Clos

Sinónimos: *Adesmia calycosa* Phil., *Patagonium monospermum* (Clos) Kuntze, *Patagonium calycosum* (Phil.) Reiche
Arbusto. Endémico.
Distribución: ATA, COQ.
Rango altitudinal: 200-2600 m.

Adesmia montana Phil.

Sinónimos: *Patagonium montanum* (Phil.) Kuntze
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ, RME.
Rango altitudinal: 2100-2800 m.

Adesmia mucronata Hook. & Arn.

Sinónimos: *Adesmia closii* Phil., *Patagonium mucronatum* (Hook. & Arn.) Kuntze, *Patagonium closii* (Phil.) Kuntze
Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO.

Rango altitudinal: 0-2600 m.

***Adesmia multicuspis* Clos**

Sinónimos: *Adesmia oxalidophylla* Phil., *Adesmia melanocarpa* (Phil. ex Reiche) Dyer, *Patagonium oxalidophyllum* (Phil.) Kuntze, *Patagonium multicuspis* (Clos) Kuntze, *Patagonium oxalidophyllum* (Phil.) Kuntze var. *melanocarpum* Phil. ex Reiche

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: ATA, COQ.

Rango altitudinal: 1100-2300 m.

***Adesmia obcordata* Clos**

Sinónimos: *Patagonium obovatum* (Clos) Kuntze, *Patagonium obcordatum* (Clos) Kuntze

Arbusto. Nativo.

Distribución: RME, LBO.

Rango altitudinal: 200-2500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Adesmia obovata* Clos**

Sinónimos: *Adesmia leptacantha* Phil., *Patagonium obovatum* (Clos) Kuntze, *Patagonium leptacanthum* (Phil.) Kuntze

Arbusto. Nativo.

Distribución: RME, LBO, MAU, AIS.

Rango altitudinal: 200-2500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Cuerno de cabra, jarilla.

***Adesmia obscura* Clos**

Sinónimos: *Adesmia graveolens* Phil., *Adesmia villosa* Phil., hom. illeg., *Patagonium obscurum* (Clos) Kuntze, *Patagonium graveolens* (Phil.) Kuntze, *Patagonium obscurum* (Clos) Kuntze var. *graveolens* (Phil.) Reiche, *Patagonium villosum* (Phil.) Reiche

Arbusto. Endémico.

Distribución: ATA, COQ.

Rango altitudinal: 2000-3400 m.

***Adesmia occulta* (R.E. Fr.) Burkart**

Sinónimos: *Patagonium occultum* R.E. Fr.

Subarbusto. Nativo.

Distribución: AYP, TAR, ANT.

Rango altitudinal: 3000-4400 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

***Adesmia odontophylla* Phil.**

Sinónimos: *Patagonium odontophyllum* (Phil.) Kuntze
Arbusto. Endémico.

Distribución: ATA.

Rango altitudinal: 1115-2200 m.

***Adesmia ovalensis* Ulibarri**

Arbusto. Endémico.

Distribución: COQ.

Rango altitudinal: 200-300 m.

Adesmia papposa* (Lag.) DC. var. *papposa

Sinónimos: *Adesmia arvensis* Phil., *Adesmia chillanensis* Phil., *Adesmia elongata* Phil., *Aeschynomene papposa* Lag., *Patagonium papposum* (Lag.) Kuntze, *Patagonium chillanense* (Phil.) Reiche, *Patagonium arvense* (Phil.) Kuntze, *Patagonium elongatum* (Phil.) Kuntze, *Patagonium leiocarpum* (Hook. & Arn.) Kuntze var. *elongatum* (Phil.) Reiche

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 0-2500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Adesmia papposa* (Lag.) DC. var. *radicifolia

(Clos) M.N. Correa

Sinónimos: *Adesmia radicifolia* Clos, *Patagonium radicifolium* (Clos) Kuntze

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, BIO.

Rango altitudinal: 0-3100 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Adesmia parviflora* Clos**

Sinónimos: *Patagonium parviflorum* (Clos) Kuntze, *Patagonium parviflorum* (Clos) Kuntze var. *diffusum* Bertero ex Reiche

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAG.

Rango altitudinal: 0-2600 m.

***Adesmia parvifolia* Phil.**

Sinónimos: *Adesmia axillaris* Phil., *Adesmia parvifolia* Phil. var. *axillaris* (Phil.) Reiche, *Patagonium parvifolium* (Phil.) Reiche, *Patagonium parvifolium*

(Phil.) Reiche var. *axillare* (Phil.) Reiche, *Patagonium axillare* (Phil.) Kuntze, *Patagonium lanatum* (Hook.f.) Kuntze var. *axillaris* (Phil.) Speg.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-2600 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Adesmia pauciflora* Vogel**

Sinónimos: *Patagonium pauciflorum* (Vogel) Kuntze

Arbusto. Endémico.

Distribución: RME.

Rango altitudinal: 1500 m.

***Adesmia pearcei* Phil.**

Sinónimos: *Patagonium pearcei* (Phil.) Kuntze

Arbusto. Endémico.

Distribución: BIO.

Rango altitudinal: 1500 m.

***Adesmia pedicellata* Hook. & Arn.**

Sinónimos: *Adesmia genistoides* C. Presl, *Adesmia ulicina* C. Presl, *Adesmia calopogon* Phil., *Adesmia deserticola* Phil., *Patagonium pedicellatum* (Hook. & Arn.) Kuntze, *Patagonium deserticum* (Phil.) Kuntze, *Patagonium genistoides* (C. Presl) Kuntze, *Patagonium genistoides* (C. Presl) Reiche, comb. illeg., *Patagonium ulicinum* (C. Presl) Kuntze, *Patagonium calopogon* Phil. ex Reiche

Arbusto. Endémico.

Distribución: ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-2800 m.

***Adesmia pentaphylla* Phil.**

Sinónimos: *Patagonium pentaphyllum* (Phil.) Reiche

Arbusto. Nativo.

Distribución: RME.

Rango altitudinal: 2200-3000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Adesmia peraltae* (Phil. ex Reiche) Ulibarri**

Sinónimos: *Patagonium peraltae* Phil. ex Reiche

Arbusto. Endémico.

Distribución: ATA, COQ.

Nombre vulgar: Varilla.

***Adesmia phylloidea* Clos**

Sinónimos: *Adesmia virgata* Bertero ex Steud., nom. nud., *Patagonium phylloideum* (Clos) Kuntze Arbusto. Endémico.

Distribución: COQ, VAL, RME.

Rango altitudinal: 100-1400 m.

***Adesmia pinifolia* Gillies ex Hook. & Arn.**

Sinónimos: *Patagonium pinifolium* (Gillies ex Hook. & Arn.) Kuntze ex Taub.

Arbusto. Nativo.

Distribución: RME.

Rango altitudinal: 1500-3700 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Nombre vulgar: Leña amarilla.

***Adesmia pironii* I.M. Johnst.**

Arbusto. Endémico.

Distribución: COQ, VAL.

Rango altitudinal: 100-900 m.

***Adesmia polyphylla* Phil.**

Sinónimos: *Patagonium polyphyllum* (Phil.) Reiche

Arbusto. Nativo.

Distribución: AYP, TAR, ANT.

Rango altitudinal: 3200-4500 m.

Países limítrofes: Bolivia.

***Adesmia propinqua* Clos**

Sinónimos: *Adesmia dendroides* Phil., *Patagonium propinquum* (Clos) Kuntze, *Patagonium dendroides* (Phil.) Kuntze

Arbusto. Endémico.

Distribución: NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 100-1500 m.

***Adesmia prostrata* Clos var. *eglandulosa* Burkart**

Sinónimos: *Adesmia coluteoides* Phil., *Patagonium coluteoides* (Phil.) Kuntze

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, RME, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 500-1500 m.

Adesmia prostrata* Clos var. *prostrata

Sinónimos: *Patagonium prostratum* (Clos) Kuntze, *Adesmia meyeniana* Phil., *Patagonium meyenianum* (Phil.) Kuntze

Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: RME, LBO, MAU.
Rango altitudinal: 1000-1500 m.

***Adesmia pumila* Hook.f.**

Sinónimos: *Patagonium pumilum* (Hook.f.) Kuntze
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAG.
Rango altitudinal: 0-900 m.
Países limítrofes: Argentina.

***Adesmia pungens* Clos**

Sinónimos: *Adesmia intricata* Phil. ex Reiche, nom. nud., *Patagonium intricatum* Phil., *Patagonium pungens* (Clos) Kuntze
Arbusto. Endémico.
Distribución: ANT, ATA, COQ.
Rango altitudinal: 0-2100 m.

***Adesmia pusilla* Phil.**

Sinónimos: *Patagonium pusillum* (Phil.) Kuntze
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: TAR, ANT, ATA.
Rango altitudinal: 100-600 m.

***Adesmia quadripinnata* (Hicken) Burkart**
Sinónimos: *Adesmia oligophyla* Phil. var. *quadripinnata* Hicken
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: MAU.
Rango altitudinal: 800-2600 m.
Países limítrofes: Argentina.

***Adesmia rahmeri* Phil.**

Sinónimos: *Patagonium rahmeri* (Phil.) Reiche
Hierba. Anual o bienal. Nativa.
Distribución: TAR, ANT, ATA.
Rango altitudinal: 2600-4400 m.
Países limítrofes: Argentina.

***Adesmia ramosissima* Phil.**

Sinónimos: *Patagonium ramosissimum* (Phil.) Kuntze
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ, LBO.
Rango altitudinal: 500-1000 m.

***Adesmia reclinata* Muñoz**

Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ.
Rango altitudinal: 0-1000 m.
Nombre vulgar: Lentejilla.

***Adesmia renjifoana* (Phil. ex Reiche) Ulibarri**

Sinónimos: *Adesmia renjifoana* Phil., nom. nud., *Patagonium renjifoanum* Phil. ex Reiche
Arbusto. Nativo.
Distribución: LBO.
Rango altitudinal: 1500-2600 m.
Países limítrofes: Argentina.

***Adesmia resinosa* (Phil. ex Reiche) Martic.**

Sinónimos: *Patagonium resinosum* Phil. ex Reiche
Arbusto o árbol pequeño. Endémico.
Distribución: VAL, RME.
Rango altitudinal: 1700-2000 m.

***Adesmia retusa* Griseb.**

Sinónimos: *Adesmia grisebachii* Phil., *Patagonium retusum* (Griseb.) Kuntze var. *grisebachii* (Phil.) Reiche, *Patagonium retusum* (Griseb.) Kuntze
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ARA, LLA.
Rango altitudinal: 0-1800 m.
Países limítrofes: Argentina.

***Adesmia rubroviridis* Burkart**

Arbusto. Endémico.
Distribución: COQ.
Rango altitudinal: 2200-2600 m.

***Adesmia salicornioides* Speg.**

Sinónimos: *Patagonium salicornioides* (Speg.) Speg.
Subarbusto. Nativo.
Distribución: MAG.
Rango altitudinal: 0-1500 m.
Países limítrofes: Argentina.

***Adesmia sandwithii* Burkart**

Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAG.
Rango altitudinal: 1000-2000 m.
Países limítrofes: Argentina.

***Adesmia schneideri* Phil.**

Sinónimos: *Adesmia rigida* Skottsb., *Patagonium schneideri* (Phil.) Kuntze, *Patagonium schneideri* (Phil.) Reiche, comb. illeg.

Arbusto. Nativo.

Distribución: ATA, RME, LBO.

Rango altitudinal: 200-3300 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Adesmia spinosissima* Meyen**

Sinónimos: *Adesmia rupicola* Wedd., *Patagonium spinosissimum* (Meyen) Kuntze

Arbusto. Nativo.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA.

Rango altitudinal: 2700-4300 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Adesmia spuma* Werderm. ex Burkart**

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ATA, COQ.

Rango altitudinal: 2000-4600 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Adesmia subterranea* Clos**

Sinónimos: *Patagonium subterraneum* (Clos) Kuntze
Subarbusto. Nativo.

Distribución: ATA, COQ, VAL.

Rango altitudinal: 1200-4300 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Cuerno de cabra.

Adesmia tenella* Hook. & Arn. var. *macrocarpa

Ulibarri

Sinónimos: *Patagonium angustifolium* (Hook. & Arn.) Reiche, comb. illeg.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: ATA.

Rango altitudinal: 230-440 m.

***Adesmia tenella* Hook. & Arn. var. *misera* (Phil.)**

Skottsb.

Sinónimos: *Adesmia smithiae* DC. var. *misera* Phil.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Adesmia tenella* Hook. & Arn. var. *tenella

Sinónimos: *Adesmia angustifolia* Hook. & Arn., *Adesmia vesicaria* Bertero ex Colla, *Adesmia parvula* Phil., *Adesmia tenuicaulis* Phil., *Patagonium parvulum* (Phil.) Kuntze, *Patagonium tenuicaule* (Phil.) Reiche, *Patagonium vesicarium* (Bertero ex Colla) Reiche, *Patagonium vesicarium* (Bertero ex Colla) Kuntze, comb. illeg.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO.

Rango altitudinal: 0-1300 m.

***Adesmia tomentosa* Meyen**

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: VAL, MAU.

Rango altitudinal: 200-300 m.

***Adesmia torcaeae* Phil.**

Sinónimos: *Patagonium torcaeum* (Phil.) Reiche

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL.

Rango altitudinal: 200-3200 m.

***Adesmia trifoliata* Phil.**

Sinónimos: *Adesmia philippiana* (Hosseus) Burkart, *Patagonium philippianum* Hosseus, *Patagonium triphyllum* Speg., *Patagonium trifoliatum* (Phil.) Kuntze
Arbusto. Endémico.

Distribución: VAL, RME.

Rango altitudinal: 2000 m.

***Adesmia trifoliolata* Gillies ex Hook. & Arn.**

Sinónimos: *Patagonium trifoliolatum* (Gillies ex Hook. & Arn.) Kuntze ex Taub.

Hierba. Anual o bienal. Nativa.

Distribución: VAL, RME.

Rango altitudinal: 200-2300 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Adesmia uspallatensis* Gillies ex Hook. & Arn.**

Sinónimos: *Patagonium uspallatense* (Gillies ex Hook. & Arn.) Kuntze

Arbusto. Nativo.

Distribución: VAL, RME.

Rango altitudinal: 1900-3000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Adesmia verrucosa* Meyen**

Arbusto. Nativo.
Distribución: AYP.
Rango altitudinal: 1700-3600 m.
Países limítrofes: Perú.

Adesmia villosa Hook.f.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAG.
Rango altitudinal: 0-2400 m.
Países limítrofes: Argentina.

Adesmia viscida Bertero ex Colla
Sinónimos: *Adesmia aprica* Phil., *Adesmia simonsi* Phil.,
Patagonium apricum (Phil.) Kuntze, *Patagonium mucronatum* (Hook. & Arn.) Kuntze var. *apricum* (Phil.) Reiche, *Patagonium simonsii* (Phil.) Kuntze
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 0-3000 m.

Adesmia viscidissima I.M. Johnst.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ANT.
Rango altitudinal: 700-800 m.

Adesmia viscosa Gillies ex Hook. & Arn.
Sinónimos: *Adesmia pulchra* Phil., *Patagonium pulchrum* (Phil.) Kuntze, *Patagonium viscosum* (Gillies ex Hook. & Arn.) Kuntze
Arbusto. Endémico.
Distribución: LBO, ARA.
Rango altitudinal: 300-800 m.

Adesmia volckmannii Phil.
Sinónimos: *Patagonium campestre* Rendle, *Patagonium volckmannii* (Phil.) Kuntze, *Adesmia quadrijuga* Phil., *Patagonium quadrijugum* (Phil.) Kuntze, *Patagonium volckmannii* (Phil.) Reiche, comb. illeg.
Arbusto. Nativo.
Distribución: RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 200-2200 m.
Países limítrofes: Argentina.

Adesmia zoellneri Ulibarri
Arbusto. Endémico.

Distribución: COQ, VAL.
Rango altitudinal: 1000-1300 m.

Albizia

Albizia lophantha (Willd.) Benth.
Árbol. Introducido.
Distribución: VAL, RME, MAU, BIO, JFE.

Anarthrophyllum

Anarthrophyllum andicolum (Gillies ex Hook. & Arn.) F. Phil.
Sinónimos: *Anarthrophyllum andicolum* (Gillies ex Hook. & Arn.) F. Phil. var. *bridgesii* Chodat & Wilcz., *Anarthrophyllum juniperinum* (Meyen) F. Phil., *Genista andicola* Gillies ex Hook. & Arn., *Genista juniperina* Meyen
Arbusto. Endémico.
Distribución: VAL, RME, LBO.
Rango altitudinal: 0-1800 m.
Nombre vulgar: Pichi-romero.

Anarthrophyllum cumingii (Hook. & Arn.) F. Phil.
Sinónimos: *Genista cumingii* Hook. & Arn., *Anarthrophyllum cumingii* (Hook. & Arn.) F. Phil. var. *angustifolia* Chodat & Wilcz.
Arbusto. Endémico.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU.
Rango altitudinal: 1800-3000 m.

Anarthrophyllum desideratum (DC.) Benth. var. *desideratum*
Sinónimos: *Genista desiderata* DC., *Anarthrophyllum desideratum* Neger, nom. illeg.
Subarbusto. Nativo.
Distribución: AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-1000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Anarthrophyllum desideratum (DC.) Benth. var. *morenonis* (Kuntze) Speg.
Sinónimos: *Anarthrophyllum morenonis* Kuntze
Subarbusto. Nativo.
Distribución: MAG.
Rango altitudinal: 0-1000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Anarthrophyllum elegans (Gillies ex Hook. & Arn.) F. Phil.

Sinónimos: *Genista elegans* Gillies ex Hook. & Arn., *Anarthrophyllum pungens* Chodat

Arbusto. Nativo.

Distribución: VAL.

Rango altitudinal: 1000-2500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Anarthrophyllum gayanum (A. Gray) B.D. Jacks.

Sinónimos: *Genista gayana* A. Gray, *Genista umbellata* Clos, *Anarthrophyllum umbellatum* (Clos) F. Phil.

Subarbusto. Nativo.

Distribución: COQ, RME.

Rango altitudinal: 2000-3700 m.

Países limítrofes: Argentina.

Anarthrophyllum rigidum (Gillies ex Hook. & Arn.) Hieron.

Sinónimos: *Genista rigida* Gillies ex Hook. & Arn., *Anarthrophyllum brevistipula* Phil.

Arbusto. Nativo.

Distribución: MAU, MAG.

Rango altitudinal: 200-2500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Astragalus

Astragalus amatus Clos

Sinónimos: *Astragalus procumbens* Hook. & Arn., *Phaca tricolor* Clos, *Astragalus tricolor* (Clos) Reiche, *Astragalus ferrugineus* Clos, *Astragalus leucomallus* Phil., *Phaca brachyptera* Phil., *Astragalus brachypterus* (Phil.) Reiche, *Astragalus litoreus* Phil., *Tragacantha brevialata* Kuntze, *Astragalus subandinus* Speg., *Astragalus chilensis* E. Sheld.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Países limítrofes: Bolivia y Perú.

Astragalus arequipensis Vogel

Sinónimos: *Astragalus boliviensis* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Astragalus arnottianus (Gillies ex Hook. & Arn.)

Reiche

Sinónimos: *Phaca arnottiana* Gillies ex Hook. & Arn., *Phaca uspallatensis* Phil., *Phaca reedi* Phil., *Astragalus reedii* (Phil.) Hauman, *Phaca nana* Phil., *Astragalus nanus* (Phil.) Reiche, *Astragalus philippi* Speg.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO.

Países limítrofes: Argentina.

Astragalus bellus (Kuntze) R.E. Fr.

Sinónimos: *Phaca pulchella* Clos, *Astragalus pulchellus* (Clos) Reiche, *Tragacantha bella* Kuntze

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ.

Rango altitudinal: 300 m.

Países limítrofes: Argentina.

Astragalus berteri Colla

Sinónimos: *Astragalus prostratus* Hook. & Arn., *Astragalus alberjilla* Steud., *Phaca grata* Clos, *Astragalus gratus* (Clos) Reiche, *Astragalus filifolius* Clos, *Astragalus elongatus* (Phil.) Reiche, *Phaca concinna* Phil., *Astragalus concinnus* (Phil.) Reiche, *Astragalus cauquenensis* Phil., *Astragalus pencyanus* Phil., *Tragacantha longior* Kuntze, *Astragalus rhudolphi* Speg., *Phaca elongata* Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 180-2700 m.

Astragalus berterianus (Moris) Reiche

Sinónimos: *Phaca berteriana* Moris, *Phaca canescens* Hook. & Arn., *Astragalus canescens* (Hook. & Arn.) Gray, nom. illeg., *Astragalus oblongifolius* Clos, *Astragalus sphaerocarpus* Clos, *Astragalus placens* Clos var. *oblongifolius* (Clos) Reiche, *Phaca laxiflora* Phil., *Astragalus laxiflorus* (Phil.) Reiche, *Phaca dolichostachya* Phil., *Astragalus dolichostachys* (Phil.) Reiche, *Phaca dissitiflora* Phil., *Astragalus laxiflorus* (Phil.) Reiche var. *dissitiflora* (Phil.) Reiche, *Astragalus aconcaguensis* Speg.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, BIO.

Astragalus bustilloisii Clos

Sinónimos: *Phaca depauperata* Phil., *Astragalus depauperatus* (Phil.) Reiche, *Phaca saxifraga* Phil., *Astragalus brachycalyx* Phil., *Tragacantha atacamensis* Kuntze, *Astragalus atacamensis* (Kuntze) R.E. Fr., *Astragalus tarapacanus* Speg.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Garbanzo silvestre.

***Astragalus cachinalensis* Phil.**
Sinónimos: *Tragacantha cachinalensis* (Phil.) Kuntze
Hierba. Anual o bienal. Endémica.
Distribución: ANT, ATA.

***Astragalus chamissonis* (Vogel) Reiche**
Sinónimos: *Phaca chamissonis* Vogel, *Phaca ochroleuca* Hook. & Arn., *Astragalus ochroleucus* (Hook. & Arn.) Gray, nom. illeg., *Astragalus ovalensis* Clos, *Astragalus chilensis* (Nees) Reiche, hom. illeg., *Astragalus placens* Clos, *Astragalus volckmannii* Phil., *Astragalus araucanus* (F. Phil.) Reiche, *Astragalus monospermus* Phil., *Astragalus laetevirens* Phil., *Phaca chilensis* Nees, *Phaca araucana* F. Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Hierba loca.

***Astragalus confinis* I.M. Johnst.**
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: TAR.
Rango altitudinal: 2400 m.
Países limítrofes: Perú.

***Astragalus coquimbensis* (Hook. & Arn.) Reiche**
Sinónimos: *Phaca coquimbensis* Hook. & Arn., *Astragalus vasticola* I.M. Johnst., *Phaca carizalensis* Phil., *Phaca atacamensis* Phil.
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: ANT, ATA, COQ.

***Astragalus cruckshanksii* (Hook. & Arn.) Griseb.**
Sinónimos: *Phaca cruckshanksii* Hook. & Arn., *Astragalus amunategui* Phil., *Tragacantha cruckshanksii* (Hook. & Arn.) Kuntze var. *glabrescens* Kuntze,

Astragalus landbecki (Phil.) Reiche, *Phaca landbecki* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU.
Países limítrofes: Argentina.

***Astragalus cryptanthus* Wedd.**
Sinónimos: *Phaca clandestina* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR.
Países limítrofes: Bolivia.

***Astragalus cryptobotrys* I.M. Johnst.**
Sinónimos: *Phaca cryptantha* Phil., *Astragalus clandestinus* (Phil.) Hieron.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT.
Países limítrofes: Argentina.

***Astragalus curvicaulis* (Clos) Reiche**
Sinónimos: *Phaca curvicaulis* Clos, *Astragalus elatus* (Hook. & Arn.) Reiche, comb. illeg., *Phaca elata* Hook. & Arn., *Tragacantha curvicaulis* (Clos) Kuntze
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO.
Nombre vulgar: Hierba loca.

***Astragalus darumbium* (Bertero ex Colla) Clos**
Sinónimos: *Sutherlandia darumbium* Bertero ex Colla, *Phaca macrophysa* Phil., *Astragalus macrophysus* (Phil.) Reiche, *Phaca robusta* Phil., *Astragalus macrophysus* (Phil.) Reiche var. *robustus* (Phil.) Reiche, *Tragacantha firma* Kuntze
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: RME, LBO.
Países limítrofes: Argentina.

***Astragalus diminutivus* (Phil.) Gómez-Sosa**
Sinónimos: *Astragalus deminutivus* I.M. Johnst., *Phaca diminutiva* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: TAR.
Rango altitudinal: 3500-4500 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

***Astragalus dodtii* Phil.**

Sinónimos: *Astragalus rengifoi* Phil., *Astragalus melanogonatus* I.M. Johnst., *Tragacantha dodtii* (Phil.) Kuntze
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: ANT, ATA, COQ.

***Astragalus domeykoanus* (Phil.) Reiche**
Sinónimos: *Phaca domeykoana* Phil., *Phaca orites* Phil., *Astragalus orites* (Phil.) Reiche
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA.
Países limítrofes: Argentina.

***Astragalus edmonstonei* (Hook.) B.L. Rob.**
Sinónimos: *Phaca edmonstonei* Hook., *Astragalus flavus* (Hook. & Arn.) E. Sheld., *Astragalus chrysanthus* (Moris) Reiche, nom. illeg., *Phaca flava* Hook. & Arn., *Phaca chrysantha* Moris, *Astragalus affinis* Steud., *Phaca podocarpa* Phil., *Phaca acutidens* Phil., *Astragalus hohenacheri* Speg., *Tragacantha flava* (Hook. & Arn.) Kuntze, *Tragacantha chrysanthia* (Moris) Kuntze
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ATA, COQ, VAL, LBO, MAU.
Nombre vulgar: Hierba loca.

***Astragalus germainii* Phil.**
Sinónimos: *Astragalus segethi* Phil., *Astragalus dilectus* Phil., *Astragalus closianus* Phil., *Astragalus dessaueri* Phil., *Astragalus alfalfalis* Phil., *Astragalus azureus* Phil. ex Reiche, *Astragalus germaini* Phil. var. *azureus* Phil. ex Fr., *Tragacantha germaini* (Phil.) Kuntze, *Tragacantha closiana* (Phil.) Kuntze, *Tragacantha dialecta* (Phil.) Kuntze, *Tragacantha segethii* (Phil.) Kuntze
Subarbusto. Endémico.
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU.

***Astragalus johnstonii* Gómez-Sosa**
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: VAL, RME.

***Astragalus limariensis* Muñoz**
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ANT, COQ.
Nombre vulgar: Tetilla.

***Astragalus looseri* I.M. Johnst.**

Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU.
Países limítrofes: Argentina.

***Astragalus magellanicus* Gómez-Sosa**
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AIS, MAG.
Países limítrofes: Argentina.

***Astragalus maulensis* Speg.**
Sinónimos: *Phaca brachytropis* Phil., hom. illeg., *Astragalus brachytropis* (Phil.) Reiche, comb. illeg.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: MAU.
Rango altitudinal: 0-500 m.

***Astragalus micranthellus* Wedd.**
Sinónimos: *Tragacantha micranthella* (Wedd.) Kuntze
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Astragalus minimus* Vogel**
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Astragalus minutissimus* Wedd.**
Sinónimos: *Tragacantha minutissima* (Wedd.) Kuntze
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR.
Países limítrofes: Bolivia y Perú.

***Astragalus monteroi* I.M. Johnst.**
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ARA.

***Astragalus monticola* Phil.**
Sinónimos: *Astragalus barceloi* Phil., *Tragacantha monticola* (Phil.) Kuntze
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: RME.
Países limítrofes: Argentina.

***Astragalus nivicola* Gómez-Sosa**
Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAG.

Países limítrofes: Argentina.

***Astragalus nudus* Clos**

Sinónimos: *Tragacantha nuda* (Clos) Kuntze

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ATA, COQ, VAL.

Nombre vulgar: Alfalfillo.

***Astragalus orthocarpus* I.M. Johnst.**

Sinónimos: *Astragalus oliganthus* (Phil.) Reiche, nom. illeg., *Phaca oligantha* Phil., *Tragacantha oligantha* (Phil.) Kuntze

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: LBO.

***Astragalus palenae* (Phil.) Reiche**

Sinónimos: *Phaca palenae* Phil., *Phaca rahmeri* Phil., *Astragalus rahmeri* (Phil.) Reiche, *Astragalus pallens* Reiche, *Phaca oreophila* Phil., *Tragacantha oreophila* (Phil.) Kuntze

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAU, ARA, LLA, AIS, MAG.

Países limítrofes: Argentina.

***Astragalus paposanus* I.M. Johnst.**

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ANT, COQ.

***Astragalus patagonicus* (Phil.) Speg.**

Sinónimos: *Phaca patagonica* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AIS, MAG.

Países limítrofes: Argentina.

***Astragalus pehuENCHES* Niederl.**

Sinónimos: *Phaca inflata* Gillies ex Hook. & Arn., *Astragalus inflatus* (Gillies ex Hook. & Arn.) Steud., *Phaca striata* Clos, *Astragalus striatus* (Clos) Reiche, *Phaca macrocarpa* Phil., *Astragalus macrocarpus* (Phil.) Reiche, nom. illeg., *Tragacantha bisinflata* Kuntze, *Tragacantha grandis* Kuntze, *Astragalus grandis* (Kuntze) Speg., *Tragacantha striata* (Clos) Kuntze

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU.

Países limítrofes: Argentina.

***Astragalus pissisii* (Phil.) I.M. Johnst.**

Sinónimos: *Astragalus canescens* (Hook. & Arn.)

Reiche var. *pissisii* (Phil.) Reiche, *Phaca pissisii* Phil., *Tragacantha pissisii* (Phil.) Kuntze

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, MAU.

***Astragalus pusillus* Vogel**

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Astragalus reichei* Speg.**

Sinónimos: *Phaca compacta* Phil., *Astragalus compactus* (Phil.) Reiche

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: TAR, ANT.

Rango altitudinal: 3000-4500 m.

Países limítrofes: Bolivia.

***Astragalus schineterorum* Barneby**

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ.

***Astragalus tacorensis* Gómez-Sosa**

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR.

Rango altitudinal: 3700-4500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Astragalus triflorus* (DC.) A. Gray**

Sinónimos: *Phaca triflora* DC., *Tragacantha triflora* (DC.) Kuntze

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: TAR, ANT.

Países limítrofes: Perú.

***Astragalus trifoliatus* Phil.**

Sinónimos: *Astragalus valparadisiensis* Speg., *Tragacantha trifoliata* (Phil.) Kuntze

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: VAL.

***Astragalus vagus* (Clos) Reiche**

Sinónimos: *Phaca vaga* Clos, *Astragalus san-romani* (Phil.) Reiche, *Phaca san-romani* Phil., *Tragacantha vaga* (Clos) Kuntze
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ATA, COQ.

Astragalus valerianensis I.M. Johnst.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ATA.
Rango altitudinal: 2000-3000 m.

Astragalus verticillatus (Phil.) Reiche
Sinónimos: *Phaca verticillata* Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: VAL, LBO, MAU, BIO.

Astragalus vesiculosus Clos
Sinónimos: *Phaca nubigena* Meyen ex Vogel,
Astragalus nubigenus (Meyen ex Vogel) Taub.,
Astragalus meyerianus Speg., *Phaca bustilloi* Phil.,
Tragacantha andina Kuntze, *Astragalus rupestris* Reiche
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU.
Países limítrofes: Argentina.

Astragalus werdermannii I.M. Johnst.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: TAR.
Rango altitudinal: 4000-4700 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Balsamocarpon

Balsamocarpon brevifolium Clos
Sinónimos: *Caesalpinia brevifolia* (Clos) Benth.
Arbusto. Endémico.
Distribución: ATA, COQ.
Rango altitudinal: 0-1900 m.
Nombre vulgar: Algarrobilla.

Caesalpinia

Caesalpinia major (Medik.) Dandy & Exell
Sinónimos: *Bonduc majus* Medik.
Arbusto. Nativo.
Distribución: IPA.

Nombre vulgar: Ngaoho, naoho (Rapa Nui).

Calliandra

Calliandra chilensis Benth.
Sinónimos: *Feuilleea chilensis* (Benth.) Kuntze, *Acacia nigra* Clos
Arbusto. Endémico.
Distribución: ATA, COQ.
Rango altitudinal: 1100 m.

Crotalaria

Crotalaria grahamiana Wight & Arn.
Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: IPA.

Crotalaria incana L.
Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: AYP.
Rango altitudinal: 40-60 m.

Crotalaria pallida Aiton
Hierba o subarbusto. Perenne. Introducida.
Distribución: IPA.
Nombre vulgar: Nga ehe ehe (Rapa Nui).

Cytisus

Cytisus scoparius (L.) Link
Arbusto. Introducido.
Distribución: MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Cytisus striatus Rothm.
Arbusto. Introducido.
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA.

Dalea

Dalea azurea (Phil.) Reiche
Sinónimos: *Parosela azurea* (Phil.) J.F. Macbr.,
Psoralea azurea Phil., *Lotodes azureum* (Phil.) Kuntze
Subarbusto. Endémico.
Distribución: ANT.
Rango altitudinal: 0-500 m.

Dalea moquehuana J.F. Macbr.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR.

Rango altitudinal: 1900-2700 m.

Países limítrofes: Perú.

Dalea pennellii (J.F. Macbr.) J.F. Macbr. var. *chilensis* Barneby

Subarbusto. Endémico.

Distribución: AYP, TAR.

Rango altitudinal: 2500-3300 m.

Desmanthus

Desmanthus virgatus (L.) Willd.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: AYP.

Dipogon

Dipogon lignosus (L.) Verdc.

Arbusto trepador. Introducido.

Distribución: TAR.

Errazurizia

Errazurizia multifoliolata (Clos) I.M. Johnst.

Sinónimos: *Errazurizia glandulifera* Phil., *Psoralea multifoliolata* Clos, *Dalea multifoliolata* (Clos) Reiche, *Parosela multifoliolata* (Clos) J.F. Macbr.

Arbusto. Endémico.

Distribución: ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-1400 m.

Erythrostemon

Erythrostemon angulatus (Hook. & Arn.) E.

Gagnon & G. P. Lewis

Sinónimos: *Caesalpinia angulicaulis* Clos, *Zuccagnia angulata* Hook. & Arn., *Caesalpinia angulata* (Hook. & Arn.) Baill., *Sophora angulata* (Hook. & Arn.) Ravenna

Arbusto. Endémico.

Distribución: ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-1900 m.

Nombre vulgar: Retamo.

Erythrostemon gilliesii (Hook.) Klotzsch

Sinónimos: *Poinciana gilliesii* Wall. ex Hook., *Caesalpinia gilliesii* (Wall. ex Hook.) Benth., nom. illeg., *Caesalpinia gilliesii* (Wall. ex Hook.) D. Dietr.

Arbusto. Nativo.

Distribución: AYP, TAR, ATA, COQ, VAL, RME.

Rango altitudinal: 0-2500 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Galega

Galega officinalis L.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: ANT, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, JFE.

Geoffroea

Geoffroea decorticans (Gillies ex Hook. & Arn.)

Burkart

Sinónimos: *Gourliea decorticans* Gillies ex Hook. & Arn., *Lucuma spinosa* Molina, *Gourliea chilensis* Clos, *Gourliea spinosa* (Molina) Skeels

Árbol. Nativo.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 100-2600 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Nombre vulgar: Chañar.

Glycyrrhiza

Glycyrrhiza astragalina Gillies ex Hook. & Arn.

Subarbusto. Nativo.

Distribución: VAL, BIO.

Rango altitudinal: 1000-2500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Hoffmannseggia

Hoffmannseggia aphylla (Phil.) G.P. Lewis &

Sotuyo

Sinónimos: *Caesalpinia aphylla* Phil.

Arbusto. Endémico.

Distribución: AYP, TAR.

Rango altitudinal: 0-3200 m.

Hoffmannseggia doellii Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: TAR, ANT, ATA.

Rango altitudinal: 2300-3500 m.

Hoffmannseggia eremophila (Phil.) Burkart ex Ulibarri

Sinónimos: *Hoffmannseggia andina* Miers var. *eremophila* (Phil.) Reiche, *Hoffmannseggia andina* Miers, nom. nud., *Hoffmannseggia andina* Phil., *Zuccagnia eremophila* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ANT, ATA.

Rango altitudinal: 3000-4000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Hoffmannseggia glauca (Ortega) Eifert

Sinónimos: *Hoffmannseggia falcaria* Cav., nom. illeg., *Larrea glauca* Ortega, *Caesalpinia glauca* (Ortega) Kunth, *Caesalpinia falcaria* (Cav.) L. Fisher

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME.

Rango altitudinal: 0-4000 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Nombre vulgar: Porotillo, culchao.

Hoffmannseggia minor (Phil.) Ulibarri

Sinónimos: *Hoffmannseggia doellii* Phil. var. *minor* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT.

Rango altitudinal: 800-4000 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Hoffmannseggia prostrata Lag. ex DC.

Sinónimos: *Hoffmannseggia gracilis* (Ruiz & Pav.)

Hook. & Arn., *Caesalpinia prostrata* (Lag. ex DC.) J.F.

Macbr., *Larrea gracilis* Ruiz & Pav.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA.

Rango altitudinal: 0-2700 m.

Países limítrofes: Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Ají.

Hoffmannseggia trifoliata Cav.

Sinónimos: *Hoffmannseggia trifoliata* Cav. var.

microphylla Speg., *Hoffmannseggia trifoliata* Cav. var.

glandulosa Speg., *Hoffmannseggia trifoliata* Cav. fma.

normalis Speg., *Hoffmannseggia trifoliata* Cav. fma.

microphylla Speg.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AIS.

Rango altitudinal: 0-600 m.

Países limítrofes: Argentina.

Hoffmannseggia viscosa (Ruiz & Pav.) Hook.

Sinónimos: *Caesalpinia ternata* (Phil.) J.F. Macbr., *Larrea viscosa* Ruiz & Pav., *Caesalpinia viscosa* (Ruiz & Pav.) Fisch., *Hoffmannseggia ternata* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR.

Rango altitudinal: 1500-3000 m.

Países limítrofes: Bolivia y Perú.

Indigofera

Indigofera truxillensis Kunth

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP.

Rango altitudinal: 20-500 m.

Países limítrofes: Perú.

Lablab

Lablab purpureus (L.) Sweet

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: IPA.

Lathyrus

Lathyrus berteroanus Colla ex Savi

Sinónimos: *Lathyrus gracilis* Phil., *Lathyrus debilis*

Vogel var. *berteroanum* (Colla ex Savi) Reiche

Hierba trepadora. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 20-1120 m.

Lathyrus cabrerianus Burkart

Sinónimos: *Lathyrus pubescens* Clos, hom. illeg.,

Lathyrus dumetorum Burkart, hom. illeg.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: NUB, BIO, ARA, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 10-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Lathyrus campestris* Phil.**

Sinónimos: *Lathyrus debilis* Vogel var. *campestris* (Phil.) Reiche, *Lathyrus gracillimus* Reiche

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: MAU, LLA.

Países limítrofes: Argentina.

Rango altitudinal: 20 m.

***Lathyrus macropus* Gillies ex Hook. & Arn.**

Sinónimos: *Lathyrus linearifolius* Griseb., nom. illeg.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL, RME, ARA.

Rango altitudinal: 550-1680 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Lathyrus cicera* L.**

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: VAL.

***Lathyrus crassipes* Gillies ex Hook. & Arn.**

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: RME, BIO, LLA.

Rango altitudinal: 70 m.

Países limítrofes: Argentina.

Lathyrus magellanicus* Lam. var. *glaucescens

Speg.

Sinónimos: *Lathyrus magellanicus* Lam. var. *oxyphylla*

Speg., *Lathyrus magellanicus* Lam. var. *campestris*

Dusén

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AIS, MAG.

Rango altitudinal: 600-650 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Arvejilla.

***Lathyrus hookeri* G. Don**

Sinónimos: *Lathyrus sessilifolius* Hook. & Arn.,
Lathyrus chilensis Steud., *Lathyrus eptiolaris* Clos,
Lathyrus pisaster Clos, *Lathyrus roseus* Phil., *Lathyrus litoralis* Phil., *Lathyrus ovalifolius* Phil., *Lathyrus trichocalyx* Phil., *Lathyrus magellanicus* Lam. var. *araucanus* Phil., *Lathyrus heterocirrus* Phil., *Lathyrus magellanicus* Lam. var. *heterocirrus* (Phil.) Reiche, *Lathyrus sessilifolius* Hook. & Arn. fma. *trichocalyx* (Phil.) Burkart, *Lathyrus hookeri* G. Don var. *trichocalyx* (Phil.) Burkart

Hierba trepadora. Perenne. Nativa.

Distribución: RME, LBO, BIO.

Rango altitudinal: 1100-1300 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Lathyrus magellanicus* Lam. var. *longipes* (Phil.) Burkart**

Sinónimos: *Lathyrus longipes* Phil., *Lathyrus dumetorum* Phil. var. *longipes* (Phil.) Reiche

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: RME, LBO.

Rango altitudinal: 0-2400 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Arvejilla.

Lathyrus magellanicus* Lam. var. *magellanicus

Sinónimos: *Lathyrus magellanicus* Lam. var. *subsessilifolius* Kuntze, *Lathyrus magellanicus* D. Don, nom. illeg., *Lathyrus patagonicus* Hauman, *Lathyrus pterocaulos* Phil.

Hierba trepadora. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 10-2500 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Arvejilla.

***Lathyrus japonicus* Willd. var. *aleuticus* (Greene)**

Fernald

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: AIS.

Lathyrus japonicus* Willd. var. *japonicus

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: BIO, ARA, LLA.

***Lathyrus lomanus* I.M. Johnst.**

Hierba trepadora. Perenne. Endémica.

Distribución: ANT.

Lathyrus magellanicus* Lam. var. *tucumanensis

Burkart

Hierba trepadora. Perenne. Nativa.

Distribución: LRI.

Rango altitudinal: 2400 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Lathyrus multiceps* Clos**

Sinónimos: *Lathyrus multiceps* Clos var. *setiger* (Phil.) Acevedo, *Lathyrus setiger* Phil., *Lathyrus eurypterus* Phil., *Lathyrus setiger* Phil. var. *eurypterus* (Phil.) Reiche, *Lathyrus ecirrhosus* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 180-2200 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Lathyrus nervosus* Lam.**

Sinónimos: *Lathyrus trigonus* Vogel, *Lathyrus ovalifolius* Phil. var. *mucronatus* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ARA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 10-1250 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Lathyrus pubescens* Hook. & Arn.**

Sinónimos: *Lathyrus petiolaris* Vogel, *Lathyrus acutifolius* Vogel, *Lathyrus andiculus* Gand., *Lathyrus dumetorum* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, BIO, ARA, LRI.

Rango altitudinal: 40-800 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

***Lathyrus pusillus* Elliott**

Sinónimos: *Lathyrus stipularis* J. Presl, *Lathyrus montevidensis* Vogel, *Lathyrus arvensis* Phil., *Lathyrus debilis* Vogel var. *arvensis* (Phil.) Reiche, *Lathyrus crassipes* Phil., nom. illeg., *Lathyrus dicirrhosus* Clos Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: LLA.

Países limítrofes: Argentina y Perú.

***Lathyrus sativus* L.**

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO.

***Lathyrus subandinus* Phil.**

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 100-2500 m.

Leucaena

***Leucaena leucocephala* (Lam.) de Wit**

Arbusto o árbol pequeño. Introducido.

Distribución: IPA.

Lotus

***Lotus corniculatus* L.**

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: ATA, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG.

***Lotus pedunculatus* Cav.**

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, IPA.

***Lotus subpinnatus* Lag.**

Sinónimos: *Hosackia subpinnata* (Lag.) Torr. & A. Gray

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 0-2300 m.

***Lotus tenuis* Waldst. & Kit. ex Willd.**

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: VAL, RME, NUB, BIO, ARA, LLA.

Lupinus

***Lupinus albus* L.**

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: BIO, ARA.

***Lupinus angustifolius* L.**

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: NUB, BIO.

***Lupinus arboreus* Sims**

Arbusto. Introducido.

Distribución: COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG, JFE.

***Lupinus luteus* L.**

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: VAL.

***Lupinus microcarpus* Sims**

Sinónimos: *Lupinus comberanus* C.P. Sm., *Lupinus fischeranus* C.P. Sm., *Lupinus verticillatus* C.P. Sm.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.

Rango altitudinal: 0-2500 m.

Países limítrofes: Argentina y Perú.

Nombre vulgar: Altramuz, hierba del traro.

***Lupinus oreophilus* Phil.**

Sinónimos: *Lupinus oreophilus* Greene, nom. illeg.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: AYP, TAR, ANT.

Rango altitudinal: 2700-4400 m.

***Lupinus polyphyllus* Lindl.**

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: LLA, AIS, MAG.

***Lupinus subacaulis* Griseb.**

Sinónimos: *Lupinus chilensis* C.P. Sm.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT.

Rango altitudinal: 3000-4500 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Lupinus subinflatus* C.P. Sm.**

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT.

Rango altitudinal: 2500-4000 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

***Lupinus tarapacensis* C.P. Sm.**

Arbusto. Nativo.

Distribución: AYP, TAR.

Rango altitudinal: 3600 m.

Países limítrofes: Perú.

***Lupinus werdermannianus* C.P. Sm.**

Arbusto. Endémico.

Distribución: TAR.

Rango altitudinal: 2500 m.

Macroptilium

***Macroptilium lathyroides* (L.) Urban**

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: IPA.

Medicago

***Medicago arabica* (L.) Huds.**

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE.

***Medicago arborea* L.**

Arbusto. Introducido.

Distribución: RME, MAU.

***Medicago lupulina* L.**

Hierba. Anual o bienal. Introducida.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, JFE, IPA.

***Medicago minima* (L.) Bartal.**

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, ARA, MAG.

***Medicago polymorpha* L. var. *confinis* (Koch)**

Ooststr. & B. Reichg.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, JFE.

Medicago polymorpha* L. var. *polymorpha

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: AYP, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, JFE.

***Medicago polymorpha* L. var. *vulgaris* (Benth.)**

Shinners

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: VAL, RME, NUB, BIO, ARA, LRI, JFE.

***Medicago sativa* L.**

Hierba o subarbusto. Perenne. Introducida.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.

Melilotus

Melilotus albus Medik.

Hierba o subarbusto. Bienal. Introducida.

Distribución: AYP, TAR, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, AIS, MAG.

Melilotus indicus (L.) All.

Hierba o subarbusto. Anual. Introducida.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE, IPA.

Melilotus officinalis (L.) Lam.

Hierba o subarbusto. Anual o bienal. Introducida.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAG.

Ornithopus

Ornithopus compressus L.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: BIO.

Ornithopus pinnatus (Mill.) Druce

Hierba. Anual o perenne. Introducida.

Distribución: BIO.

Ornithopus sativus Brot.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: BIO.

Otholobium

Otholobium glandulosum (L.) J.W. Grimes

Sinónimos: *Psoralea glandulosa* L., *Lotodes*

glandulosum (L.) Kuntze, *Hoita glandulosa* (L.) Rydb.

Arbusto o árbol pequeño. Nativo.

Distribución: AYP, TAR, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.

Rango altitudinal: 600-1400 m.

Países limítrofes: Bolivia y Perú.

Prosopis

Prosopis alba Griseb.

Sinónimos: *Prosopis siliquastrum* (Cav. ex Lag.) DC.

var. *longisiliqua* Phil., *Prosopis atacamensis* Phil.

Árbol. Nativo.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA.

Rango altitudinal: 0-2500 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Algarrobo blanco.

Prosopis burkartii Muñoz

Arbusto. Endémico.

Distribución: TAR.

Rango altitudinal: 995 m.

Prosopis chilensis (Molina) Stuntz emend. Burkart

Sinónimos: *Prosopis siliquastrum* (Cav. ex Lag.) DC.,

Ceratonia chilensis Molina, *Acacia siliquastrum* Cav. ex Lag., *Prosopis schinopoma* Stuck.

Árbol. Nativo.

Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO.

Rango altitudinal: 500-2500 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Algarrobo del centro.

Prosopis flexuosa DC. var. *flexuosa*

Arbusto. Nativo.

Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Prosopis flexuosa DC. var. *fruticosa* (Meyen) F.A.

Roig

Sinónimos: *Prosopis fruticosa* Meyen

Arbusto. Endémico.

Distribución: AYP, TAR, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 100-800 m.

Prosopis strombulifera (Lam.) Benth.

Sinónimos: *Strombocarpa strombulifera* (Lam.) A.

Gray, *Acacia strombulifera* (Lam.) Willd., *Spirolobium*

australe Orb., *Mimosa circinalis* Cav., nom. illeg.,

Mimosa strombulifera Lam., *Prosopis reptans* Benth.

var. *chilensis* Zoellner

Arbusto. Nativo.

Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO.

Rango altitudinal: 0-1600 m.
Países limítrofes: Argentina y Perú.
Nombre vulgar: Espinillo, retortón.

Prosopis tamarugo Phil.
Árbol. Endémico.
Distribución: AYP, TAR, ANT.
Rango altitudinal: 60-2350 m.

Rhynchosia

Rhynchosia minima (L.) DC.
Arbusto trepador. Introducido.
Distribución: AYP.

Robinia

Robinia pseudoacacia L.
Árbol. Introducido.
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, JFE, IPA.

Senna

Senna arnottiana (Gillies ex Hook.) H.S. Irwin & Barneby
Sinónimos: *Cassia arnottiana* Gillies ex Hook., *Cassia andina* Phil., *Cassia arnottiana* Gillies ex Hook. var. *andina* (Phil.) Reiche
Arbusto o subarbusto. Nativo.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB.
Rango altitudinal: 800-2800 m.
Países limítrofes: Argentina.

Senna birostris (Dombey ex Vogel) H.S. Irwin & Barneby var. *arequipensis* (Meyen ex Vogel) H.S. Irwin & Barneby
Sinónimos: *Cassia arequipensis* Meyen ex Vogel, *Cassia tarapacana* Phil.
Arbusto. Nativo.
Distribución: AYP, TAR.
Rango altitudinal: 2200-3900 m.
Países limítrofes: Perú.

Senna bronniartii (Gaudich.) H.S. Irwin & Barneby

Sinónimos: *Cassia misera* Phil., *Cassia bronniartii* Gaudich.
Arbusto o subarbusto. Nativo.
Distribución: AYP, TAR, ANT.
Rango altitudinal: 100-1100 m.
Países limítrofes: Perú.

Senna candolleana (Vogel) H.S. Irwin & Barneby
Sinónimos: *Cassia closiana* Phil., *Cassia obtusa* Clos, *Cassia candolleana* Vogel, *Cassia emarginata* Clos, nom. illeg., *Cassia bicapsularis* L. var. *chilensis* Benth.
Arbusto. Endémico.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO.
Rango altitudinal: 0-800 m.

Senna cruckshanksii (Hook. & Arn.) H.S. Irwin & Barneby
Sinónimos: *Cassia stipulacea* Aiton var. *tenuistipula* Bertero ex Vogel, *Cassia campanae* Phil., *Cassia confusa* Phil. var. *campanae* (Phil.) Reiche, *Cassia cruckshanksii* Hook. & Arn.
Arbusto. Endémico.
Distribución: COQ, VAL, RME.
Rango altitudinal: 400-600 m.

Senna cumingii (Hook. & Arn.) H.S. Irwin & Barneby var. *alcaparra* (Phil.) H.S. Irwin & Barneby
Sinónimos: *Cassia alcaparra* Phil.
Arbusto. Endémico.
Distribución: COQ, VAL.
Rango altitudinal: 0-1800 m.

Senna cumingii (Hook. & Arn.) H.S. Irwin & Barneby var. *coquimbensis* (Vogel) H.S. Irwin & Barneby
Sinónimos: *Cassia coquimbensis* Vogel, *Cassia flaccida* Clos
Arbusto. Endémico.
Distribución: ANT, ATA, COQ.
Rango altitudinal: 0-400 m.

Senna cumingii (Hook. & Arn.) H.S. Irwin & Barneby var. *cumingii*
Sinónimos: *Cassia cumingii* Hook. & Arn.
Arbusto. Endémico.
Distribución: ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Senna cumingii (Hook. & Arn.) H.S. Irwin & Barneby var. ***eremobia*** (Phil.) H.S. Irwin & Barneby

Sinónimos: *Cassia eremobia* Phil.

Arbusto. Endémico.

Distribución: ANT.

Rango altitudinal: 0-200 m.

Senna huidobriana (Phil.) Zoellner & San Martin

Sinónimos: *Cassia huidobriana* Phil.

Arbusto. Endémico.

Distribución: COQ.

Rango altitudinal: 0-300 m.

Senna paposana (Phil.) Zoellner & San Martin

Sinónimos: *Cassia paposana* Phil.

Arbusto. Endémico.

Distribución: ANT.

Rango altitudinal: 400-600 m.

Senna septemtrionalis (Viv.) H.S. Irwin &

Barneby

Árbol. Introducido.

Distribución: LBO.

Senna stipulacea (Aiton) H.S. Irwin & Barneby

var. ***anglorum*** H.S. Irwin & Barneby

Arbusto. Endémico.

Distribución: COQ, VAL, RME, MAU, NUB.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Senna stipulacea (Aiton) H.S. Irwin & Barneby

var. ***stipulacea***

Sinónimos: *Cassia stipulacea* Aiton, *Cassia foetida* Ruiz & Pav. ex G. Don, *Cassia myrtifolia* Phil. ex Reiche, *Cassia stipulacea* Willd., nom. illeg., *Cassia pencana* Phil. ex sched.

Arbusto. Endémico.

Distribución: VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Nombre vulgar: Quebracho, alcaparra.

Senna urmenetae (Phil.) H.S. Irwin & Barneby

Sinónimos: *Cassia urmenetae* Phil., *Cassia glaucescens* Benth., *Cassia oreades* Phil.

Arbusto. Endémico.

Distribución: ATA, COQ, RME.

Rango altitudinal: 0-2500 m.

Sophora

Sophora cassioides (Phil.) Sparre

Sinónimos: *Edwardsia cassioides* Phil.

Árbol. Endémico.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 0-900 m.

Nombre vulgar: Pilo, pelú.

Sophora fernandeziana (Phil.) Skottsb. var. ***fernandeziana***

Sinónimos: *Sophora tetraptera* J.S. Muell. subsp. *fernandeziana* Skottsb.

Árbol. Endémico.

Distribución: JFE.

Rango altitudinal: 200-510 m.

Nombre vulgar: Mayu-monte, mayu del monte.

Sophora fernandeziana (Phil.) Skottsb. var. ***reediana*** (Phil.) Skottsb.

Sinónimos: *Edwardsia reediana* Phil., *Sophora reediana* (Phil.) Yakovlev

Árbol. Endémico.

Distribución: JFE.

Sophora macrocarpa Sm.

Sinónimos: *Sophora donihuensis* Ravenna

Arbusto o árbol pequeño. Endémico.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 10-1500 m.

Nombre vulgar: Mayu, mayo.

Sophora masafuerana (Phil.) Skottsb.

Sinónimos: *Edwardsia masafuerana* Phil.

Árbol. Endémico.

Distribución: JFE.

Rango altitudinal: 70-400 m.

Nombre vulgar: Pelú de Juan Fernández, leña dura, madera dura.

Sophora toromiro (Phil.) Skottsb.

Sinónimos: *Edwardsia toromiro* Phil., *Sophora tetraptera* auct., non J. Mill.

Arbusto o árbol pequeño. Endémico.

Distribución: IPA.

Nombre vulgar: Toromiro.

Nota: Extinto en estado silvestre.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: LBO, BIO, LLA.

Trifolium arvense L.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, AIS, MAG.

Trifolium aureum Pollich

Hierba. Anual o bienal. Introducida.

Distribución: MAG.

Trifolium campestre Schreb.

Hierba. Anual o bienal. Introducida.

Distribución: COQ, VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG.

Trifolium cernuum Brot.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: LBO, MAU.

Trifolium chilense Hook. & Arn.

Sinónimos: *Lupinaster ochreatus* (Kunze ex Steud.) C. Presl, *Trifolium ochreatum* Kunze ex Steud.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: VAL, RME, LBO, BIO, LLA.

Rango altitudinal: 600-900 m.

Trifolium depauperatum Desv.

Sinónimos: *Lupinaster depauperatus* (Desv.) C. Presl

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 100-1000 m.

Países limítrofes: Perú.

Trifolium dubium Sibth.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.

Trifolium fragiferum L.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: MAG.

Trifolium glomeratum L.

Spartium

Spartium junceum L.

Arbusto. Introducido.

Distribución: AYP, ANT, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Tara

Tara spinosa (Molina) Britton & Rose

Sinónimos: *Poinciana spinosa* Molina, *Caesalpinia tinctoria* (Kunth) Benth. ex Reiche, *Caesalpinia chilensis* DC., *Caesalpinia spinosa* (Molina) Kuntze Árbol. Nativo.

Distribución: AYP, TAR, COQ, VAL.

Rango altitudinal: 0-3000 m.

Países limítrofes: Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Tara.

Teline

Teline monspessulana (L.) K. Koch

Arbusto. Introducido.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE.

Nombre vulgar: Retamilla.

Trifolium

Trifolium angustifolium L.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Trifolium antucoense D. Heller

Sinónimos: *Trifolium circumdatum* Kunze, nom. illeg., *Lupinaster circumdatus* (Kunze) C. Presl, *Trifolium inconspicuum* Poepp. ex D. Heller, nom. nud.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.

***Trifolium hybridum* L.**

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: BIO, LLA, MAG.

***Trifolium incarnatum* L.**

Hierba. Anual o bienal. Introducida.

Distribución: VAL, RME, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA.

***Trifolium macraei* Hook. & Arn.**

Sinónimos: *Trifolium bicephalum* Elmer, *Trifolium catalinae* S. Watson, *Trifolium mercedense* P.B. Kenn, *Trifolium traskae* P.B. Kenn

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: RME, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 0-600 m.

Nota: Se encuentra también en California.

***Trifolium microdon* Hook. & Arn.**

Sinónimos: *Trifolium lechleri* Phil., *Trifolium chrysanthum* Hook. & Arn., *Trifolium microdon* Hook. & Arn. var. *pilosum* Eastw., *Trifolium tricuspidatum* Bertero ex Steud.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: RME, BIO, ARA, LLA.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Nota: Se encuentra también en Estados Unidos y Canadá.

***Trifolium physanthum* Hook. & Arn.**

Sinónimos: *Trifolium valdivianum* Phil. ex D. Heller & Zohary, nom. nud.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: VAL, LBO, MAU, BIO, LLA.

Rango altitudinal: 125-140 m.

Trifolium polymorphum* Poir. var. *grandiflorum

Parodi

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: RME, MAU, NUB, BIO.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Trifolium polymorphum* Poir. var. *polymorphum

Sinónimos: *Trifolium grandiflorum* Hook. & Arn., *Amoria polymorpha* (Poir.) C. Presl, *Trifolium rivale* Closs, non Steud., *Trifolium crosnierii* Clos, *Trifolium indecorum* Clos, *Trifolium simplex* Clos, *Trifolium brevipes* Phil., *Trifolium concinnum* Phil., *Trifolium amphicarpum* Phil., *Trifolium rubrum* Larrañaga

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.

Rango altitudinal: 0-2700 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Trifolium pratense* L.**

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.

***Trifolium repens* L.**

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE, IPA.

***Trifolium spadiceum* L.**

Hierba. Anual o bienal. Introducida.

Distribución: MAG.

***Trifolium striatum* L.**

Hierba. Anual o bienal. Introducida.

Distribución: RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

***Trifolium subterraneum* L.**

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: COQ, LBO, MAU, BIO, ARA.

***Trifolium suffocatum* L.**

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: RME, LBO.

***Trifolium tomentosum* L.**

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: VAL, RME, LBO, BIO.

***Trifolium triaristatum* Bertero ex Colla**

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: VAL, LBO, BIO, LLA.

Nota: Se encuentra también en México y Estados Unidos.

***Trifolium vernum* Phil.**

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: VAL, LBO.

Rango altitudinal: 1500-2000 m.

***Trifolium vestitum* D. Heller & Zohary**

Sinónimos: *Trifolium volekmani* Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, RME.

Rango altitudinal: 2000-3000 m.

Trigonella

***Trigonella monspeliaca* L.**

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: VAL, RME, LBO.

Ulex

***Ulex europaeus* L.**

Arbusto. Introducido.

Distribución: VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG.

Vicia

***Vicia araucana* Phil.**

Hierba. Anual o bienal. Endémica.

Distribución: MAU, NUB.

Rango altitudinal: 2000-2200 m.

***Vicia benghalensis* L.**

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: AYP, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, MAG.

***Vicia bijuga* Gillies ex Hook. & Arn.**

Sinónimos: *Lathyrus anomalus* Phil., *Vicia solisii* Phil.,

Vicia saffordii Phil., *Vicia sericella* Speg., *Vicia sericella* Speg. var. *glabrata* Speg.

Hierba. Anual o bienal. Nativa.

Distribución: RME, NUB, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Vicia coquimbensis* Martic.**

Sinónimos: *Vicia truncata* Phil., hom. illeg.

Hierba. Anual o perenne. Endémica.

Distribución: COQ.

***Vicia graminea* Sm.**

Sinónimos: *Vicia graminea* Sm. var. *heterophyla*

Kuntze, *Vicia graminea* Sm. var. *multiflora* Hook. & Arn., *Vicia grata* Phil.

Hierba. Anual o bienal. Nativa.

Distribución: RME, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Vicia hirsuta* (L.) Gray**

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG.

***Vicia inconspicua* Phil.**

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: ARA, LLA.

Rango altitudinal: 0-400 m.

***Vicia linearifolia* Hook. & Arn.**

Sinónimos: *Vicia hookeri* G. Don, *Vicia micrantha* Hook. & Arn.

Hierba trepadora. Anual. Nativa.

Distribución: VAL, BIO, ARA, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Vicia magellanica* Hook.f.**

Sinónimos: *Vicia graminea* auct. non Sm., *Vicia kingii* Hook.f., *Vicia patagonica* Hook.f., *Vicia depauperata* Clos, *Vicia patagonica* Hook.f. var. *depauperata* (Clos) Speg., *Vicia andicola* Phil. non Kunth, *Vicia magellanica* Hook.f. var. *dianthes* (Phil.) Reiche

Hierba. Anual o bienal. Nativa.

Distribución: COQ, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

***Vicia modesta* Phil.**

Hierba. Anual o bienal. Endémica.

Distribución: ANT, VAL.

Rango altitudinal: 20-250 m.

***Vicia mucronata* Clos**

Hierba. Anual o bienal. Endémica.

Distribución: VAL, RME, LBO, ARA, LLA.

Rango altitudinal: 0-800 m.

***Vicia nana* Vogel**

Sinónimos: *Vicia dentata* Gillies ex Hook. & Arn., *Vicia valdiviana* Phil., *Vicia leptantha* Phil.

Hierba trepadora. Anual. Nativa.

Distribución: BIO, LLA.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Vicia nigricans* Hook. & Arn.**

Sinónimos: *Vicia macraei* Hook. & Arn., *Vicia coxii* Phil., *Vicia darapskiana* Phil., *Vicia andina* Phil., *Vicia leyboldii* Phil., *Vicia magnifolia* Clos, *Vicia moorei* Phil., *Vicia speciosa* Phil., *Vicia commutata* Phil., *Vicia fodinarum* Phil., *Vicia apiculata* Phil., *Vicia apiculata* Phil. var. *parvifolia* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Vicia pallida* Hook. & Arn.**

Sinónimos: *Vicia berteroana* Phil.

Hierba. Anual o bienal. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO.

Rango altitudinal: 10-1900 m.

***Vicia parviflora* Cav.**

Hierba trepadora. Anual. Introducida.

Distribución: ARA.

***Vicia sativa* L. subsp. *nigra* (L.) Ehrh.**

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: RME, BIO, ARA, LLA.

Vicia sativa* L. subsp. *sativa

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.

***Vicia sessiliflora* Clos**

Hierba. Anual o bienal. Endémica.

Distribución: LLA.

Rango altitudinal: 30-100 m.

***Vicia setifolia* Kunth**

Sinónimos: *Vicia graminea* Sm. var. *setifolia* (Kunth) Kuntze, *Vicia acerosa* Clos, *Vicia acerosa* Clos var. *angustifolia* (Clos) Reiche, *Vicia angustifolia* Clos, hom. illeg.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: RME, LLA.

Rango altitudinal: 0-1600 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Vicia subserrata* Phil.**

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: COQ, RME.

Rango altitudinal: 100-200 m.

***Vicia tetrasperma* (L.) Schreb.**

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: AYP, VAL, RME, LBO, MAU, AIS, MAG.

***Vicia vicina* Clos**

Hierba. Anual o bienal. Endémica.

Distribución: AYP, TAR, ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 0-1800 m.

***Vicia villosa* Roth**

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Weberbauerella

***Weberbauerella chilensis* Faúndez & Saldivia**

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: TAR, ATA.

Rango altitudinal: 2500-3600 m.

FAGACEAE

Quercus

***Quercus robur* L.**

Árbol. Introducido.

Distribución: NUB, BIO, ARA, LRI, JFE.

Nombre vulgar: Encino, roble europeo.

FRANCOACEAE

Araeoandra

***Araeoandra tenuicaulis* (Barnéoud) Lefor**

Sinónimos: *Viviania tenuicaulis* Barnéoud

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: COQ.

Rango altitudinal: 0-600 m.

Balbisia

***Balbisia gracilis* (Meyen) Hunz. & Ariza**

Sinónimos: *Wendtia gracilis* Meyen, *Wendtia gracilis* Meyen var. *typica* Knuth, nom. illeg., *Wendtia reynoldsii* Endl. ex Walp., *Wendtia trigyna* (Kunze) Kuntze, *Wendtia trigyna* (Kunze) Kuntze var. *poeppigiana* Kuntze

Subarbusto. Nativo.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, AIS.

Rango altitudinal: 0-1500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Balbisia microphylla* (Phil.) Reiche**

Sinónimos: *Ledocarpon microphylla* Phil.

Subarbusto. Endémico.

Distribución: AYP, TAR, ATA.

Rango altitudinal: 3000-3500 m.

Nombre vulgar: Purisa, pupuñía.

***Balbisia peduncularis* (Lindl.) D. Don**

Sinónimos: *Ledocarpon pedunculare* Lindl., *Crukshanksia cistiflora* Hook. & Arn., *Ledocarpon cistiflorum* Meyen, nom. nud.

Subarbusto. Nativo.

Distribución: AYP, ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 200-500 m.

Países limítrofes: Perú.

Nombre vulgar: Flor de San José, amancai, palo negro, copa de oro, mancay.

***Balbisia stitchkinii* Ricardi**

Subarbusto. Endémico.

Distribución: AYP.

Rango altitudinal: 3800-4000 m.

Cissarobryon

***Cissarobryon elegans* Kunze ex Poepp.**

Sinónimos: *Cissarobryon aristulatum* Phil., *Cissarobryon macrophyllum* Phil., *Cissarobryon parvifolium* Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 200-2500 m.

Francoa

Francoa appendiculata* Cav. var. *appendiculata

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 800-1500 m.

***Francoa appendiculata* Cav. var. *ramosa* (D. Don)**

Rolfe

Sinónimos: *Francoa ramosa* D. Don

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: VAL, RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.

Rango altitudinal: 80-2000 m.

Francoa appendiculata* Cav. var. *sonchifolia

(Cav.) Rolfe

Sinónimos: *Francoa sonchifolia* Cav.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Nombre vulgar: Hierba del pasmo, llaupangue.

Tetilla

***Tetilla hydrocotylifolia* DC.**

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, ARA.

Rango altitudinal: 40-900 m.

Viviania

Viviania crenata (Hook.) G. Don

Sinónimos: *Macraea crenata* Hook.

Arbusto. Endémico.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO.

Rango altitudinal: 0-2300 m.

Nombre vulgar: Oreganillo.

Viviania marifolia Cav.

Sinónimos: *Viviania rosea* (Lindl.) Klotzsch, *Macraea rosea* Lindl., *Viviania brevipedunculata* Phil., *Viviania laxa* Phil.

Arbusto. Nativo.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 3200-4000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Oreganillo, té de burro.

Viviania ovata Phil.

Sinónimos: *Viviania bernalesii* Phil., *Viviania rosea* (Lindl.) Klotzsch var. *ovata* (Phil.) Reiche, *Viviania viridis* Phil. ex Reiche

Arbusto. Nativo.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB.

Rango altitudinal: 2000-2500 m.

Países limítrofes: Argentina.

FRANKENIACEAE

Frankenia

Frankenia chilensis K. Presl

Sinónimos: *Frankenia campestris* Schauer, *Frankenia chilensis* K. Presl var. *campestris* (Schauer) Gunckel, *Frankenia erecta* Gay, *Frankenia nicolletiana* Gay, *Frankenia farinosa* J. Remy, *Frankenia aspera* Phil., *Frankenia chilensis* K. Presl var. *aspera* (Phil.) I.M. Johnst., *Frankenia florida* Phil., *Frankenia nicolletiana* Gay var. *florida* (Phil.) Reiche, *Frankenia glabrata* Phil., *Frankenia chilensis* K. Presl var. *florida* (Phil.) Gunckel, *Coldenia glabra* Phil.

Arbusto. Nativo.

Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ, RME.

Rango altitudinal: 10-1500 m.

Países limítrofes: Perú.

Frankenia chubutensis Speg.

Sinónimos: *Niederleinia chubutensis* (Speg.) Nied.

Arbusto o subarbusto. Nativo.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Frankenia microphylla Cav.

Sinónimos: *Franca microphylla* (Cav.) Vis., *Frankenia microphylla* Cav. var. *relaxata* Speg., *Niederleinia microphylla* (Cav.) Hieron. ex Nied.

Subarbusto. Nativo.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 0-400 m.

Países limítrofes: Argentina.

Frankenia salina (Molina) I.M. Johnst.

Sinónimos: *Frankenia berteroana* Gay, *Frankenia micrantha* Gay, *Frankenia salina* (Molina) I.M. Johnst. var. *micrantha* (Gay) Gunckel, *Franca grandifolia* (Cham. & Schldl.) Greene, *Frankenia campestris* (Gay) Tidestrom, *Frankenia grandifolia* Cham. & Schldl. var. *micrantha* (Gay) W.L. Bray, *Frankenia grandifolia* Cham. & Schldl., *Frankenia grandifolia* Cham. & Schldl. var. *campestris* Gray, *Frankenia latifolia* K. Presl, *Frankenia micrantha* Gay var. *berteroana* (Gay) W.L. Bray, *Ocymum salinum* Molina, *Velezia latifolia* Eschsch.

Subarbusto. Endémico.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Nombre vulgar: Hierba del salitre, salitre, vichilla, dichilla.

Frankenia triandra J. Remy

Sinónimos: *Anthobryum triandrum* (J. Remy) Surgis, *Anthobryum aretioides* Phil., *Anthobryum clarenii* (R.E. Fr.) Cabrera, *Anthobryum tetragonum* Phil., *Frankenia clarenii* R.E. Fries, *Pycnophyllum sulcatum* Griseb., *Anthobryum aretioides* Phil.

Subarbusto. Nativo.

Distribución: AYP, TAR, ANT.

Rango altitudinal: 3300-4800 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.
Nombre vulgar: Llaretilla.

Frankenia vidalii F. Phil.
Arbusto o subarbusto. Endémico.
Distribución: IDE.
Rango altitudinal: 200-500 m.

GENTIANACEAE

Centaureum

Centaureum cachanlahuen (Molina) B.L. Rob.
Sinónimos: *Gentiana cachanlahuen* Molina, *Gentiana peruviana* Lam., *Chironia chilensis* Willd., nom. illeg., *Erythraea chilensis* (Willd.) Pers., *Centaureum chilense* (Willd.) Druce, nom. illeg., *Erythraea chilensis* (Willd.) Pers. var. *humilis* Phil. ex Reiche
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, JFE.
Rango altitudinal: 0-1700 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Canchanlahue, canchanlahuen, cachén, canchanlahua.
Nota: Introducida en el Archipiélago de Juan Fernández.

Centaureum erythraea Rafn
Hierba. Anual o perenne. Introducida.
Distribución: LLA, AIS.

Centaureum littorale (Turner) Gilmour
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: ARA, LLA, AIS.

Centaureum pulchellum (Sw.) Druce
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: LRI, LLA.

Cicendia

Cicendia quadrangularis (Lam.) Griseb.
Sinónimos: *Microcala quadrangularis* (Dombey ex Lam.) Griseb., *Gentiana quadrangularis* Lam., *Exacum*

quadrangulare (Lam.) Willd., *Exacum chilense* Bertero, nom. nud., *Exacum inflatum* Hook. & Arn.
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.
Rango altitudinal: 0-1000 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Gentiana

Gentiana prostrata Haenke
Sinónimos: *Gentiana sedifolia* Kunth, *Gentiana gayi* Griseb., *Gentiana podocarpa* (Phil.) Griseb., *Gentiana prostrata* Haenke var. *podocarpa* (Phil.) Kusn., *Gentiana ramosissima* Phil., *Varasia podocarpa* Phil., *Gentiana sedifolia* Kunth var. *lineata* Phil., *Gentiana minima* Phil., *Varasia sessilis* Phil.
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, MAG.
Rango altitudinal: 1800-4500 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.
Nombre vulgar: Mamañika.

Gentianella

Gentianella coquimbensis (Briq.) Martic. & Quezada
Sinónimos: *Gentiana coquimbensis* Briq., *Gentianella coquimbensis* (Briq.) T.N. Ho & S.W. Liu, comb. illeg.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ATA, COQ.
Rango altitudinal: 1600-3500 m.

Gentianella magellanica (Gaudich.) Fabris ex D.M. Moore
Sinónimos: *Gentiana lactea* Phil., *Gentiana pearcei* Phil., *Gentiana valdiviana* Phil., *Gentiana magellanica* Gaudich., *Gentiana araucana* Phil., *Gentiana modesta* Phil.
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-2000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Gentianella multicaulis (Gillies ex Griseb.) Fabris

Sinónimos: *Gentianella gilliesii* (Gilg) Martic. & Arroyo, nom. illeg., *Gentiana gilliesii* Gilg, nom. illeg. Hierba. Bienal. Nativa. Distribución: ATA, COQ. Rango altitudinal: 1500-4000 m. Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

***Gentianella ottonis* (Phil.) Muñoz**

Sinónimos: *Gentiana ottonis* Phil., *Gentiana hexamera* Phil., *Gentiana ottonis* Phil. var. *hexamera* (Phil.) Reiche Hierba. Perenne. Nativa. Distribución: COQ, VAL, RME, MAU. Rango altitudinal: 2400-3200 m. Países limítrofes: Argentina.

***Gentianella tarapacana* (Gilg) T.N. Ho & S.W. Liu**

Sinónimos: *Gentiana tarapacana* Gilg Hierba. Bienal. Endémica. Distribución: TAR, ANT. Rango altitudinal: 3800 m.

Schenkia

***Schenkia spicata* (L.) Mansion**

Sinónimos: *Centaureum spicatum* (L.) Fritsch ex Janch. Hierba. Anual o perenne. Nativa. Distribución: IPA.

GERANIACEAE

Erodium

***Erodium botrys* (Cav.) Bertol.**

Hierba. Anual. Introducida. Distribución: COQ, VAL, RME, NUB, BIO, ARA, LRI.

***Erodium cicutarium* (L.) L'Hér. ex Aiton**

Hierba. Anual o bienal. Introducida. Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.

***Erodium geoides* A. St.-Hil.**

Sinónimos: *Erodium botrys* auct. non (Cav.) Bertol. Hierba. Anual o bienal. Introducida. Distribución: COQ, VAL, ARA. Rango altitudinal: 0-800 m.

Erodium malacoides* (L.) L'Hér. ex Aiton var. *malacoides

Hierba. Anual o bienal. Introducida. Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME.

***Erodium malacoides* (L.) L'Hér. ex Aiton var. *ribifolium* (Jacq.) DC.**

Hierba. Anual o bienal. Introducida. Distribución: COQ, VAL, RME.

***Erodium moschatum* (L.) L'Hér. ex Aiton**

Hierba. Anual o bienal. Introducida. Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE.

Geranium

***Geranium berteroanum* Colla**

Sinónimos: *Geranium andinum* Phil., *Geranium proximum* Steud., *Geranium patagonicum* Hook.f., *Geranium apricum* Phil., *Geranium chilense* Aedo & Muñoz Garm., *Geranium collae* Aedo, *Muñoz Garm.* & Pando, *Geranium neohispidum* Aedo & Muñoz Garm., *Geranium submolle* Steud., *Geranium columbinum* auct. non L., *Geranium berteroanum* Colla var. *apricum* (Phil.) Reiche, *Geranium berteroanum* Colla var. *caespitosum* Reiche, *Geranium berteroanum* Colla var. *hispidum* Reiche

Hierba. Perenne. Nativa. Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG. Rango altitudinal: 0-2100 m. Países limítrofes: Argentina.

***Geranium core-core* Steud.**

Sinónimos: *Geranium argentinum* R. Knuth, *Geranium moorei* Phil., *Geranium commutatum* Steud., *Geranium ochsenii* Phil., *Geranium squamosum* Phil., *Geranium subsericeum* R. Knuth, *Geranium rapulum* A. St.-Hil. & Naudin, *Geranium columbinum* auct. non L., *Geranium commutatum* Steud. var. *oschsenii* (Phil.) Reiche

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.

Rango altitudinal: 0-4000 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Nombre vulgar: Core-core.

Nota: Introducida en el Archipiélago de Juan Fernández.

***Geranium dissectum* L.**

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, JFE.

***Geranium magellanicum* Hook.f.**

Sinónimos: *Geranium magellanicum* Hook.f. var. *typicum* R. Knuth, nom. illeg.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: BIO, ARA, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-1200 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Geranium molle* L.**

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, MAG.

***Geranium purpureum* Vill.**

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: VAL, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.

***Geranium pusillum* L.**

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: RME, MAU, AIS, MAG, JFE.

***Geranium robertianum* L.**

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, JFE.

***Geranium sessiliflorum* Cav.**

Sinónimos: *Geranium acaule* auct. non Willd., *Geranium sessiliflorum* Cav. fma. *albiflorum* Kuntze, nom. nud.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, COQ, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-4800 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Geranium skottsbergii* R. Knuth**

Sinónimos: *Geranium columbinum* auct. non L., *Geranium philippii* J.F. Macbr., *Geranium berteroanum* Colla var. *ciliatum* Reiche, *Geranium berteroanum* Colla var. *philippii* (J.F. Macbr.) L.E. Navas

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, ARA, AIS.

Rango altitudinal: 0-1300 m.

GESNERIACEAE

Asteranthera

***Asteranthera ovata* (Cav.) Hanst.**

Sinónimos: *Asteranthera chiloensis* Hanst., *Columnea ovata* Cav.

Hierba epífita. Perenne. Nativa.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 1000-2000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Estrellita, estrellita del bosque, voqui.

Mitraria

***Mitraria coccinea* Cav.**

Sinónimos: *Gesneria chilensis* Molina

Arbusto trepador. Nativo.

Distribución: COQ, VAL, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 500-2000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Botellita, chilca, voquivoqui, vochi-vochi.

Sarmienta

***Sarmienta scandens* (J.D. Brandis ex Molina) Pers.**

Sinónimos: *Sarmienta repens* Ruiz & Pavón, nom. illeg., *Urceolaria scandens* J.D. Brandis ex Molina, *Urceolaria chilensis* Molina, *Ulceolaria chilensis* Roemer. & Schultes

Subarbusto epífito. Endémico.

Distribución: COQ, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 0-1400 m.

Nombre vulgar: Italahuén, votri, medallita, habaslahuén, canucán.

GOMORTEGACEAE

Gomortega

Gomortega keule (Molina) Baill.

Sinónimos: *Lucuma keule* Molina, *Gomortega nitida* Ruiz & Pav., *Keulia chilensis* Molina, *Adenostemum nitidum* (Ruiz & Pav.) Pers.

Árbol. Endémico.

Distribución: MAU, NUB, BIO.

Rango altitudinal: 0-700 m.

Nombre vulgar: Queule, keule.

GOODENIACEAE

Selliera

Selliera radicans Cav.

Sinónimos: *Goodenia radicans* (Cav.) Pers., *Goodenia repens* Labill., *Selliera fasciculata* Buchenan, *Selliera herpystica* Schldtl., *Selliera microphylla* Colenso, *Selliera repens* de Vriese

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 0-900 m.

Nombre vulgar: Roseta nudosa de los pantanos, maleza de las marismas.

GRISELINIACEAE

Griselinia

Griselinia carlomunozii M.O. Dillon & Muñoz-Schick

Arbusto. Endémico.

Distribución: ANT.

Rango altitudinal: 200-500 m.

Griselinia jodinifolia (Griseb.) Taub.

Sinónimos: *Decostea jodinifolia* Griseb.

Arbusto. Endémico.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 0-800 m.

Griselinia racemosa (Phil.) Taub.

Sinónimos: *Decostea racemosa* Phil.

Arbusto. Nativo.

Distribución: ARA, LRI, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 0-1300 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Lamulahuen.

Griselinia ruscifolia (Clos) Ball

Sinónimos: *Decostea ruscifolia* Clos, *Griselinia ruscifolia* (Clos) Taub., comb. illeg.

Arbusto. Nativo.

Distribución: LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 500-2000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Lilinque.

Griselinia scandens (Ruiz & Pav.) Taub.

Sinónimos: *Decostea scandens* Ruiz & Pav., *Griselinia alata* Ball

Arbusto. Endémico.

Distribución: COQ, VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 0-800 m.

Nombre vulgar: Yelmo.

GROSSULARIACEAE

Ribes

Ribes bicolor Phil.

Sinónimos: *Ribes glandulosum* Ruiz & Pav., *Ribes ruizii* Rehder

Arbusto. Endémico.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 1700 m.

Ribes cucullatum Hook. & Arn.

Sinónimos: *Ribes lacarens*e Phil., *Ribes nubigenum* Phil., *Ribes nebularum* Phil., *Ribes montanum* Phil., *Ribes brachystachya* Phil.

Arbusto. Nativo.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-3000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Zarzaparrilla.

Ribes densiflorum Phil.

Sinónimos: *Ribes cucullatum* Hook. & Arn. var. *densiflorum* (Phil.) Sparre, *Ribes nitidissimum* Neger

Arbusto. Nativo.

Distribución: NUB, BIO, ARA, LLA.

Rango altitudinal: 1000-2000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Ribes integrifolium Phil.

Arbusto. Endémico.

Distribución: BIO, ARA.

Rango altitudinal: 1100-1400 m.

Nombre vulgar: Parrilla falsa.

Ribes magellanicum Poir.

Sinónimos: *Ribes ovallei* Phil., *Ribes parviflorum* Phil., *Ribes parvifolium* Phil., *Ribes ahrendssii* Phil., *Ribes palenae* Phil., *Ribes micranthum* Phil., *Ribes magellanicum* Poir. subsp. *parviflorum* (Phil.) Sparre

Arbusto. Nativo.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-2000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Zarzaparrilla, parrilla.

Ribes nemorosum Phil.

Sinónimos: *Ribes polyanthes* Phil., *Ribes rupicola* Phil., *Ribes stolpi* Phil.

Arbusto. Endémico.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 1400-1800 m.

Nombre vulgar: Zarzaparrilla.

Ribes punctatum Ruiz & Pav.

Sinónimos: *Rebis punctata* (Ruiz & Pav.) Spach, *Rebis ebracteolata* Spach, *Ribes ebracteolatum* (Spach) Gay, *Ribes sublobatum* Phil., *Ribes collinum* Phil., *Ribes berteroanum* Phil., *Ribes heterophyllum* Phil., *Ribes georgianum* F. Phil.

Arbusto. Nativo.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.

Rango altitudinal: 500-2000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Brevilla, zarzaparrilla, parrilla, uvilla.

Ribes trilobum Meyen

Sinónimos: *Rebis gayanum* (Spach) Reiche, *Ribes villosum* Gay

Arbusto. Endémico.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 0-2400 m.

Nombre vulgar: Parrilla, muhul.

Ribes valdivianum Phil.

Sinónimos: *Ribes valdivianum* Phil. var. *sessiliflorum* Phil.

Arbusto. Nativo.

Distribución: RME, LBO, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 0-1700 m.

Países limítrofes: Argentina.

GUNNERACEAE

Gunnera

***Gunnera bertero* Phil.**

Sinónimos: *Gunnera laxiflora* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: LBO, MAU.

Rango altitudinal: 2700-3100 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Gunnera bracteata Steud. ex G. Benn.

Sinónimos: *Gunnera glabra* Phil., *Gunnera insularis* Phil., *Gunnera pyramidalis* Schindl.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: JFE.
Rango altitudinal: 0-500 m.
Nombre vulgar: Pangue.

Gunnera lobata Hook.f.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Gunnera magellanica Lam.
Sinónimos: *Dysemone integrifolia* Banks ex Blume,
Misandra magellanica J.F. Gmel., *Gunnera plicata*
Vahl, *Gunnera falklandica* Hook.f., *Gunnera reichei*
Schindl., *Gunnera integrifolia* Blume
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI,
LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-1800 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Gunnera masafuerae Skottsb.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: JFE.
Rango altitudinal: 0-500 m.
Nombre vulgar: Pangue.

Gunnera peltata Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: JFE.
Rango altitudinal: 0-500 m.
Nombre vulgar: Pangue.

Gunnera tinctoria (Molina) Mirb. var. ***meyerii***
(L.E. Mora) L.E. Mora, Pabón-Mora & F. González
Sinónimos: *Gunnera chilensis* Lam. var. *meyerii* L.E.
Mora
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ARA, LLA.
Rango altitudinal: 0-1500 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Pangue, nalca.

Gunnera tinctoria (Molina) Mirb. var. ***tinctoria***
Sinónimos: *Panke tinctoria* Molina, *Gunnera chilensis*
Lam., *Gunnera scabra* Ruiz & Pav., *Panke*

anapodophyllifolia Feuille, *Panke chilensis* Oersted,
Panke caulescens J.F. Gmelin
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ, VAL, LBO, MAU, NUB, BIO,
ARA, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-1000 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Pangue, nalca.

Gunnera tinctoria (Molina) Mirb. var. ***valdiviensis***
(L.E. Mora) L.E. Mora, Pabón-Mora & F. González
Sinónimos: *Gunnera chilensis* Lam. var. *valdiviensis*
L.E. Mora
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: LLA.
Rango altitudinal: 0-600 m.
Nombre vulgar: Pangue, nalca.

HALORAGACEAE

Haloragis

Haloragis masafuerana Skottsb. var. ***asperrima***
(Skottsb.) Orchard
Sinónimos: *Haloragis asperrima* Skottsb.
Subarbusto. Endémico.
Distribución: JFE.
Rango altitudinal: 70-945 m.

Haloragis masafuerana Skottsb. var. ***masafuerana***
Subarbusto. Endémico.
Distribución: JFE.
Rango altitudinal: 0-600 m.

Haloragis masatierrana Skottsb.
Subarbusto. Endémico.
Distribución: JFE.
Rango altitudinal: 100-640 m.

Myriophyllum

Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc.
Sinónimos: *Myriophyllum proserpinacoides* Gillies ex
Hook. & Arn.
Hierba acuática. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-2000 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Lima, lima trencilla, wakalima, loroma, aguasana.

***Myriophyllum quitense* Kunth**

Sinónimos: *Myriophyllum elatinoides* Gaudich. var. *ternatum* (Gaudich.) Reiche, *Myriophyllum ternatum* Gaudich., *Myriophyllum ternatum* Gaudich. var. *tetraphyllum* Hook. & Arn.

Hierba acuática. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-4500 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Loroma, aguasana, loroma hembra.

HELIOTROPIACEAE

Heliotropium

***Heliotropium amplexicaule* Vahl**

Hierba o subarbusto. Perenne. Introducida.

Distribución: RME.

Rango altitudinal: 550-600 m.

***Heliotropium angiospermum* Murray**

Hierba o subarbusto. Anual o perenne. Introducida.

Distribución: TAR.

Heliotropium chenopodiaceum* (A. DC.) Clos var. *chenopodiaceum

Sinónimos: *Heliotropium chenopodiaceum* A. DC., *Cochranea chenopodiacea* (A. DC.) Miers

Arbusto. Endémico.

Distribución: ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 200-1700 m.

***Heliotropium chenopodiaceum* (A. DC.) Clos var. *ericoideum* (Miers) Reiche**

Sinónimos: *Cochlearia ericoidea* Miers, *Heliotropium pearcei* Phil., *Eritrichium glabratum* Phil.

Arbusto. Endémico.

Distribución: ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-2300 m.

***Heliotropium curassavicum* L.**

Sinónimos: *Heliotropium curassavicum* L. var. *parviflorum* Ball, *Heliotropium curassavicum* L. var. *genuinum* I.M. Johnst., nom. illeg.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO.

Rango altitudinal: 0-2000 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Heliotropium eremogenum* I.M. Johnst.**

Arbusto. Endémico.

Distribución: TAR, ANT.

Rango altitudinal: 0-300 m.

***Heliotropium filifolium* (Miers) I.M. Johnst.**

Sinónimos: *Cochranea filifolia* Miers, *Heliotropium chenopodiaceum* (A. DC.) Clos var. *filifolium* (Miers) Reiche, *Cochranea kingi* Phil., *Heliotropium kingi* (Phil.) Reiche

Arbusto. Endémico.

Distribución: ATA.

Rango altitudinal: 0-400 m.

***Heliotropium floridum* (A. DC.) Clos**

Sinónimos: *Heliotropium floridum* A.DC., *Cochranea florida* (A. DC.) Miers, *Heliotropium floridum* (A. DC.) Clos var. *latifolium* Phil.

Arbusto. Endémico.

Distribución: ANT, ATA.

Rango altitudinal: 0-600 m.

***Heliotropium geissei* F. Phil.**

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME.

Rango altitudinal: 1000-1200 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Heliotropium glutinosum* Phil.**

Sinónimos: *Cochranea glutinosa* (Phil.) Phil.

Arbusto. Endémico.

Distribución: ATA.

Rango altitudinal: 1100-1500 m.

Heliotropium huascoense I.M. Johnst.

Arbusto. Endémico.

Distribución: ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Heliotropium inconspicuum Reiche

Sinónimos: *Cochranea parviflora* Phil.

Arbusto. Endémico.

Distribución: ANT, ATA.

Rango altitudinal: 1000-1200 m.

Heliotropium jaffuelii I.M. Johnst.

Arbusto. Endémico.

Distribución: ANT.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Heliotropium krauseanum Fedde

Arbusto. Nativo.

Distribución: TAR.

Rango altitudinal: 700 m.

Países limítrofes: Perú.

Heliotropium linariifolium Phil.

Sinónimos: *Heliotropium linearifolium* F. Phil., *Heliotropium longiflorum* Phil.

Arbusto. Endémico.

Distribución: TAR, ANT, ATA.

Rango altitudinal: 0-1300 m.

Heliotropium longistylum Phil.

Sinónimos: *Cochranea longistyla* (Phil.) Phil., *Heliotropium vernicosum* Phil.

Arbusto. Endémico.

Distribución: ATA, COQ, VAL.

Rango altitudinal: 50-600 m.

Heliotropium megalanthum I.M. Johnst.

Sinónimos: *Cochranea corymbosa* Miers, *Heliotropium corymbosum* (Miers) Reiche, *Heliotropium crassifolium* Phil., *Cochranea crassifolia* (Phil.) Phil.

Subarbusto. Endémico.

Distribución: ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-700 m.

Heliotropium myosotifolium (A. DC.) Reiche

Sinónimos: *Heliotropium stenophyllum* Hook. & Arn. var. *myosotifolium* (A. DC.) Clos, *Heliotropium*

stenophyllum (Hook. & Arn.) A. DC. var. *myosotifolium* A. DC., *Cochranea myosotifolia* (A. DC.) Miers, *Cochranea hebecula* Miers, *Cochranea hispidula* Miers, *Heliotropium hispidulum* (Miers) Reiche, *Cochranea sentis* Phil., *Heliotropium canum* Phil., *Heliotropium hispidulum* Phil.

Arbusto. Endémico.

Distribución: TAR, ATA.

Rango altitudinal: 0-2400 m.

Heliotropium paronychioides A. DC.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.

Rango altitudinal: 100-3100 m.

Países limítrofes: Argentina.

Heliotropium philippianum I.M. Johnst.

Arbusto. Endémico.

Distribución: ANT, ATA.

Rango altitudinal: 0-300 m.

Heliotropium pycnophyllum Phil.

Sinónimos: *Cochranea pycnophylla* (Phil.) F. Phil. ex Reiche, *Heliotropium breamum* Phil., *Heliotropium brevifolium* Phil.

Arbusto. Endémico.

Distribución: ANT, ATA.

Rango altitudinal: 0-1100 m.

Heliotropium sclerocarpum Phil.

Sinónimos: *Cochranea sclerocarpa* Phil., *Heliotropium chenopodiaceum* (A. DC.) Clos var. *sclerocarpa* (Phil.) Reiche

Arbusto. Endémico.

Distribución: ATA.

Rango altitudinal: 0-800 m.

Heliotropium sinuatum (Miers) I.M. Johnst.

Sinónimos: *Cochranea sinuata* Miers, *Heliotropium izagae* Phil., *Heliotropium rosmarinifolium* Phil.

Arbusto. Endémico.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-1300 m.

Heliotropium stenophyllum Hook. & Arn.

Sinónimos: *Heliotropium stenophyllum* (Hook. & Arn.) A. DC., *Cochranea stenophylla* (Hook. & Arn.) Miers,

Meladendron chilense Molina, *Heliotropium rosmarinifolium* Bertero ex Steud., nom. nud., *Heliotropium rosmarinifolium* Bertero ex A.DC., *Heliotropium stenophyllum* (Hook. & Arn.) A. DC. var. *rosmarinifolium* (Bertero ex A. DC.) Clos, *Cochranea conferta* Miers, nom. nud., *Cochranea congesta* Miers Arbusto. Endémico.
Distribución: ATA, COQ, VAL.
Rango altitudinal: 0-1000 m.

Heliotropium taltalense (Phil.) I.M. Johnst.
Sinónimos: *Cochranea taltalensis* Phil., *Heliotropium rugosum* Phil., *Cochranea rugosa* (Phil.) Phil.
Arbusto. Endémico.
Distribución: ANT, ATA.
Rango altitudinal: 0-700 m.

HYDRANGEACEAE

Hydrangea

Hydrangea serratifolia (Hook. & Arn.) F. Phil.
Sinónimos: *Cornidia serratifolia* Hook. & Arn., *Cornidia integerrima* Hook. & Arn., *Hydrangea integerrima* (Hook. & Arn.) Engl., *Hydrangea scandens* Poepp.
Arbusto trepador. Nativo.
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.
Rango altitudinal: 500-1500 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Canelilla, pehuelden, voqui naranjo, laurela.

HYPERICACEAE

Hypericum

Hypericum androsaemum L.
Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: LBO, MAU, LRI, LLA.

Hypericum caespitosum Cham. & Schltdl.
Sinónimos: *Hypericum chilense* Gay, *Hypericum muscoides* Phil., *Hypericum chilense* Gay var. *muscoides*

(Phil.) Reiche, *Hypericum uliginosum* Kunth var. *prostratum* R. Keller, *Hypericum brevistylum* auct. non Choisy
Hierba. Anual o perenne. Endémica.
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.
Rango altitudinal: 5-2000 m.
Nombre vulgar: Ñanco.

Hypericum perforatum L.

Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE.

Hypericum silenoides Juss.

Sinónimos: *Hypericum paposanum* I.M. Johnst., *Hypericum indecorum* Kunth, *Hypericum multiflorum* Kunth
Hierba. Anual o perenne. Nativa.
Distribución: ANT, ARA, LRI.
Rango altitudinal: 10-250 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Hypericum x inodorum L.

Hierba o subarbusto. Anual o perenne. Introducida.
Distribución: VAL, MAU, ARA, LLA, AIS.

KRAMERIACEAE

Krameria

Krameria cistoidea Hook. & Arn.
Arbusto. Endémico.
Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME.
Rango altitudinal: 0-2500 m.
Nombre vulgar: Pacul, chañarcillo.

Krameria lappacea (Dombey) Burdet & B.B. Simpson

Sinónimos: *Landia lappacea* Dombey, *Krameria triandra* Ruiz & Pav. var. *humboldtiana* Chodat, *Krameria iluca* Phil., *Krameria pentapetala* Ruiz & Pav.
Arbusto. Nativo.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ.
Rango altitudinal: 300-4500 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

LAMIACEAE

Cuminia

Cuminia eriantha (Benth.) Benth.

Sinónimos: *Bystropogon erianthus* Benth., *Cuminia fernandezia* Colla, *Johowia fernandezia* (Colla) Epling & Looser, *Cuminia brevidens* Benth., *Skottsbergiella fernandezia* (Colla) Epling, *Cuminia eriantha* (Benth.) Benth. var. *fernandezia* (Colla) Harley

Arbusto. Endémico.

Distribución: JFE.

Rango altitudinal: 200-500 m.

Galeopsis

Galeopsis tetrahit L.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: LLA.

Gardoquia

Gardoquia gilliesii Graham

Sinónimos: *Satureja gilliesii* (Graham) Briq., *Gardoquia chilensis* Benth., *Satureja chilensis* (Benth.) Briq., *Clinopodium chilense* (Benth.) Govaerts

Arbusto. Endémico.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Nombre vulgar: Oreganillo.

Gardoquia multiflora Ruiz & Pav.

Sinónimos: *Satureja multiflora* (Ruiz & Pav.) Briq., *Clinopodium multiflorum* (Ruiz & Pav.) Kuntze, *Rizoa ovatifolia* Cav.

Arbusto. Endémico.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 0-1700 m.

Nombre vulgar: Menta de árbol.

Glechoma

Glechoma hederacea L.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: ARA, LRI, LLA, MAG.

Kurzamra

Kurzamra pulchella (Clos) Kuntze

Sinónimos: *Soliera pulchella* Clos, *Micromeria pulchella* (Clos) Wedd.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ATA, COQ.

Rango altitudinal: 3500-4100 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Poleo de cordillera.

Lamium

Lamium amplexicaule L.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, MAG.

Lamium purpureum L.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: MAG.

Lepechinia

Lepechinia chilensis (Molina) R. Morales

Sinónimos: *Lepechinia chamaedryoides* (Balb.) Epling, *Rosmarinus chilensis* Molina, *Sphacele chilense* (Molina) Briq., *Sphacele chamaedryoides* (Balb.) Briq., *Sphacele campanulata* Benth., *Dracocephalum chamaedryoides* Balb., *Phytoxis sidertifolia* Molina, *Phytoxis acidissima* Molina, *Alguelagum chilense* (Molina) Kuntze

Arbusto. Endémico.

Distribución: COQ, VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 0-1600 m.

Nombre vulgar: Salvia, salvia macho, lahuén, alhuealuén.

Lepechinia salviae (Lindl.) Epling

Sinónimos: *Sphacele salviae* (Lindl.) Briq., *Sphacele lindleyi* Benth., *Stachys salviae* Lindl., *Gardoquia salviaefolia* Colla, *Alguelagum salviae* (Lindl.) Kuntze

Arbusto. Endémico.

Distribución: COQ, VAL, RME.

Rango altitudinal: 0-900 m.

Nombre vulgar: Salvia, salvia blanca, lahuenlahuén.

***Lepechinia subhastata* (Benth.) Epling**

Sinónimos: *Sphacele subhastata* Benth., *Alguelagum subhastatum* (Benth.) Kuntze

Arbusto. Endémico.

Distribución: VAL.

Rango altitudinal: 0-1500 m.

Lycopus

***Lycopus europaeus* L.**

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: LRI, LLA.

Marrubium

***Marrubium vulgare* L.**

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, AIS, JFE.

Melissa

***Melissa officinalis* L.**

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, JFE.

Mentha

***Mentha aquatica* L.**

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, JFE.

***Mentha pulegium* L.**

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE.

***Mentha suaveolens* Ehrh.**

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: ANT, ATA, VAL, RME, LBO, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE.

***Mentha x piperita* L.**

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Micromeria

***Micromeria darwinii* Benth.**

Sinónimos: *Clinopodium darwinii* (Benth.) Kuntze, *Clinopodium darwinii* (Benth.) Kuntze var. *pusilla* (Phil.) Epling, *Satureja darwinii* (Benth.) Briq., *Satureja pusilla* Macloskie, *Micromeria darwinii* Benth. var. *pusilla* (Phil.) Speg., *Micromeria pusilla* Phil.

Subarbusto. Nativo.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Micromeria gilliesii* Benth.**

Sinónimos: *Clinopodium gilliesii* (Benth.) Kuntze, *Satureja parvifolia* (Phil.) Epling, *Satureja gilliesii* (Benth.) Briq., *Oreosphacus parvifolia* Phil.

Arbusto. Nativo.

Distribución: AYP, TAR, ANT.

Rango altitudinal: 1200-4000 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Nombre vulgar: Muña.

Molucella

***Molucella laevis* L.**

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: VAL.

Prunella

***Prunella vulgaris* L.**

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.

Salvia

***Salvia gilliesii* Benth.**

Sinónimos: *Salvia cuspidata* Ruiz et Pav. subsp. *gilliesii* (Benth.) J.R.I. Wood, *Salvia gilliesii* Benth. var. *glandulosa* Griseb.

Arbusto. Nativo.

Distribución: TAR, ANT.

Rango altitudinal: 500-4000 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

***Salvia rhombifolia* Ruiz & Pav.**

Sinónimos: *Salvia pilosa* Vahl, *Salvia foliosa* Benth., *Salvia tafallae* Benth., *Salvia paposana* Phil.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: TAR, ANT.

Rango altitudinal: 0-4000 m.

Países limítrofes: Perú.

***Salvia tubiflora* Sm.**

Sinónimos: *Salvia biflora* Ruiz & Pav., *Salvia excisa* Ruiz & Pav., *Salvia scrobiculata* Meyen, *Salvia biflora* Ruiz & Pav. var. *glabrata* Benth.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ANT, ATA.

Rango altitudinal: 0-3000 m.

Países limítrofes: Perú.

***Salvia verbenaca* L.**

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: RME.

Scutellaria

***Scutellaria nummulariifolia* Hook.f.**

Sinónimos: *Cruzia serpyllacea* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-900 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Scutellaria racemosa* Pers.**

Sinónimos: *Scutellaria rojasii* Briq., *Scutellaria rumicifolia* Kunth, *Scutellaria hastata* Larrañaga, *Scutellaria heterophylla* Willd. ex Benth., *Scutellaria bonariensis* Willd. ex Benth.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL, RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 0-1500 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

***Scutellaria valdiviana* (Clos) Epling**

Sinónimos: *Theresa valdiviana* Clos

Arbusto. Endémico.

Distribución: MAU, BIO, LRI.

Rango altitudinal: 0-200 m.

Stachys

***Stachys albicaulis* Lindl.**

Sinónimos: *Stachys eriophylla* Briq.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 1000-2000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Hierba de Santa María.

***Stachys arvensis* L.**

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: VAL, LLA, JFE, IPA.

***Stachys bridgesii* Benth.**

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, RME, LBO, MAU, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 0-2300 m.

Nombre vulgar: Hierba de Santa Rosa.

***Stachys eremicola* Epling**

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-600 m.

***Stachys gilliesii* Benth.**

Sinónimos: *Stachys petiolosa* Briq.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO.

Rango altitudinal: 0-2300 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

***Stachys grandidentata* Lindl.**

Sinónimos: *Stachys toronjicillo* Phil., *Stachys closi* Phil., *Stachys serrata* Clos

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.

Rango altitudinal: 0-2900 m.

Nombre vulgar: Hierba santa.

***Stachys macraei* Benth.**

Sinónimos: *Stachys chonotica* Hook.f.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 0-2000 m.

***Stachys ochroleuca* Phil.**

Sinónimos: *Stachys litoralis* Phil., *Stachys dubia* Briq., *Stachys rupestris* Phil., *Stachys meyeniana* Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 0-3000 m.

***Stachys pannosa* Phil.**

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, NUB, BIO.

Rango altitudinal: 0-700 m.

***Stachys philippiana* Vatke**

Sinónimos: *Stachys andina* Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, RME, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 2000-3000 m.

***Stachys sericea* Cav.**

Sinónimos: *Stachys glabrata* Phil., *Stachys sidertidoides* Gillies ex Benth., *Stachys candidissima* Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.

Rango altitudinal: 500-2500 m.

***Stachys truncata* Kunze ex Benth.**

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, MAU, AIS.

Rango altitudinal: 0-600 m.

Teucrium

***Teucrium bicolor* Sm.**

Sinónimos: *Teucrium orchideum* Lindl., *Teucrium cavanillesii* Bertero ex Steud., nom. nud., *Teucrium chilense* Desf. ex Steud., nom. nud., *Teucrium heterophyllum* Cav.

Arbusto. Endémico.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 0-2100 m.

Nombre vulgar: Oreganillo.

***Teucrium nudicaule* Hook.**

Sinónimos: *Teucrium leucanthum* Phil., *Teucrium nudicaule* Hook. var. *leucanthum* (Phil.) Epling, *Teucrium tripartitum* Meyen

Arbusto. Endémico.

Distribución: ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-2100 m.

LARDIZABALACEAE

Boquila

***Boquila trifoliolata* (DC.) Decne.**

Sinónimos: *Lardizabala trifoliolata* DC., *Lardizabala funaria* (Molina) Looser, *Cogylia ternata* Molina, *Dolichos funarius* Molina, *Boissiera trifoliata* Dombey ex DC., nom. nud., *Boquila discolor* Decne., *Lardizabala discolor* Kunze ex Poepp. & Endl.

Arbusto trepador. Nativo.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 0-1700 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Pilpilvoqui, voqui blanco, voqui pil-pil.

Lardizabala

***Lardizabala biternata* Ruiz & Pav.**

Sinónimos: *Cogylia biternata* (Ruiz & Pav.) Molina, *Boissiera triternata* Dombey ex DC., nom. nud., *Lardizabala triternata* Ruiz & Pav., *Lardizabala infuscata* Miers, *Lardizabala sylvicola* Miers, *Cogylia triternata* (Ruiz & Pav.) Molina

Arbusto trepador. Endémico.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, JFE.

Rango altitudinal: 0-1500 m.

Nombre vulgar: Cóguil, coguilera, voqui-cóguil, collivoqui, voqui blanco, huipinka, coile.
Nota: Introducida en el Archipiélago de Juan Fernández.

LAURACEAE

Beilschmiedia

Beilschmiedia berteroana (Gay) Kosterm.
Sinónimos: *Cryptocarya berteroana* Gay, *Bellota nitida* Phil., *Cryptocarya nitida* Phil., *Boldu chilanum* Nees ex Meisn., *Boldu nitidum* (Phil.) Meisn., *Bellota pauciflora* Phil.
Árbol. Endémico.
Distribución: RME, LBO, MAU, NUB.
Rango altitudinal: 0-1300 m.
Nombre vulgar: Belloto, belloto del centro.

Beilschmiedia miersii (Gay) Kosterm.
Sinónimos: *Bellota miersii* Gay, *Boldu chilanum* Nees
Árbol. Endémico.
Distribución: VAL, RME.
Rango altitudinal: 0-1500 m.
Nombre vulgar: Belloto, belloto del norte.

Cryptocarya

Cryptocarya alba (Molina) Loosener
Sinónimos: *Peumus rubra* Molina, *Peumus alba* Molina, *Cryptocarya rubra* (Molina) Skeels, *Peumus mammosa* Molina, *Laurus peumus* Molina, *Cryptocarya peumus* Nees, *Icosandra rufescens* Phil., *Cryptocarya stenantha* Phil., *Cryptocarya peumus* Nees var. *stenantha* (Phil.) Mez, *Cryptocarya peumus* Nees var. *laxiflora* Phil. ex Mez, *Cryptocarya laxiflora* Phil., *Cryptocarya peumo* (Dombey ex Lam.) Kosterm., *Cryptocarya mammosa* (Molina) Kosterm., *Laurus peumo* Dombey ex Lam.
Árbol. Endémico.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 0-1500 m.
Nombre vulgar: Peumo.

Persea

Persea lingue (Ruiz & Pav.) Nees

Sinónimos: *Persea meyeniana* Nees, *Laurus lingue* Miers ex Bertero, *Persea lingue* (Ruiz & Pav.) Nees var. *canescens* Nees, *Persea lingue* (Ruiz & Pav.) Nees var. *palustris* Nees, *Persea intermedia* Phil., *Nothaphoebe lingue* Baeza, *Nothaphoebe meyeniana* Baeza, *Laurus lingue* Ruiz & Pav.

Árbol. Nativo.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 0-900 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Lingue.

LENTIBULARIACEAE

Pinguicula

Pinguicula antarctica Vahl
Sinónimos: *Pinguicula magellanica* Comm. ex Franch.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-1000 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Flor de pantano, violeta cimarrona, violeta de pantano, grasilla.

Pinguicula chilensis

Gay
Sinónimos: *Pinguicula antarctica* Donat, hom. illeg.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.
Rango altitudinal: 1500-3000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Utricularia

Utricularia gibba L.
Sinónimos: *Utricularia gayana* A.DC., *Utricularia tenuis* Cav., *Utricularia tenuis* Cav. var. *poeppigii* A. DC.
Hierba acuática. Perenne. Nativa.
Distribución: ATA, COQ, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.
Rango altitudinal: 0-2500 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.
Nombre vulgar: Chupa bichos, bolsita de agua, manguera.

LINACEAE

Cliococca

Cliococca selaginoides (Lam.) C.M. Rogers & Mildner

Sinónimos: *Linum selaginoides* Lam., *Cliococca tenuifolia* Bab., *Linum babingtonii* Planch., *Linum selaginoides* Lam. var. *chilense* Planch., *Linum microphyllum* Larrañaga

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.

Rango altitudinal: 0-1300 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Nombre vulgar: Merulahuén.

Linum

Linum bienne Mill.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Linum catharticum L.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: MAG.

Linum chamissonis Schiede

Sinónimos: *Linum aquilinum* Molina var. *grandiflorum* Hook. & Arn., *Linum oligophyllum* Hook. & Arn., nom. illeg., *Linum macraei* Benth. var. *cumingii* Urban

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 0-800 m.

Nombre vulgar: Ñanco, ñancolahuén, retamilla, nanco, nancolahuén.

Linum cremnophilum I.M. Johnst.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ANT, ATA.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Linum macraei Benth. var. ***macraei***

Sinónimos: *Linum aquilinum* Molina, *Mesynium chilense* Raf., *Linum chironioides* Griseb., *Linum*

macraei Benth. var. *olygophyllum* (Hook. & Arn.)

Reiche, *Linum cumingii* Lodd.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Nombre vulgar: Ñancolahuén.

Linum macraei Benth. var. ***marticorenae*** Mildner

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: VAL, LBO, MAU, NUB, BIO.

Rango altitudinal: 0-300 m.

Linum prostratum Dombey ex Lam.

Sinónimos: *Linum paposanum* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ANT.

Rango altitudinal: 200-1000 m.

Países limítrofes: Bolivia y Perú.

Linum ramosissimum Gay

Sinónimos: *Linum obtusifolium* Phil., *Linum chamissonis* Schiede var. *obtusifolium* (Phil.) Reiche, *Linum*

chamissonis Schiede var. *ramosissimum* (Gay) Reiche

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ.

Rango altitudinal: 0-600 m.

Linum usitatissimum L.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: ATA, VAL, NUB, BIO, ARA, JFE.

LINDERNIACEAE

Lindernia

Lindernia dubia (L.) Pennell

Sinónimos: *Gratiola dubia* L., *Lindernia dubia* (L.)

Pennell var. *anagallidea* (Michx.) Cooperr.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.

Rango altitudinal: 20-850 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

LOASACEAE

Blumenbachia

Blumenbachia dissecta (Hook. & Arn.) Weigend & Grau

Sinónimos: *Loasa dissecta* Hook. & Arn., *Caiophora espigneira* (Gay) Urb. & Gilg, *Blumenbachia espigneira* Gay, *Caiophora dissecta* (Hook. & Arn.) Urb. & Gilg, *Loasa microcalyx* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 1030-2600 m.

Países limítrofes: Argentina.

Blumenbachia prietea Gay

Sinónimos: *Caiophora prietea* (Gay) Urb. & Gilg

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 900-2580 m.

Países limítrofes: Argentina.

Blumenbachia silvestris Poepp.

Sinónimos: *Caiophora silvestris* (Poepp.) Urb. & Gilg, *Caiophora scandens* Meyen & Klotzsch ex Walp., *Caiophora silvestris* (Poepp.) Urb. & Gilg var. *mitis* (Phil.) Urb. & Gilg, *Caiophora tomentosula* Urb. & Gilg, *Blumenbachia mitis* Phil., *Blumenbachia domeykoana* Phil., *Loasa ochagaviae* Phil., *Loasa volckmanni* Phil., *Blumenbachia nemorosa* Phil., *Blumenbachia scandens* Meyen

Hierba. Bienal o perenne. Nativa.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 115-2350 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Ortiga caballuna.

Caiophora

Caiophora chuquitensis (Meyen) Urb. & Gilg

Sinónimos: *Loasa chuquitensis* Meyen, *Blumenbachia chuquitensis* (Meyen) Hook. f., *Caiophora superba* Phil.

Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT.

Rango altitudinal: 3220-4100 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Caiophora cirsifolia C. Presl

Sinónimos: *Caiophora sepiaria* (Ruiz & Pav. ex G. Don) J.F. Macbr., *Blumenbachia sepiaria* Ruiz & Pav. ex G. Don

Hierba trepadora. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR.

Rango altitudinal: 3050-3950 m.

Países limítrofes: Perú.

Caiophora coronata (Gillies ex Arn.) Hook. & Arn.

Sinónimos: *Loasa coronata* Gillies ex Arn., *Blumenbachia coronata* (Gillies ex Arn.) Hieron., *Caiophora absinthiifolia* C. Presl

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME.

Rango altitudinal: 1500-4400 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Nombre vulgar: Ortiguilla.

Caiophora deserticola Weigend & M. Ackermann

Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa.

Distribución: TAR.

Rango altitudinal: 2400-3900 m.

Países limítrofes: Perú.

Caiophora rosulata (Wedd.) Urb. & Gilg

Sinónimos: *Loasa rosulata* Wedd., *Caiophora anemonoides* Urb. & Gilg, *Caiophora rahmeri* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT.

Rango altitudinal: 3570-4600 m.

Países limítrofes: Bolivia.

Grausa

Grausa gayana (Urb. & Gilg) Wigend & R.H.

Acuña

Sinónimos: *Loasa sagittata* auct. non Hook. & Arn., *Loasa gayana* Urb. & Gilg

Hierba trepadora. Perenne. Endémica.

Distribución: ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 60-1000 m.

Grausa lateritia (Gillies ex Arn.) Wigend & R.H. Acuña

Sinónimos: *Loasa acaulis* (Phil.) Urb. & Gilg, *Blumenbachia acaulis* Phil., *Loasa lateritia* Gillies ex Arn.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 1100-2500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Grausa martinii (Phil.) Wegend & R.H. Acuña

Sinónimos: *Loasa martinii* Phil.
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: ARA, LRI, LLA.
Rango altitudinal: 10-800 m.

Grausa micrantha (Poep.) Weigend & R.H. Acuña

Sinónimos: *Loasa remyi* Gay, *Loasa micrantha* Poepp.
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 350-780 m.

Grausa sagittata (Hook. & Arn.) Weigend & R.H. Acuña

Sinónimos: *Loasa sagittata* Hook. & Arn.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: LLA.

Huidobria

Huidobria chilensis Gay

Sinónimos: *Loasa chilensis* (Gay) Urb. & Gilg
Arbusto. Endémico.
Distribución: ANT, ATA.
Rango altitudinal: 10-1800 m.

Huidobria fruticosa Phil.

Sinónimos: *Loasa fruticosa* (Phil.) Urb. & Gilg
Arbusto. Endémico.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA.
Rango altitudinal: 10-3730 m.

Loasa

Loasa acanthifolia Desr.

Sinónimos: *Loasa punicea* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.
Rango altitudinal: 10-2000 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Ortiga brava.

Loasa acerifolia Dombey ex Juss.

Sinónimos: *Loasa furcata* Phil., *Loasa solaniifolia* Gay, *Loasa williamsi* Phil.
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: COQ, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.
Rango altitudinal: 10-1870 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Ortiga brava.

Loasa argentina Urb. & Gilg

Sinónimos: *Loasa patagonica* Urb. & Gilg, nom. nud.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AIS, MAG.
Países limítrofes: Argentina.

Loasa arnottiana Gay

Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: COQ.
Rango altitudinal: 240-1800 m.

Loasa caespitosa Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME.
Rango altitudinal: 3300-3400 m.

Loasa elongata Hook. & Arn.

Sinónimos: *Loasa bertrandii* Phil., *Loasa urmenetae* Phil.
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: ANT, ATA, COQ.
Rango altitudinal: 10-700 m.

Loasa floribunda Hook. & Arn.

Sinónimos: *Loasa floribunda* Hook. & Arn. var. *brachysepala* Urb. & Gilg
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: COQ, VAL, RME.
Rango altitudinal: 240-1800 m.

Loasa heterophylla Hook. & Arn.

Sinónimos: *Loasa aphanantha* Urb. & Gilg, *Loasa parviflora* Phil., hom. illeg., *Loasa insons* Poepp. var. *prostrata* Poepp., *Loasa barneoudii* Gay, *Loasa elongata* Phil., nom. nud., *Loasa subandina* Phil.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, MAU.

Rango altitudinal: 1000-2600 m.

Países limítrofes: Argentina.

Loasa humilis F. Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: MAU.

Rango altitudinal: 2800 m.

Loasa illapelina Phil.

Sinónimos: *Loasa illapelina* Phil. var. *laciniata* (Phil.)

Urb. & Gilg, *Loasa leucantha* Phil.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: ATA, COQ.

Rango altitudinal: 10-900 m.

Loasa insons Poepp.

Sinónimos: *Loasa intricata* Gay, *Loasa tricolor* Ker Gawl. var. *insons* (Poepp.) Urb. & Gilg, *Loasa meyeniana* Walp.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 1150-2450 m.

Países limítrofes: Argentina.

Loasa mollensis Muñoz-Schick & Trenqualye

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: VAL.

Rango altitudinal: 30 m.

Loasa multifida Gay

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: ATA, COQ.

Rango altitudinal: 130-1480 m.

Loasa nitida Desr.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: TAR, ANT.

Rango altitudinal: 10-700 m.

Loasa pallida Gillies ex Arn.

Sinónimos: *Loasa aldunatea* Gay

Subarbusto. Endémico.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO.

Rango altitudinal: 1400-3400 m.

Nombre vulgar: Ortiga caballuna.

Loasa paradoxa Urb. & Gilg

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: VAL, RME.

Rango altitudinal: 1970-3500 m.

Loasa placei Lindl.

Sinónimos: *Loasa tricolor* Ker Gawl. var. *placei* (Lindl.)

Urb. & Gilg

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 10-1000 m.

Loasa prostrata Gillies ex Arn.

Sinónimos: *Loasa tricolor* Ker Gawl. var. *prostrata* (Gillies ex Arn.) Urb. & Gilg, *Loasa prostrata* Gillies ex Arn. var. *cumingii* Hook. & Arn., *Loasa alba* D. Don

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO.

Rango altitudinal: 10-3000 m.

Loasa rotundifolia Phil.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: ATA.

Rango altitudinal: 1270-1279 m.

Loasa sclareifolia Juss.

Sinónimos: *Loasa sclareifolia* Juss. var. *brachycarpa* Urb. & Gilg, *Loasa sclareifolia* Juss. var. *inermis* Urb. & Gilg, *Loasa sclareifolia* Juss. var. *nemoralis* (Phil.) Urb. & Gilg, *Loasa nemoralis* Phil.

Hierba. Bienal o perenne. Nativa.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 100-2000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Ortiga brava.

Loasa sigmoidea Urb. & Gilg

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, MAU.

Rango altitudinal: 650-3500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Loasa tricolor* Ker Gawl.**

Sinónimos: *Loasa bryoniaefolia* Schrad. ex DC.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, MAU.

Rango altitudinal: 10-1500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Cardito.

***Loasa triloba* Dombey ex Juss.**

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.

Rango altitudinal: 10-1700 m.

Mentzelia

***Mentzelia albescens* (Gillies ex Arn.) Griseb.**

Sinónimos: *Bartonia albescens* Gillies ex Arn., *Bartonia sinuata* C. Presl, *Nuttallia albescens* (Gillies ex Arn.) Standl.

Hierba. Bienal. Nativa.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME.

Rango altitudinal: 220-1600 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Mentzelia bartonioides* (C. Presl) Urb. & Gilg**

Sinónimos: *Mentzelia andina* I.M. Johnst., hom. illeg., *Mentzelia pinnatifida* Sleumer, hom. illeg., *Acrolasia bartonioides* C. Presl, *Acrolasia solieri* Gay, *Mentzelia solieri* (Gay) Urb. & Gilg ex Urb., *Mentzelia pinnatifida* (Phil.) Urb. & Gilg, *Mentzelia andina* Urb. & Gilg, *Acrolasia bartonioides* Gay, hom. illeg., *Acrolasia pinnatifida* Phil.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: ATA, COQ.

Rango altitudinal: 980-3500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Mentzelia scabra* Kunth subsp. *atacamensis* (Urb. & Gilg) Weigend**

Sinónimos: *Mentzelia chilensis* Gay var. *atacamensis* Urb. & Gilg

Subarbusto. Endémico.

Distribución: AYP, ANT, COQ.

Rango altitudinal: 5-2000 m.

***Mentzelia scabra* Kunth subsp. *chilensis* (Gay)**

Weigend

Sinónimos: *Mentzelia ignea* (Phil.) Urb. & Gilg, *Mentzelia chilensis* Gay, *Loasa ignea* Phil.

Arbusto o subarbusto. Nativo.

Distribución: ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 415-1000 m.

Países limítrofes: Bolivia.

Nasa

***Nasa urens* (Jacq.) Weigend**

Sinónimos: *Loasa urens* Jacq.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: ANT.

Rango altitudinal: 10 m.

Países limítrofes: Perú.

Pinnasa

***Pinnasa bergii* (Hieron.) Weigend & R.H. Acuña**

Sinónimos: *Loasa bergii* Hieron.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AIS, MAG.

Rango altitudinal: 60-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Pinnasa nana* (Phil.) Weigend & R.H. Acuña**

Sinónimos: *Loasa nana* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: RME, ARA, LLA.

Rango altitudinal: 1550-2000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Pinnasa pinnatifida* (Gillies ex Arn.) Weigend & R.H. Acuña**

Sinónimos: *Loasa pinnatifida* (Gillies ex Arn., *Loasa bridgesii* Urb. & Gilg, *Loasa chillana* Urb. & Gilg, *Loasa filicifolia* Poepp., *Loasa acutiloba* Urb. & Gilg, *Loasa poeppigiana* Urb. & Gilg, *Loasa tripartita* Urb. & Gilg

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.

Rango altitudinal: 990-2800 m.

Países limítrofes: Argentina.

Pinnasa volubilis (Dombey ex Juss.) Weigend & R.H. Acuña

Sinónimos: *Loasa volubilis* Dombey ex Juss., *Loasa artemisiifolia* Poepp. ex Urb. & Gilg, *Loasa volubilis* Dombey ex Juss. var. *alpina* Poepp.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.

Rango altitudinal: 900-2600 m.

Presliophytum

Presliophytum malesherboides (Phil.) R.H. Acuña & Weigend

Sinónimos: *Loasa malesherboides* Phil., *Loasa longiseta* Phil.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 1450-3200 m.

Países limítrofes: Argentina.

Presliophytum sessiliflorum (Phil.) R.H. Acuña & Weigend

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: ANT.

Rango altitudinal: 400-750 m.

Scyphanthus

Scyphanthus elegans Sweet

Sinónimos: *Grammatocarpus volubilis* C. Presl, *Scyphanthus stenocarpus* (Poepp.) Urb. & Gilg, *Grammatocarpus cumingii* C. Presl

Hierba trepadora. Anual o bienal. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 20-3000 m.

Nombre vulgar: Monjita.

LORANTHACEAE

Desmaria

Desmaria mutabilis (Poepp. & Endl.) Tiegh. ex T. Durand & B.D. Jacks.

Sinónimos: *Loranthus mutabilis* Poepp. & Endl., *Phrygilanthus mutabilis* (Poepp. & Endl.) Eichl., *Gaiandendron mutabile* (Poepp. & Endl.) Engl. & Prantl.

Arbusto parásito. Endémico.

Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 0-1700 m.

Ligaria

Ligaria cuneifolia (Ruiz & Pav.) Tiegh.

Sinónimos: *Loranthus cuneifolius* Ruiz & Pav., *Ligaria coronata* Tiegh., *Loranthus linearifolius* Bertero

Arbusto parásito. Nativo.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, NUB.

Rango altitudinal: 0-3000 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Notanthera

Notanthera heterophylla (Ruiz & Pav.) G. Don

Sinónimos: *Loranthus heterophyllus* Ruiz & Pav., *Phrygilanthus berteroii* (Hook. & Arn.) Eichler, *Loranthus buxifolius* Cham. & Schldl., *Loranthus eschscholzianus* Mart. ex Schult. & Schult.f., *Loranthus valdivianus* Miq., *Loranthus berteroii* Hook. & Arn., *Psittacanthus berteroii* (Hook. & Arn.) G. Don, *Phrygilanthus heterophyllus* (Ruiz & Pav.) Eichler

Arbusto parásito. Endémico.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, JFE.

Rango altitudinal: 0-1500 m.

Nombre vulgar: Quintral del boldo.

Tristerix

Tristerix aphyllus (DC.) Barlow & Wiens

Sinónimos: *Phrygilanthus aphyllus* (DC.) Eichler fma. *luteus* Follmann, *Loranthus aphyllus* DC., *Loranthus cactorum* Hook. & Arn., *Phrygilanthus aphyllus* (DC.) Eichler, *Loranthus pumilus* Miers ex Schult. & Schult.f.

Arbusto parásito. Endémico.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO.

Rango altitudinal: 0-1800 m.

Nombre vulgar: Quintral del quisco.

Tristerix corymbosus (L.) Kuijt

Sinónimos: *Phrygilanthus tetrandus* (Ruiz & Pav.) Eichler, *Loranthus tetrandus* Ruiz & Pav., *Lonicera corymbosa* L., *Tristerix tetrandrus* (Ruiz & Pav.) Mart., *Loranthus corymbosus* (L.) Desr., *Loranthus utui* Molina Arbusto parásito. Nativo.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, JFE.
Rango altitudinal: 0-2400 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Quintral.
Nota: Introducida en el Archipiélago de Juan Fernández.

***Tristerix verticillatus* (Ruiz & Pav.) Barlow & Wiens**
Sinónimos: *Phrygilanthus verticillatus* (Ruiz & Pav.) Eichler, *Loranthus verticillatus* Ruiz & Pav., *Metastachys verticillata* (Ruiz & Pav.) Tiegh., *Notanthera verticillata* (Ruiz & Pav.) G. Don, *Loranthus sternbergianus* Schult. & Schult.f., *Notanthera sternbergianus* (Schult. f.) G. Don, *Phrygilanthus sternbergianus* (Schult. f.) Reiche, *Loranthus poeppigii* DC., *Notanthera poeppigii* (DC.) G. Don Arbusto parásito. Nativo.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.
Rango altitudinal: 0-3500 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.
Nombre vulgar: Quintral.

LYTHRACEAE

Ammannia

***Ammannia coccinea* Rottb.**
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: MAU.

***Ammannia latifolia* L.**
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: MAU.

Lythrum

***Lythrum hyssopifolia* L.**
Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: TAR, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE.

***Lythrum maritimum* Kunth**

Sinónimos: *Lythrum album* auct. non Kunth, *Lythrum albicaule* Bertero
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ATA, VAL, RME, JFE.
Rango altitudinal: 0-2000 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Lythrum portula* (L.) D.A. Webb**

Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: ARA, LLA.

***Lythrum salicaria* L.**

Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: RME, LLA.

Pleurophora

***Pleurophora polyandra* Hook. & Arn.**

Sinónimos: *Pleurophora polyandra* Hook. & Arn. fma. *squarrosa* (Steud.) Koehne, *Pleurophora uncinata* Phil.
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO.
Rango altitudinal: 200-2000 m.

***Pleurophora pungens* D. Don**

Sinónimos: *Pleurophora pungens* D. Don fma. *imbricata* Koehne
Subarbusto. Endémico.
Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO.
Rango altitudinal: 500-1000 m.
Nombre vulgar: Lengua de gallina.

***Pleurophora pusilla* Hook. & Arn.**

Sinónimos: *Pleurophora pusilla* Hook. & Arn. fma. *vestita* Koehne, *Pleurophora pilosiuscula* Gay var. *glabra* Phil.
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO.
Rango altitudinal: 0-900 m.

MALPIGHIACEAE

Dinemagonum

***Dinemagonum gayanum* A. Juss.**

Sinónimos: *Dinemagonum bridgesianum* A. Juss., *Dinemagonum maculigerum* Phil., *Dinemagonum albicaule* Phil., *Dinemagonum gayanum* A. Juss. var. *albicaule* (Phil.) Reiche, *Dinemagonum gayanum* A. Juss. var. *bridgesianum* (A. Juss.) Reiche, *Dinemagonum bridgesianum* A. Juss. fma. *glanduloso-bracteolata* Nied., *Dinemagonum bridgesianum* A. Juss. var. *parvifolium* Nied. Arbusto o subarbusto. Endémico. Distribución: TAR, ATA, COQ, VAL. Rango altitudinal: 0-2600 m. Nombre vulgar: Té de burro, pingo blanco.

Dinemandra

***Dinemandra ericoides* A. Juss.**

Sinónimos: *Dinemandra glaberrima* A. Juss., *Dinemandra strigosa* Phil., *Dinemandra ramosissima* Phil., *Dinemandra subaptera* Phil., *Dinemandra glauca* Baill., *Dinemandra ericoides* A. Juss. var. *triandra* Nied., *Dinemandra glaberrima* A. Juss. Arbusto o subarbusto. Endémico. Distribución: TAR, ANT, ATA. Rango altitudinal: 0-2800 m. Nombre vulgar: Té de burro, té bravo, colorado.

MALVACEAE

Abutilon

***Abutilon grandifolium* (Willd.) Sweet**

Arbusto o subarbusto. Introducido. Distribución: ANT.

Andeimalva

***Andeimalva chilensis* (Gay) J.A. Tate**

Sinónimos: *Malacothamnus chilensis* (Gay) Krapov., *Sphaeralcea glabrata* Phil., *Sphaeralcea grandifolia* Phil., *Sphaeralcea capitata* Phil., *Sphaeralcea viridis* Phil., *Sphaeralcea pteroana* Phil., *Sphaeralcea*

chilensis Gay, *Sphaeroma chilense* (Gay) Kuntze, *Sphaeroma glabratum* (Phil.) Kuntze Arbusto. Endémico.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU. Rango altitudinal: 300-3000 m.

Anoda

***Anoda cristata* (L.) Schltdl.**

Hierba. Perenne. Introducida. Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, JFE.

Corynabutilon

***Corynabutilon bicolor* (Phil. ex K. Schum.) Kearney**

Sinónimos: *Abutilon bicolor* Phil. ex K. Schum. Arbusto. Nativo. Distribución: COQ, RME. Rango altitudinal: 200-2200 m. Países limítrofes: Argentina. Nombre vulgar: Matamora, malva.

***Corynabutilon ceratocarpum* (Hook. & Arn.) Kearney**

Sinónimos: *Sida ceratocarpa* Hook. & Arn., *Abutilon ceratocarpum* (Hook. & Arn.) Gay Arbusto. Endémico. Distribución: VAL, RME, LBO. Rango altitudinal: 700-2400 m. Nombre vulgar: Huella.

***Corynabutilon hirsutum* (Phil.) A.E. Martic.**

Sinónimos: *Anoda hirsuta* Phil., *Abutilon hirsutum* (Phil.) Reiche Arbusto. Endémico. Distribución: BIO, ARA. Rango altitudinal: 300-500 m.

***Corynabutilon ochsenii* (Phil.) Kearney**

Sinónimos: *Anoda ochsenii* Phil., *Abutilon ochsenii* (Phil.) Phil. ex F. Phil., *Abutilon ochsenii* (Phil.) Phil. ex F. Phil. var. *stellaris* Reiche, *Abutilon garckeii* Baker f. Arbusto. Endémico. Distribución: ARA, LRI. Rango altitudinal: 0-500 m.

Corynabutilon salicifolium (Reiche) Krapov.

Sinónimos: *Abutilon salicifolium* Reiche

Arbusto. Endémico.

Distribución: BIO, ARA.

Rango altitudinal: 0-200 m.

Corynabutilon viride (Phil.) A.E. Martic.

Sinónimos: *Abutilon viride* Phil.

Arbusto. Endémico.

Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO.

Rango altitudinal: 1000-1800 m.

Corynabutilon vitifolium (Cav.) Kearney

Sinónimos: *Sida vitifolia* Cav., *Abutilon vitifolium* (Cav.)

D. Don, *Sidalcea triloba* Turcz.

Arbusto o árbol pequeño. Endémico.

Distribución: VAL, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 0-1400 m.

Nombre vulgar: Huella.

Cristaria

Cristaria adenophora I.M. Johnst.

Hierba. Anual o perenne. Endémica.

Distribución: ANT, ATA.

Rango altitudinal: 2400-3300 m.

Cristaria andicola Gay

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 2000-4700 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Malvilla, primavera.

Cristaria argylifolia Phil.

Sinónimos: *Cristaria aspera* Gay var. *pilosa* (Phil.)

Reiche, *Cristaria pilosa* Phil.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: ATA.

Rango altitudinal: 300-700 m.

Cristaria aspera Gay var. ***aspera***

Sinónimos: *Cristaria intermedia* Gay, *Cristaria urmenetae* Phil., *Cristaria lata* Turcz.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-800 m.

Cristaria aspera Gay var. ***formosula*** (I.M. Johnst.)

Muñoz-Schick

Sinónimos: *Cristaria formosula* I.M. Johnst.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: ANT, ATA.

Rango altitudinal: 0-700 m.

Cristaria aspera Gay var. ***sadae*** (Phil.) Muñoz-

Schick

Sinónimos: *Cristaria sadae* Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ANT, ATA.

Rango altitudinal: 0-700 m.

Cristaria calderana Muñoz-Schick

Hierba. Anual o perenne. Endémica.

Distribución: ATA.

Rango altitudinal: 0-100 m.

Cristaria cordato-rotundifolia Gay

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ATA.

Rango altitudinal: 1300-2500 m.

Cristaria cyanea Phil. ex Baker f.

Sinónimos: *Cristaria cyanea* Phil.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: TAR, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 1000-2400 m.

Nombre vulgar: Malvilla negra.

Cristaria dissecta Hook. & Arn. var. ***dissecta***

Sinónimos: *Lecanophora dissecta* (Hook. & Arn.) Speg., *Cristaria flexuosa* Phil., *Cristaria ovallea* Gay, *Cristaria univittata* Hochr., *Cristaria glandulosa* Phil. non *Cristaria* Phil. 1864 non *C. glandulosa* Phil. 1864 Hierba. Anual o perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO.

Rango altitudinal: 100-3700 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Malvavisco, malva.

Cristaria dissecta Hook. & Arn. var. ***glandulosa***
(Phil.) Muñoz-Schick

Sinónimos: *Cristaria glandulosa* Phil., *Cristaria glomerulata* I.M. Johnst., *Cristaria saniculaefolia* Phil. ex Baker f., *Cristaria saniculifolia* Phil.

Hierba. Anual o perenne. Nativa.

Distribución: ATA, COQ.

Rango altitudinal: 300-2800 m.

Países limítrofes: Argentina.

Cristaria dissecta Hook. & Arn. var. ***inconspicua***

(F. Phil.) Muñoz-Schick

Sinónimos: *Cristaria inconspicua* F. Phil.

Hierba. Anual o perenne. Nativa.

Distribución: COQ.

Rango altitudinal: 2700-3500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Cristaria fuentesiana I.M. Johnst.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ANT, ATA.

Rango altitudinal: 100-800 m.

Cristaria glaucophylla Cav. var. ***eriantha*** (Hook. & Arn.) Muñoz-Schick

Sinónimos: *Cristaria australis* Phil., *Cristaria eriantha* Hook. & Arn., *Sida eriantha* (Hook. & Arn.) Steud.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, RME, MAU.

Rango altitudinal: 0-100 m.

Cristaria glaucophylla Cav. var. ***glaucophylla***

Sinónimos: *Lecanophora glaucophylla* (Cav.) Speg., *Cristaria betonicaefolia* Pers., *Cristaria carrizalensis* Phil., *Cristaria glaucophylla* Cav. var. *simplex* Reiche, *Cristaria haenkeana* C. Presl, *Cristaria hirsuta* C. Presl, *Cristaria hispida* Phil., hom. illeg., *Cristaria pannosa* Phil. ex Reiche, *Cristaria trichocaula* Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ATA, COQ, VAL.

Rango altitudinal: 0-600 m.

Cristaria gracilis Gay

Sinónimos: *Cristaria divaricata* Phil. ex Baker f., *Cristaria humilis* Phil., *Cristaria patens* Phil., *Cristaria ranunculifolia* Phil. ex Baker f., *Cristaria divaricata* Phil. var. *hirsuta* Phil., *Cristaria divaricata* Phil., hom. illeg., *Cristaria ranunculifolia* Phil.

Hierba. Anual o perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 1000-4200 m.

Países limítrofes: Perú.

NOMBRE vulgar: Malvilla.

Cristaria insularis F. Phil. var. ***insularis***

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: IDE.

Rango altitudinal: 80 m.

Cristaria insularis F. Phil. var. ***johowii*** (Skottsb.)

Muñoz-Schick

Sinónimos: *Cristaria johowii* Skottsb.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: IDE.

Cristaria integerrima Phil. var. ***integerrima***

Sinónimos: *Cristaria diaziana* I.M. Johnst., *Cristaria foliosa* Phil., *Cristaria grandidentata* Phil. ex Baker f., *Cristaria intonsa* I.M. Johnst., *Cristaria oxyptera* Phil., *Cristaria paposana* I.M. Johnst., *Cristaria rotundifolia* Phil., *Cristaria borchersii* Phil., *Cristaria setosa* Phil., *Cristaria larrañagae* Phil., *Cristaria grandidentata* Phil.

Hierba. Anual o perenne. Endémica.

Distribución: TAR, ANT, ATA.

Rango altitudinal: 0-1500 m.

Cristaria integerrima Phil. var. ***lobulata*** (Phil.)

Muñoz-Schick

Sinónimos: *Cristaria lobulata* Phil.

Hierba. Anual o perenne. Endémica.

Distribución: ANT, ATA.

Rango altitudinal: 200-500 m.

Cristaria leucantha I.M. Johnst.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ANT.

Rango altitudinal: 0-200 m.

Cristaria molinae Gay

Sinónimos: *Cristaria diversifolia* Phil. fma. *parvula* (Phil.) I.M. Johnst., *Cristaria grandiflora* Turcz., *Cristaria heterophylla* Phil., hom. illeg., *Cristaria trifida* Phil., *Cristaria parvula* Phil., *Cristaria diversifolia* Phil.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-800 m.

***Cristaria multiflora* Gay**

Sinónimos: *Cristaria glabrata* Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: TAR, ATA, COQ, VAL.

Rango altitudinal: 0-2200 m.

***Cristaria ovata* Muñoz-Schick**

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-100 m.

***Cristaria tenuissima* Muñoz-Schick**

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: TAR, ANT.

Rango altitudinal: 0-300 m.

***Cristaria viridiluteola* Gay var. *pinnata* (Phil.)**

Muñoz-Schick

Sinónimos: *Cristaria pinnata* Phil., *Cristaria thinophila* I.M. Johnst.

Hierba. Anual o perenne. Endémica.

Distribución: TAR, ANT, ATA.

Rango altitudinal: 0-300 m.

Cristaria viridiluteola* Gay var. *viridiluteola

Sinónimos: *Cristaria bipinnatifida* Phil., *Cristaria viridiluteola* Gay var. *geraniifolia* (C. Presl) Reiche, *Cristaria seselifolia* Turcz., *Cristaria bipinnata* Phil.

Hierba. Anual o perenne. Endémica.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-800 m.

Nombre vulgar: Malvilla, malvilla salada.

Gossypium

***Gossypium barbadense* L.**

Arbusto. Introducido.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, IPA.

Hibiscus

***Hibiscus trionum* L.**

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: MAU, BIO.

Lecanophora

***Lecanophora subacaulis* Krapov.**

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 0-300 m.

Países limítrofes: Argentina.

Malva

***Malva assurgentiflora* (Kellogg) M.F. Ray**

Arbusto. Introducido.

Distribución: AYP, ANT, ATA, COQ, VAL, MAU, JFE.

***Malva dendromorpha* M.F. Ray**

Subarbusto. Introducido.

Distribución: AYP, TAR, ANT, COQ, VAL, LBO, MAU, LLA.

***Malva moschata* L.**

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: LLA, AIS.

***Malva neglecta* Wallr.**

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: VAL, RME, ARA.

***Malva nicaeensis* All.**

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, JFE.

***Malva parviflora* L.**

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: AYP, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, JFE.

***Malva sylvestris* L.**

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: ANT, VAL, RME, AIS.

***Malva verticillata* L.**

Arbusto. Introducido.

Distribución: ANT.

Malvastrum

***Malvastrum coromandelianum* (L.) Garccke**

Subarbusto. Introducido.

Distribución: TAR, RME, IPA.

Rango altitudinal: 3500-4800 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Malvella

***Malvella leprosa* (Ortega) Krapov.**

Sinónimos: *Malva albifolia* Larrañaga, *Malva leprosa* Ortega, *Malva sulphurea* Gillies ex Hook. & Arn., *Malvastrum sulfureum* (Gillies ex Hook. & Arn.) Griseb., *Sida hederacea* (Douglas) Torr., *Sida hederacea* (Douglas) Torr. var. *sulphurea* (Gillies ex Hook. & Arn.) Baker f., *Sida leprosa* (Ortega) K. Schum., *Sida leprosa* (Ortega) K. Schum. var. *sulphurea* (Hook. & Arn.) Hochr., *Sida sulphurea* (Gillies ex Hook. & Arn.) A. Gray, *Disella hederacea* (Douglas ex Hook.) Greene, *Malva hederacea* Douglas ex Hook.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME.

Rango altitudinal: 0-2000 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Nototriche argentea* A.W. Hill**

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT.

Rango altitudinal: 3300-4500 m.

Países limítrofes: Perú.

***Nototriche auricoma* (Phil.) A.W. Hill**

Sinónimos: *Malvastrum auricomum* Phil., *Malvastrum auricomum* Phil. ex Baker f.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: AYP, TAR, ANT.

Rango altitudinal: 4200-4700 m.

***Nototriche clandestina* (Phil.) A.W. Hill**

Sinónimos: *Malvastrum clandestinum* (Phil.) Baker f., *Sida clandestina* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ANT, ATA.

Rango altitudinal: 3000-5100 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Altea.

***Nototriche compacta* (A. Gray) A.W. Hill**

Sinónimos: *Malvastrum compactum* A. Gray, *Malvastrum megalorrhizum* (Phil.) Baker f., *Sida compacta* Gay, hom. illeg., *Sida macrorhiza* Phil. ex Baker f., nom. nud., *Sida megalorrhiza* Phil., *Nototriche holosericea* A.W. Hill, *Nototriche megalorrhiza* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO.

Rango altitudinal: 1900-4500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Mostaza.

***Nototriche diminutiva* (Phil.) I.M. Johnst.**

Sinónimos: *Malva diminutiva* Phil., *Malvastrum diminutivum* (Phil.) Baker f.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: TAR, ANT.

Rango altitudinal: 3800-4000 m.

***Nototriche estipulata* A.W. Hill ex B.L. Burtt**

Hierba. Perenne. Nativa.

Modiola

***Modiola caroliniana* (L.) G. Don**

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE.

Nototriche

***Nototriche alternata* A.W. Hill**

Sinónimos: *Nototriche sajamensis* (Hieron.) A.W. Hill, *Malvastrum sajamense* Hieron.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP.

Rango altitudinal: 4000-5000 m.

Países limítrofes: Perú.

***Nototriche anthemidifolia* (J. Remy) A.W. Hill**

Sinónimos: *Malvastrum anthemidifolium* (J. Remy) A. Gray, *Sida anthemidifolia* J. Remy

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR.

Distribución: AYP, TAR, ANT.

Rango altitudinal: 3000-4700 m.

Países limítrofes: Perú.

Nombre vulgar: Oqelatalata, tanitani, psike de cordillera.

***Nototriche hillii* Krapov.**

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ATA.

Rango altitudinal: 4000-4700 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

***Nototriche leucosphaera* A.W. Hill**

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT.

Rango altitudinal: 4300-4600 m.

Países limítrofes: Bolivia.

***Nototriche meyenii* Ulbr.**

Sinónimos: *Sida borussica* Meyen

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP.

Rango altitudinal: 4000-4800 m.

Países limítrofes: Perú.

***Nototriche nana* A.W. Hill**

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: AYP, TAR, ANT.

Rango altitudinal: 3700-4600 m.

***Nototriche obcuneata* (Baker f.) A.W. Hill var.**

***cinerea* A.W. Hill**

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP.

Rango altitudinal: 4400-4900 m.

Países limítrofes: Bolivia.

***Nototriche obcuneata* (Baker f.) A.W. Hill var.**

obcuneata

Sinónimos: *Malvastrum obcuneatum* Baker f.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP.

Rango altitudinal: 4000-4400 m.

Países limítrofes: Perú.

***Nototriche orbigniana* (Wedd.) A.W. Hill**

Sinónimos: *Malvastrum orbignyanum* Wedd.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP.

Rango altitudinal: 4400-4500 m.

Países limítrofes: Bolivia y Perú.

***Nototriche ovata* Krapov.**

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ATA.

Rango altitudinal: 3800-4100 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Nototriche parviflora* (Phil.) A.W. Hill**

Sinónimos: *Malvastrum parviflorum* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT.

Rango altitudinal: 4100-5000 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Nombre vulgar: Layo.

***Nototriche philippii* A.W. Hill**

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, ANT, ATA.

Rango altitudinal: 3200-4500 m.

Países limítrofes: Argentina y Perú.

***Nototriche pulverulenta* B.L. Burtt & A.W. Hill**

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR.

Rango altitudinal: 4200-4500 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

***Nototriche pulvinata* A.W. Hill**

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: AYP.

Rango altitudinal: 4000-4900 m.

Países limítrofes: Bolivia.

***Nototriche pusilla* A.W. Hill**

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT.

Rango altitudinal: 3800-4800 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Nototriche pygmaea* (J. Remy) A.W. Hill**

Sinónimos: *Malvastrum pygmaeum* (J. Remy) A. Gray,

Nototriche werdermannii Ulbr., *Sida pygmaea* J. Remy

Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: AYP, TAR.
Rango altitudinal: 3500-4600 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nototriche rugosa (Phil.) A.W. Hill
Sinónimos: *Malvastrum pedicularifolium* (Meyen) A. Gray var. *rugosum* (Phil.) Reiche, *Malvastrum rugosum* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA.
Rango altitudinal: 1900-4600 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.
Nombre vulgar: Malva.

Nototriche stipularis (Phil.) A.E. Martic.
Sinónimos: *Malvastrum stipulare* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: TAR, ANT.
Rango altitudinal: 3200-4400 m.
Países limítrofes: Bolivia.

Nototriche turritella A.W. Hill
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR.
Rango altitudinal: 3600-4600 m.
Países limítrofes: Bolivia y Perú.

Palaua

Palaua concinna (Phil.) I.M. Johnst.
Sinónimos: *Sida concinna* Phil.
Arbusto. Endémico.
Distribución: ANT.
Rango altitudinal: 0-600 m.

Palaua dissecta Benth.
Sinónimos: *Palaua bipinnatifida* Reiche
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: TAR, ANT.
Rango altitudinal: 100-400 m.
Países limítrofes: Perú.

Palaua inconspicua I.M. Johnst.
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: ANT.
Rango altitudinal: 0-200 m.

Países limítrofes: Perú.
Palaua modesta (Phil.) Reiche
Sinónimos: *Sida modesta* Phil.
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: ANT.
Rango altitudinal: 300-400 m.

Sida

Sida rhombifolia L.
Hierba o subarbusto. Anual o perenne. Introducida.
Distribución: COQ, IPA.

Sida spinosa L.
Subarbusto. Introducido.
Distribución: AYP, ATA.

Sphaeralcea

Sphaeralcea obtusiloba (Hook.) G. Don
Sinónimos: *Malva obtusiloba* Hook., *Sphaeralcea gayana* Phil., *Sphaeralcea berteroana* Phil., *Sphaeralcea collina* Phil., *Sphaeralcea floribunda* Phil., *Sphaeralcea rupestris* Phil., *Sphaeralcea coquimbana* Phil., *Sphaeralcea vidali* Phil., *Sphaeralcea circinata* Phil., *Sphaeroma obtusilobum* (Gay) Kuntze, *Sphaeroma rupestre* (Phil.) Kuntze, *Sphaeroma valparadiseum* (Phil.) Kuntze, *Sphaeroma berteroana* (Phil.) Kuntze, *Sphaeroma collinum* (Phil.) Kuntze, *Sphaeroma coquimbarum* (Phil.) Kuntze, *Sphaeroma gayanum* (Phil.) Kuntze, *Sphaeralcea arenaria* Phil., *Sphaeralcea valparadisea* Phil.
Subarbusto. Endémico.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, ARA.
Rango altitudinal: 0-2000 m.
Nombre vulgar: Malvavísca, malva del cerro.

Sphaeralcea purpurata (Lindl.) Krapov.
Sinónimos: *Malva belloa* Gay, *Malva purpurata* Lindl., *Malva purpurea* Gay, *Malva tenuifolia* Hook. & Arn., *Malvastrum belloum* (Gay) A. Gray, *Malvastrum purpuratum* (Lindl.) G. Nicholson, *Malvastrum tenuifolium* (Hook. & Arn.) Baker f., *Malva laeta* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 0-300 m.
Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Malva loca.

Tarasa

***Tarasa antofagastana* (Phil.) Krapov.**

Sinónimos: *Malva antofagastana* Phil., *Malvastrum antofagastanum* (Phil.) Baker f., *Malveopsis antofagastana* (Phil.) Kuntze
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: ANT, ATA.
Rango altitudinal: 1500-3600 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

***Tarasa congestiflora* (I.M. Johnst.) Krapov.**

Sinónimos: *Malvastrum congestiflorum* I.M. Johnst.
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT.
Rango altitudinal: 2000-3800 m.
Países limítrofes: Perú.

***Tarasa humilis* (Gillies ex Hook. & Arn.) Krapov.**

Sinónimos: *Malva humilis* Gillies ex Hook. & Arn.,
Malva subacaulis Phil., *Malvastrum humile* (Gillies ex Hook. & Arn.) A. Gray, *Malvastrum humile* (Gillies ex Hook. & Arn.) A. Gray var. *subacaule* (Phil.) Reiche, *Malvastrum subacaule* (Phil.) Baker f.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: RME, MAU, NUB, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 900-3300 m.
Países limítrofes: Argentina.

***Tarasa martiniana* Krapov.**

Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: ANT.
Rango altitudinal: 3000 m.

***Tarasa operculata* (Cav.) Krapov.**

Sinónimos: *Malvastrum plumosum* (C. Presl) A. Gray, *Malva operculata* Cav., *Tarasa rahmeri* Phil., *Malvastrum operculatum* (Cav.) Hochr., *Malva plumosa* C. Presl, *Malvastrum plumosum* (C. Presl) A. Gray var. *atacamensis* Baker f., *Tarasa rahmeri* Phil. var. *atacamensis* (Baker f.) Bruns
Subarbusto. Nativo.
Distribución: AYP, TAR, ANT.
Rango altitudinal: 1500-3800 m.
Países limítrofes: Perú.

Nombre vulgar: Malva, canchalahua.

***Tarasa pediculata* Krapov.**

Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: AYP, TAR, ANT.
Rango altitudinal: 1800-3700 m.

***Tarasa reichei* (Phil.) Krapov.**

Sinónimos: *Malva reichei* Phil., *Sida reichei* (Phil.) Reiche
Arbusto. Endémico.
Distribución: LBO, MAU.
Rango altitudinal: 0-100 m.

***Tarasa tarapacana* (Phil.) Krapov.**

Sinónimos: *Malva tarapacana* Phil., *Malvastrum tarapacanum* (Phil.) Baker f.
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT.
Rango altitudinal: 3000-4000 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

***Tarasa tenella* (Cav.) Krapov.**

Sinónimos: *Malva tenella* Cav., *Malvastrum tenellum* (Cav.) Hieron.
Hierba. Anual o bienal. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT.
Rango altitudinal: 2500-3800 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.
Nombre vulgar: Malvilla, malva.

***Tarasa umbellata* Krapov.**

Arbusto. Endémico.
Distribución: VAL, MAU.
Rango altitudinal: 10-130 m.

Thespisia

***Thespisia populnea* (L.) Sol. ex Corrêa**

Árbol. Nativo.
Distribución: IPA.
Nombre vulgar: Makoi (Rapa Nui).

Triumfetta

***Triumfetta semitriloba* Jacq.**

Arbusto o árbol pequeño. Nativo.
Distribución: IPA.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Hau hau (Rapa Nui).

Urocarpidium

***Urocarpidium albiflorum* Ulbr.**

Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: AYP.
Rango altitudinal: 2600 m.
Países limítrofes: Perú.

***Urocarpidium chilensis* (A. Braun & C.D. Bouché) Krapov.**

Sinónimos: *Fuertesimalva chilensis* (A. Braun & C.D. Bouché) Fryxell, *Malva chilensis* A. Braun & C.D. Bouché
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: AYP, ANT, ATA, COQ.
Rango altitudinal: 400-2200 m.
Países limítrofes: Perú.

***Urocarpidium mathewsii* (Turcz.) Krapov.**

Sinónimos: *Malva mathewsii* Turcz.
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: ANT, ATA, COQ.
Rango altitudinal: 0-600 m.
Países limítrofes: Perú.

***Urocarpidium peruvianum* (L.) Krapov.**

Sinónimos: *Malva peruviana* L., *Malvastrum peruvianum* (L.) A. Gray, *Fuertesimalva peruviana* (L.) Fryxell
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT, COQ.
Rango altitudinal: 100-2300 m.
Países limítrofes: Bolivia y Perú.

***Urocarpidium sanambrosianum* D.M. Bates**

Sinónimos: *Fuertesimalva sanambrosiana* (D.M. Bates) Fryxell
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: IDE.
Rango altitudinal: 200-500 m.

Waltheria

***Waltheria indica* L.**
Subarbusto. Introducido.
Distribución: AYP, IPA.

MELIACEAE

Melia

***Melia azedarach* L.**
Árbol. Introducido.
Distribución: IPA.
Nombre vulgar: Miro tahiti (Rapa Nui).

MISODENDRACEAE

Misodendrum

***Misodendrum angulatum* Phil.**
Subarbusto parásito. Nativo.
Distribución: NUB, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 4-1350 m.
Países limítrofes: Argentina.

***Misodendrum brachystachium* DC.**

Sinónimos: *Archiphyllum brachystachium* (DC.) Tiegh., *Archiphyllum macrophyllum* (Phil.) Tiegh., *Misodendrum macrophyllum* Phil.
Subarbusto parásito. Nativo.
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 10-1500 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Cabello de ángel.

***Misodendrum gayanum* Tiegh.**

Sinónimos: *Misodendrum imbricatum* Hook.f., non Poepp. & Endl.
Subarbusto parásito. Nativo.
Distribución: BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.
Rango altitudinal: 10-1300 m.
Países limítrofes: Argentina.

***Misodendrum linearifolium* DC.**

Sinónimos: *Angelopogon linearifolium* (DC.) Poepp. ex Tiegh., *Misodendrum microphyllum* Hook. & Arn. Subarbusto parásito. Nativo. Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG. Rango altitudinal: 10-2500 m. Países limítrofes: Argentina.

***Misodendrum macrolepis* Phil.**

Subarbusto parásito. Endémico. Distribución: LLA, AIS. Rango altitudinal: 900 m.

***Misodendrum oblongifolium* DC.**

Sinónimos: *Archiphyllum oblongifolium* (DC.) Tiegh. Subarbusto parásito. Nativo. Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG. Rango altitudinal: 45-2000 m. Países limítrofes: Argentina. Nombre vulgar: Cabello de ángel.

***Misodendrum punctulatum* DC.**

Sinónimos: *Misodendrum imbricatum* Poepp. & Endl., *Misodendrum punctulatum* DC. var. *magellanicum* DC. Subarbusto parásito. Nativo. Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG. Rango altitudinal: 3-1600 m. Países limítrofes: Argentina. Nombre vulgar: Injerto.

***Misodendrum quadriflorum* DC.**

Sinónimos: *Telophyllum quadriflorum* (DC.) Tiegh. Subarbusto parásito. Nativo. Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, AIS, MAG. Rango altitudinal: 10-1710 m. Países limítrofes: Argentina.

MOLLUGINACEAE

Glinus

***Glinus radiatus* (Ruiz & Pav.) Rohrb.**

Sinónimos: *Mollugo radiata* Ruiz & Pav., *Mollugo araucana* Phil.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Hierba del pollo.

MONIMIACEAE

Peumus

***Peumus boldus* Molina**

Sinónimos: *Ruizia fragrans* Ruiz & Pav., *Peumus fragrans* (Ruiz & Pav.) Pers., *Boldoa fragrans* (Ruiz & Pav.) Gay, *Boldea boldus* (Molina) Looser, *Boldus chilensis* Molina, *Boldu chilanum* Nees Árbol. Endémico. Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA. Rango altitudinal: 0-1500 m. Nombre vulgar: Boldo, boldu.

MONTIACEAE

Calandrinia

***Calandrinia acaulis* Kunth**

Sinónimos: *Calandrinia megarhiza* Hemsl. Hierba. Perenne. Nativa. Distribución: AYP, TAR, ATA. Rango altitudinal: 3500-4750 m. Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Calandrinia affinis* Gillies ex Arn.**

Hierba. Perenne. Nativa. Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU. Rango altitudinal: 2000-3400 m. Países limítrofes: Argentina. Nombre vulgar: Quiaca.

***Calandrinia caespitosa* Gillies ex Arn.**

Sinónimos: *Calandrinia diffusa* Gillies ex Arn., *Calandrinia rupestris* Barnéoud, *Calandrinia densa* Phil., nom. illeg., *Calandrinia rupestris* Barnéoud var.

skottsbergii (Gand.) Skottsb., *Calandrinia caespitosa* Gillies ex Arn. var. *skottsbergii* (Gand.) Añon, *Calandrinia densa* Reiche ex Peralta & D.I. Ford, nom. illeg., *Calandrinia gayana* Barnéoud var. *glomerata* Reiche, *Claytonia caespitosa* (Gillies ex Arn.) Kuntze, *Claytonia diffusa* (Gillies & Hook.) Kuntze, *Claytonia rupestris* (Barnéoud) Kuntze
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, MAU, ARA, MAG.
Rango altitudinal: 1980-3950 m.
Países limítrofes: Argentina.

Calandrinia ciliata (Ruiz & Pav.) DC.
Sinónimos: *Talinum ciliatum* Ruiz & Pav., *Calandrinia caulescens* Kunth, *Calandrinia feltonii* Skottsb.
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: VAL, RME, LBO, BIO, LLA.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Calandrinia colchaguensis Barnéoud
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.
Rango altitudinal: 990-2800 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Calandrinia compacta Barnéoud
Sinónimos: *Calandrinia occulta* Phil., *Calandrinia armeriifolia* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, RME.
Rango altitudinal: 1900-4600 m.
Países limítrofes: Argentina.

Calandrinia compressa Schrad. ex DC.
Sinónimos: *Calandrinia gaudichaudii* Barnéoud, *Calandrinia macilenta* Barnéoud, *Calandrinia procumbens* Moris, *Calandrinia virgata* Phil., *Calandrinia tenella* Hook. & Arn.
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.
Rango altitudinal: 10-2000 m.
Países limítrofes: Bolivia.

Calandrinia fuegiana Gand.
Sinónimos: *Calandrinia caespitosa* Gillies ex Arn. var. *australis* Skottsb.

Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAG.
Rango altitudinal: 550-1100 m.
Países limítrofes: Argentina.

Calandrinia graminifolia Phil.
Sinónimos: *Calandrinia affinis* Gillies ex Arn. var. *graminifolia* (Phil.) Reiche
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 1800-2100 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Calandrinia monandra (Ruiz & Pav.) DC.
Sinónimos: *Talinum monandrum* Ruiz & Pav., *Monocosmia corrigioloides* Fenzl, *Corrigiola deltoides* Hook. & Arn., *Monocosmia monandra* (Ruiz & Pav.) Baill.
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, JFE.
Rango altitudinal: 5-2100 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nota: Introducida en el Archipiélago de Juan Fernández.

Calandrinia nitida (Ruiz & Pav.) DC.
Sinónimos: *Calandrinia multicaulis* Phil., *Calandrinia axilliflora* Barnéoud, *Talinum diffusum* Colla, *Talinum nitidum* Ruiz & Pav.
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: VAL, RME, LBO, LRI.
Rango altitudinal: 30-1185 m.

Calandrinia ranunculina J.M. Watson, A.R.
Flores & Elvebak
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAG.
Rango altitudinal: 150 m.
Países limítrofes: Argentina.

Calandrinia skottsbergii Gand.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ARA, AIS.
Rango altitudinal: 1200-2300 m.
Países limítrofes: Argentina.

Cistanthe

Cistanthe amaranoides (Phil.) Carolin ex Hershkovitz
Sinónimos: *Philippiamra amaranthoides* (Phil.) Kuntze, *Silvaea amaranoides* Phil., *Silvaea corrigioloides* Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ.
Rango altitudinal: 20-3350 m.
Nombre vulgar: Anojarjinchu.

Cistanthe arancioana Peralta
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: ANT.
Rango altitudinal: 1300-2600 m.

Cistanthe arenaria (Cham.) Carolin ex Hershkovitz
Sinónimos: *Calandrinia arenaria* Cham., *Calandrinia chamssoi* Barnéoud, *Calandrinia arenaria* Cham. var. *chamssoi* (Barnéoud) Reiche, *Calandrinia arenaria* Cham. var. *subverticillata* (Phil.) Reiche, *Calandrinia arenaria* Cham. var. *vicina* (Phil.) Reiche, *Calandrinia solisii* Phil., *Calandrinia nana* Phil., *Calandrinia subverticillata* Phil., *Talinum trigonum* Colla, *Calandrinia venulosa* Hook. & Arn., *Claytonia trigona* (Colla) Kuntze
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 5-1800 m.
Países limítrofes: Argentina.

Cistanthe cabrerae (Añon) Peralta
Sinónimos: *Calandrinia cabrerae* Añon
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ANT, ATA.
Rango altitudinal: 2755 m.
Países limítrofes: Argentina.

Cistanthe cachinalensis (Phil.) Peralta & D.I. Ford
Sinónimos: *Calandrinia taltalensis* I.M. Johnst., *Calandrinia cachinalensis* Phil.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica.
Distribución: ANT, ATA, COQ.
Rango altitudinal: 2-500 m.

Cistanthe calycina (Phil.) Carolin ex Hershkovitz

Sinónimos: *Calandrinia calycina* Phil., *Calandrinia bochersii* Phil., nom. illeg.
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: ANT, ATA, COQ.
Rango altitudinal: 10-1370 m.

Cistanthe celosiooides (Phil.) Carolin ex Hershkovitz
Sinónimos: *Philippiamra celosiooides* (Phil.) Kuntze, *Philippiamra fastigiata* (Phil.) Pax & K. Hoffm., *Philippiamra pachyphylla* (Phil.) Kuntze, *Silvaea capitata* Phil., *Silvaea celosiooides* Phil., *Silvaea fastigiata* Phil., *Silvaea pachyphylla* Phil.
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA.
Rango altitudinal: 90-4000 m.
Países limítrofes: Perú.
Nombre vulgar: Básal.

Cistanthe cephalophora (I.M. Johnst.) Carolin ex Hershkovitz
Sinónimos: *Calandrinia cephalophora* I.M. Johnst.
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: TAR, ANT, ATA.
Rango altitudinal: 20-3730 m.

Cistanthe chrysanthia (I.M. Johnst.) Peralta & D.I. Ford
Sinónimos: *Calandrinia chrysanthia* I.M. Johnst.
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: ANT.
Rango altitudinal: 0-200 m.

Cistanthe coquimbensis (Barnéoud) Carolin ex Hershkovitz
Sinónimos: *Calandrinia coquimbensis* Barnéoud
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: ATA, COQ.
Rango altitudinal: 100-800 m.

Cistanthe cymosa (Phil.) Hershkovitz
Sinónimos: *Calandrinia cymosa* Phil.
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ.
Rango altitudinal: 2-1100 m.

Cistanthe densiflora (Barnéoud) Hershkovitz

Sinónimos: *Calandrinia densiflora* Barnéoud, *Calandrinia barneoudii* Phil., *Calandrinia fasciculata* Phil., *Calandrinia viridis* Phil., *Calandrinia spicata* Phil. Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ.
Rango altitudinal: 265-3400 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Pata de guanaco.

Cistanthe fenzlii (Barnéoud) Carolin ex Hershkovitz
Sinónimos: *Calandrinia fenzlii* Barnéoud, *Calandrinia lancifolia* Phil., *Calandrinia sanguinea* Phil. Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: LBO, BIO, ARA.

Cistanthe frigida (Barnéoud) Peralta
Sinónimos: *Calandrinia frigida* Barnéoud, *Cistanthe picta* (Gillies ex Arn.) Carolin ex Hershkovitz var. *frigida* (Barnéoud) Hershkovitz, *Calandrinia picta* Gillies ex Arn. var. *frigida* (Barnéoud) Reiche Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME.
Rango altitudinal: 1250-4200 m.
Países limítrofes: Argentina.

Cistanthe grandiflora (Lindl.) Schiltl.
Sinónimos: *Cistanthe discolor* (Schrad.) Spach, *Calandrinia grandiflora* Lindl., *Calandrinia speciosa* Lehm., *Cistanthe grandiflora* (Lindl.) Carolin ex Hershkovitz, comb. illeg., *Calandrinia spectabilis* Otto & Dietr., *Calandrinia discolor* Schrad., *Cistanthe speciosa* (Lehm.) Lilja, *Calandrinia glauca* Schrad. Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 5-2800 m.
Nombre vulgar: Doquilla, hierba del corrimiento, mármol, pata de guanaco, renilla.

Cistanthe humilis (Phil.) Peralta
Sinónimos: *Calandrinia humilis* Phil., *Calandrinia oblongifolia* Barnéoud var. *humilis* (Phil.) Reiche Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ATA, COQ.
Rango altitudinal: 1200-4500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Cistanthe lamprosperma (I.M. Johnst.) Peralta & D.I. Ford
Sinónimos: *Calandrinia lamprosperma* I.M. Johnst. Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ANT.
Rango altitudinal: 50-900 m.

Cistanthe laxiflora (Phil.) Peralta & D.I. Ford
Sinónimos: *Calandrinia aegilitis* F. Phil., *Calandrinia laxiflora* Phil. Hierba suculenta. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ, VAL.
Rango altitudinal: 5-1600 m.

Cistanthe longiscapa (Barnéoud) Carolin ex Hershkovitz
Sinónimos: *Calandrinia litoralis* Phil., *Calandrinia longiscapa* Barnéoud Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: ANT, ATA, COQ.
Rango altitudinal: 5-3800 m.

Cistanthe minuscula (Añon) Peralta
Sinónimos: *Calandrinia minuscula* Añon Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: TAR, ANT, ATA.
Rango altitudinal: 2400-4450 m.
Países limítrofes: Argentina.

Cistanthe picta (Gillies ex Arn.) Carolin ex Hershkovitz
Sinónimos: *Calandrinia picta* Gillies ex Arn., *Calandrinia picta* Gillies ex Arn. var. *portulacifolia* (Phil.) Hicken, *Calandrinia portulacifolia* Phil., *Calandrinia villanuevae* Phil. Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO.
Rango altitudinal: 1100-4100 m.
Países limítrofes: Argentina.

Cistanthe salsolooides (Barnéoud) Carolin ex Hershkovitz
Sinónimos: *Calandrinia salsolooides* Barnéoud, *Calandrinia calocephala* Phil., *Calandrinia spicigera* Phil., *Calandrinia acuminata* Phil. Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 1200-4300 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Congonilla, kámin.

Cistanthe stricta (Phil.) Peralta
Sinónimos: *Calandrinia stricta* Phil.
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: ATA.
Rango altitudinal: 920-1900 m.
Países limítrofes: Argentina.

Cistanthe thyrsoides (Reiche) Peralta & D.I. Ford
Sinónimos: *Calandrinia thyrsoides* Reiche
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: AYP, TAR, ATA, COQ.
Rango altitudinal: 10-2850 m.

Lenzia

Lenzia chamaepitys Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ANT, ATA, COQ.
Rango altitudinal: 3500-4600 m.
Países limítrofes: Argentina.

Montia

Montia fontana L.
Sinónimos: *Montia linearifolia* d'Urv., *Calandrinia pusilla* Barnéoud, *Monocosmia verrucosa* Phil.
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG.
Rango altitudinal: 10-2600 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Montiopsis

Montiopsis andicola (Gillies) D.I. Ford
Sinónimos: *Calandrinia andicola* Gillies, *Calandrinia denticulata* Gillies, *Calandrinia denticulata* Gillies var. *andicola* (Gillies) Reiche, *Calandrinia denticulata* Gillies var. *echinata* Barnéoud, *Calandrinia oligantha* Phil., *Calandrinia saxifraga* Barnéoud, *Calandrinia saxifraga* Barnéoud var. *oligantha* (Phil.) Reiche, *Calandrinia tricolor* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB.
Rango altitudinal: 700-3600 m.
Países limítrofes: Argentina.

Montiopsis berteroana (Phil.) D.I. Ford
Sinónimos: *Calandrinia berteroana* Phil., *Calandrinia floribunda* Phil., *Calandrinia rosea* Phil.
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 10-2350 m.
Países limítrofes: Argentina.

Montiopsis capitata (Hook. & Arn.) D.I. Ford
Sinónimos: *Calandrinia capitata* Hook. & Arn., *Calandrinia capituligera* Phil., *Calandrinia erithrichioides* Phil., *Calandrinia erythrocoma* Phil., *Calandrinia petiolata* Phil., *Calandrinia prostrata* Phil.
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: AYP, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, AIS.
Rango altitudinal: 400-3650 m.
Países limítrofes: Argentina.

Montiopsis cistiflora (Gillies ex Arn.) D.I. Ford
Sinónimos: *Calandrinia dianthoides* Phil., *Calandrinia splendens* Barnéoud, *Calandrinia splendens* Barnéoud var. *dianthoides* (Phil.) Reiche, *Calandrinia cistiflora* Gillies ex Arn.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 1100-3400 m.
Países limítrofes: Argentina.

Montiopsis copiapina (Phil.) D.I. Ford
Sinónimos: *Calandrinia copiapina* Phil., *Calandrinia polia* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ANT, ATA, COQ.
Rango altitudinal: 1200-4500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Montiopsis cumingii (Hook. & Arn.) D.I. Ford
Sinónimos: *Calandrinia cumingii* Hook. & Arn.
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT, COQ, VAL, RME, MAU.

Rango altitudinal: 1300-4700 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Montiopsis demissa* (Phil.) D.I. Ford**

Sinónimos: *Calandrinia demissa* Phil., *Calandrinia depressa* Phil.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: TAR, ATA, COQ, VAL, RME.

Rango altitudinal: 5-670 m.

***Montiopsis gayana* (Barnéoud) D.I. Ford**

Sinónimos: *Calandrinia gayana* Barnéoud, *Calandrinia tenuifolia* Phil., *Calandrinia rahmeri* Phil., *Calandrinia vidali* Phil., *Calandrinia glandulifera* Phil., *Calandrinia conferta* Gillies ex Arn., *Calandrinia hirtella* Phil., *Calandrinia calycotricha* Phil., *Calandrinia gayana* Barnéoud var. *hirtella* (Phil.) Reiche

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.

Rango altitudinal: 100-2900 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Montiopsis gilliesii* (Hook. & Arn.) D.I. Ford**

Sinónimos: *Calandrinia gilliesii* Hook. & Arn., *Calandrinia canescens* Phil., *Calandrinia sessiliflora* Phil., *Calandrinia sericea* Hook. & Arn. var. *sessiliflora* (Phil.) Hauman, *Calandrinia setosa* Phil. var. *longifolia* Phil., *Calandrinia leucotricha* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 2250-3400 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Montiopsis glomerata* (Phil.) D.I. Ford**

Sinónimos: *Calandrinia glomerata* Phil., *Calandrinia callithrix* Phil., *Calandrinia leucocephala* Phil.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: ATA, COQ.

Rango altitudinal: 3200-3760 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Montiopsis modesta* (Phil.) D.I. Ford**

Sinónimos: *Calandrinia modesta* Phil.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 3050-4030 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Montiopsis parviflora* (Phil.) D.I. Ford**

Sinónimos: *Calandrinia bandurriae* Phil., *Calandrinia parviflora* Phil.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: AYP, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 190-4100 m.

***Montiopsis polycarpoides* (Phil.) Peralta**

Sinónimos: *Calandrinia polycarpoides* Phil., *Calandrinopsis polycarpoides* (Phil.) R. Franz

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: ANT, VAL.

Rango altitudinal: 750-2110 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

***Montiopsis potentilloides* (Barnéoud) D.I. Ford**

Sinónimos: *Calandrinia potentilloides* Barnéoud, *Calandrinia uspallatensis* Phil., *Montiopsis uspallatensis* (Phil.) D.I. Ford, *Calandrinia nivalis* Phil., *Calandrinia sericea* Hook. & Arn. var. *uspallatensis* (Phil.) Reiche, *Calandrinia setosa* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME.

Rango altitudinal: 900-3800 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Montiopsis ramosissima* (Hook. & Arn.) D.I. Ford**

Sinónimos: *Calandrinia landbeckii* Phil., *Calandrinia poeppigiana* Walp., *Calandrinia ramosissima* Hook. & Arn.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 100-1800 m.

***Montiopsis sericea* (Hook. & Arn.) D.I. Ford**

Sinónimos: *Calandrinia argentea* Phil., *Calandrinia ferruginea* Barnéoud, *Calandrinia potentilloides* Barnéoud var. *minor* Barnéoud, *Calandrinia sericea* Hook. & Arn., *Calandrinopsis sericea* (Hook. & Arn.) R. Franz, *Calandrinia sericea* Hook. & Arn. var. *longipes* Hook. & Arn.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, RME, MAU, NUB.

Rango altitudinal: 450-3600 m.

Nombre vulgar: Hierba del chancho.

***Montiopsis trifida* (Hook. & Arn.) D.I. Ford**

Sinónimos: *Calandrinia aurea* Barnéoud, *Calandrinia capitata* Hook. & Arn. var. *prolifera* (Phil.) Reiche, *Calandrinia involucrata* Phil., *Calandrinia leucopogon* Phil., *Calandrinia montana* Phil., *Calandrinia prolifera* Phil., *Calandrinia trifida* Hook. & Arn., *Calandrinopsis montana* (Phil.) R. Franz
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO.
Rango altitudinal: 10-3300 m.

Montiopsis umbellata (Ruiz & Pav.) D.I. Ford
Sinónimos: *Talinum umbellatum* Ruiz & Pav., *Calandrinia umbellata* (Ruiz & Pav.) DC., *Calandrinia hispida* Phil., *Calandrinia phalacra* Phil., *Calandrinia sanfurgi* Phil., *Calandrinia sericea* Hook. & Arn. var. *phalacra* (Phil.) Reiche, *Calandrinopsis umbellata* (Ruiz & Pav.) R. Franz, *Calandrinia sericea* Hook. & Arn. var. *aequipes* Hook. & Arn.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.
Rango altitudinal: 40-3000 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Flor de la mistela.

MORACEAE

Broussonetia

Broussonetia papyrifera (L.) L'Hér. ex Vent.
Arbusto o árbol pequeño. Introducido.
Distribución: IPA.
Nombre vulgar: Mahute (Rapa Nui).

MYRICACEAE

Morella

Morella pavonis (C. DC.) Parra-O
Sinónimos: *Myrica pavonis* C. DC.
Arbusto o árbol pequeño. Nativo.
Distribución: AYP, TAR.
Rango altitudinal: 450-2800 m.
Países limítrofes: Perú.

MYRTACEAE

Amomyrtus

Amomyrtus luma (Molina) D. Legrand & Kausel
Sinónimos: *Eugenia darwinii* Hook.f., *Myrtus luma* Molina, *Myrtus multiflora* Juss. ex J. St.-Hil., *Myrtus darwinii* (Hook.f.) Barnéoud, *Myrcia lechleriana* Miq., *Myrtus valdiviana* Phil., *Pseudocaryophyllus darwinii* (Hook.f.) Burret
Árbol. Nativo.
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.
Rango altitudinal: 0-800 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Luma.

Amomyrtus meli (Phil.) D. Legrand & Kausel
Sinónimos: *Myrtus meli* Phil., *Pseudocaryophyllus meli* (Phil.) Burret
Árbol. Endémico.
Distribución: BIO, ARA, LRI, LLA.
Rango altitudinal: 0-600 m.
Nombre vulgar: Meli.

Blepharocalyx

Blepharocalyx cruckshanksii (Hook. & Arn.) Nied.
Sinónimos: *Eugenia cruckshanksii* Hook. & Arn., *Eugenia divaricatum* O. Berg, *Luma cruckshanksii* (Hook. & Arn.) A. Gray, *Eugenia divaricatum* O. Berg var. *obovata* O. Berg, *Eugenia divaricatum* O. Berg var. *ovalis* O. Berg, *Eugenia divaricatum* O. Berg var. *pauciflora* O. Berg, *Blepharocalyx divaricatus* (O. Berg) Nied., *Blepharocalyx divaricatus* (O. Berg) Nied. var. *obovatus* (O. Berg) Reiche, *Blepharocalyx divaricatus* (O. Berg) Nied. var. *ovalis* (O. Berg) Reiche, *Blepharocalyx divaricatus* (O. Berg) Nied. var. *pauciflorus* (O. Berg) Reiche, *Temu divaricatum* (O. Berg) O. Berg
Árbol. Endémico.
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.
Rango altitudinal: 0-200 m.
Nombre vulgar: Temu, palo colorado.

Eucalyptus

***Eucalyptus camaldulensis* Dehnh.**

Árbol. Introducido.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU.

***Eucalyptus globulus* Labill.**

Árbol. Introducido.

Distribución: VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, JFE, IPA.

Legrandia

***Legrandia concinna* (Phil.) Kausel**

Sinónimos: *Eugenia concinna* Phil.

Arbusto o árbol pequeño. Endémico.

Distribución: MAU, NUB.

Rango altitudinal: 500-1000 m.

Nombre vulgar: Luma.

Luma

***Luma apiculata* (DC.) Burret**

Sinónimos: *Eugenia apiculata* DC., *Eugenia proba* O. Berg, *Myrceugenella apiculata* (DC.) Kausel, *Myrceugenella apiculata* (DC.) Nied., *Eugenia gilliesi* Hook. & Arn., *Eugenia affinis* Gillies ex Hook. & Arn., *Eugenia hookeri* Steud., *Eugenia apiculata* DC. var. *arnyan* Hook.f., *Eugenia barneoudii* O. Berg, *Eugenia spectabilis* Phil., *Eugenia modesta* Phil., *Eugenia mucronata* Phil., *Eugenia palenae* Phil., *Eugenia cuspidata* Phil., *Eugenia ebracteata* F. Phil., *Myrtus chequenilla* Kuntze, *Luma gilliesi* (Hook. & Arn.) Burret, *Luma spectabilis* (Phil.) Burret, *Luma hookeri* (Steud.) Burret, *Myrceugenella apiculata* (DC.) Kausel var. *australis* Kausel, *Myrceugenella grandjotii* Kausel, *Myrceugenella apiculata* (DC.) Kausel var. *spectabilis* (Phil.) Kausel

Árbol. Nativo.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 500-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Arrayán, palo colorado.

***Luma chequen* (Molina) A. Gray**

Sinónimos: *Eugenia chequen* Molina, *Myrtus chequen* (Molina) Spreng., *Eugenia gayana* Barnéoud, *Myrtus*

uliginosa Miq., *Myrtus uliginosa* Miq. fma. *major* Miq.,

Myrtus gayana (Barnéoud) O. Berg, *Eugenia bella* Phil.,

Eugenia pulchra O. Berg, *Eugenia myrtomimeta* Diels,

Luma gayana (Barnéoud) Burret, *Myrceugenella*

chequen (Molina) Kausel, *Myrceugenella gayana*

(Barnéoud) Kausel, *Myrceugenella langerfeldtii* Kausel,

Myrceugenella chequen (Molina) Kausel var.

myrtomimeta (Diels) Kausel

Arbusto o árbol pequeño. Endémico.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 0-1100 m.

Nombre vulgar: Chequén, arrayán blanco.

Myrceugenia

***Myrceugenia chrysocarpa* (O. Berg) Kausel**

Sinónimos: *Luma chrysocarpa* (O. Berg) Burret,

Eugenia chrysocarpa O. Berg, *Eugenia philippii* O.

Berg, *Eugenia buxifolia* Phil., *Eugenia patagonica* Phil.,

Eugenia petiolata Phil., *Myrceugenia buxifolia* (Phil.)

Reiche, *Luma philippii* (O. Berg) Burret

Arbusto o árbol pequeño. Nativo.

Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 500-1200 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Luma blanca, pitrilla.

***Myrceugenia colchaguensis* (Phil.) L.E. Navas**

Sinónimos: *Eugenia colchaguensis* Phil., *Myrceugenia malvillana* Kausel

Arbusto. Endémico.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 0-400 m.

***Myrceugenia correifolia* (Hook. & Arn.) O. Berg**

Sinónimos: *Eugenia correifolia* Hook. & Arn., *Eugenia maritima* Barnéoud, *Luma correifolia* (Hook. & Arn.) A.

Gray, *Eugenia thalassaia* O. Berg, *Myrceugenia johowi* Gusinde, *Myrceugenia thalassaia* (O. Berg) Gusinde ex

Fuentes, *Myrceugenia maritima* (Barnéoud) Kausel

Arbusto o árbol pequeño. Endémico.

Distribución: COQ, VAL, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 0-700 m.

Nombre vulgar: Petrillo, petrilla.

***Myrceugenia exsucca* (DC.) O. Berg**

Sinónimos: *Luma exsucca* (DC.) Burret, *Eugenia exsucca* DC., *Myrceugenia multiflora* (Hook. & Arn.) Kausel, *Eugenia temu* Hook. & Arn., *Luma temu* (Hook. & Arn.) Gray, *Myrceugenia lechleriana* O. Berg, *Myrceugenia camphorata* O. Berg, *Eugenia exsucca* DC. var. *patagua* O. Berg, *Eugenia pitra* O. Berg, *Eugenia exsucca* DC. var. *temu* (Hook. & Arn.) O. Berg, *Eugenia exsucca* DC. var. *apiculata* O. Berg, *Eugenia corralensis* Phil., *Luma pitra* (O. Berg) Burret, *Luma corralensis* (Phil.) Burret
Árbol. Nativo.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.
Rango altitudinal: 0-1000 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Pitra, petra, patagua.

***Myrceugenia lanceolata* (Juss. ex J. St.-Hil.)**

Kausel
Sinónimos: *Myrtus lanceolata* Juss. ex J. St.-Hil., *Eugenia dombeyana* DC., *Myrtus gudilla* Colla, *Eugenia stenophylla* Hook. & Arn., *Eugenia gudilla* (Colla) Barnéoud, *Luma stenophylla* (Hook. & Arn.) Gray, *Eugenia stenophylla* Hook. & Arn. var. *latifolia* Hook. ex O. Berg, *Myrceugenia stenophylla* (Hook. & Arn.) O. Berg, *Luma dombeyana* (DC.) Burret

Arbusto. Endémico.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 200-800 m.

Nombre vulgar: Arrayancillo, ñipa.

***Myrceugenia leptospermoidea* (DC.) Kausel**

Sinónimos: *Eugenia leptospermoidea* DC., *Eugenia leptospermoidea* DC. var. *microphylla* O. Berg, *Eugenia leptospermoidea* DC. var. *latifolia* O. Berg, *Eugenia leptospermoidea* DC. var. *longifolia* O. Berg, *Eugenia thymifolia* Phil. ex Reiche

Arbusto. Endémico.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 0-400 m.

Nombre vulgar: Macella, petrillo.

***Myrceugenia obtusa* (DC.) O. Berg**

Sinónimos: *Eugenia obtusa* DC., *Myrtus raran* Colla, *Eugenia raran* (Colla) Barnéoud, *Luma obtusa* (DC.) A. Gray, *Myrceugenia chilensis* O. Berg, *Eugenia polyantha* Phil., *Myrceugenia obtusa* (DC.) O. Berg var.

raran (Colla) O. Berg, *Myrceugenia obtusa* (DC.) O. Berg var. *berteroana* O. Berg, *Myrceugenia obtusa* (DC.) O. Berg var. *polyantha* (Phil.) O. Berg
Arbusto o árbol pequeño. Endémico.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 0-1400 m.

Nombre vulgar: Rarán.

***Myrceugenia ovata* (Hook. & Arn.) O. Berg var. *nannophylla* (Burret) Landrum**

Sinónimos: *Myrceugenia montana* Kausel, *Myrceugenia nannophylla* (Burret) Kausel, *Luma nannophylla* Burret, *Myrceugenia valientei* Kausel
Arbusto. Nativo.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 500-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Myrceugenia ovata* (Hook. & Arn.) O. Berg var. *ovata

Sinónimos: *Eugenia ovata* Hook. & Arn., *Eugenia cumingii* Hook. & Arn., *Eugenia trichocarpa* Phil., *Luma ovata* (Hook. & Arn.) Burret, *Luma cumingii* (Hook. & Arn.) Burret

Arbusto o árbol pequeño. Endémico.

Distribución: BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 0-100 m.

Nombre vulgar: Huillipeta.

***Myrceugenia parvifolia* (DC.) Kausel**

Sinónimos: *Eugenia parvifolia* DC., *Luma baeckeoides* Griseb.

Arbusto o árbol pequeño. Endémico.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 0-200 m.

Nombre vulgar: Chequén, chilquilco.

***Myrceugenia pinifolia* (F. Phil.) Kausel**

Sinónimos: *Eugenia pinifolia* F. Phil., *Myrceugenia stenophylla* (Hook. & Arn.) O. Berg var. *pinifolia* (F. Phil.) Reiche
Arbusto. Endémico.

Distribución: MAU, NUB, BIO.

Rango altitudinal: 0-100 m.

***Myrceugenia planipes* (Hook. & Arn.) O. Berg**

Sinónimos: *Myrceugenia distoma* (O. Berg) Kausel, *Eugenia planipes* Hook. & Arn., *Myrcia planipes* (Hook. & Arn.) Kiaersk., *Eugenia planipes* Hook. & Arn. var. *genuina* O. Berg, nom. illeg., *Eugenia planipes* Hook. & Arn. var. *grandifolia* O. Berg, *Eugenia distoma* O. Berg
Árbol. Nativo.

Distribución: NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 500-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Pitra.

***Myrceugenia rufa* (Colla) Skottsb. ex Kausel**

Sinónimos: *Myrtus rufa* Colla, *Eugenia ferruginea* Hook. & Arn., *Eugenia rufa* (Colla) Barnéoud, *Luma ferruginea* (Hook. & Arn.) A. Gray, *Myrceugenia ferruginea* (Hook. & Arn.) Reiche, *Luma rufa* (Colla) Burret

Árbusto. Endémico.

Distribución: COQ, VAL.

Rango altitudinal: 0-200 m.

***Myrceugenia schulzei* Johow**

Sinónimos: *Luma schulzei* (Johow) Burret

Árbol. Endémico.

Distribución: JFE.

Rango altitudinal: 400 m.

Nombre vulgar: Luma de Más Afuera.

Myrcianthes

***Myrcianthes coquimbensis* (Barnéoud) Landrum & Grifo**

Sinónimos: *Reichea coquimbensis* (Barnéoud) Kausel, *Myrtus coquimbensis* Barnéoud, *Aspidogenia coquimbensis* (Barnéoud) Burret

Árbusto. Endémico.

Distribución: COQ.

Rango altitudinal: 0-200 m.

Nombre vulgar: Lucumillo, lucumilla.

Myrteola

***Myrteola nummularia* (Poir.) O. Berg**

Sinónimos: *Eugenia humifusa* Phil., *Myrteola barneoudii* (O. Berg) O. Berg var. *humifusa* (Phil.) Reiche, *Myrteola bullata* O. Berg, *Myrteola humifusa* (Phil.) O. Berg, *Myrteola leucomyrtillus* (Griseb.) Reiche, *Myrteola nummularia* (Poir.) O. Berg var.

barneoudii (O. Berg) Kausel, *Myrteola nummularia* (Poir.) O. Berg var. *repens* (Phil.) Reiche, *Myrteola repens* (Phil.) O. Berg, *Myrtus barneoudii* O. Berg, *Myrtus leucomyrtillus* Griseb., *Myrtus nummularia* Poir., *Myrtus nummularia* Poir. var. *major* Hook.f., *Myrtus repens* Phil., *Myrteola barneoudii* (O. Berg) O. Berg, *Myrteola bullata* O. Berg var. *pentamera* O. Berg, *Myrteola bullata* O. Berg var. *tetramera* O. Berg, *Eugenia humilis* Phil.

Árbusto o subarbusto. Nativo.

Distribución: NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.

Rango altitudinal: 100-1500 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Daudapo, huarapo, naurapo.

Nothomyrcia

***Nothomyrcia fernandeziana* (Hook. & Arn.)**

Kausel

Sinónimos: *Myrceugenia fernandeziana* (Hook. & Arn.) Johow, *Myrtus fernandeziana* Hook. & Arn., *Eugenia lumilla* Phil., *Eugenia fernandeziana* (Hook. & Arn.) Barnéoud, *Myrceugenia luma* O. Berg, *Luma fernandeziana* (Hook. & Arn.) Burret

Árbol. Endémico.

Distribución: JFE.

Rango altitudinal: 0-300 m.

Nombre vulgar: Luma de Juan Fernández, lumilla.

Psidium

***Psidium guajava* L.**

Árbusto. Introducido.

Distribución: IPA.

Nombre vulgar: Guayaba, tuaba (Rapa Nui).

Syzygium

***Syzygium jambos* (L.) Alston**

Árbol. Introducido.

Distribución: IPA.

Tepualia

***Tepualia stipularis* (Hook. & Arn.) Griseb.**

Sinónimos: *Metrosideros stipularis* (Hook. & Arn.) Hook.f., *Myrtus stipularis* Hook. & Arn., *Tepualia patagonica* Phil., *Tepualia philippiana* Griseb., *Tepualia stipularis* (Hook. & Arn.) Griseb. var. *patagonica* (Phil.) Reiche, *Tepualia stipularis* (Hook. & Arn.) Griseb. var. *philippiana* (Griseb.) Speg.
Arbusto o árbol pequeño. Nativo.
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-1000 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Tepu, tepú.

Ugni

Ugni candollei (Barnéoud) O. Berg
Sinónimos: *Myrtus candollei* Barnéoud, *Myrtus krausei* Phil., *Ugni krausei* (Phil.) O. Berg, *Ugni candollei* (Barnéoud) O. Berg fma. *litoralis* Kausel, *Ugni candollei* (Barnéoud) O. Berg fma. *monticola* Kausel
Arbusto. Endémico.
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.
Rango altitudinal: 100-800 m.
Nombre vulgar: Murta, murta blanca, tautau, chauchau, trautrau.

Ugni molinae Turcz.

Sinónimos: *Eugenia ugni* (Molina) Hook. & Arn., *Myrtus ugni* Molina, *Ugni myrtus* Macloskie, *Ugni ugni* (Molina) Macloskie, nom. illeg., *Ugni poeppigii* O. Berg, *Myrtus molinae* Barnéoud, *Ugni philippii* O. Berg
Arbusto. Nativo.
Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, JFE.
Rango altitudinal: 700-1500 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Murtilla, murta, murtillo, uñi.
Nota: Introducida en el Archipiélago de Juan Fernández.

Ugni selkirkii (Hook. & Arn.) O. Berg

Sinónimos: *Eugenia selkirkii* Hook. & Arn., *Myrtus berteroii* Phil., *Ugni berteroii* (Phil.) F. Phil.
Arbusto. Endémico.
Distribución: JFE.
Rango altitudinal: 400-800 m.
Nombre vulgar: Murtillo.

NOTHOFAGACEAE

Nothofagus

Nothofagus alessandrii Espinosa
Sinónimos: *Fuscospora alessandrii* (Espinosa) Heenan & Smissen
Árbol. Endémico.
Distribución: MAU.
Rango altitudinal: 100-500 m.
Nombre vulgar: Ruil.

Nothofagus alpina (Poepp. & Endl.) Oerst.

Sinónimos: *Nothofagus nervosa* (Phil.) Dimitri & Milano, comb. illeg., *Fagus alpina* Poepp. & Endl., *Fagus nervosa* Phil., *Nothofagus procera* (Poepp. & Endl.) Oerst., comb. illeg., *Nothofagus nervosa* (Phil.) Krasser, *Lophozonia alpina* (Poepp. & Endl.) Heenan & Smissen
Árbol. Nativo.
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.
Rango altitudinal: 200-1200 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Raulí.

Nothofagus antarctica (G. Forst.) Oerst.

Sinónimos: *Fagus antarctica* G. Forst., *Fagus antarctica* G. Forst. var. *sublobata* A. DC., *Fagus antarctica* G. Forst. var. *uliginosa* A. DC., *Calucechinus antactica* Hombr. & Jacq., *Calucechinus montagni* Hombr. & Jacq., *Fagus antarctica* G. Forst. var. *microphylla* Phil., *Nothofagus montagnei* (Hombr. & Jacq.) Krasser
Árbol. Nativo.
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-1500 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Ñirre, ñire.

Nothofagus betuloides (Mirb.) Oerst.

Sinónimos: *Fagus betuloides* Mirb., *Nothofagus patagonica* Gand., *Betula antarctica* G. Forst., nom. nud., *Betula antarctica* G. Forst. ex Willd., *Fagus dubia* Mirb., *Fagus forsteri* Hook., *Calusparassus forsteri* Hombr. & Jacq., *Calusparassus betuloides* Hombr. & Jacq.
Árbol. Nativo.
Distribución: LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-1500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Coigüe de Magallanes, guindo.

***Nothofagus dombeyi* (Mirb.) Oerst.**

Sinónimos: *Fagus dombeyi* Mirb., *Fagus dombeyi* Mirb. var. *microphylla* Phil.

Árbol. Nativo.

Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Coigüe, coihue.

***Nothofagus glauca* (Phil.) Krasser**

Sinónimos: *Fagus glauca* Phil., *Nothofagus obliqua* (Mirb.) Oerst. var. *glauca* (Phil.) Reiche, *Nothofagus megalocarpa* Reiche, *Lophozonia glauca* (Phil.) Heenan & Smissen

Árbol. Endémico.

Distribución: RME, LBO, MAU, NUB, BIO.

Rango altitudinal: 100-1500 m.

Nombre vulgar: Roble maulino, hualo, roble colorado.

***Nothofagus macrocarpa* (A. DC.) F.M. Vázquez & R.A. Rodr.**

Sinónimos: *Nothofagus obliqua* (Mirb.) Oerst. var. *macrocarpa* (A. DC.) Reiche, *Fagus obliqua* Mirb. var. *macrocarpa* A.DC., *Lophozonia macrocarpa* (A. DC.) Heenan & Smissen

Árbol. Endémico.

Distribución: VAL, RME, LBO.

Rango altitudinal: 800-2200 m.

Nombre vulgar: Roble, roble blanco, roble de Santiago.

***Nothofagus nitida* (Phil.) Krasser**

Sinónimos: *Fagus nitida* Phil.

Árbol. Nativo.

Distribución: LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-900 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Coigüe de Chiloé, roble de Chiloé.

***Nothofagus obliqua* (Mirb.) Oerst.**

Sinónimos: *Fagus obliqua* Mirb., *Lophozonia heterocarpa* Turcz., *Fagus obliqua* Mirb. var. *macranthera* A. DC., *Fagus obliqua* Mirb. var. *dentatosquamata* Kuntze, *Nothofagus leoni* Espinosa,

Fagus obliqua (Mirb.) Oerst. var. *valdiviana* (Phil.) A.

DC., *Fagus valdiviana* Phil., *Fagus obliqua* Mirb. var.

integrisquamata Kuntze, *Nothofagus obliqua* (Mirb.)

Oerst. subsp. *valdiviana* (Phil.) F.M. Vázquez & R.A.

Rodr., *Nothofagus obliqua* (Mirb.) Oerst. subsp. *andina*

F.M. Vázquez & R.A. Rodr., *Lophozonia obliqua*

(Mirb.) Heenan & Smissen, *Lophozonia obliqua* (Mirb.)

Heenan & Smissen subsp. *andina* (F.M. Vázquez & R.

Rodr.) Heenan & Smissen, *Lophozonia obliqua* (Mirb.)

Heenan & Smissen subsp. *valdiviana* (Phil.) Heenan &

Smissen

Árbol. Nativo.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO,

ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 0-2500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Hualle, roble, coyán, roble-pellín.

***Nothofagus pumilio* (Poepp. & Endl.) Krasser**

Sinónimos: *Fagus antarctica* G. Forst. var. *bicrenata* A.

DC., *Fagus pumilio* Poepp. & Endl., *Calusparassus*

pumilio Hombr. & Jacq., *Fagus antarctica* G. Forst. var.

pumilio (Poepp. & Endl.) Kuntze

Árbol. Nativo.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-2000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Lenga.

***Nothofagus x leonii* Espinosa**

Árbol. Endémico.

Distribución: MAU, NUB.

Rango altitudinal: 100-600 m.

Nombre vulgar: Huala.

Nota: Híbrido natural entre *Nothofagus obliqua* y *Nothofagus glauca* (Donoso 1971, 2006).

NYCTAGINACEAE

Allionia

***Allionia incarnata* L.**

Sinónimos: *Allionia puberula* Phil., *Wedelia incarnata* (L.) Cockerell, *Wedelia incarnata* (L.) Kuntze, *Allionia bandurriae* Phil., *Allionia jarae* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA.

Rango altitudinal: 0-3000 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Boerhavia

***Boerhavia diffusa* L.**

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: AYP, TAR, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, BIO, IPA.

Mirabilis

***Mirabilis acuta* (Reiche) Heimerl**

Sinónimos: *Oxybaphus ovatus* (Ruiz & Pav.) Vahl var. *acutus* Reiche

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 500-2900 m.

Nombre vulgar: Tapahua.

***Mirabilis cordifolia* (Kunze ex Choisy) Heimerl**

Sinónimos: *Oxybaphus cordifolius* Kunze ex Choisy, *Allione cordifolia* (Kunze ex Choisy) Kuntze

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 0-900 m.

Países limítrofes: Perú.

***Mirabilis elegans* (Choisy) Heimerl**

Sinónimos: *Oxybaphus elegans* Choisy, *Allionia elegans* (Choisy) Kuntze, *Oxybaphus dichotomus* Phil., *Oxybaphus san-romani* Phil., *Mirabilis elegans* (Choisy) Heimerl var. *dichotoma* (Phil.) Heimerl

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME.

Rango altitudinal: 0-3000 m.

Países limítrofes: Perú.

***Mirabilis expansa* (Ruiz & Pav.) Standl.**

Sinónimos: *Calyxhymenia expansa* Ruiz & Pav., *Allionia expansa* (Ruiz & Pav.) Kuntze, *Oxybaphus expansa* (Ruiz & Pav.) Vahl

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, VAL.

Rango altitudinal: 100-3600 m.

Países limítrofes: Bolivia y Perú.

***Mirabilis jalapa* L.**

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: ANT, BIO, JFE, IPA.

***Mirabilis ovata* (Ruiz & Pav.) F. Meigen**

Sinónimos: *Oxybaphus campestris* Griseb., *Allionia ovata* (Ruiz & Pav.) Standl., *Calyxhymenia ovata* Ruiz & Pav., *Mirabilis campestris* (Griseb.) I.M. Johnst., *Oxybaphus ovatus* (Ruiz & Pav.) Vahl

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO.

Rango altitudinal: 0-3200 m.

Países limítrofes: Argentina y Perú.

***Mirabilis prostrata* (Ruiz & Pav.) Heimerl**

Sinónimos: *Oxybaphus micranthus* Choisy, *Oxybaphus prostratus* (Ruiz & Pav.) Vahl, *Allionia micrantha* (Choisy) Molfino, *Calyxhymenia prostrata* Ruiz & Pav., *Allionia excelsa* (Willd.) kuntze, *Allionia prostrata* (Ruiz & Pav.) Kuntze

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 0-1400 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Mirabilis trollii* Heimerl**

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: TAR.

Rango altitudinal: 2200 m.

NYMPHAEACEAE

Nymphaea

***Nymphaea alba* L.**

Hierba acuática. Perenne. Introducida.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.

OLEACEAE

Fraxinus

***Fraxinus excelsior* L.**

Árbol. Introducido.

Distribución: BIO.

Ligustrum

***Ligustrum ovalifolium* Hassk.**

Arbusto o árbol pequeño. Introducido.

Distribución: JFE.

Nombre vulgar: Ligustrina.

Menodora

***Menodora linoides* Phil.**

Arbusto. Endémico.

Distribución: COQ, VAL.

Rango altitudinal: 1200-1800 m.

Nombre vulgar: Linacillo.

ONAGRACEAE

Camissonia

Camissonia dentata* (Cav.) Reiche subsp. *dentata

Sinónimos: *Oenothera dentata* Cav., *Oenothera contorta* Douglas var. *divaricata* (Gay) Munz, *Chamissonia tenuifolia* (Spach) Reiche, *Camissonia flava* Link, *Oenothera chamissonis* Link, *Holostigma argutum* Spach, *Holostigma heterophyllum* Spach, *Sphaerostigma chamissonis* (Link) Fisch. & C.A. Mey., *Oenothera minutiflora* D. Dietr., *Sphaerostigma dentatum* (Cav.) Gay, *Sphaerostigma divaricatum* Gay, *Sphaerostigma ramosissimum* Phil., *Chamissonia acuminata* (Phil.) Reiche, *Chamissonia paradoxa* (Spach) Reiche var. *divaricata* (Gay) Reiche, *Oenothera torulosa* H. Lév. fma. *chilensis* (D. Dietr.) H. Lév., *Oenothera micrantha* Spreng. var. *acuminata* (Phil.) Munz, *Sphaerostigma heterophylla* (Spach) Gay

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, AIS.

Rango altitudinal: 0-3500 m.

Países limítrofes: Argentina y Perú.

Camissonia dentata* (Cav.) Reiche subsp. *littoralis

P.H. Raven & D.M. Moore

Sinónimos: *Sphaerostigma acuminatum* Phil.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: MAU, BIO.

Rango altitudinal: 0-200 m.

Clarkia

***Clarkia tenella* (Cav.) F.H. Lewis & M.E. Lewis**

subsp. *ambigua* (Phil.) D.M. Moore & F.H. Lewis ex Martic.

Sinónimos: *Clarkia tenella* (Cav.) F.H. Lewis & M.E. Lewis subsp. *ambigua* (Phil.) D.M. Moore & F.H. Lewis, comb. illeg., *Godetia ambigua* Phil.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: NUB, BIO, ARA.

***Clarkia tenella* (Cav.) F.H. Lewis & M.E. Lewis subsp. *araucana* D.M. Moore & F.H. Lewis**

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: NUB, BIO, ARA, LLA.

Rango altitudinal: 0-300 m.

Clarkia tenella* (Cav.) F.H. Lewis & M.E. Lewis subsp. *tenella

Sinónimos: *Oenothera tenella* Cav., *Godetia cavanillesii* Spach, *Godetia tenella* (Cav.) Steud., *Oenothera auricula* H. Lév. var. *tenella* (Cav.) H. Lév., *Godetia dasycarpa* Phil., *Godetia tenella* (Cav.) Steud. var. *dasycarpa* (Phil.) Munz, *Oenothera quadrivulnera* Douglas var. *dasycarpa* (Cav.) Thell. ex Probst, *Godetia quadrivulnera* (Douglas) Spach var. *tenella* Jeps., *Oenothera prismatica* H. Lév. var. *dasycarpa* H. Lév.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 0-3200 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Clarkia tenella* (Cav.) F.H. Lewis & M.E. Lewis subsp. *tenuifolia* (Cav.) D.M. Moore & F.H. Lewis**

Sinónimos: *Oenothera tenuifolia* Cav., *Godetia tenuifolia* (Cav.) Spach, *Oenothera tenella* Cav. var. *tenuifolia* (Cav.) Lindl., *Godetia gayana* Spach, *Oenothera gayana* (Spach) Steud., *Oenothera prismatica* H. Lév. var. *tenuifolia* (Cav.) H. Lév.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, RME.

Rango altitudinal: 0-200 m.

Nombre vulgar: Inuil, sangre de toro, sangre de buey, huasita.

Epilobium

Epilobium australe Poepp. & Hausskn. ex Hausskn.

Sinónimos: *Epilobium lechleri* Phil. & Hausskn. ex Hausskn., *Epilobium australe* Poepp. & Hausskn. ex Hausskn. var. *andinum* (Phil.) Sam., *Epilobium australe* Poepp. & Hausskn. ex Hausskn. var. *lechleri* (Phil. & Hausskn. ex Hausskn.) Sam., *Epilobium australe* Poepp. & Hausskn. ex Hausskn. var. *interruptum* (Sam.) Sam., *Epilobium australe* Poepp. & Hausskn. ex Hausskn. var. *pumilum* Sam., *Epilobium interruptum* Sam., *Epilobium deflexum* Sam., *Epilobium tetragonum* L. var. *antarcticum* Hook.f., *Epilobium antarcticum* (Hook.f.) Kuntze, *Epilobium transandinum* Sam.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-4000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Epilobium barbeyanum H. Lév.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, BIO.

Rango altitudinal: 1000-3500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Epilobium brachycarpum C. Presl

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: BIO.

Epilobium campestre (Jeps.) Hoch & W.L. Wagner

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: RME.

Rango altitudinal: 1700-1900 m.

Epilobium ciliatum Raf.

Sinónimos: *Epilobium hookerianum* Hausskn. ex Skottsb., *Epilobium valdivense* Hausskn. var. *alboffii* Macloskie, *Epilobium tetragonum* auct. non L., *Epilobium valdiviense* Hausskn., *Epilobium magellanicum* Phil. & Hausskn. ex Hausskn., *Epilobium*

longipes Sam., *Epilobium chilense* Hausskn., *Epilobium constrictum* Sam., *Epilobium cunninghami* Hausskn., *Epilobium pedicellare* J. Presl var. *latifolium* Walp., *Epilobium aconcahuinum* Phil., *Epilobium albiflorum* Phil., *Epilobium chilense* Hausskn. var. *latifolium* Sam., *Epilobium chilense* Hausskn. var. *macrum* Sam., *Epilobium leiophyton* Sam.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-3200 m.

Países limítrofes: Argentina.

Epilobium conjugens Skottsb.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Epilobium densifolium Hausskn.

Sinónimos: *Epilobium nivale* Meyen var. *lignosum* (F. Phil.) Hosseus, *Epilobium lignosum* F. Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, MAG.

Rango altitudinal: 500-3300 m.

Países limítrofes: Argentina.

Epilobium denticulatum Ruiz & Pav.

Sinónimos: *Epilobium andicolum* Hausskn., *Epilobium caesium* Hausskn.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, COQ, BIO.

Rango altitudinal: 1500-4500 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Tuari.

Epilobium fragile Sam.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT.

Rango altitudinal: 3300-4200 m.

Países limítrofes: Bolivia y Perú.

Epilobium glaucum Phil.

Sinónimos: *Epilobium glaucum* Phil. var. *stenophyllum* Macloskie & Dusén, *Epilobium patagonicum* Rendle, *Epilobium nubigenum* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-3000 m.
Países limítrofes: Argentina.

***Epilobium nivale* Meyen**

Sinónimos: *Epilobium andinum* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 300-4000 m.
Países limítrofes: Argentina.

***Epilobium obscurum* Schreb.**

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: RME, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

***Epilobium puberulum* Hook. & Arn.**

Sinónimos: *Epilobium pedunculatum* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.
Rango altitudinal: 0-1000 m.
Países limítrofes: Argentina.

***Epilobium subdentatum* (Meyen) Lievens & Hoch**

Sinónimos: *Boisduvalia subulata* (Ruiz & Pav.) Raim., *Boisduvalia volckmannii* Phil., *Oenothera gauroides* Kuntze, *Boisduvalia tocornalii* Gay, *Nierembergia subdentata* Meyen, *Oenothera uniflora* Gillies ex Hook. & Arn., nom. nud., *Boisduvalia concinna* (D. Don) Spach, *Oenothera subulata* Ruiz & Pav., *Oenothera concinna* D. Don, *Epilobium concinnum* (D. Don) Hoch & P.H. Raven

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 0-1800 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Epilobium tetragonum* L. subsp. *lamyi* (F.W.**

Schultz) Nyman

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: RME, MAU, BIO, ARA, LLA.

Fuchsia

***Fuchsia lycioides* Andrews**

Sinónimos: *Fuchsia rosea* Ruiz & Pav.

Arbusto. Endémico.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME.
Rango altitudinal: 0-1500 m.

Nombre vulgar: Palo falso, palo de yegua, coralito, palo blanco.

***Fuchsia magellanica* Lam.**

Sinónimos: *Fuchsia magellanica* Lam. var. *macrostema* (Ruiz & Pav.) Munz, *Fuchsia araucana* F. Phil., *Fuchsia coccinea* Dryand. var. *robustior* Hook.f., *Fuchsia gracilis* Lindl. var. *macrostema* (Ruiz & Pav.) Lindl., *Fuchsia gracilis* Lindl., *Fuchsia macrostema* Ruiz & Pav., *Fuchsia coccinea* auct. non Dryand., *Dorvala echaris* Comm. ex Lam., *Thilcum tinctorium* Molina, *Fuchsia magellanica* Lam. var. *typica* Munz, nom. illeg., *Fuchsia macrostema* Ruiz & Pav. var. *grandiflora* Hook., *Fuchsia coccinea* Dryand. var. *macrostema* (Ruiz & Pav.) Hook., *Fuchsia magellanica* Lam. var. *gracilis* (Lindl.) L.H. Bailey, *Fuchsia conica* Lindl., *Fuchsia macrostema* Ruiz & Pav. var. *conica* (Lindl.) Sweet, *Fuchsia gracilis* Lindl. var. *multiflora* Lindau, *Fuchsia discolor* Lindl., *Fuchsia magellanica* Lam. var. *discolor* (Lindl.) L.H. Bailey, *Fuchsia chonotica* Phil., *Fuchsia coccinea* Dryand. var. *chonotica* (Phil.) Reiche, *Fuchsia magellanica* Lam. var. *molinae* Espinosa, *Fuchsia magellanica* Lam. var. *eburnea* Pisano, *Fuchsia magellanica* Lam. var. *conica* (Lindl.) L.H. Bailey, *Fuchsia gracilis* Lindl. var. *tenella* Lindl., *Fuchsia macrostema* Ruiz & Pav. var. *tenella* (Lindl.) DC., *Fuchsia macrostema* Ruiz & Pav. var. *gracilis* (Lindl.) Sweet

Arbusto. Nativo.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.

Rango altitudinal: 0-2000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Chilco, chilca, palo blanco.

Nota: Introducida en el Archipiélago de Juan Fernández.

Gayophytum

***Gayophytum humile* A. Juss.**

Sinónimos: *Gayophytum densifolium* Phil., *Gayophytum minutum* Phil., *Gayophytum humile* A. Juss. var. *densifolium* (Phil.) Reiche, *Gayophytum nuttallii* Torr. & A. Gray, *Gayophytum humile* A. Juss. var. *robustum* (Phil.) Reiche

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: ATA, COQ, RME, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 500-3600 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Quinchamalí.

***Gayophytum micranthum* Hook. & Arn.**

Sinónimos: *Gayophytum gracile* Phil., *Gayophytum robustum* Phil., *Gayophytum humile* A. Juss. var. *gracile* (Phil.) Reiche, *Sphaerostigma paradoxum* (Spach) Gay, *Oenothera gracilis* (Phil.) H. Lév.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 1200-4300 m.

Países limítrofes: Argentina.

Ludwigia

***Ludwigia grandiflora* (Michx.) Greuter & Burdet subsp. *hexapetala* (Hook. & Arn.) G.L. Nesom & Kartesz**

Sinónimos: *Jussiaea hexapetala* Hook. & Arn.,
Ludwigia hexapetala (Hook. & Arn.) Zardini, A.G. Gu
& P.H. Raven

Hierba acuática. Perenne. Nativa.

Distribución: RME, LBO, MAU, BIO.

Rango altitudinal: 10-500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Ludwigia octovalvis* (Jacq.) P.H. Raven**

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: AYP, TAR.

Rango altitudinal: 10-270 m.

***Ludwigia peploides* (Kunth) P.H. Raven subsp. *montevidensis* (Spreng.) P.H. Raven**

Sinónimos: *Jussiaea montevidensis* Spreng., *Jussiaea repens* L. var. *montevidensis* (Spreng.) Munz, *Jussiaea repens* L., *Ludwigia adscendens* (L.) H. Hara var. *montevidensis* (Spreng.) H. Hara, *Jussiaea glandulosa* Larrañaga

Hierba acuática. Perenne. Nativa.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Países limítrofes: Argentina y Perú.

Nombre vulgar: Pasto de la rana.

***Ludwigia peruviana* (L.) H. Hara**

Hierba acuática. Perenne. Introducida.

Distribución: LBO, BIO.

Rango altitudinal: 100-360 m.

Oenothera

***Oenothera acaulis* Cav.**

Sinónimos: *Lavauxia mutica* Spach, *Oenothera mutica* (Spach) Gay

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.

Rango altitudinal: 0-1100 m.

Nombre vulgar: Colsilla, hierba de la apostema, rodalán.

***Oenothera affinis* Cambess.**

Sinónimos: *Oenothera berteriana* Spach, *Oenothera chilensis* Fisch. & C.A. Mey., *Raimannia berteriana* (Spach) Sprague & Riley

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, JFE.

Rango altitudinal: 0-4000 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Nombre vulgar: Flor de San José, metrón, metrún, Don Diego de la noche.

Nota: Introducida en el Archipiélago de Juan Fernández.

***Oenothera arequipensis* Munz & I.M. Johnst.**

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: ANT.

Rango altitudinal: 0-2700 m.

Países limítrofes: Perú.

***Oenothera biennis* L.**

Hierba. Bienal. Introducida.

Distribución: VAL.

***Oenothera coquimbensis* Gay**

Sinónimos: *Oenothera grandidentata* Phil., *Oenothera coquimbensis* Gay var. *grandidentata* (Phil.) Reiche

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL.

Rango altitudinal: 0-700 m.

***Oenothera glazioviana* Michelii**

Hierba. Bienal. Introducida.

Distribución: LBO, LLA.

***Oenothera grisea* W. Dietr.**

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: VAL.

Rango altitudinal: 0-100 m.

***Oenothera magellanica* Phil.**

Sinónimos: *Oenothera magellanica* Phil. var.

chubutensis Macloskie, *Oenothera polymorpha* H. Lév.

var. *magellanica* (Phil.) H. Lév.

Hierba. Anual o bienal. Nativa.

Distribución: AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-3000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Oenothera nana* Griseb.**

Hierba. Anual o bienal. Nativa.

Distribución: TAR, ANT.

Rango altitudinal: 2500-4500 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Oenothera odorata* Jacq.**

Sinónimos: *Oenothera odorata* Jacq. fma. *glabrescens*

Speg., *Oenothera odorata* Jacq. fma. *media* Speg.,

Oenothera odorata Jacq. fma. *undulata* Speg.,

Oenothera ibaria Phil., *Raimannia odorata* (Jacq.)

Sprague & Riley, *Onagra undulata* Moench, *Oenothera*

undulata Aiton, *Oenothera odorata* Jacq. var. *virescens*

Ser., *Oenothera odorata* Jacq. var. *glaucescens* Ser.,

Oenothera odoratissima Tausch, *Oenothera mollissima*

L. subsp. *odorata* (Jacq.) Thell.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-2800 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Oenothera peruana* W. Dietr.**

Hierba. Anual o bienal. Nativa.

Distribución: TAR.

Rango altitudinal: 2500-3300 m.

Países limítrofes: Perú.

***Oenothera picensis* Phil.**

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO,

BIO, JFE.

Rango altitudinal: 0-2000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nota: Introducida en el Archipiélago de Juan Fernández.

***Oenothera ravenii* W. Dietr. subsp. *chilensis* W.**

Dietr.

Hierba. Anual o bienal. Endémica.

Distribución: VAL, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 0-300 m.

***Oenothera rosea* L'Hér. ex Aiton**

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: AYP, COQ, VAL, RME, LBO, MAU,

NUB, BIO, ARA, JFE, IPA.

***Oenothera sandiana* Hassk.**

Sinónimos: *Oenothera rubida* Rusby

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: AYP, TAR.

Rango altitudinal: 2000-4000 m.

Países limítrofes: Bolivia y Perú.

***Oenothera stricta* Ledeb. ex Link**

Sinónimos: *Oenothera propinqua* Spach, *Oenothera*

bracteata Phil., *Oenothera propinqua* Spach var.

sparsiflora Phil., *Oenothera valdiviana* Phil., *Oenothera*

glabrescens Phil., *Oenothera brachysepala* Spach,

Oenothera arguta Greene, *Onagra arguta* (Greene)

Small, *Oenothera bracteata* Phil. var. *glabrescens* (Phil.)

Reiche, *Oenothera mollissima* L. var. *valdiviana* (Phil.)

Reiche, *Oenothera mollissima* L. subsp. *propinqua*

(Spach) Thell., *Oenothera stricta* Ledeb. ex Link var.

propinqua (Spach) Reiche

Hierba. Anual o bienal. Nativa.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU,

NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, IPA.

Rango altitudinal: 0-2150 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Don Diego de la noche, flor de San José.

Nota: Introducida en Rapa Nui (Isla de Pascua).

***Oenothera villaricae* W. Dietr.**

Hierba. Anual o bienal. Nativa.

Distribución: ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

OROBANCHACEAE

Agalinis

Agalinis linariooides (Cham. & Schltdl.) D'Arcy

Sinónimos: *Gerardia linariooides* Cham. & Schltdl.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-2000 m.

Países limítrofes: Bolivia.

Nombre vulgar: Cartucho.

Agalinis meyeniana (Benth.) Barringer

Sinónimos: *Gerardia rigida* Gillies ex Benth. var. *meyeniana* Benth.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ATA.

Rango altitudinal: 800-1300 m.

Bellardia

Bellardia trixago (L.) All.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: VAL, MAU, NUB, BIO, ARA, AIS.

Bellardia viscosa (L.) Fisch. & C.A. Mey

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.

Castilleja

Castilleja attenuata (A. Gray) T.I. Chuang & Heckard

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO.

Castilleja laciniata Hook. & Arn.

Sinónimos: *Orthocarpus australis* Benth., *Orthocarpus laciniatus* (Hook. & Arn.) D.D. Keck

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, MAU, BIO.

Rango altitudinal: 300-700 m.

Países limítrofes: Perú.

Castilleja pumila (Benth.) Wedd. ex Herrera

Sinónimos: *Castilleja nubigena* Kunth var. *pumila*

Benth., *Castilleja fissifolia* L. subsp. *pumila* (Benth.)

Wedd., *Castilleja fissifolia* L.f. var. *pumila* (Benth.)

Wedd.

Hierba parásita. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR.

Rango altitudinal: 3000-4000 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Albahaca.

Euphrasia

Euphrasia adenonota I.M. Johnst.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: ATA, COQ.

Rango altitudinal: 2800-3200 m.

Euphrasia andicola Benth.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: LBO, MAU, ARA.

Euphrasia antarctica Benth.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-2500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Euphrasia chrysanthia Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 1000-3000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Euphrasia cockayneana Petrie

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-820 m.

Euphrasia flavicans Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ARA, LRI, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 0-1500 m.

Euphrasia formosissima Skottsb.

Subarbusto. Endémico.

Distribución: JFE.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Euphrasia intricata Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: BIO.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Euphrasia meiantha Clos

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 1000-2000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Euphrasia muscosa Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: LLA, AIS.

Rango altitudinal: 1200 m.

Euphrasia perpusilla Phil.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: LLA.

Rango altitudinal: 200-300 m.

Euphrasia philippii Wetst.

Sinónimos: *Euphrasia picta* Phil., *Euphrasia montana* Phil.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: BIO, ARA.

Rango altitudinal: 0-1300 m.

Euphrasia subexserta Benth.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 500-3000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Euphrasia trifida Poepp. ex Benth.

Sinónimos: *Euphrasia aurea* F. Phil., *Euphrasia spectabilis* Phil., *Euphrasia caespitosa* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 1000-2200 m.

Países limítrofes: Argentina.

Euphrasia villaricensis Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: LLA.

Rango altitudinal: 220-360 m.

Neobartsia

Neobartsia chilensis (Benth.) Uribe-Convers & Tank

Sinónimos: *Bartsia chilensis* Benth.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: COQ, VAL.

Rango altitudinal: 300-600 m.

Neobartsia peruviana (Walp.) Uribe-Convers & Tank

Sinónimos: *Bartsia peruviana* Walp., *Bartsia meyeniana* Benth.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP.

Rango altitudinal: 1100-4900 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Neobartsia serrata (Molau) Uribe-Convers & Tank

Sinónimos: *Bartsia serrata* Molau

Subarbusto. Nativo.

Distribución: AYP, TAR.

Rango altitudinal: 2300-3600 m.

Países limítrofes: Perú.

Orobanche

Orobanche chilensis (Phil.) Beck

Sinónimos: *Myzorrhiza chilensis* Phil.

Hierba parásita. Perenne. Nativa.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME.

Rango altitudinal: 0-1800 m.

Países limítrofes: Argentina.

NOMBRE VULGAR: Orobanca.

Orobanche minor Sm.

Hierba parásita. Anual. Introducida.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA.

Orobanche ramosa L.

Hierba parásita. Anual. Introducida.
Distribución: COQ, RME, MAU, NUB, BIO, ARA.

Orobanche tarapacana Phil.
Hierba parásita. Perenne. Endémica.
Distribución: AYP, TAR.
Rango altitudinal: 0-2800 m.

Parentucellia

Parentucellia latifolia Caruel
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

OXALIDACEAE

Oxalis

Oxalis adenophylla Gillies ex Hook. & Arn.
Sinónimos: *Acetosella adenophylla* (Gillies ex Hook. & Arn.) Kuntze, *Acetosella bustillosii* (Phil.) Kuntze, *Oxalis bustillosii* Phil., *Oxalis bustillosii* Phil. var. *biflora* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.
Rango altitudinal: 0-2600 m.
Países limítrofes: Argentina.

Oxalis arbuscula Barnéoud
Sinónimos: *Oxalis fruticula* Phil., *Acetosella arbuscula* (Barnéoud) Kuntze, *Acetosella fruticula* (Phil.) Kuntze
Subarbusto. Endémico.
Distribución: ANT, ATA.
Rango altitudinal: 600-1200 m.

Oxalis arenaria Bertero ex Colla
Sinónimos: *Oxalis araucana* Reiche, *Oxalis biglandulosa* Steud., *Oxalis hyalinorhiza* Poepp. ex R. Knuth
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, MAG.
Rango altitudinal: 0-1100 m.

Oxalis articulata Savigny
Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: RME, BIO.

Oxalis atacamensis Reiche
Sinónimos: *Acetosella trichocalyx* (Phil.) Kuntze
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ANT, ATA.
Rango altitudinal: 400-600 m.

Oxalis aureoflava Steud.
Sinónimos: *Oxalis corniculata* L. var. *aureoflava* (Steud.) Gunckel, *Acetosella aureoflava* (Steud.) Kuntze, *Xanthoxalis aureoflava* (Steud.) Holub
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.
Rango altitudinal: 0-1000 m.

Oxalis berteroana Barnéoud
Sinónimos: *Oxalis compacta* Gillies ex Hook. & Arn. subsp. *berteroana* (Barnéoud) Lourteig, *Oxalis falconiana* Steud. *berteroana* (Barnéoud) Lourteig, *Oxalis chaetocalyx* Phil., *Oxalis josephii* R. Knuth, *Oxalis pachyphylla* Phil., *Oxalis peraltae* Phil., *Acetosella berteroana* (Barnéoud) Kuntze, *Acetosella falconiana* (Steud.) Kuntze, *Acetosella pachyphylla* (Phil.) Kuntze, *Oxalis berteroana* Barnéoud var. *uniflora* Phil.
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU.
Rango altitudinal: 1100-1700 m.
Países limítrofes: Argentina.

Oxalis bulbocastanum Phil.
Sinónimos: *Oxalis breana* Phil., *Oxalis thyrsoides* Reiche, *Oxalis occidentalis* R. Knuth
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA.
Rango altitudinal: 200-700 m.

Oxalis caesia Phil.
Arbusto. Endémico.
Distribución: ANT, ATA.
Rango altitudinal: 0-1000 m.

Oxalis campanensis Lourteig
Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: VAL, RME.

Rango altitudinal: 1500-1800 m.

***Oxalis cinerea* Zucc.**

Sinónimos: *Oxalis alpina* Phil., *Oxalis lineata* Gillies ex Hook. & Arn., *Oxalis niveiphylla* R. Knuth, *Oxalis pearcei* Phil., *Oxalis spodiophylla* Walp. var. *microphylla* Walp., *Oxalis spodiophylla* Walp., *Oxalis fernandezii* R. Knuth, *Oxalis besseri* R. Knuth, *Acetosella haenkeana* (Zucc.) Kuntze, *Acetosella lineata* (Gillies ex Hook. & Arn.) Kuntze, *Acetosella pearcei* (Phil.) Kuntze, *Acetosella spodiophylla* (Walp.) Kuntze Subarbusto. Nativo.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, ARA.
Rango altitudinal: 1000-2700 m.
Países limítrofes: Argentina y Perú.

***Oxalis clandestina* Phil.**

Hierba. Anual o bienal. Endémica.

Distribución: VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.

Rango altitudinal: 0-200 m.

***Oxalis colchaguensis* Lourteig**

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU.

***Oxalis compacta* Gillies ex Hook. & Arn.**

Sinónimos: *Oxalis gilliesii* Phil., *Oxalis landbeckii* Phil., *Oxalis platypila* Gillies ex Hook. & Arn., *Oxalis reichei* R. Knuth, *Oxalis uspallatensis* R. Knuth, *Acetosella compacta* (Gillies ex Hook. & Arn.) Kuntze, *Acetosella gayana* (Phil.) Kuntze, *Acetosella platypila* (Gillies ex Hook. & Arn.) Kuntze, *Oxalis gayana* Phil.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, BIO.

Rango altitudinal: 1600-4300 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Oxalis corniculata* L. var. *atropurpurea* Planch.**

Sinónimos: *Oxalis corniculata* L. var. *purpurascens* Speg.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: COQ, RME, JFE.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Oxalis corniculata* L. var. *corniculata

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG, JFE, IPA.

***Oxalis debilis* Kunth**

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: JFE.

***Oxalis dumetorum* Barnéoud**

Sinónimos: *Oxalis prorepens* Phil., *Oxalis hookeriana* Pohl ex Progel, *Oxalis lechleri* Steud., *Acetosella dumetorum* (Barnéoud) Kuntze

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 0-200 m.

***Oxalis enneaphylla* Cav.**

Sinónimos: *Oxalis cunninghamii* R. Knuth, *Oxalis enneaphylla* Cav. subsp. *ibari* (Phil.) Lourteig, *Oxalis patagonica* Speg., *Acetosella enneaphylla* (Cav.) Kuntze, *Oxalis enneaphylla* Cav. var. *patagonica* (Speg.) Skottsb., *Oxalis frigida* R. Knuth, *Oxalis ibari* Phil., *Oxalis pumila* d'Urv., *Oxalis enneaphylla* Cav. var. *pumila* (d'Urv.) Hook.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 0-2600 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Oxalis eremobia* Phil.**

Sinónimos: *Oxalis inesitae* Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ANT, ATA.

Rango altitudinal: 2100-3300 m.

***Oxalis ericoides* R. Knuth**

Subarbusto. Endémico.

Distribución: ANT.

Rango altitudinal: 1500-3000 m.

***Oxalis erythrorhiza* Gillies ex Hook. & Arn.**

Sinónimos: *Oxalis bryoides* Phil., *Oxalis guessfeldtii* R. Knuth, *Acetosella bryoides* (Phil.) Kuntze, *Acetosella erythrorhiza* (Gillies ex Hook. & Arn.) Kuntze

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ANT, ATA, COQ, RME, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 1500-4300 m.

Países limítrofes: Argentina.

Oxalis gigantea Barnéoud

Arbusto. Endémico.

Distribución: ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Nombre vulgar: Churco, churqui.

Oxalis gyrorhiza Bertero ex Colla

Sinónimos: *Oxalis radicans* Ruiz & Pav. ex R. Knuth, *Acetosella gyrorhiza* (Bertero ex Colla) Kuntze, *Oxalis autumnalis* Poepp. ex Progel, nom. illeg.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 0-400 m.

Oxalis holosericea Phil.

Sinónimos: *Acetosella holosericea* (Phil.) Kuntze

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: LBO, MAU.

Rango altitudinal: 2500-2700 m.

Países limítrofes: Argentina.

Oxalis hypsophila Phil.

Sinónimos: *Oxalis exigua* Phil., *Oxalis coyensis* R.

Knuth, *Oxalis fluehmannii* Phil., *Oxalis gracilinervosa* R. Knuth, *Oxalis leptocaulos* Phil., *Oxalis microphylla* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO.

Rango altitudinal: 2600-5000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Oxalis incana Phil.

Subarbusto. Endémico.

Distribución: RME.

Rango altitudinal: 0-2000 m.

Oxalis johnstonii R. Knuth

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ANT, ATA.

Rango altitudinal: 0-900 m.

Oxalis laciniata Cav.

Sinónimos: *Oxalis squamoso-radicosa* Steud.,

Acetosella laciniata (Cav.) Kuntze, *Acetosella*

squamoso-radicosa (Steud.) Kuntze, *Oxalis prichardii*

Rendle, *Oxalis squamoso-radicosa* Steud. var.

pubescens Skottsb., *Oxalis laciniata* Cav. var. *pubescens* (Skottsb.) J.M.H. Shaw

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 0-2600 m.

Países limítrofes: Argentina.

Oxalis laxa Hook. & Arn. var. *hispidissima*

Barnéoud

Sinónimos: *Oxalis laxa* Hook. & Arn. var. *violacea* R.

Knuth, *Oxalis micrantha* Bertero ex Colla var. *setifera* R. Knuth, *Acetosella platycaulis* (Steud.) Kuntze, *Oxalis chosicensis* R. Knuth, *Oxalis platycaulis* Steud., *Oxalis umbellata* Kuntze ex R. Knuth, nom. nud.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO.

Rango altitudinal: 0-1600 m.

Países limítrofes: Argentina y Perú.

Oxalis laxa Hook. & Arn. var. *laxa*

Sinónimos: *Oxalis deflexa* Poepp. ex Progel, *Oxalis dichotomiflora* Steud., *Oxalis geranioides* R. Knuth, *Oxalis laxa* Hook. & Arn. var. *major* R. Knuth, *Oxalis laxa* Hook. & Arn. var. *minor* Barnéoud, *Oxalis micrantha* Bertero ex Colla var. *alsinoides* (Walp.) R. Knuth, *Oxalis micrantha* Bertero ex Colla var. *purpurea* R. Knuth, *Oxalis brevicaulis* Steud., *Oxalis alsinoides* Walp.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, BIO.

Rango altitudinal: 0-1200 m.

Países limítrofes: Perú.

Oxalis leucophylla Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ATA.

Rango altitudinal: 0-200 m.

Oxalis loricata Dusén

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-1500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Oxalis magellanica G. Forst.

Sinónimos: *Oxalis carnosa* Molina, *Oxalis modesta* Phil., *Acetosella modesta* (Phil.) Kuntze, *Oxalis cataractae* A. Cunn., *Oxalis lactea* Hook.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ARA, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-2000 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Ojos de agua.

Oxalis matancillae Lourteig
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ANT.
Rango altitudinal: 100-400 m.

Oxalis megalorrhiza Jacq.
Sinónimos: *Oxalis ornata* Phil., *Oxalis paposana* Phil., *Oxalis borchersii* Phil., *Oxalis darapskyi* Phil. ex Reiche, *Oxalis paniculata* Reiche, *Oxalis paposana* Phil. var. *hirta* R. Knuth, *Oxalis succulenta* Barnéoud, *Oxalis tarapacana* Phil., *Oxalis reticulata* Steud., *Oxalis illapelina* Phil., *Oxalis brevis* Phil., *Oxalis carnosa* Molina var. *incana* Reiche
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO.
Rango altitudinal: 0-3200 m.
Países limítrofes: Perú.

Oxalis micrantha Bertero ex Colla
Sinónimos: *Oxalis cumingii* Herb., *Acetosella cumingii* (Herb.) Kuntze, *Acetosella micrantha* (Bertero ex Colla) Kuntze, *Acetosella pygmaea* (Phil.) Kuntze, *Acetosella vinagrillo* (Steud.) Kuntze, *Oxalis micrantha* Bertero ex Colla var. *major* R. Knuth, *Oxalis pygmaea* Phil., *Oxalis vinaqrillo* Steud., *Xanthoxalis micrantha* (Bertero ex Colla) Holub
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE.
Rango altitudinal: 0-1300 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nota: Introducida en el Archipiélago de Juan Fernández.

Oxalis mira Lourteig
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: COQ.
Rango altitudinal: 400-600 m.

Oxalis morenoensis Lourteig
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ANT.
Rango altitudinal: 0-1000 m.

Oxalis nahuelhuapiensis Speg.
Sinónimos: *Oxalis comberi* R. Knuth
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: RME, ARA.
Rango altitudinal: 1500-2500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Oxalis novemfoliolata Heibl & Martic.
Subarbusto. Endémico.
Distribución: ATA.
Rango altitudinal: 100-450 m.

Oxalis ornithopus Phil.
Sinónimos: *Acetosella ornithopus* (Phil.) Kuntze
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ANT, ATA.
Rango altitudinal: 0-600 m.

Oxalis ovaleana Phil.
Hierba suculenta. Anual. Endémica.
Distribución: ANT, ATA, COQ.
Rango altitudinal: 0-600 m.

Oxalis pachyrrhiza Wedd.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, MAU.
Rango altitudinal: 3500-4000 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Oxalis penicillata Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: VAL, RME, LBO.
Rango altitudinal: 2000-3700 m.
Países limítrofes: Argentina.

Oxalis perdicaria (Molina) Bertero
Sinónimos: *Oxalis delicatula* Phil., *Oxalis lobata* Sims, *Oxalis mallobolba* Cav., *Acetosella eriorrhiza* (Zucc.) Kuntze, *Acetosella lobata* (Sims) Kuntze, *Acetosella mallobolba* (Cav.) Kuntze, *Acetosella perdicaria* (Molina) Kuntze, *Oxalis autumnalis* A. St.-Hil., *Oxalis*

eriorhiza Zucc., *Oxalis tenera* Spreng., *Sassia perdicaria* Molina
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB,
BIO, ARA, LRI, LLA.
Rango altitudinal: 0-500 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Flor de mayo, flor de la perdiz, mayo,
rimu.

***Oxalis pes-caprae* L.**
Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: COQ, VAL, RME, BIO, LLA, JFE.

***Oxalis purpurea* L.**
Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: JFE.

***Oxalis pycnophylla* Wedd.**
Sinónimos: *Oxalis hauthalii* R. Knuth
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ANT.
Rango altitudinal: 2200-5000 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

***Oxalis ricardii* Lourteig**
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ANT.
Rango altitudinal: 0-1000 m.

***Oxalis rigida* (Barnéoud) Lourteig**
Sinónimos: *Oxalis adenocaulos* Phil., *Oxalis puberula* Phil., *Oxalis san-romanii* Phil., *Oxalis torcana* Phil., *Acetosella puberula* (Phil.) Kuntze, *Oxalis laxa* Hook. & Arn. var. *rigida* Barnéoud
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ANT, ATA, COQ, RME, LBO.
Rango altitudinal: 800-2700 m.
Países limítrofes: Argentina.

***Oxalis rosea* Jacq.**
Sinónimos: *Oxalis rosea* Jacq. var. *simplex* Reiche
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB,
BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.
Rango altitudinal: 0-1500 m.
Nombre vulgar: Culle colorado.

***Oxalis squamata* Zucc.**
Sinónimos: *Oxalis chilensis* R. Knuth, *Oxalis geminata* Hook. & Arn., *Oxalis hirhii* Phil., *Oxalis macropus* Phil., *Oxalis polyantha* Walp., *Acetosella geminata* (Gillies ex Hook. & Arn.) Kuntze, *Acetosella macropus* (Phil.) Kuntze, *Acetosella polyantha* (Walp.) Kuntze, *Acetosella squamata* (Zucc.) Kuntze, *Oxalis trichocalyx* Steud., *Xanthoxalis polyantha* (Walp.) Holub
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, BIO.
Rango altitudinal: 1000-3200 m.
Países limítrofes: Argentina.

***Oxalis squarrosa* Barnéoud**
Sinónimos: *Oxalis briquetii* R. Knuth, *Oxalis coquimbana* Phil., *Oxalis glutinosa* Phil., *Acetosella squarrosa* (Barnéoud) Kuntze, *Acetosella glutinosa* (Phil.) Kuntze, *Acetosella coquimbana* (Phil.) Kuntze Subarbusto. Endémico.
Distribución: ATA, COQ.
Rango altitudinal: 1000-2800 m.

***Oxalis strictula* Steud.**
Sinónimos: *Oxalis aberrans* Reiche
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: VAL, RME, LBO.
Rango altitudinal: 500-1200 m.

***Oxalis tacorensis* B.L. Burtt**
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT.
Rango altitudinal: 4200-5100 m.
Países limítrofes: Bolivia.
Nombre vulgar: Chincura.

***Oxalis tortuosa* Lindl.**
Sinónimos: *Oxalis gaudichaudii* Barnéoud, *Oxalis maritima* Barnéoud, *Oxalis glomerata* Hook. & Arn., *Oxalis bridgesii* Bertero ex Colla, *Oxalis zonata* Liebm.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica.
Distribución: ATA, COQ, VAL, LBO, JFE.
Rango altitudinal: 0-300 m.

***Oxalis tuberosa* Molina**
Hierba suculenta. Perenne. Nativa.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nota: Descrita para Chile por Molina (1782) y citada para Chile por Lourteig (2000), sin mencionar la localidad o material de referencia.

***Oxalis valdiviensis* Barnéoud**

Sinónimos: *Oxalis berningeri* R. Knuth, *Oxalis hapalconidea* Barnéoud, *Oxalis tolguacensis* R. Knuth, *Acetosella antucensis* (Phil.) Kuntze, *Acetosella hapalconidea* (Barnéoud) Kuntze, *Acetosella valdiviensis* (Barnéoud) Kuntze, *Oxalis antucensis* Phil., *Oxalis capillipes* R. Knuth, *Oxalis tinctoria* Poepp. ex Progel, *Oxalis valdiviensis* Barnéoud var. *antucensis* (Phil.) Reiche, *Oxalis valdiviana* Vilm., *Oxalis valdiviensis* Barnéoud var. *humilis* Speg., *Xanthoxalis valdiviensis* (Barnéoud) Holub

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 1000-1500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Oxalis virgosa* Molina**

Sinónimos: *Oxalis subcarnosa* Klotzsch ex Walp., *Acetosella virgosa* (Molina) Kuntze, *Acetosella subcarnosa* (Klotzsch ex Walp.) Kuntze

Arbusto. Endémico.

Distribución: ATA, COQ, VAL.

Rango altitudinal: 0-100 m.

PAPAVERACEAE

Argemone

***Argemone crassifolia* G.B. Ownbey**

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ATA.

Rango altitudinal: 1300 m.

***Argemone hunnemannii* Otto & A. Dietr.**

Sinónimos: *Argemone mexicana* L. var. *grandiflora* auct. non (Sweet) Reiche, *Argemone platyceras* Link & Otto var. *chilensis* Prain, *Argemone platyceras* Link & Otto var. *hunnemannii* (Otto & A. Dietr.) Fedde, *Argemone mexicana* sensu Gay, non L.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 0-2500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Cardo blanco.

***Argemone rosea* Hook.**

Sinónimos: *Argemone mexicana* L. var. *rosea* (Hook.) Reiche, *Argemone mexicana* L. var. *spinosa* Barnéoud ex Reiche, *Argemone mexicana* L. var. *tomentosa* Barnéoud ex Reiche, *Argemone platyceras* Link & Otto var. *hispido-rosea* Fedde

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-900 m.

***Argemone subfusciformis* G.B. Ownbey**

Sinónimos: *Argemone mexicana* L. var. *ochroleuca* auct. non (Sweet) Lindl., *Argemone mexicana* auct. non L., *Argemone mexicana* L. var. *glauca* Barnéoud ex Reiche

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME.

Rango altitudinal: 0-2000 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Cardo blanco.

Eschscholzia

***Eschscholzia californica* Cham.**

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Fumaria

***Fumaria agraria* Lag.**

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE, IPA.

***Fumaria capreolata* L.**

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE, IPA.

***Fumaria officinalis* L.**

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: VAL.

***Fumaria parviflora* Lam.**

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, BIO.

Papaver

***Papaver dubium* L.**

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: MAG.

***Papaver hybridum* L.**

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: VAL, RME.

***Papaver rhoeas* L.**

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: RME, LBO, LLA.

***Papaver somniferum* L.**

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, BIO, LRI, MAG, JFE.

PASSIFLORACEAE

Malesherbia

***Malesherbia auristipulata* Ricardi**

Subarbusto. Endémico.

Distribución: AYP, TAR.

Rango altitudinal: 1800-2100 m.

***Malesherbia campanulata* Ricardi**

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ.

Rango altitudinal: 3300-4000 m.

***Malesherbia corallina* Muñoz-Schick & R. Pinto**

Subarbusto. Endémico.

Distribución: TAR.

Rango altitudinal: 2700-2800 m.

***Malesherbia densiflora* Phil.**

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ATA.

Rango altitudinal: 2500-3100 m.

***Malesherbia deserticola* Phil.**

Sinónimos: *Malesherbia borchersi* Phil.

Subarbusto. Endémico.

Distribución: ANT, ATA.

Rango altitudinal: 3400-3500 m.

Malesherbia fasciculata* D. Don var. *fasciculata

Sinónimos: *Malesherbia thyrsoidea* Bertero ex Steud., *Gynopleura fascicula* (D. Don) Roem.

Subarbusto. Endémico.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO.

Rango altitudinal: 400-1000 m.

Malesherbia fasciculata* D. Don var. *glandulosa

Ricardi

Subarbusto. Endémico.

Distribución: COQ.

Rango altitudinal: 1000-1400 m.

Malesherbia humilis* Poepp. var. *gabrielae

(Ricardi) Gengler

Sinónimos: *Malesherbia gabrielae* Ricardi

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: COQ.

Rango altitudinal: 700-2600 m.

Malesherbia humilis* Poepp. var. *humilis

Sinónimos: *Gynopleura humilis* (D. Don) Roem., *Gynopleura dilatata* Walp., *Malesherbia dilatata* (Walp.) F. Phil.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, MAU.

Rango altitudinal: 0-1800 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Piojito, piojillo.

***Malesherbia humilis* Poepp. var. *parviflora* (Phil.)**

Ricardi

Sinónimos: *Malesherbia multiflora* Ricardi, *Malesherbia parviflora* Phil.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-2900 m.

Malesherbia humilis Poepp. var. *propinqua* (Gay) Ricardi
Sinónimos: *Malesherbia propinqua* Gay, *Malesherbia humilis* D. Don var. *propinqua* (Gay) Reiche
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: COQ.
Rango altitudinal: 600-2000 m.

Malesherbia humilis Poepp. var. *taltalina* (Ricardi) Gengler
Sinónimos: *Malesherbia taltalina* Ricardi
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: ANT.
Rango altitudinal: 0-200 m.

Malesherbia lactea Phil.
Sinónimos: *Malesherbia rosulata* Werderm.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ANT, ATA.
Rango altitudinal: 2500-3900 m.
Países limítrofes: Argentina.

Malesherbia lanceolata Ricardi
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ATA, COQ.
Rango altitudinal: 2900-3300 m.

Malesherbia linearifolia (Cav.) Pers.
Sinónimos: *Gynopleura linearifolia* Cav., *Malesherbia linearifolia* (Cav.) Poir., comb. illeg., *Malesherbia coronata* D. Don, *Malesherbia subalpina* Poepp. ex Walp., *Gynopleura coronata* (D. Don) Roem., *Malesherbia humilis* D. Don var. *subalpina* (Poepp.) Gay
Subarbusto. Endémico.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO.
Rango altitudinal: 400-3200 m.

Malesherbia lirana Gay var. *bracteata* (Phil.) Ricardi
Sinónimos: *Malesherbia bracteata* Phil., *Malesherbia oblongifolia* auct. non Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ATA, COQ.
Rango altitudinal: 3000-3500 m.

Malesherbia lirana* Gay var. *lirana

Sinónimos: *Malesherbia hieronymi* Harms, *Malesherbia lirana* Gay var. *hieronymi* (Harms) Ricardi, *Malesherbia cuneata* Phil., *Malesherbia serpyllifolia* Phil., *Malesherbia lirana* Gay var. *sepyllifolia* (Phil.) Reiche, *Malesherbia lirana* Gay var. *subtomentosa* Kuntze, *Malesherbia incana* Werderm.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME.
Rango altitudinal: 2000-4000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Malesherbia obtusa Phil. var. *johnstonii* (Werderm.) Ricardi
Sinónimos: *Malesherbia johnstonii* Werderm.
Subarbusto. Endémico.
Distribución: ATA.
Rango altitudinal: 2500 m.

Malesherbia obtusa Phil. var. *obtusa*
Sinónimos: *Malesherbia breviflora* Phil.
Subarbusto. Endémico.
Distribución: ATA.
Rango altitudinal: 500 m.

Malesherbia paniculata D. Don
Sinónimos: *Gynopleura coerulea* C. Presl, *Malesherbia linearifolia* (Cav.) Pers. var. *paniculata* (D. Don) Reiche
Subarbusto. Endémico.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO.
Rango altitudinal: 400-2500 m.
Nombre vulgar: Farolito.

Malesherbia rugosa Gay var. *pseudopulverulenta* (Ricardi)
Subarbusto. Endémico.
Distribución: ATA.
Rango altitudinal: 2000 m.

Malesherbia rugosa Gay var. *rugosa*
Sinónimos: *Malesherbia ovata* Phil., *Malesherbia oblongifolia* Phil., *Malesherbia foliosa* Phil., *Malesherbia prolifera* Phil., *Malesherbia serrata* Phil., *Malesherbia brevipedunculata* Werderm., *Malesherbia glandulifera* Werderm.
Subarbusto. Endémico.
Distribución: ATA.
Rango altitudinal: 1000-3000 m.

***Malesherbia tenuifolia* D. Don**

Sinónimos: *Gynopleura tenuifolia* (D. Don) Roem.,
Malesherbia pulchra Phil.
Subarbusto. Endémico.
Distribución: TAR.
Rango altitudinal: 2500 m.

***Malesherbia tocopillana* Ricardi**

Subarbusto. Endémico.
Distribución: ANT.
Rango altitudinal: 0-200 m.

Passiflora

***Passiflora foetida* L.**

Arbusto trepador. Nativo.
Distribución: AYP.
Rango altitudinal: 20-50 m.
Países limítrofes: Bolivia y Perú.

***Passiflora pinnatistipula* Cav.**

Sinónimos: *Passiflora chilensis* Miers, *Tacsonia pinnatistipula* (Cav.) Juss.
Arbusto trepador. Nativo.
Distribución: COQ, VAL.
Rango altitudinal: 2500-3000 m.
Países limítrofes: Bolivia y Perú.
Nombre vulgar: Flor de la pasión, flor de la corona de Cristo, pasionaria, granadilla.

PHRYMACEAE

Erythranthe

***Erythranthe bridgesii* (Benth.) G.L. Nesom**

Sinónimos: *Mimulus parviflorus* Lindl. var. *bridgesii* Benth., *Mimulus longipes* Phil., *Mimulus bridgesii* (Benth.) Clos var. *integrifolia* Clos, *Mimulus bridgesii* (Benth.) Clos var. *stoloniformis* Clos, *Mimulus bridgesii* (Benth.) Clos, *Mimulus acutidens* Reiche
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.
Rango altitudinal: 0-500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Placa, berro.

***Erythranthe cuprea* (Dombrain) G.L. Nesom**

Sinónimos: *Mimulus luteus* L. var. *cuprea* Hook., *Mimulus cupreus* Dombrain
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 900-2100 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Placa, berro.

***Erythranthe depressa* (Phil.) G.L. Nesom var.**

ciminum (C. Bohlen) J.M. Watson & A.R. Flores
Sinónimos: *Mimulus depressus* Phil. var. *ciminum* C. Bohlen
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ATA.
Rango altitudinal: 2900-3100 m.

Erythranthe depressa* (Phil.) G.L. Nesom var. *depressa

Sinónimos: *Mimulus pissisi* Phil., *Mimulus acaulis* Phil., *Mimulus depressus* Phil. var. *acaulis* (Phil.) Reiche, *Mimulus depressus* Phil. var. *pissisi* (Phil.) Reiche, *Mimulus depressus* Phil.
Hierba. Anual o Perenne. Endémica.
Distribución: ANT, ATA, COQ.
Rango altitudinal: 2000-4500 m.

***Erythranthe glabrata* (Kunth) G.L. Nesom**

Sinónimos: *Mimulus andiculus* Kunth, *Mimulus parviflorus* Lindl., *Mimulus glabratus* Kunth var. *parviflorus* (Lindl.) Grant, *Mimulus sylvaticus* Phil., *Mimulus kingii* Phil., *Mimulus tener* Phil., *Mimulus parviflorus* Lindl. var. *externa* Skottsb., *Mimulus glabratus* Kunth var. *externus* (Skottsb.) Skottsb., *Mimulus pilosiusculus* Kunth, *Mimulus propinquus* Lindl., *Mimulus parviflorus* Lindl. var. *nana* Wedd., *Mimulus glabratus* Kunth
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.
Rango altitudinal: 0-4500 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.
Nombre vulgar: Oqororo.

Erythranthe lutea* (L.) G.L. Nesom var. *lutea

Sinónimos: *Mimulus punctatus* Miers ex Bertero, *Mimulus luteus* L. var. *nummularius* Clos, *Mimulus luteus* L. var. *micranthus* Phil., *Mimulus glabratus* Kunth var. *micranthus* (Phil.) Boivin, *Mimulus luteus* L. var. *rivularis* (Lodd.) Lindl., *Mimulus rivularis* Lodd., *Mimulus luteus* L. fma. *macrophyllus* Clos, *Mimulus punctatus* Miers ex Bertero, *Mimulus luteus* L. Hierba. Anual o Perenne. Nativa. Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS. Rango altitudinal: 0-3700 m. Países limítrofes: Argentina.

***Erythranthe lutea* (L.) G.L. Nesom var. *variegata* (Lodd.) Hook.**
Sinónimos: *Mimulus variegatus* Lodd., *Mimulus luteus* L. var. *variegatus* (Lodd.) Hook. Hierba. Perenne. Endémica. Distribución: LBO. Rango altitudinal: 500-2000 m. Nota: Probablemente una forma del híbrido E. lutea x E. naiandina, que es común.

***Erythranthe minima* (C. Bohlen) J.M. Watson & A.R. Flores**
Sinónimos: *Mimulus minimus* C. Bohlen, *Mimulus depresso* Phil. var. *nanus* (Phil.) Reiche, *Mimulus nanus* auct. non Phil. Hierba. Anual. Endémica. Distribución: ATA. Rango altitudinal: 1000-2050 m.

***Erythranthe naiandina* (J.M. Watson & C. Bohlen) G.L. Nesom**
Sinónimos: *Mimulus naiandinus* J.M. Watson & C. Bohlen
Hierba. Perenne. Endémica. Distribución: RME, LBO, MAU, BIO. Rango altitudinal: 500-2500 m.

PHYTOLACCACEAE

Anisomeria

***Anisomeria coriacea* D. Don**

Sinónimos: *Anisomeria drastica* (Bertero) Moq., *Pircunia drastica* Bertero, *Phytolacca drastica* (Bertero) Poepp. & Endl. Hierba. Perenne. Endémica. Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU. Rango altitudinal: 500-2600 m. Nombre vulgar: Pircún, pirco, congrio.

***Anisomeria littoralis* (Poepp. & Endl.) Moq.**
Sinónimos: *Phytolacca chilensis* Miers, nom. nud., *Phytolacca littoralis* Poepp. & Endl., *Anisomeria chilensis* (Miers) H. Walter, *Anisomeris fruticosa* Phil. Arbusto. Endémico. Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, MAU. Rango altitudinal: 0-1300 m.

Ercilla

***Ercilla spicata* (Bertero) Moq.**
Sinónimos: *Ercilla volubilis* A. Juss., *Galvezia spicata* Bertero, *Suriana volubilis* (A. Juss.) Dombey & Cav. ex D. Don, *Bridgesia spicata* (Bertero) Hook. & Arn., *Apodostachys densiflora* Turcz., *Phytolacca volubilis* (A. Juss.) Heimerl, *Ercilla spicata* (Hook. & Arn.) Moq. Arbusto trepador. Endémico. Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI. Rango altitudinal: 0-3000 m. Nombre vulgar: Coralillo, siete huiras, voqui-auca, voqui-traro.

***Ercilla syncarpellata* Nowicke**
Arbusto trepador. Endémico. Distribución: MAU, LRI, LLA, AIS. Rango altitudinal: 0-300 m. Nombre vulgar: Coralillo, siete huiras, voqui-auca, voqui-traro.

Phytolacca

***Phytolacca bogotensis* Kunth**
Sinónimos: *Phytolacca australis* Phil., *Phytolacca bogotensis* Kunth var. *australis* (Phil.) Hauman, comb. illeg., *Phytolacca micrantha* H. Walter, *Phytolacca parviflora* Hauman. Hierba. Perenne. Nativa. Distribución: BIO, ARA, LRI, LLA. Rango altitudinal: 0-3000 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.
Nombre vulgar: Carmín.

Phytolacca chilensis (Miers ex Moq.) H. Walter
Sinónimos: *Pircunia chilensis* Miers ex Moq.
Subarbusto. Endémico.
Distribución: VAL, RME, LBO.

PIPERACEAE

Peperomia

Peperomia berteroana Miq.
Sinónimos: *Peperomia tristanensis* Christoph.,
Peperomia berteroana Miq. subsp. *tristanensis*
(Christoph.) Valdeb.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: JFE.
Rango altitudinal: 0-600 m.
Nota: También presente en Isla Inaccesible e Isla Tristan da Cunha.

Peperomia coquimbensis Skottsb.
Hierba epífita. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ.
Rango altitudinal: 500 m.
Nombre vulgar: Congonilla.

Peperomia doellii Phil.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica.
Distribución: ANT, ATA, COQ.
Rango altitudinal: 0-700 m.

Peperomia fernandeziana Miq.
Sinónimos: *Peperomia fernandeziana* Miq. fma.
oblongifolia Skottsb., *Peperomia chilensis* C. DC.
Hierba epífita o terrestre. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ, VAL, LRI, LLA, JFE.
Rango altitudinal: 0-600 m.
Nombre vulgar: Congonilla.

Peperomia margaritifera Bertero ex Hook.
Sinónimos: *Peperomia margaritifera* Bertero ex Hook.
var. *umbraticola* Skottsb. ex Yunck.
Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: JFE.
Rango altitudinal: 200-400 m.

Peperomia nummularioides Griseb.
Sinónimos: *Peperomia australis* Phil., *Peperomia nummulariifolia* Kunth
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ, LRI, LLA, AIS.
Rango altitudinal: 0-500 m.
Nombre vulgar: Congonilla del monte.

Peperomia skottsbergii C. DC.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: JFE.
Rango altitudinal: 100-600 m.

PITTOSPORACEAE

Pittosporum

Pittosporum crassifolium Banks & Sol. ex A. Cunn.
Arbusto o árbol pequeño. Introducido.
Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, JFE.

Pittosporum undulatum Vent.
Arbusto. Introducido.
Distribución: VAL.
Nombre vulgar: Pitosporo.

PLANTAGINACEAE

Bacopa

Bacopa monnieri (L.) Pennell
Sinónimos: *Lysimachia monnieri* L., *Herpestis monnieri* (L.) Kunth, *Bacopa monnieri* (L.) Wettst., nom. illeg., *Bramia indica* Lam.
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, MAU.
Rango altitudinal: 0-3500 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Callitrichaceae

Callitrichie albomarginata Fassett

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: RME.

Rango altitudinal: 2700 m.

Callitrichie antarctica Engelm. ex Hegelm.

Hierba acuática. Anual. Nativa.

Distribución: RME, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Callitrichie deflexa A. Braun ex Hegelm.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: COQ, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Callitrichie heterophylla Pursh

Hierba acuática. Anual. Nativa.

Distribución: BIO, ARA, LLA.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Callitrichie lechleri (Hegelm.) Fassett var.

berteroana (Hegelm.) Fassett

Sinónimos: *Callitrichie marginata* Torr. var. *berteroana* Hegelm., *Callitrichie berteroniana* Steud.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: VAL, LBO, AIS.

Rango altitudinal: 140-750 m.

Países limítrofes: Argentina.

Callitrichie lechleri (Hegelm.) Fassett var. ***lechleri***

Sinónimos: *Callitrichie marginata* Torr. var. *lechleri*

Hegelm., *Callitrichie oblongicarpa* Fassett

Hierba acuática. Anual. Nativa.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.

Rango altitudinal: 0-2000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nota: Introducida en el Archipiélago de Juan Fernández.

Callitrichie terrestris Raf. subsp. ***turfosa*** (Bertero

emend. Hegelm.) Bacigalupo

Sinónimos: *Callitrichie turfosa* Bertero

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: ANT, VAL, RME, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Callitrichie truncata Guss.

Hierba acuática. Anual. Introducida.

Distribución: ARA, MAG.

Cymbalaria

Cymbalaria muralis P. Gaertn., B. Mey. & Scherb.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: VAL, RME, MAU, BIO, JFE.

Digitalis

Digitalis purpurea L.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: ATA, VAL, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.

Fonkia

Fonkia uliginosa Phil.

Sinónimos: *Gratiola uliginosa* (Phil.) F. Phil., *Gratiola peruviana* L. var. *uliginosa* (Phil.) Reiche

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Gratiola

Gratiola peruviana L.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ATA, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 0-1500 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Hebe

Hebe elliptica (G. Forst.) Pennell

Sinónimos: *Hebe magellanica* J.F. Gmel., *Veronica elliptica* G. Forst., *Veronica simpsoni* Phil.

Arbusto. Nativo.

Distribución: AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Hebe salicifolia* (G. Forst.) Pennell**

Sinónimos: *Veronica salicifolia* G. Forst., *Veronica fonki* Phil.

Arbusto. Nativo.

Distribución: LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-200 m.

Países limítrofes: Bolivia.

Hippuris

***Hippuris vulgaris* L.**

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: BIO, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Pinito de agua.

Kickxia

***Kickxia elatine* (L.) Dumort.**

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: RME, NUB, BIO, ARA, JFE.

Limosella

***Limosella australis* R. Br.**

Sinónimos: *Limosella aquatica* L. var. *tenuifolia* (Nutt.)

Hook.f., *Limosella aquatica* auct. non L., *Limosella tenuifolia* Nutt.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-4500 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Linaria

***Linaria canadensis* (L.) Dum. Cours.**

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, MAU, BIO, ARA, LRI.

***Linaria vulgaris* Mill.**

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: VAL, LBO, NUB, BIO, ARA, AIS.

Littorella

***Littorella australis* Griseb. ex Benth. & Hook.f.**

Sinónimos: *Plantago araucana* Rahn

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Mecardonia

***Mecardonia procumbens* (Mill.) Small var.**

***flagellaris* (Cham. & Schltdl.) V.C. Souza**

Sinónimos: *Herpestis flagellaris* Cham. & Schltdl., *Moniera flagellaris* (Cham. & Schltdl.) Kuntze, *Bacopa flagellaris* (Cham. & Schltdl.) Wetst., *Moniera procumbens* (Mill.) Kuntze var. *flagellaris* (Cham. & Schltdl.) Kuntze, *Mecardonia flagellaris* (Cham. & Schltdl.) Rossow, *Bacopa chamaedryoides* (Kunth) Wetst. var. *flagellaris* (Cham. & Schltdl.) Chodat & Hassl.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: LBO, MAU.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Mecardonia procumbens* (Mill.) Small var.**

procumbens

Sinónimos: *Erinus procumbens* Mill., *Herpestis chamaedryoides* Kunth, *Bacopa procumbens* (Mill.) Greenm.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: MAU.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Melosperma

***Melosperma andicola* Benth.**

Sinónimos: *Melosperma glabra* Phil., *Herpestis andicola* Gillies ex Benth.

Subarbusto. Nativo.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB.
Rango altitudinal: 2300-2700 m.
Países limítrofes: Argentina.

***Melosperma angustifolia* Phil.**

Sinónimos: *Melosperma andicola* Benth. var. *angustifolia* (Phil.) Rossow
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 2500-4500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Monttea

Monttea chilensis* Gay var. *chilensis

Arbusto o árbol pequeño. Endémico.
Distribución: COQ, VAL.
Rango altitudinal: 0-500 m.
Nombre vulgar: Uvillo.

***Monttea chilensis* Gay var. *taltalensis* Reiche**

Arbusto o árbol pequeño. Endémico.
Distribución: ANT, COQ.
Rango altitudinal: 0-700 m.

Ourisia

***Ourisia alpina* Poepp. & Endl.**

Sinónimos: *Ourisia pallens* Poepp. & Endl., *Ourisia alpina* Poepp. & Endl. var. *pallens* (Poepp. & Endl.) Benth., *Ourisia rosea* Phil., *Ourisia alpina* Poepp. & Endl. var. *glabra* Phil., *Ourisia rancoana* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.
Rango altitudinal: 1000-2700 m.
Países limítrofes: Argentina.

Ourisia breviflora* Benth. subsp. *breviflora

Sinónimos: *Ourisia antarctica* Hook.f.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-1200 m.
Países limítrofes: Argentina.

***Ourisia breviflora* Benth. subsp. *uniflora* (Phil.) Meudt**

Sinónimos: *Ourisia uniflora* Phil., *Ourisia breviflora* Benth. var. *uniflora* (Phil.) Reiche
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: NUB, BIO, LLA.
Rango altitudinal: 500-2000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Ourisia coccinea* (Cav.) Pers. subsp. *coccinea

Sinónimos: *Dichroma coccinea* Cav., *Ourisia villosa* Molina, *Ourisia pearcei* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.
Rango altitudinal: 0-1600 m.
Países limítrofes: Argentina.

Ourisia coccinea* (Cav.) Pers. subsp. *elegans

(Phil.) Meudt
Sinónimos: *Ourisia coccinea* (Cav.) Pers. var. *minor* Benth., *Ourisia coccinea* (Cav.) Pers. var. *elegans* (Phil.) Reiche, *Ourisia elegans* Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.
Rango altitudinal: 100-2600 m.

***Ourisia fragrans* Phil.**

Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: LLA.
Rango altitudinal: 1300-2200 m.
Países limítrofes: Argentina.

***Ourisia fuegiana* Skottsb.**

Sinónimos: *Ourisia muscosa* auct. non Benth.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-1200 m.
Países limítrofes: Argentina.

***Ourisia microphylla* Poepp. & Endl.**

Sinónimos: *Ourisia polyantha* auct. non Poepp. & Endl.
Subarbusto. Nativo.
Distribución: MAU, NUB, BIO.
Rango altitudinal: 800-2200 m.
Países limítrofes: Argentina.

***Ourisia muscosa* Benth.**

Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR.

Rango altitudinal: 3800-5000 m.
Países limítrofes: Bolivia y Perú.

Ourisia polyantha Poepp. & Endl.
Sinónimos: *Ourisia diazii* Phil.
Subarbusto. Endémico.
Distribución: RME, LBO.
Rango altitudinal: 1300-2400 m.

Ourisia pygmaea Phil.
Sinónimos: *Ourisia uniflora* auct. non Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.
Rango altitudinal: 1400-2200 m.
Países limítrofes: Argentina.

Ourisia ruelloides (L.f.) Kuntze
Sinónimos: *Ourisia poeppigii* Benth., *Ourisia racemosa* Clos, *Ourisia magellanica* C.F. Gaertn., *Ourisia glabra* Molina, *Chelone ruelloides* L.f.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-2600 m.
Países limítrofes: Argentina.

Ourisia serpyllifolia Benth.
Sinónimos: *Ourisia melospermoides* Phil.
Subarbusto. Endémico.
Distribución: VAL, RME, MAU.
Rango altitudinal: 1000-2200 m.

Plantago

Plantago australis Lam. subsp. ***australis***
Sinónimos: *Plantago candollei* Raf., *Plantago accrescens* Pilg., *Plantago kurtzii* Pilg., *Plantago refracta* Pilg., *Plantago stuckertii* Pilg., *Plantago leptophylla* Decne., *Plantago cantagallensis* Zahlbr., *Plantago bicallosa* Decne., *Plantago australis* Lam. subsp. *angustifolia* (Pilg.) Rahn, *Plantago bicallosa* Decne. var. *angustifolia* Pilg., *Plantago gigantea* Decne., *Plantago durvillei* Fisch. & C.A. Mey.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: TAR, VAL, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.
Rango altitudinal: 0-3500 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Plantago australis Lam. subsp. ***cumingiana*** (Fisch. & C.A. Mey.) Rahn
Sinónimos: *Plantago cumingiana* Fisch. & C.A. Mey., *Plantago pugae* Phil., *Plantago calbucana* Phil., *Plantago foncki* Phil., *Plantago tomentosa* Lam. var. *foncki* (Phil.) Reiche, *Plantago laevigata* Phil., *Plantago ovata* Phil., *Plantago julieti* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: VAL, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-2000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Plantago barbata G. Forst. subsp. ***austroandina***
Rahn
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AIS, MAG.
Rango altitudinal: 100-1800 m.
Países limítrofes: Argentina.

Plantago barbata G. Forst. subsp. ***barbata***
Sinónimos: *Plantago andicola* Gillies ex Hook.f., *Plantago imberbis* Hook.f., *Plantago pauciflora* Lam., *Plantago barbata* G. Forst. var. *pauciflora* (Gay) Pilg., *Plantago andicola* Decne. ex Barnéoud, *Plantago pauciflora* Lam. var. *major* Barnéoud, *Plantago barbata* G. Forst. var. *imberbis* Hook.f., *Plantago caespitosa* Phil., *Plantago barbata* G. Forst. var. *caespitosa* (Phil.) Pilg., *Plantago pachyrrhiza* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 500-3600 m.
Países limítrofes: Argentina.

Plantago barbata G. Forst. subsp. ***monanthos***
(d'Urv.) Rahn
Sinónimos: *Plantago monanthos* d'Urv., *Plantago polymorpha* Banks & Sol. ex Hook.f., *Plantago barbata* G. Forst. var. *elongata* Hook.f., *Plantago barbata* G. Forst. var. *monanthos* (d'Urv.) Pilg.,
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: RME, MAG.
Rango altitudinal: 0-200 m.
Países limítrofes: Argentina.

Plantago barbata G. Forst. subsp. *muscooides*

(Hook.f.) Rahn

Sinónimos: *Plantago monanthos* d'Urv. var. *muscooides*

Hook.f., *Plantago monanthos* d'Urv. var. *abbreviata*

Hook.f., *Plantago barbata* G. Forst. fma. *muscooides*

(Hook.f.) Pilg., *Plantago barbata* G. Forst. fma.

abbreviata (Hook.f.) Pilg.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 0-200 m.

Países limítrofes: Argentina.

Plantago brasiliensis Sims

Sinónimos: *Plantago brasiliensis* Sims var. *gayana*

(Decne. ex Barnéoud) Pilg., *Plantago obtusata* Decne.,

Plantago chilensis Rapin, *Plantago decaisnei* Barnéoud,

Plantago gayana Decne. ex Barnéoud, *Plantago*

lasiothrix Kunze ex Decne., *Plantago brasiliensis* Sims

var. *chilensis* (Rapin) Pilg., *Plantago sericea* Ruiz &

Pav. var. *decaisnei* (Barnéoud) Wedd., *Plantago*

brasiliensis Sims var. *decaisnei* (Barnéoud) Pilg.,

Plantago brasiliensis Sims var. *lasiothrix* (Decne.) Pilg.,

Plantago dolichophylla Phil., *Plantago vidali* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA,

LLA.

Rango altitudinal: 0-2200 m.

Países limítrofes: Argentina.

Plantago coronopus L.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: COQ, LBO, NUB, BIO, ARA.

Plantago fernandezia Bertero ex Barnéoud

Sinónimos: *Robinsonia nervosa* Phil.

Arbusto. Endémico.

Distribución: JFE.

Rango altitudinal: 500-600 m.

Plantago firma Kunze ex Walp.

Sinónimos: *Plantago brachystachys* Walp., *Plantago*

virginica L. var. *firma* (Walp.) Reiche, *Plantago*

truncata Cham. & Schldl. var. *canohirsuta* Pilg.,

Plantago leonensis Steud., *Plantago clausa* Steud.,

Plantago marginata Steud., *Plantago skottsbergii* Pilg.,

Plantago truncata Cham. & Schldl. subsp. *skottsbergii* (Pilg.) Pilg., *Plantago truncata* Cham. & Schldl. subsp.

firma (Kuntze ex Walp.) Pilg.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB,

BIO, ARA, LRI, JFE.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Plantago grandiflora Meyen

Sinónimos: *Plantago macrantha* Decne. ex Barnéoud,

Plantago macrantha Decne. ex Barnéoud var. *nitidifolia*

Barnéoud, *Plantago macrantha* Decne. ex Barnéoud var.

trichophylla Phil., *Plantago macrantha* Decne. ex

Barnéoud var. *hirsuta* Phil., *Plantago macrantha* Decne. ex Barnéoud var. *argentea* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO,

ARA.

Rango altitudinal: 1300-2800 m.

Países limítrofes: Argentina.

Plantago hispidula Ruiz & Pav.

Sinónimos: *Plantago callosa* Colla, *Plantago*

macrosperma Steud., *Plantago subtrinervis* Phil.,

Plantago stenopetala Phil., *Plantago disticha* Phil.,

Plantago albida Phil., *Plantago steinheilii* Barnéoud,

Plantago heterophylla Phil., nom. illeg., *Plantago*

stenopetala Phil. var. *stricta* Phil., *Plantago tumida* Link

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL,

RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 0-200 m.

Nombre vulgar: Llantén.

Plantago johnstonii Pilg.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: ANT.

Rango altitudinal: 20-300 m.

Plantago lanceolata L.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO,

MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE,

IPA.

Plantago litorea Phil.

Sinónimos: *Plantago philippiana* Vatke, *Plantago*

glabriuscula Phil., *Plantago oligantha* Phil.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL.

Rango altitudinal: 0-3600 m.

Plantago lundborgii Sparre

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: IDE.

Rango altitudinal: 0-200 m.

Plantago major L.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: AYP, ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE, IPA.

Plantago maritima L.

Sinónimos: *Plantago juncoidea* Lam., *Plantago maritima* L. var. *juncoides* (Lam.) A. Gray

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Plantago pachyneura Steud.

Sinónimos: *Plantago durvillei* Fisch. & C.A. Mey. subsp. *eupachyneura* (Pilg.) Pilg., nom. illeg., *Plantago australis* Lam. subsp. *pachyneura* (Steud.) Rahn, *Plantago pachyneura* Steud. subsp. *eupachyneura* Pilg., *Plantago hygrophila* Steud., *Plantago pachyneura* Steud. var. *hygrophila* (Steud.) Pilg., *Plantago durvillei* Fisch. & C.A. Mey. var. *hygrophila* (Steud.) Pilg., *Plantago berteroii* Steinh. ex Decne., *Plantago pachystachys* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG.

Rango altitudinal: 1300-2500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Plantago pulvinata Speg.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AIS.

Rango altitudinal: 0-400 m.

Países limítrofes: Argentina.

Plantago rancaguae Steud.

Sinónimos: *Plantago quillota* Vatke, *Plantago deserticola* Phil., *Plantago steinheili* Barnéoud, *Plantago brachyantha* Phil., *Plantago bracteosa* Phil.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO.

Rango altitudinal: 0-200 m.

Plantago sempervivoides Dusén

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 700-1600 m.

Países limítrofes: Argentina.

Plantago sericea Ruiz & Pav. subsp. *araucana*

Rahn

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: MAU, BIO.

Rango altitudinal: 1200 m.

Plantago sericea Ruiz & Pav. subsp. *sericans*

(Pilg.) Rahn

Sinónimos: *Plantago monticola* Decne., *Plantago monticola* Decne. subsp. *sericans* Pilg., *Plantago monticola* Decne. subsp. *eumonticola* Pilg., nom. illeg.

Hierba. Anual o bienal. Nativa.

Distribución: AYP.

Rango altitudinal: 2900-4400 m.

Países limítrofes: Argentina y Perú.

Plantago tehuelcha Speg.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: BIO, MAG.

Rango altitudinal: 0-900 m.

Países limítrofes: Argentina.

Plantago truncata Cham. & Schltdl.

Sinónimos: *Plantago australis* Lam. subsp. *truncata* (Cham. & Schltdl.) Rahn, *Plantago eschscholtziana* Fisch. & C.A. Mey., *Plantago truncata* Cham. & Schltdl. subsp. *eschscholtziana* (Fisch. & C.A. Mey.) Pilg., *Plantago berteroniana* Steud., *Plantago obscura* Steud., *Plantago bridgesii* Decne., *Plantago valparadisiaca* Decne., *Plantago amphibola* Phil., *Plantago angustifolia* Phil., *Plantago tomentosa* Lam. subsp. *angustifolia* (Phil.) Reiche, *Plantago truncata* Cham. & Schltdl. var. *philippii* Pilg.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 0-800 m.

Plantago tubulosa Decne.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT.

Rango altitudinal: 2900-5000 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.
Nombre vulgar: Psike.

Plantago uniglumis Wallr. ex Walp.
Sinónimos: *Plantago coelorrhiza* Morris & Macloskie,
Plantago barbata G. Forst. var. *uncialis* Wedd.,
Plantago uncialis Decne. ex Barnéoud, *Plantago barbata* G. Forst. fma. *uncialis* (Decne. ex Barnéoud)
Pilg., *Plantago uniglumis* Wallr. ex Walp. fma. *maxima* Pilg.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 200-3200 m.
Países limítrofes: Argentina.

Stemodia

Stemodia durantifolia (L.) Sw. var. *chilensis*
(Benth.) C.C. Cowan
Sinónimos: *Stemodia chilensis* Benth., *Stemodiaca chilensis* Kuntze
Hierba acuática. Perenne. Nativa.
Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 0-500 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Contrayerba.

Veronica

Veronica anagallis-aquatica L.
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: AYP, TAR, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, JFE.

Veronica arvensis L.
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: ATA, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG, JFE.

Veronica beccabunga L.
Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: LLA.

Veronica chamaedrys L.

Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: LRI.

Veronica officinalis L.
Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: ARA, LRI.

Veronica peregrina L. subsp. *xalapensis* (Kunth) Pennell
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: COQ, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, AIS, MAG.

Veronica persica Poir.
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE.

Veronica scutellata L.
Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: LRI, LLA.

Veronica serpyllifolia L.
Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

PLUMBAGINACEAE

Armeria

Armeria maritima (Mill.) Willd.
Sinónimos: *Armeria maritima* (Mill.) Willd. subsp. *andina* (Poepp. ex Boiss.) D.M. Moore & Yates, *Armeria andina* Poepp. ex Boiss., *Armeria macloviana* Cham., *Armeria curvifolia* Bertero, *Armeria chilensis* Boiss., *Armeria androsacea* Boiss., *Armeria brachyphylla* Boiss., *Armeria delphinii* Phil., *Armeria tenuifolia* Phil., *Armeria patagonica* Phil., *Armeria exaristata* Phil., *Armeria aegialea* Phil., *Armeria bella* Albov., *Statice punicea* Rendle, *Statice macloviana* Mackloskie, *Statice maritima* Mill.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-3200 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nota: Para una completa sinonimia, ver E. Ruiz, Flora de Chile 2(3): 2. 2005.

Bakerolimon

Bakerolimon plumosum (Phil.) O.A. Lincz.

Sinónimos: *Limonium plumosum* (Phil.) Kuntze, *Statice plumosa* Phil.

Arbusto. Endémico.

Distribución: ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Limonium

Limonium guaicuru (Molina) Kuntze

Sinónimos: *Plegorrhiza guaicura* Molina, *Statice chilensis* Phil., *Plegorrhiza adstringens* Willd.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ATA, COQ, VAL.

Rango altitudinal: 0-200 m.

Nombre vulgar: Guaicurú.

Plumbago

Plumbago caerulea Kunth

Arbusto o subarbusto. Nativo.

Distribución: ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-2500 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

POLEMONIACEAE

Bryantiella

Bryantiella glutinosa (Phil.) J.M. Porter

Sinónimos: *Gilia glutinosa* Phil.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA.

Rango altitudinal: 0-3700 m.

Países limítrofes: Perú.

Nombre vulgar: Lipelipe, pachareke, alhucema del campo, pasto de lluvia.

Collomia

Collomia biflora (Ruiz & Pav.) Brand

Sinónimos: *Gilia biflora* (Ruiz & Pav.) J.F. Macbr.,

Phlox biflora Ruiz & Pav., *Collomia cavanillesii* Hook.

& Arn., *Collomia cavanillesii* Hook. & Arn. fma.

coccinea (Lehm. ex Lindl.) Wherry, *Collomia coccinea*

Lehm. ex Lindl., *Collomia soehrensi* Phil., *Collomia*

stenosiphon Kunze, *Collomia lateritia* Don, *Collomia*

biflora (Ruiz & Pav.) Brand var. *lateritia* (Don) Brand,

Collomia cavanillesii Hook. & Arn. fma. *lateritia* (Don)

Wherry, *Collomia cavanillesii* Hook. & Arn. fma.

soehrensi (Phil.) Wherry, *Collomia cavanillesii* Hook. &

Arn. fma. *stenosiphon* (Kunze) Wherry, *Phlox*

unidentata Bertero

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO,

ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 200-1300 m.

Países limítrofes: Argentina.

Gilia

Gilia crassifolia Benth.

Sinónimos: *Gilia crassifolia* Benth. var. *andicola* (Phil.)

Brand, *Gilia lanigera* Phil., *Gilia andicola* Phil., *Gilia*

intermedia Phil.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO.

Rango altitudinal: 0-4000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Gilia laciniata Ruiz & Pav.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, JFE.

Rango altitudinal: 0-4300 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Latalata, comino del campo.

Gilia valdiviensis Griseb.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, LLA, JFE.

Rango altitudinal: 0-3000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nota: Introducida en la isla Más Afuera (Archipiélago Juan Fernández).

Ipomopsis

Ipomopsis gossypifera (Gillies ex Benth.) V.E. Grant

Sinónimos: *Gilia gossypifera* Gillies ex Benth., *Gilia involucrata* Phil.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: TAR, ANT, ATA.

Rango altitudinal: 2400-4500 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Leptosiphon

Leptosiphon pusillus (Benth.) J.M. Porter & L.A. Johnson

Sinónimos: *Linanthus pusillus* (Benth.) Greene, *Gilia pusilla* Benth.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO.

Rango altitudinal: 0-800 m.

Microsteris

Microsteris gracilis (Hook.) Greene

Sinónimos: *Gilia gracilis* Hook., *Collomia gracilis* (Hook.) Douglas ex Benth., *Gilia gracilis* Hook. var. *minuartioides* (Franch.) Borsini, comb. illeg., *Collomia gracilis* (Hook.) Douglas ex Benth. var. *minuartioides* Franch., *Collomia eritrichoides* Griseb., *Gilia gracilis* Hook. var. *eritrichoides* (Griseb.) Brand, *Polemonium morenonis* Kuntze, *Navarretia gracilis* (Hook.) Kuntze, *Phlox gracilis* (Hook.) Greene, *Gilia gracilis* Phil., hom. illeg.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, JFE.

Rango altitudinal: 0-4100 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nota: Introducida en el Archipiélago de Juan Fernández.

Navarretia

Navarretia involucrata Ruiz & Pav.

Sinónimos: *Gilia berterii* DC., *Gilia navarettia* Steud., *Gilia mucronata* Lehm., *Gilia eryngoides* Lehm., *Collomia navarretia* G. Don

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG.

Rango altitudinal: 1000-2000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Polemonium

Polemonium micranthum Benth.

Sinónimos: *Polemonium antarcticum* Griseb., *Polemonium gayanum* (Wedd.) Brand, *Gilia gayana* Wedd., *Gilia diffusa* Phil., *Gilia johowi* F. Meigen, *Polemoniella antarctica* (Griseb.) A. Nelson & J.F. Macbr. fma. *diffusa* (Phil.) Wherry, *Polemoniella antarctica* (Griseb.) A. Nelson & J.F. Macbr. fma. *gayana* (Wedd.) Wherry, *Polemoniella antarctica* (Griseb.) A. Nelson & J.F. Macbr. fma. *johowi* (F. Meigen) Wherry

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-2000 m.

Países limítrofes: Argentina.

POLYGALACEAE

Monnina

Monnina linearifolia Ruiz & Pav.

Sinónimos: *Pteromonnia linearifolia* (Ruiz & Pav.) B. Eriksen

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 0-1800 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Agua-rica, quelén-quelén.

Monnina philippiana Chodat

Sinónimos: *Monnina pterocarpa* Ruiz & Pav. var. *angustifolia* (DC.) Hook. & Arn., *Pteromonnia philippiana* (Chodat) B. Eriksen, *Monnina angustifolia* auct. non DC.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO.

Rango altitudinal: 100-1600 m.

Países limítrofes: Argentina.

Polygala

***Polygala darwiniana* A.W. Benn.**

Sinónimos: *Acanthocladus tehuelchum* Speg., *Polygala tehuelchum* (Speg.) Speg.

Hierba. Anual o bienal. Nativa.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Polygala gayi* A.W. Benn.**

Hierba. Anual o bienal. Endémica.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.

Rango altitudinal: 0-1600 m.

***Polygala gnidioides* Willd.**

Sinónimos: *Polygala thesioides* Willd., *Polygala pratensis* Phil., *Polygala eutaxoides* Turcz.

Hierba. Bienal o perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 0-1800 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Chin-chín, quelén-quelén, clinclín, quelulahuén.

***Polygala persistens* A.W. Benn.**

Sinónimos: *Polygala paradoxa* Chodat

Hierba. Bienal o perenne. Nativa.

Distribución: MAU.

Rango altitudinal: 0-2000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Polygala salasiana* Gay**

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ATA, COQ, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-2600 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Polygala solieri* Gay**

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ATA.

Rango altitudinal: 2800-3000 m.

***Polygala subandina* Phil.**

Sinónimos: *Polygala oxyantha* Phil., *Polygala philippiana* Chodat, *Polygala mendocina* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: RME, LBO, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 0-4500 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

POLYGONACEAE

Chorizanthe

***Chorizanthe commissuralis* J. Remy**

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-1300 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Pegadera, kinchanlawa.

***Chorizanthe dasyantha* Phil.**

Sinónimos: *Chorizanthe fasciculata* Phil., *Chorizanthe humilis* Phil., *Chorizanthe illapelina* Phil., *Chorizanthe intricata* Phil., *Chorizanthe parviflora* Phil., *Chorizanthe tenuis* Phil., hom. illeg.

Subarbusto. Endémico.

Distribución: ATA, COQ, VAL.

Rango altitudinal: 15-65 m.

***Chorizanthe densa* Phil.**

Subarbusto. Endémico.

Distribución: VAL.

Rango altitudinal: 800-900 m.

***Chorizanthe deserticola* Phil.**

Subarbusto. Endémico.

Distribución: ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-500 m.

***Chorizanthe flavescens* Phil.**

Subarbusto. Endémico.

Distribución: COQ.

Rango altitudinal: 0-500 m.

***Chorizanthe frankenioides* J. Remy**

Subarbusto. Endémico.

Distribución: ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-500 m.

***Chorizanthe gajardoi* Teillier & Macaya**

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ.

Rango altitudinal: 1850-1950 m.

***Chorizanthe glabrescens* Benth.**

Sinónimos: *Chorizanthe tenuis* Phil., *Chorizanthe vaginata* Benth. var. *arida* J. Remy

Subarbusto. Endémico.

Distribución: COQ.

Rango altitudinal: 20-350 m.

***Chorizanthe kingii* Phil.**

Sinónimos: *Chorizanthe pauciflora* Phil.

Subarbusto. Endémico.

Distribución: ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-500 m.

***Chorizanthe mieresii* Teillier & Macaya**

Subarbusto. Endémico.

Distribución: ATA, COQ.

Rango altitudinal: 3-260 m.

***Chorizanthe navasiae* Teillier & Macaya**

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ.

Rango altitudinal: 5-280 m.

***Chorizanthe novoana* Teillier & Macaya**

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: VAL.

Rango altitudinal: 0-100 m.

***Chorizanthe paniculata* Benth.**

Sinónimos: *Chorizanthe macraei* Benth., *Chorizanthe macraei* Benth. var. *humilis* Benth., *Chorizanthe ramosissima* Benth., *Chorizanthe rosea* Phil.

Subarbusto. Endémico.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO.

Rango altitudinal: 20-1600 m.

Nombre vulgar: Sanguinaria.

***Chorizanthe peduncularis* Benth.**

Sinónimos: *Chorizanthe umbellata* Phil.

Subarbusto. Endémico.

Distribución: ATA, COQ.

Rango altitudinal: 2490 m.

***Chorizanthe rosasii* Teillier & Macaya**

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ.

Rango altitudinal: 1700-2600 m.

***Chorizanthe vaginata* Benth.**

Sinónimos: *Chorizanthe vaginata* Benth. var. *maritima* J. Remy

Subarbusto. Endémico.

Distribución: ATA, COQ, VAL, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 0-200 m.

***Chorizanthe virgata* Benth.**

Sinónimos: *Chorizanthe virgata* Benth. var. *tomentosa* Benth.

Subarbusto. Endémico.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO.

Rango altitudinal: 900 m.

***Chorizanthe viridis* Phil.**

Subarbusto. Endémico.

Distribución: COQ, VAL.

Rango altitudinal: 800-1100 m.

Emex

***Emex spinosa* (L.) Campd.**

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: COQ.

Fallopia

***Fallopia japonica* (Houtt.) Ronse Decr.**

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: LLA, AIS.

***Fallopia sachalinensis* (F. Schmidt)**

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: LLA.

Koenigia

***Koenigia islandica* L.**

Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 0-2700 m.

Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Mollaca, quilo, voqui negro.

Lastarriaea

***Lastarriaea chilensis* J. Remy**

Sinónimos: *Lastarriaea linearis* Phil. ex Parry,
Lastarriaea stricta Phil., *Chorizanthe chilensis* (J. Remy) Goodman, *Chorizanthe lastarriaea* Parry, nom. illeg.
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO.
Rango altitudinal: 0-200 m.

***Muehlenbeckia hastulata* (Sm.) I.M. Johnst. var. *rotundata* (Phil.) Brandbyge**

Sinónimos: *Muehlenbeckia rotundata* Phil.
Arbusto. Nativo.
Distribución: NUB, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-1000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Oxytheca

***Oxytheca dendroidea* Nutt. subsp. *chilensis* (J. Remy) Ertter**

Sinónimos: *Briseagnoa chilensis* J. Remy, *Oxytheca apiculata* Miers ex Benth., nom. nud., *Oxytheca spiculata* Miers
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME.
Rango altitudinal: 2100-3500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Muehlenbeckia

***Muehlenbeckia fruticulosa* (Walp.) Standl.**

Sinónimos: *Polygonum fruticosum* Walp.
Arbusto. Nativo.
Distribución: AYP.
Rango altitudinal: 3400-3500 m.
Países limítrofes: Bolivia y Perú.
Nombre vulgar: Visvisa.

***Muehlenbeckia hastulata* (Sm.) I.M. Johnst. var. *fascicularis* (Meisn.) Brandbyge**

Sinónimos: *Muehlenbeckia chilensis* Meisn. var. *fascicularis* Meisn.
Arbusto. Nativo.
Distribución: VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.
Rango altitudinal: 0-500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Persicaria

***Persicaria maculosa* Gray**

Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: AYP, TAR, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Polygonum

***Polygonum acuminatum* Kunth**

Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, IPA.
Nombre vulgar: Tavari (Rapa Nui).

***Polygonum aviculare* L.**

Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.

***Polygonum bowenkampii* Phil.**

Hierba. Perenne. Endémica.

Muehlenbeckia hastulata* (Sm.) I.M. Johnst. var. *hastulata

Sinónimos: *Muehlenbeckia chilensis* Meisn.,
Muehlenbeckia chilensis Meisn. var. *brachybotrys* Meisn., *Muehlenbeckia chilensis* Meisn. var. *injucunda* (Lindl.) Meisn., *Polygonum hastulatum* (Sm.) Kuntze, *Polygonum injucunda* Lindl., *Rumex hastulatus* Sm., *Karkinetron undulatum* Raf., *Calacinum chilense* (Meisn.) J.F. Macbr.
Arbusto. Nativo.
Distribución: AYP, TAR, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Distribución: RME.

***Polygonum brasiliense* K. Koch**

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: AIS, MAG.

***Polygonum campanulatum* Hook. f.**

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: LLA, AIS.

***Polygonum convolvulus* L.**

Hierba trepadora. Anual. Introducida.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.

***Polygonum hydropiper* L.**

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: MAU, NUB, BIO, LLA.

***Polygonum hydropiperoides* Michx.**

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: AYP, TAR, ATA, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, JFE.

***Polygonum lapathifolium* L.**

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: ATA, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE.

***Polygonum maritimum* L.**

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: COQ, VAL, NUB, BIO, LRI, LLA, AIS, MAG.

***Polygonum mite* Schrank**

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: VAL.

***Polygonum orientale* L.**

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: RME, BIO, ARA.

***Polygonum sanguinaria* J. Remy**

Subarbusto. Endémico.

Distribución: COQ, VAL, RME, BIO, AIS.

Rango altitudinal: 0-2200 m.

Nombre vulgar: Sanguinaria.

Rumex

***Rumex acetosa* L.**

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: MAG.

***Rumex acetosella* L.**

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: AYP, TAR, ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.

***Rumex conglomeratus* Murray var. *vulgaris* Wallr.**

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, JFE.

***Rumex crispissimus* Kuntze**

Sinónimos: *Rumex decumbens* Dusén

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL, MAG.

Rango altitudinal: 0-800 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Rumex crispus* L.**

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE, IPA.

***Rumex cristatus* DC.**

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: RME, LLA.

***Rumex cuneifolius* Campd.**

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ATA, VAL, RME, BIO, ARA, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 0-4000 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Rumex darwinianus* Rech. f.**

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: LLA.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Rumex longifolius* DC.**

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: RME, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, MAG.

***Rumex magellanicus* Campd.**

Sinónimos: *Rumex hippiatricus* J. Remy, *Rumex magellanicus* Griseb., hom. illeg., *Rumex magellanicus* Campd. var. *dusenii* Rech.f., *Rumex erosus* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 1000-4000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Huaicrahu.

***Rumex maricola* J. Remy**

Sinónimos: *Rumex cuneifolius* Campd. var. *maricola* (J. Remy) Rech.f., *Rumex arenarius* Poepp. ex Endl.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 0-500 m.

***Rumex maritimus* L.**

Hierba. Anual o bienal. Introducida.

Distribución: VAL, RME, MAG.

***Rumex obtusifolius* L.**

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: RME, LBO, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

***Rumex patagonicus* Rchb.f.**

Sinónimos: *Rumex chiloensis* Rchb.f.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ARA, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 0-500 m.

***Rumex pulcher* L.**

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, MAG, JFE.

***Rumex romassa* J. Remy**

Sinónimos: *Rumex asplundii* Rech.f.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 1000-3500 m.

Países limítrofes: Argentina.

PORTULACACEAE

Portulaca

***Portulaca oleracea* L.**

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: AYP, TAR, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, JFE, IPA.

***Portulaca philippii* I.M. Johnst.**

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA.

Rango altitudinal: 500-3600 m.

PRIMULACEAE

Anagallis

Anagallis alternifolia* Cav. var. *alternifolia

Sinónimos: *Anagallis alternifolia* Cav. var. *minor* R. Knuth, *Anagallis alternifolia* Cav. var. *tenelliformis* R. Knuth fma. laxa R. Knuth

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-2500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Anagallis alternifolia* Cav. var. *repens* (d'Urv.) Knuth**

Sinónimos: *Lysimachia repens* d'Urv., *Anagallis alternifolia* Cav. var. *densifolia* Hook.f., *Euparea chilensis* Baudo, *Anagallis alternifolia* Cav. var. *angustifolia* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-3500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Anagallis arvensis* L.**

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: AYP, TAR, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, JFE, IPA.

Androsace

***Androsace salasii* Kurtz**

Sinónimos: *Collomia pusilla* Dusén, *Androsace pusilla* (Dusén) Lourteig

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-2500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Centunculus

***Centunculus minimus* L.**

Sinónimos: *Anagallis minima* (L.) E.H.L. Krause

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: ANT, COQ, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, JFE.

Lysimachia

***Lysimachia sertulata* Baudó**

Sinónimos: *Lysimachia chilensis* (Griseb.) Knuth, *Lysimachia marginata* Macloskie, *Lysimachia umbellata* Phil., *Theopyxis chilensis* Griseb.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 0-2000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Melilukul.

Pelletiera

***Pelletiera verna* A. St.-Hil.**

Sinónimos: *Pelletiera serpyllifolia* (Poir.) Kuntze, *Asterolinon serpyllifolium* (Poir.) Ball, *Asterolinon trinum* Baudó

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: VAL, RME, LBO, BIO, LLA.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Primula

***Primula comberi* W.W. Sm.**

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ARA.

Rango altitudinal: 1500-2000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Primula magellanica* Lehm.**

Sinónimos: *Primula decipiens* Duby, *Primula farinosa* L. var. *magellanica* (Lehm.) Hook.f., *Primula farinosa* L. subsp. *magellanica* (Lehm.) W.W. Sm. & Forrest

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ARA, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-1800 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Primula, oreja de oso.

Samolus

***Samolus latifolius* Duby**

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: VAL, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 5-800 m.

***Samolus repens* Pers.**

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: BIO.

Rango altitudinal: 5-10 m.

Nota: Se encuentra también en Australia.

***Samolus spathulatus* (Cav.) Duby**

Sinónimos: *Androsace spathulata* Cav., *Primula pistiifolia* Griseb., *Steirostemon spathulatus* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AIS, MAG.

Rango altitudinal: 5-900 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Samolus valerandi* L.**

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: ATA, COQ, VAL.

Rango altitudinal: 10-2500 m.

PROTEACEAE

Embothrium

Embothrium coccineum J.R. Forst. & G. Forst.
Sinónimos: *Embothrium coccineum* J.R. Forst. & G. Forst. var. *cavanillesii* Kuntze, *Embothrium coccineum* J.R. Forst. & G. Forst. var. *oblanceolatum* Kuntze, *Embothrium coccineum* J.R. Forst. & G. Forst. var. *lanceolatum* (Ruiz & Pav.) Kuntze, *Embothrium coccineum* J.R. Forst. & G. Forst. var. *obovatum* Kuntze, *Embothrium coccineum* J.R. Forst. & G. Forst. fma. *lanceolatum* (Ruiz & Pav.) R.L. Pérez-Mor., *Embothrium lanceolatum* Ruiz & Pav., *Embothrium valdivianum* Gand., *Embothrium gilliesii* Meisn.
Árbol. Nativo.
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-1500 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Notro, notru, ciruelillo, fosforito, treumún.

Gevuina

Gevuina avellana Molina
Sinónimos: *Quadria heterophylla* Ruiz & Pav., *Quadria avellana* (Molina) Gaertn.
Árbol. Nativo.
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.
Rango altitudinal: 100-700 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Avellano, Gevuín.

Lomatia

Lomatia dentata (Ruiz & Pav.) R. Br.
Sinónimos: *Embothrium dentatum* Ruiz & Pav., *Tricondylus dentatus* (Ruiz & Pav.) Kuntze, *Lomatia dentata* (Ruiz & Pav.) R. Br. var. *acutifolia* Meisn., *Lomatia dentata* (Ruiz & Pav.) R. Br. var. *obtusifolia* Meisn.
Árbol. Nativo.
Distribución: COQ, VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.
Rango altitudinal: 0-1800 m.
Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Avellanillo, piñol, guardafuego, palo negro.

Lomatia ferruginea (Cav.) R. Br.

Sinónimos: *Embothrium ferrugineum* Cav., *Tricondylus ferrugineus* (Cav.) Salisb., *Lomatia pinnatifida* Hort ex Thornton, nom. nud.
Árbol. Nativo.
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-800 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Fuinque, romerillo, huinque, piuné, moré.

Lomatia hirsuta (Lam.) Diels subsp. *obliqua* (Ruiz & Pav.) R.T. Penn.

Sinónimos: *Lomatia obliqua* (Ruiz & Pav.) R. Br., *Tricondylus obliqua* (Ruiz & Pav.) Kuntze, *Lomatia obliqua* (Ruiz & Pav.) R. Br. var. *alnifolia* (Poepp. ex Meisn.) Meisn., *Lomatia obliqua* (Ruiz & Pav.) R. Br. var. *subintegrifolia* Meisn., *Embothrium obliquum* Ruiz & Pav.

Árbol. Nativo.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.
Rango altitudinal: 0-1000 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Radal, ralar, nogal silvestre.

Orites

Orites myrtoidea (Poepp. & Endl.) Benth. & Hook.f. ex B.D. Jacks.

Sinónimos: *Lomatia chilensis* Gay, *Roupala myrtoidea* Poepp. & Endl., *Lomatia alpina* Phil., nom. nud., *Embothrium myrtifolium* Poepp. ex Meisn., *Tricondylus chilensis* (Gay) Kuntze
Arbusto. Nativo.
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 700-1500 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Radal enano.

QUILLAJACEAE

Quillaja

***Quillaja saponaria* Molina**

Sinónimos: *Quillaja molinae* DC., *Quillaja poeppigii* Walp., *Smegmadermos emarginatus* Ruiz & Pav., *Smegmaria emarginata* (Ruiz & Pav.) Willd.

Árbol. Nativo.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 10-2000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Quillay.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.

Rango altitudinal: 0-3000 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Centella.

Nota: Introducida en el Archipiélago de Juan Fernández.

RAFFLESIACEAE

Pilostyles

***Pilostyles berteroii* Guill.**

Sinónimos: *Apodanthes berteroii* (Guill.) Gardner, *Frostia berteroii* H. Karst.

Hierba parásita. Perenne. Nativa.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, NUB.

Rango altitudinal: 0-3700 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

***Anemone decapetala* Ard. var. *foliolosa* Eichler**

Sinónimos: *Anemone cicutifolia* I.M. Johnst., *Anemone triternata* Vahl, *Anemone decapetala* Ard. var. *triloba* Juss. ex Lorentz, *Anemone fumariaefolia* Juss., *Anemone decapetala* Ard. var. *triternata* (Vahl) Kuntze, *Anemone decapetala* Niederl., *Anemone tridentata* Britton

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-2500 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Centella, flor de la esperanza.

***Anemone hepaticifolia* Hook.**

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: LRI, LLA.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Nombre vulgar: Flor de la estrella.

RANUNCULACEAE

Anemone

***Anemone antucensis* Poepp.**

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG.

Rango altitudinal: 100-1800 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Anemone moorei* Espinosa**

Subarbusto. Endémico.

Distribución: MAU.

Rango altitudinal: 500 m.

Nombre vulgar: Pata de león.

***Anemone multifida* Poir.**

Sinónimos: *Anemone multifida* Poir. var. *grandiflora* Rendle, *Anemone multifida* Poir. var. *lanigera* (Gay) Ulbr., *Anemone commersoniana* Richardson ex Spreng., *Anemone multifida* Poir. var. *magellanica* DC., *Anemone multifida* Poir. var. *commersoniana* (Richardson ex Spreng.) Ulbr., *Anemone multifida* Poir. var. *hudsoniana* DC., *Anemone lanigera* Gay, *Anemone multifida* Poir. var. *uniflora* DC.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-2000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Anemone rigida* Gay**

Subarbusto. Endémico.

Distribución: RME, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 1000-1500 m.

Aquilegia

Aquilegia vulgaris L.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Barneoudia

Barneoudia balliana Britton

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, RME.

Rango altitudinal: 3000-5000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Barneoudia chilensis Gay

Sinónimos: *Barneoudia cyanoleuca* Leyb., *Barneoudia domeykoana* Leyb., *Anemone chilensis* (Gay) Kurtz, *Anemone chilensis* (Gay) Reiche, comb. illeg., *Anemone barneoudia* Kuntze, *Anemone gayana* R. Wagner

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME.

Rango altitudinal: 2000-4000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Barneoudia major Phil.

Sinónimos: *Anemone major* (Phil.) F. Meigen, *Anemone major* (Phil.) Reiche, comb. illeg., *Barneoudia maxima* Leyb.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO.

Rango altitudinal: 1000-4000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Callianthemoides

Callianthemoides semiverticillata (Phil.) Tamura

Sinónimos: *Anemone myriophylla* Speg., *Ranunculus pseudosemiverticillatus* Espinosa & C. Rudolph, *Ranunculus semiverticillatus* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: LLA.

Rango altitudinal: 100-2500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Caltha

Caltha appendiculata Pers.

Sinónimos: *Caltha appendiculata* Pers. var. *chilensis* Huth, *Caltha limbata* Schleidl., *Caltha paradoxa* Sol. ex T.F. Forst., *Psychrophila appendiculata* (Pers.) Gay, *Caltha holophylla* Leyb., *Psychrophila holophylla* Leyb.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-2000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Caltha dioneifolia Hook.f.

Sinónimos: *Psychrophila dioneifolia* (Hook.f.) Gay

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-1100 m.

Países limítrofes: Argentina.

Caltha sagittata Cav.

Sinónimos: *Caltha involuta* A.W. Hill, *Caltha alata* A.W. Hill, *Caltha sagittata* Cav. var. *latifolia* Huth, *Psychrophila sagittata* (Cav.) Gay, *Psychrophila andicola* Gay, *Caltha multicapsularis* Sol. ex T.F. Forst., *Caltha andicola* (Gay) Walp., *Caltha de-ranco* Steud., *Caltha digitata* A. Cunn.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-3500 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

NOMBRE VULGAR: Maillico.

Clematis

Clematis bonariensis Juss. ex DC.

Arbusto trepador. Introducido.

Distribución: BIO, ARA.

Rango altitudinal: 120-320 m.

Clematis montevidensis Spreng.

Arbusto trepador. Introducido.

Distribución: ATA.

Halerpestes

Halerpestes cymbalaria (Pursh) Greene
Sinónimos: *Ranunculus microcarpus* J. Presl,
Ranunculus tridentatus Kunth ex DC., *Ranunculus*
poozaoefolius Gay, *Ranunculus minutus* Gay, *Ranunculus*
hemignostus Steud., *Ranunculus maritimus* Phil.,
Ranunculus minutus Gay var. *microphylla* Phil. ex
Reiche, *Ranunculus cymbalaria* Pursh, *Ranunculus*
cymbalaria Pursh var. *americanus* DC., *Ranunculus*
tridentatus Kunth ex DC. var. *major* DC., *Ranunculus*
tridentatus Kunth ex DC. var. *minor* DC., *Ranunculus*
microcarpus J. Presl var. *maritima* Phil., *Halerpestes*
tridentata (Kunth ex DC.) Greene
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL,
RME, LBO, MAU, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-4500 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Halerpestes exilis (Phil.) Tamura
Sinónimos: *Ranunculus cymbalaria* Pursh fma. *exilis*
(Phil.) Lourteig, *Ranunculus cymbalaria* Pursh var. *exilis*
(Phil.) R.E. Fr., *Ranunculus exilis* Phil., *Ranunculus*
minutus Gay var. *exilis* (Phil.) Reiche, *Ranunculus*
minutiusculus Ulbr.
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ.
Rango altitudinal: 2000-4300 m.
Países limítrofes: Argentina.

Halerpestes uniflora (Phil. ex Reiche) Emadzade,
Lehnebach, P. Lockh. & Hörndl
Sinónimos: *Ranunculus pseudocaltha* Chodat &
Wilczek, *Ranunculus pseudocaltha* Chodat & Wilczek
fma. *minor* Chodat & Wilczek, *Ranunculus uniflorus*
Phil. ex Reiche, *Ranunculus uniflorus* Phil. ex Reiche
fma. *boliviensis* (Phil.) Lourteig, *Ranunculus boliviensis*
Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, MAU, AIS,
MAG.
Rango altitudinal: 0-4500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Hamadryas

Hamadryas delfinii Phil. ex Reiche
Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAG.
Rango altitudinal: 0-1100 m.
Países limítrofes: Argentina.

Hamadryas kingii Hook.f.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAG.
Rango altitudinal: 500-2000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Hamadryas magellanica Lam.
Sinónimos: *Hamadryas tomentosa* DC., *Hamadryas*
magellanica Lam. var. *tomentosa* (DC.) Hook.f.,
Hamadryas magellanica Franchet, *Hamadryas*
paniculata Hook.f.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAG.
Rango altitudinal: 0-1000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Hamadryas sempervivoides Sprague
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAG.
Rango altitudinal: 700-1300 m.
Países limítrofes: Argentina.

Myosurus

Myosurus apetalus Gay
Sinónimos: *Myosurus gracilis* (Speg.) Macloskie,
Myosurus aristatus Benth. ex Hook.f. var. *apetalus*
(Gay) Huth, *Myosurus aristatus* Benth. ex Hook.f. var.
gracilis Speg., *Myosurus aristatus* Benth. ex Hook.f. var.
brachypoda Speg., *Myosurus aristatus* Benth. ex Hook.f.
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: COQ, RME, MAG.
Rango altitudinal: 0-4000 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Myosurus patagonicus Speg.
Sinónimos: *Myosurus minimus* auct. non L.
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: RME, NUB, BIO, MAG.
Rango altitudinal: 0-500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Ranunculus

Ranunculus acaulis Banks & Sol. ex DC.
Sinónimos: *Ranunculus skottsbergii* Gand., *Ranunculus stenopetalus* Hook., *Ranunculus litoralis* Schltdl. ex Lechl., nom. nud., *Ranunculus litoralis* Phil., *Ranunculus binternatus* Vallentin & Cotton, *Ranunculus uniflorus* Colenso
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-1000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Ranunculus apiiifolius Pers.
Sinónimos: *Ranunculus sceleratus* auct. non L., *Aphanostemma apiiifolium* (Pers.) A. St.-Hil.
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.
Rango altitudinal: 0-500 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Apio cimarrón.

Ranunculus aquatilis L.
Hierba acuática. Perenne. Introducida.
Distribución: AYP, NUB, BIO, ARA, LLA, MAG.

Ranunculus arvensis L.
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: MAU, NUB, BIO.

Ranunculus binternatus Sm.
Sinónimos: *Ranunculus exiguis* d'Urv., *Ranunculus commersonii* DC. ex Poir., *Ranunculus montteanus* Phil., *Ranunculus crassipes* Hook.f., *Ranunculus flaccidus* Banks & Sol. ex Hook.f., *Ranunculus montteanus* Phil. var. *obtusilobus* Phil. ex Reiche
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-900 m.
Países limítrofes: Argentina.

Ranunculus bonariensis Poir. var. *trisepalus*
(Gillies ex Hook. & Arn.) Lourteig
Sinónimos: *Ranunculus trisepalus* Gillies ex Hook. & Arn., *Ranunculus obtusatus* Poepp., *Ranunculus bonariensis* Poir. var. *beta* Eichler, *Ranunculus humilis* Collie ex Hook. & Arn., *Ranunculus berteronianus* Steud., nom. nud.

Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.
Rango altitudinal: 0-900 m.
Países limítrofes: Argentina.

Ranunculus caprarum Skottsb.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: JFE.
Rango altitudinal: 1200 m.

Ranunculus chilensis DC.
Sinónimos: *Ranunculus sericans* Steud., *Ranunculus protractus* Steud., *Ranunculus elatus* Steud., *Ranunculus berteroanus* Phil., *Ranunculus chilensis* DC. var. *lasius* Phil. ex Reiche, *Ranunculus chilensis* DC. var. *gayi* Phil. ex Reiche, *Ranunculus valdivianus* Phil. ex Reiche, *Ranunculus chilensis* DC. var. *alpha* Poepp., *Ranunculus chilensis* DC. var. *beta* Poepp.
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-3600 m.
Países limítrofes: Argentina y Perú.
Nombre vulgar: Cáustico de vega, ranunculo.

Ranunculus flagelliformis Sm.
Sinónimos: *Casalea flagelliformis* (Sm.) A. St.-Hil., *Casalea flagelliformis* (Sm.) A. St.-Hil. var. *lutescens* A. St.-Hil., *Casalea hederacea* Mart. ex Eichler
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: COQ, VAL, RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.
Rango altitudinal: 0-2500 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Ranunculus fuegianus Speg.
Sinónimos: *Ranunculus binternatus* Wild.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-3700 m.
Países limítrofes: Argentina.

Ranunculus hydrophilus Gaudich.
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: BIO, ARA, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-1500 m.
Países limítrofes: Argentina.

***Ranunculus maclovianus* d'Urv.**

Sinónimos: *Ranunculus colliguensis* Steud.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: LLA, MAG.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Ranunculus minutiflorus* Bertero ex Phil.**

Sinónimos: *Ranunculus savatieri* Franch., *Ranunculus aysenensis* Gand., *Ranunculus chilensis* auct. non DC., *Casalea chilensis* A. St.-Hil., *Ranunculus saxifragaefolius* Steud., *Ranunculus miser* Phil., *Ranunculus minutiflorus* Bertero ex Phil. var. *miser* (Phil.) Reiche, *Hydrocotyle pauciflora* Phil., *Ranunculus berteroanus* Presl

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-1800 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Ranunculus muricatus* L.**

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, ARA, LRI, MAG, JFE.

***Ranunculus parviflorus* L.**

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: NUB, BIO, ARA.

Ranunculus peduncularis* Sm. var. *erodiifolius

(Gay) Reiche

Sinónimos: *Ranunculus erodiifolius* Gay, *Ranunculus peduncularis* Sm. var. *polypetalus* (Gillies ex Hook. & Arn.) Macloskie, *Ranunculus polypetalus* Gillies ex Hook. & Arn., hom. illeg., *Ranunculus andinus* Phil., *Ranunculus polypetalus* Gillies ex Hook. & Arn. var. *acaulis* Gillies

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-3500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Ranunculus peduncularis* Sm. var. *peduncularis

Sinónimos: *Ranunculus alboffii* Macloskie, *Ranunculus glandulifer* Poepp., *Ranunculus patagonicus* Poepp.,

Ranunculus peduncularis Sm. var. *alboffiana* Speg.,

Ranunculus peduncularis Sm. var. *glandulifer* (Poepp.)

Reiche, *Ranunculus peduncularis* Sm. var. *patagonicus* (Poepp.) Reiche, *Ranunculus peduncularis* Sm. var.

minor Wedd. ex Franch., *Ranunculus gilliesii* Steud.,

Ranunculus talquinus Phil. ex Reiche, *Ranunculus peduncularis* Sm. var. *glabrata* Reiche, *Ranunculus peduncularis* Sm. var. *saffordi* Phil. ex Reiche,

Ranunculus peduncularis Sm. var. *longavinus* Phil. ex Reiche, *Ranunculus peduncularis* Sm. var. *chillanensis* Phil. ex Reiche, *Ranunculus polypetalus* Steud. nom. nud., *Ranunculus pratensis* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-3000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Ranunculus pseudotrullifolius* Skottsb.**

Sinónimos: *Ranunculus dusenii* Lourteig, *Ranunculus caespitosus* Dusén, *Ranunculus trullifolius* Dusén, hom. illeg.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: LLA, MAG.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Ranunculus repens* L. var. *flore-pleno* DC.**

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: COQ, VAL, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Ranunculus repens* L. var. *repens

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

***Ranunculus sceleratus* L.**

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: VAL, RME, LBO.

***Ranunculus sericocephalus* Hook.f.**

Sinónimos: *Ranunculus fueginos* Phil. ex Reiche,

Ranunculus sericocephalus Hook.f. var. *major* Albov,

Ranunculus phillipianus De Wild.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Ranunculus spegazzinii* Lourteig**

Sinónimos: *Ranunculus oligocarpus* Speg., hom. illeg.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ARA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 1000-1500 m.
Países limítrofes: Argentina.

***Ranunculus trichophyllus* Chaix**

Sinónimos: *Ranunculus aquatilis* auct. non L.,
Ranunculus aquatilis L. var. *caespitosa* auct. non DC.,
Ranunculus aquatilis L. var. *capillacea* auct. non DC.,
Ranunculus fluitans Lam. fma. *minor* auct. non Gelert,
Ranunculus fluitans Lam. var. *fluvialis* auct. non (G. Weber ex F.H. Wigg.) Gelert, *Ranunculus curvirostris* Freyn
Hierba acuática. Anual. Nativa.
Distribución: LLA, MAG.
Rango altitudinal: 0-4000 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Ranunculus trullifolius* Hook.f.**

Sinónimos: *Ranunculus monanthos* Phil., *Ranunculus monanthos* Phil. var. *chiloensis* Phil. ex Reiche
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: COQ, ARA, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-1000 m.
Países limítrofes: Argentina.

RESEDACEAE

Reseda

***Reseda decursiva* Forssk.**

Hierba. Anual o bienal. Introducida.
Distribución: VAL.

***Reseda lutea* L.**

Arbusto. Introducido.
Distribución: NUB, BIO.

***Reseda luteola* L.**

Hierba. Anual o perenne. Introducida.
Distribución: VAL, BIO.

***Reseda odorata* L.**

Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: ATA.

***Reseda phytisma* L.**

Hierba. Anual o perenne. Introducida.
Distribución: ATA, BIO.

RHAMNACEAE

Colletia

***Colletia hystrix* Clos**

Sinónimos: *Colletia valdiviana* Phil., *Colletia spinosa* Lam. var. *armata* (Miers) Reiche, *Colletia armata* Miers, *Colletia pungens* Miers, *Colletia spinosa* Lam. var. *valdiviana* (Phil.) Reiche, *Colletia spinosissima* J.F. Gmel. var. *valdiviana* (Phil.) Escal., *Colletia aciculata* Miers, *Colletia armata* Miers var. *insularis* Miers, *Colletia brevispina* Phil., *Colletia cataphracta* Miers, *Colletia ferox* Gillies & Hook. var. *veprecula* (Miers) Suess., *Colletia hystrix* Clos var. *brevispina* (Phil.) Reiche, *Colletia spinosa* Lam., *Colletia tomentosa* Phil., *Colletia spinosa* Lam. var. *cataphracta* (Miers) Reiche, *Colletia ferox* Gillies & Hook. var. *dumosa* (Miers) Suess., *Colletia spinosa* Lam. var. *pungens* (Miers) Reiche, *Colletia veprecula* Miers, *Colletia spinosa* Lam. var. *veprecula* (Miers) Reiche
Arbusto. Nativo.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.
Rango altitudinal: 0-2000 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Crucero, yaquil.

***Colletia spartioides* Bertero ex Colla**

Arbusto. Endémico.
Distribución: JFE.
Rango altitudinal: 0-600 m.
Nombre vulgar: Yaquil.

***Colletia ulicina* Gillies & Hook.**

Sinónimos: *Colletia valenzuela* Bertero ex Steud., nom. nud.
Arbusto. Endémico.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, BIO.
Rango altitudinal: 0-1400 m.

Nombre vulgar: Crucero, junco minero, yaquil.

Discaria

***Discaria articulata* (Phil.) Miers**

Sinónimos: *Colletia articulata* Phil., *Retamilia articulata* (Phil.) Miers

Arbusto. Nativo.

Distribución: RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 0-2000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Crucero, yaquil.

***Discaria chacaye* (G. Don) Tortosa**

Sinónimos: *Colletia chacaye* G. Don, *Colletia discolor* Hook., *Colletia crenata* Clos, *Colletia serratifolia* Vent. var. *foliosa* Hook. & Arn., *Notophaena magellanica* Miers, *Notophaena cognata* Miers, *Discaria cognata* (Miers) Reiche, *Colletia montana* Phil., *Colletia dumosa* Phil., *Discaria magellanica* (Miers) Reiche, *Colletia nivalis* Phil., *Discaria foliosa* (Hook. & Arn.) Reiche, *Discaria crenata* (Clos) Regel, *Colletia serratifolia* auct. non Vent., *Discaria dumosa* (Phil.) Reiche, *Discaria montana* (Phil.) Reiche, *Notophaena discolor* (Hook.) Miers, *Notophaena foliosa* (Hook. & Arn.) Miers, *Discaria discolor* (Hook.) Reiche, comb. illeg.

Arbusto o árbol pequeño. Nativo.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-2300 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Chacaye.

Ochetophila

***Ochetophila nana* (Clos) J. Kellerm., Medán &**

Aagesen

Sinónimos: *Colletia nana* Clos, *Ochetophila parvifolia* Miers, *Ochetophila prostrata* Miers, nom. illeg., *Colletia stipellacea* Phil., *Discaria prostrata* (Miers) Reiche, nom. illeg., *Discaria nana* (Clos) Benth. & Hook. ex Weberb., *Discaria nana* (Clos) Benth. & Hook. ex Weberb. var. *inermis* Kuntze, *Discaria prostrata* (Miers) Reiche var. *inermis* Chodat & Wilczek, nom. nud.

Arbusto. Nativo.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 1000-3800 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Ochetophila trinervis* (Gillies ex Hook.) Poepp. ex Miers**

Sinónimos: *Sageretia trinervis* Gillies ex Hook. & Arn., *Ochetophila hookeriana* Reissek ex Clos, nom. illeg., *Colletia doniana* Clos, *Discaria doniana* (Clos) Weberb., *Rhamnus linearis* Clos, *Discaria trinervis* (Gillies ex Hook. & Arn.) Reiche

Arbusto o árbol pequeño. Nativo.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, AIS.

Rango altitudinal: 0-3500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Chacay.

Retanilla

***Retanilla ephedra* (Vent.) Brongn.**

Sinónimos: *Retanilla ephedra* (Vent.) Brongn. var. *crassa* (Phil.) Reiche, *Colletia ephedra* Vent., *Colletia obcordata* Vent., *Retanilla obcordata* (Vent.) Brongn., *Retanilla crassa* Phil., *Retanilla moelleri* Phil.

Arbusto. Endémico.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 0-1500 m.

Nombre vulgar: Retamilla, coquilla, camán, yaquil.

***Retanilla stricta* Hook. & Arn.**

Sinónimos: *Trevoa frutilla* Steud., nom. nud., *Retanilla affinis* Clos

Arbusto. Endémico.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 200-1500 m.

Nombre vulgar: Frutilla del campo.

***Retanilla trinervia* (Gillies & Hook.) Hook. & Arn.**

Sinónimos: *Trevoa trinervia* Gillies & Hook., *Colletia trebu* Bertero ex Colla, *Trevoa trinervis* Miers, nom. nud.

Arbusto. Endémico.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 0-1700 m.

Nombre vulgar: Trevu, trevo.

Rhamnus

Rhamnus diffusus Clos

Sinónimos: *Colletia maytenoides* Griseb., *Sciadophila maytenoides* Phil.

Arbusto. Endémico.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.

Rango altitudinal: 0-1200 m.

Nombre vulgar: Murta negra, palo negro, mofuenmamel.

Trevoa

Trevoa quinquenervia Gillies & Hook.

Sinónimos: *Talguenea quinquenervia* (Gillies & Hook.) I.M. Johnst., *Talguenea costata* Miers, *Colletia tralhuén* Bertero ex Colla, *Talguenea costata* Hook. & Arn., nom. illeg., *Talguenea mollis* Miers, nom. illeg.

Arbusto. Endémico.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB.

Rango altitudinal: 0-2200 m.

Nombre vulgar: Tralhuén, talguén, tulahuén.

ROSACEAE

Acaena

Acaena alpina Poepp. ex Walp.

Sinónimos: *Acaena digitata* Phil., *Acaena digitata* Phil. var. *latifoliolata* Bitter, *Acaena digitata* Phil. var. *subpinnata* Bitter

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.

Rango altitudinal: 2200-2500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Acaena antarctica Hook.f.

Sinónimos: *Acaena microcephala* Schltdl., *Acaena pearcei* Phil., *Acaena pumila* Phil., hom. illeg., *Acaena tenuifolia* Bitter, *Acaena pearcei* Phil. var. *glabrinervis* Bitter

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: BIO, ARA, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 1000-1600 m.

Países limítrofes: Argentina.

Acaena argentea Ruiz & Pav.

Sinónimos: *Acaena argentea* Ruiz & Pav. var. *breviscapa* Bitter, *Acaena argentea* Ruiz & Pav. fma. *nigricans* Bitter, *Acaena argentea* Ruiz & Pav. fma. *viridis* Bitter, *Acaena argentea* Ruiz & Pav. var. *coriacea* Bitter, *Acaena argentea* Ruiz & Pav. var. *grandiceps* Bitter, *Acaena argentea* Ruiz & Pav. var. *interrupte-pinnata* Bitter, *Acaena argentea* Ruiz & Pav. var. *lanigera* Bitter, *Acaena argentea* Ruiz & Pav. var. *subcalvescens* Bitter, *Acaena argentea* Ruiz & Pav. fma. *epargyreia* Bitter

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, JFE.

Rango altitudinal: 700-1000 m.

Países limítrofes: Argentina y Perú.

Nombre vulgar: Cadillo, trun, amor seco, zarzaparrilla, proquín.

Nota: Introducida en el Archipiélago de Juan Fernández.

Acaena caespitosa Gillies ex Hook. & Arn.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 0-3000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Acaena integrifolia Gillies ex Hook. & Arn.

Sinónimos: *Acaena integrifolia* Gillies ex Hook. & Arn. var. *oligantha* Bitter, *Acaena integrifolia* Gillies ex Hook. & Arn. var. *subpilosicupula* Bitter

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-2000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Acaena leptacantha Phil.

Sinónimos: *Acaena capitata* Phil., *Acaena leptacantha* Phil. var. *conferta* Bitter, *Acaena leptacantha* Phil. subsp. *connectens* Bitter, *Acaena leptacantha* Phil. var. *longissima* Bitter, *Acaena leptacantha* Phil. var. *negeri* (E. Duse) Bitter, *Acaena macrocephala* Poepp. var. *negeri* E. Duse

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.

Rango altitudinal: 1000-1700 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Pimpinela.

***Acaena lucida* (Aiton) Vahl**

Sinónimos: *Ancistrum lucidum* Aiton, *Acaena parvifolia* Phil., *Acaena lucida* (Lam.) Vahl, nom. illeg., *Acaena lucida* (Lam.) Vahl var. *parvifolia* (Phil.) Reiche, *Ancistrum lucidum* Lam., nom. illeg.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 700-1100 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Acaena macrocephala* Poepp.**

Sinónimos: *Acaena macrocephala* Poepp. var. *caput-medusae* Bitter, nom. illeg.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.

Rango altitudinal: 900-2000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Acaena magellanica* (Lam.) Vahl**

Sinónimos: *Acaena canescens* Phil., *Acaena glandulifera* Bitter, *Acaena glauccella* Bitter, *Acaena krausei* Phil., *Acaena laevigata* Aiton, *Acaena macropoda* Bitter, *Ancistrum magellanicum* Lam., *Acaena adscendens* (Lam.) Vahl, *Acaena acutifida* Bitter, *Acaena brachyglochin* Bitter, *Acaena colchaguensis* Bitter, *Acaena hirsuta* Phil., *Acaena cadilla* Hook.f., *Acaena closiana* Gay, *Acaena coxi* Phil., *Acaena petiolulata* Phil., *Acaena macrostemon* Hook.f., *Acaena depauperata* Bitter, *Acaena exaltata* Bitter, *Acaena grandistipula* Bitter, *Acaena grossifolia* Bitter, *Acaena hirta* Citerne, *Acaena humilis* Bitter, *Acaena ischnostemom* Bitter, *Acaena krausei* Phil. var. *hirsuta* (Phil.) Reiche, *Acaena krausei* Phil. var. *massonandra* Bitter, *Acaena krausei* Phil. var. *meionandra* Bitter, *Acaena laevigata* Aiton var. *venulosa* (Griseb.) Reiche, *Acaena longiaristata* H. Ross, *Acaena longistipula* Bitter, *Acaena macrophyes* Bitter, *Acaena macrostemon* Hook.f. subsp. *closiana* (Gay) Bitter, *Acaena macrostemon* Hook.f. var. *basipilosa* Bitter, *Acaena macrostemon* Hook.f. subsp. *longiaristata* (H. Ross) Bitter, *Acaena magellanica* (Lam.) Vahl subsp. *pygmaea* Bitter, *Acaena magellanica* (Lam.) Vahl var. *glabrescens* Bitter, *Acaena magellanica* (Lam.) Vahl subsp. *venulosa* (Griseb.) Bitter, *Acaena neglecta* Bitter, *Acaena obtusiloba* Bitter, *Acaena oligoglochin* Bitter, *Acaena plioglochin* Bitter, *Acaena rubescens* Bitter, *Acaena subflaccida* Bitter, *Acaena venulosa* Griseb.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 100-3500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Amor seco, cadilla, trun, sítor.

***Acaena masafuerana* Bitter**

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: JFE.

Rango altitudinal: 1000-1100 m.

***Acaena ovalifolia* Ruiz & Pav.**

Sinónimos: *Acaena elegans* Gay, *Acaena micranthera* Bitter, *Acaena ovalifolia* Ruiz & Pav. subsp. *elegans* (Gay) Bitter, *Acaena ovalifolia* Ruiz & Pav. var. *elegans* (Gay) Reiche, *Acaena tenuipila* Bitter

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.

Rango altitudinal: 500-2500 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Cadillo.

Nota: Introducida en el Archipiélago de Juan Fernández.

***Acaena patagonica* A.E. Martic.**

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: RME, MAG.

Rango altitudinal: 0-1100 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Acaena pinnatifida* Ruiz & Pav.**

Sinónimos: *Acaena multifida* Hook.f., *Acaena multifida* Hook.f. var. *utriquepilosa* Bitter, *Acaena pinnatifida* Ruiz & Pav. subsp. *pliacaantha* Bitter, *Acaena pinnatifida* Ruiz & Pav. var. *depauperata* Bitter, *Acaena calcitrapa* Phil., *Acaena euacantha* Phil., *Acaena leptophylla* Phil., *Acaena longifolia* Phil., *Acaena multifida* Hook.f. subsp. *intercedens* Bitter, *Acaena multifida* Hook.f. subsp. *quinquefida* Bitter, *Acaena oligacantha* Phil., *Acaena pinnatifida* Ruiz & Pav. var. *macrura* Bitter, *Acaena pinnatifida* Ruiz & Pav. subsp. *heterotricha* Bitter, *Acaena pinnatifida* Ruiz & Pav. var. *parvifrons* Bitter, *Acaena pinnatifida* Ruiz & Pav. subsp. *hypoleuca* Bitter, *Acaena pinnatifida* Ruiz & Pav. subsp. *liocarpa* Bitter, *Acaena pinnatifida* Ruiz & Pav. subsp. *longifolia* (Phil.) Bitter, *Acaena pinnatifida* Ruiz & Pav. subsp. *nudiscapa* Bitter, *Acaena pinnatifida* Ruiz & Pav. subsp. *oligacantha* (Phil.) Bitter, *Acaena pinnatifida* Ruiz &

Pav. var. *intermedia* Bitter, *Acaena pinnatifida* Ruiz & Pav. var. *uspallatensis* Bitter, *Acaena pinnatifida* Ruiz & Pav. var. *calcitrata* (Phil.) Reiche, *Acaena pinnatifida* Ruiz & Pav. var. *eucantha* (Phil.) Reiche, *Acaena pinnatifida* Ruiz & Pav. var. *leptophylla* (Phil.) Reiche, *Acaena pinnatifida* Ruiz & Pav. var. *longifolia* (Phil.) Reiche, *Acaena pinnatifida* Ruiz & Pav. var. *oligacantha* (Phil.) Reiche

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 1300-4000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Cadillo, amor seco, pimpinela, pimpinela cimarrona, cepacaballo.

***Acaena platyacantha* Speg.**

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: NUB, ARA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 900-2000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Acaena poeppigiana* Gay**

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 2400-3500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Acaena pumila* Vahl**

Sinónimos: *Acaena pumila* Vahl var. *acrocoma* Bitter, *Acaena glaberrima* Phil., *Acaena pumila* Vahl var. *glaberrima* (Phil.) Bitter

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 900-1100 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Acaena sericea* J. Jacq.**

Sinónimos: *Acaena fuegina* Phil., *Acaena cuneata* Hook. & Arn.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAG.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Acaena splendens* Hook. & Arn.**

Sinónimos: *Acaena splendens* Hook. & Arn. var. *gracilis* Bitter, *Acaena splendens* Hook. & Arn. var.

brachiphylla Bitter, *Acaena splendens* Hook. & Arn.

var. *brevisericea* Bitter, *Acaena splendens* Hook. & Arn.

var. *macrophylla* Bitter

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO.

Rango altitudinal: 0-3000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Abrojo, cadillo, choncli, amores secos, cepacaballo.

***Acaena tenera* Albov**

Sinónimos: *Acaena antarctica* Hook.f. var. *laxiuscula* Bitter

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 100-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Acaena trifida* Ruiz & Pav. var. *glabrescens* Regel & Körn.**

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ANT, ATA, RME.

Rango altitudinal: 0-1800 m.

Acaena trifida* Ruiz & Pav. var. *trifida

Sinónimos: *Acaena trifida* Ruiz & Pav. var. *quinquefida* (Phil.) Reiche, *Acaena quinquefida* Phil., *Acaena trifida* Ruiz & Pav. var. *mollissima* Bitter, *Acaena trifida* Ruiz & Pav. var. *nanodes* Bitter, *Acaena trifida* Ruiz & Pav. var. *robusta* Bitter, *Acaena trifida* Ruiz & Pav. var. *argentella* Bitter, *Acaena trifida* Ruiz & Pav. var. *plurifoliolata* Bitter, *Acaena trifida* Ruiz & Pav. var. *brachiphylla* Bitter

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 0-1300 m.

Nombre vulgar: Pimpinela, amores secos.

Aphanes

***Aphanes arvensis* L.**

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: ANT, COQ, RME, LBO, ARA, LLA.

Aphanes berteroana* Rothm. fma. *berteroana

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: LBO.

Rango altitudinal: 200-900 m.

***Aphanes berteroana* Rothm. fma. *vegeta* Rothm.**

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: LBO.

Rango altitudinal: 200-900 m.

***Aphanes looseri* (Rothm.) Rothm.**

Sinónimos: *Alchemilla looseri* Rothm.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: RME.

Rango altitudinal: 500-700 m.

***Aphanes neglecta* (Rothm.) Rothm.**

Sinónimos: *Alchemilla neglecta* Rothm.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: RME, ARA, LRI, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Cotoneaster

***Cotoneaster franchetii* Bois.**

Arbusto. Introducido.

Distribución: VAL, RME, BIO.

Nombre vulgar: Cotoneaster.

Crataegus

***Crataegus monogyna* Jacq.**

Arbusto. Introducido.

Distribución: RME, LBO, MAU, NUB, BIO.

Nombre vulgar: Peumo alemán.

Duchesnea

***Duchesnea indica* (Andrews) Focke**

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, ARA, LRI, LLA.

Fragaria

***Fragaria chiloensis* (L.) Mill.**

Sinónimos: *Fragaria chilensis* Ehrh., *Fragaria vesca* L.

var. *chiloensis* L., *Fragaria chilensis* Ehrh. var. *tincta*

Ser., *Fragaria chiloensis* (L.) Mill., *Fragaria chiloensis*

(L.) Duchesne, nom. illeg., *Potentilla chiloensis* (L.)

Mabb.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.

Rango altitudinal: 0-1800 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Frutilla, lahueñe.

Nota: Introducida en el Archipiélago de Juan Fernández.

Geum

***Geum andicola* (Phil.) Reiche**

Sinónimos: *Sierversia andicola* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: LLA.

Rango altitudinal: 0-2000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Geum involucratum* Pers.**

Sinónimos: *Oncostylus involucratus* (Pers.) F. Bolle,

Geum parviflorum Comm. ex Sm.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-1200 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Geum lechlerianum* Schltdl.**

Sinónimos: *Oncostylus lechlerianus* (Schltdl.) F. Bolle

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ARA, LLA.

Rango altitudinal: 0-500 m.

***Geum magellanicum* Comm. ex Pers.**

Sinónimos: *Geum chiloense* auct. non Balb. ex Ser.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: LBO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-1700 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Geum quellyon* Sweet**

Sinónimos: *Geum coccineum* Lindl., hom. illeg., *Geum grandiflorum* Steud., *Geum chiloense* Balb. ex Ser., *Geum coccineum* Sibth. & Sm.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-2600 m.

Nombre vulgar: Yerba del clavo, llallante, quillón.

Kageneckia

Kageneckia angustifolia D. Don

Árbol. Endémico.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 0-3200 m.

Nombre vulgar: Olivillo, pulpica, frangel.

Kageneckia oblonga Ruiz & Pav.

Sinónimos: *Kageneckia crataegoides* D. Don, *Kageneckia crataegifolia* Lindl., *Kageneckia ovata* Colla, *Lydaea lyday* Molina

Árbol. Endémico.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 300-600 m.

Nombre vulgar: Huayu, huayu colorado, bollén.

Lachemilla

Lachemilla diplophylla (Diels) Rothm.

Sinónimos: *Alchemilla diplophylla* Diels

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT.

Rango altitudinal: 3900-4500 m.

Países limítrofes: Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Pasto, champa del bofedal.

Lachemilla pinnata (Ruiz & Pav.) Rothm.

Sinónimos: *Alchemilla calchaquina* Lillo, *Alchemilla pinnata* Ruiz & Pav., *Alchemilla alata* Ruiz & Pav. ex Steud., *Aphanes alata* Steud., *Aphanes pinnata* Pers., *Zygalchemilla pinnata* (Ruiz & Pav.) Rydb.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT.

Rango altitudinal: 3600-4500 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Lachemilla sandiensis (Pilg.) Rothm.

Sinónimos: *Alchemilla sandiensis* Pilg.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: AYP.

Rango altitudinal: 4500-4700 m.

Margyracaena

Margyracaena x skottsbergii Bitter

Subarbusto. Endémico.

Distribución: JFE.

Rango altitudinal: 200-400 m.

Nota: Extinta en estado silvestre. Origen híbrido entre *Acaena argentea* y *Margyricarpus dyginus*.

Margyricarpus

Margyricarpus digynus (Bitter) Skottsb.

Sinónimos: *Margyricarpus setosus* Ruiz & Pav. var. *digynus* Bitter

Subarbusto. Endémico.

Distribución: JFE.

Rango altitudinal: 100-500 m.

Nombre vulgar: Hierba de la perlilla, perla, romerillo, sabinilla.

Margyricarpus pinnatus (Lam.) Kuntze

Sinónimos: *Empetrum pinnatum* Lam., *Margyricarpus setosus* Ruiz & Pav., *Margyricarpus imberbis* C. Presl

Arbusto o subarbusto. Nativo.

Distribución: ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 0-3000 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Perlilla, perla, sabinilla, romerillo.

Polylepis

Polylepis rugulosa Bitter

Sinónimos: *Polylepis tenuiruga* Bitter

Árbol. Nativo.

Distribución: AYP.

Rango altitudinal: 3000-4000 m.

Países limítrofes: Perú.

Nombre vulgar: Keñoa, keñua.

***Polylepis tarapacana* Phil.**

Sinónimos: *Polylepis tarapacana* Phil. var.

multisquamata Bitter, *Polylepis tarapacana* Phil. var.

brevifilamentosa Bitter, *Polylepis tarapacana* Phil. var.

pycnolopha Bitter, *Polylepis tarapacana* Phil. var.

sajamensis Bitter

Árbol. Nativo.

Distribución: AYP, TAR, ANT.

Rango altitudinal: 3900-4700 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Queñoa, queñua.

Potentilla

***Potentilla anserina* L.**

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: VAL, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

***Potentilla reptans* L.**

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: RME.

Prunus

***Prunus cerasus* L.**

Árbol. Introducido.

Distribución: JFE.

Nombre vulgar: Cerezo.

Rosa

***Rosa canina* L.**

Arbusto. Introducido.

Distribución: RME, MAU, BIO, LLA.

***Rosa rubiginosa* L.**

Arbusto. Introducido.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG.

Rubus

***Rubus constrictus* P.J. Müll. & LeFèvre**

Arbusto. Introducido.

Distribución: COQ, BIO, ARA, LRI, LLA.

Nombre vulgar: Mora, murra.

***Rubus geoides* Sm.**

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.

Rango altitudinal: 0-1800 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Miñe miñe, frutilla.

***Rubus praecox* Bertol.**

Arbusto. Introducido.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, JFE.

Nombre vulgar: Mora.

***Rubus radicans* Cav.**

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ARA, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 900-1500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Frutilla, miñemiñe.

***Rubus ulmifolius* Schott**

Arbusto. Introducido.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, JFE.

Nombre vulgar: Mora.

Sanguisorba

***Sanguisorba minor* Scop.**

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Tetraglochin

***Tetraglochin acanthocarpum* (Speg.) Speg.**

Sinónimos: *Margyricarpus acanthocarpus* Speg.,

Tetraglochin acanthocarpus (Speg.) Speg. fma.

macropoda Speg., *Tetraglochin acanthocarpus* (Speg.)

Speg. var. *typica* Speg., nom. illeg.

Subarbusto. Nativo.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Tetraglochin alatum (Gillies ex Hook. & Arn.) Kuntze
Sinónimos: *Margyricarpus alatus* Gillies ex Hook. & Arn., *Tetraglochin strictum* Poepp., *Tetraglochin microphyllum* Phil., *Margyricarpus strictus* (Poepp.) J. F. Macbride
Arbusto. Nativo.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO.
Rango altitudinal: 0-4000 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Pimpinela, horizonte, caulia, caulla.

Tetraglochin cristatum (Britton) Rothm.
Sinónimos: *Tetraglochin acanthocarpus* (Speg.) Speg. fma. *leiocarpum* Speg., *Margyricarpus cristatus* Britton
Arbusto o subarbusto. Nativo.
Distribución: AYP, TAR.
Rango altitudinal: 3000-4500 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.
Nombre vulgar: Caulla, cailla, queña, sangia, canela, añawayá.

RUBIACEAE

Coprosma

Coprosma oliveri Fosberg
Arbusto o árbol pequeño. Endémico.
Distribución: JFE.
Rango altitudinal: 0-500 m.
Nombre vulgar: Olivo, olivillo.

Coprosma pyrifolia (Hook. & Arn.) Skottsb.
Sinónimos: *Psychotria pyrifolia* Hook. & Arn.
Árbol. Endémico.
Distribución: JFE.
Rango altitudinal: 0-500 m.
Nombre vulgar: Peralillo.

Cruckshanksia

Cruckshanksia hymenodon Hook. & Arn.

Sinónimos: *Cruckshanksia bustillosii* Phil., *Cruckshanksia hymenodon* Hook. & Arn. var. *bustillosii* (Phil.) Ricardi & Quezada, *Rotheria lanceolata* Meyen
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME.
Rango altitudinal: 1000-3500 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Rosa del campo.

Cruckshanksia lithiophila Ricardi
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ATA.
Rango altitudinal: 3000-3600 m.

Cruckshanksia macrantha Phil.
Sinónimos: *Oreopolus macranthus* (Phil.) Ricardi
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ATA, COQ, VAL.
Rango altitudinal: 1000-4500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Cruckshanksia montiana Clos
Sinónimos: *Cruckshanksia capitata* Phil., *Cruckshanksia densifolia* Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ATA, COQ.
Rango altitudinal: 0-500 m.

Cruckshanksia palmae Clos
Sinónimos: *Oreopolus palmae* (Clos) Ricardi
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ, VAL, RME.
Rango altitudinal: 2000-4000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Cruckshanksia pumila Clos
Sinónimos: *Cruckshanksia tripartita* Phil., *Cruckshanksia chrysantha* Phil., *Cruckshanksia geisseana* Phil., *Cruckshanksia darapskyana* Phil.
Hierba. Anual o bienal. Endémica.
Distribución: ANT, ATA, COQ.
Rango altitudinal: 800-2300 m.
Nombre vulgar: Rosa, rosita.

Cruckshanksia verticillata Phil.

Sinónimos: *Crukshanksia paradoxa* Phil.,
Crukshanksia capitata Phil. var. *paradoxa* (Phil.) Reiche
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ANT, ATA, COQ.
Rango altitudinal: 100-1000 m.

Galium

Galium antarcticum Hook.f.
Sinónimos: *Galium debile* Banks & Sol., *Galium trifidum* auct. non L.
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Galium aparine L.
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.

Galium araucanum Phil.
Sinónimos: *Galium suffruticosum* Hook. & Arn. var. *araucanum* (Phil.) Reiche
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-1900 m.

Galium corymbosum Ruiz & Pav.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT, COQ.
Rango altitudinal: 2000-5000 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Galium cotinoides Cham. & Schltdl.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: LBO, MAU, NUB.
Rango altitudinal: 0-500 m.

Galium diffusoramosum Dempster & Ehrend.
Sinónimos: *Galium diffusum* Clos
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: ANT, ATA, COQ, MAU.
Rango altitudinal: 100-700 m.

Galium divaricatum Pourr. ex Lam.
Hierba. Anual. Introducida.
Nota: Dempster (1982) señala que Gay lo habría encontrado en algún lugar de Chile.

Galium eriocarpum Bartl. ex DC.
Sinónimos: *Galium brevifolium* Phil., *Galium eriocarpum* Bartl. ex DC. var. *normale* Kuntze, *Galium eriocarpum* Bartl. ex DC. var. *leiocarpum* Kuntze, *Galium philippii* Briq.
Subarbusto. Nativo.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB.
Rango altitudinal: 1000-3000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Galium fuegianum Hook.f.
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-2000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Galium gilliesii Hook. & Arn. subsp. *gilliesii*
Sinónimos: *Galium lanatum* Kuntze
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO.
Rango altitudinal: 2000-4000 m.
Países limítrofes: Argentina y Perú.

Galium gilliesii Hook. & Arn. subsp. *telanthos*
(Phil.) Dempster
Sinónimos: *Galium telanthos* Phil., *Galium trichocarpum* DC. var. *telanthos* (Phil.) Reiche, *Galium volckmanni* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ, RME, LBO, MAU.
Rango altitudinal: 1500-3500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Galium hypocarpium (L.) Endl. ex Griseb.
Sinónimos: *Relbunium hypocarpium* (L.) Hemsl., *Valantia hypocarpia* L., *Rubia relbun* Cham. & Schltdl., *Galium relbun* (Cham. & Schltdl.) Clos
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 0-4000 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.
Nombre vulgar: Relbún, kantoría.

***Galium inconspicuum* Phil.**

Sinónimos: *Galium hypnoides* Clos var. *inconspicuum* (Phil.) Reiche
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 1000-2000 m.
Países limítrofes: Argentina.

***Galium leptum* Phil.**

Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ, RME.
Rango altitudinal: 1800 m.

***Galium magellanicum* Hook.f.**

Sinónimos: *Galium chonoense* Hook.f. var. *chonoense*,
Galium nigricans Clos, *Galium forsteri* Phil., *Galium valdivianum* Phil., *Galium chonoense* Hook.f. var. *valdivianum* Reiche
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: VAL, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-1500 m.
Países limítrofes: Argentina.

***Galium masafueranum* Skottsb.**

Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: JFE.
Rango altitudinal: 1100-1400 m.

***Galium murale* (L.) All.**

Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, BIO.

***Galium ovalleanum* Phil.**

Subarbusto. Endémico.
Distribución: COQ.
Rango altitudinal: 1100-2600 m.

***Galium parisiense* L.**

Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: RME.

***Galium philippianum* Dempster**

Sinónimos: *Galium dasycarpon* Kunze ex Walp.
Subarbusto. Endémico.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO.
Rango altitudinal: 1200-2200 m.

***Galium suffruticosum* Hook. & Arn.**

Sinónimos: *Galium andinum* Phil., *Galium pteroanum* Phil., *Rubia margaritifera* Reiche
Subarbusto. Nativo.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU.
Rango altitudinal: 0-2700 m.
Países limítrofes: Argentina.

***Galium trichocarpum* DC.**

Sinónimos: *Galium eriocarpum* Bartl. ex DC. var. *trichocarpum* (DC.) Wedd. ex Hauman, *Galium chamissonis* Hook. & Arn., *Galium lasiocarpum* Phil., *Galium scandens* Phil., *Galium laxum* Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, BIO.
Rango altitudinal: 400-2200 m.

***Galium tricornutum* Dandy**

Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: NUB, BIO.

***Galium werdermannii* Standl.**

Sinónimos: *Galium hypnoides* Clos var. *hypnoides*, *Galium closianum* Briq.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: BIO, ARA.
Rango altitudinal: 1100 m.

Leptostigma

***Leptostigma arnottianum* Walp.**

Sinónimos: *Nertera arnottiana* (Walp.) B.L. Rob., *Hedyotis repens* Clos, *Coprosma calycina* Gray, *Oldenlandia uniflora* Ruiz & Pav. var. *repens* (Clos) Reiche, nom. illeg.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.
Rango altitudinal: 0-500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Nertera

***Nertera granadensis* (Mutis ex L.f.) Druce**

Sinónimos: *Gomozia granadensis* Mutis ex L.f., *Nertera depressa* Banks & Sol. ex Gaertn., *Cunina sanfuentesii* Clos

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.

Rango altitudinal: 500-3500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Coralito, chaquirita del monte, rucachucão, coralillo.

Oldenlandia

***Oldenlandia brachypetala* (Phil.) E.L. Cabral &**

Bacigalupo

Sinónimos: *Hedyotis brachypetala* Phil., *Hedyotis minuta* Phil. ex Benth. & Hook., nom. nud.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: AIS.

Rango altitudinal: 125 m.

***Oldenlandia salzmannii* (DC.) Benth. & Hook.**

Sinónimos: *Anolis salzmannii* DC., *Hedyotis salzmannii* (DC.) Steud., *Oldenlandia uniflora* Ruiz & Pav., *Hedyotis uniflora* DC., *Hedyotis pilosa* Poepp., *Hedyotis chiloensis* Phil., *Hedyotis inconspicua* F. Phil.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, JFE.

Rango altitudinal: 0-1300 m.

Países limítrofes: Argentina.

Oreopolus

***Oreopolus glacialis* (Poepp.) Ricardi**

Sinónimos: *Crukshanksia glacialis* Poepp., *Oreopolus patagonicus* Speg., *Crukshanksia patagonica* (Speg.) Macloskie, *Oreopolus glacialis* (Poepp.) Ricardi var. *pilosus* Ricardi, *Oreopolus citrinus* Schldl., *Oreocaryon nivalis* Kuntze ex K. Schum.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 300-3500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Rubia

***Rubia tinctorum* L.**

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: RME.

Sherardia

***Sherardia arvensis* L.**

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE.

RUTACEAE

Fagara

***Fagara externa* Skottsb.**

Sinónimos: *Zanthoxylum externum* (Skottsb.) Stuessy Árbol. Endémico.

Distribución: JFE.

Rango altitudinal: 500-550 m.

Nombre vulgar: Naranjillo.

***Fagara mayu* (Bertero ex Colla) Engl.**

Sinónimos: *Zanthoxylum mayu* Bertero ex Colla, *Zanthoxylon mayu* Hook. & Arn., *Xanthoxylon mayu* Bertero ex Colla

Árbol. Endémico.

Distribución: JFE.

Rango altitudinal: 160-500 m.

Nombre vulgar: Mayu, naranjillo, palo amarillo.

Pitavia

***Pitavia punctata* (Ruiz & Pav.) Molina**

Sinónimos: *Galvezia punctata* Ruiz & Pav. Árbol. Endémico.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 0-800 m.

Nombre vulgar: Pitao.

Ruta

***Ruta chalepensis* L.**

Arbusto. Introducido.

Distribución: ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, JFE.

SALICACEAE

Azara

Azara alpina Poepp. & Endl.

Arbusto. Nativo.

Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 1000-2000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Azara celastrina D. Don

Sinónimos: *Azara sparsiflora* Steud., nom. nud., *Azara lilen* Bertero, nom. nud.

Arbusto o árbol pequeño. Endémico.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Nombre vulgar: Lilén.

Azara dentata Ruiz & Pav.

Sinónimos: *Azara tomentosa* Bertero ex Steud., *Azara celastrina* D. Don var. *tomentosa* (Steud.) Reiche

Arbusto. Endémico.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 500-1500 m.

Nombre vulgar: Corcolén.

Azara integrifolia Ruiz & Pav.

Sinónimos: *Azara intermedia* Gay, *Azara hirtella* Miq., *Azara berteroniana* Steud., *Azara lechleriana* Steud., *Azara pycnophylla* Phil., *Azara browneae* F. Phil., *Azara integrifolia* Ruiz & Pav. var. *pycnophylla* (Phil.) Reiche, *Azara integrifolia* Ruiz & Pav. var. *browneae* (F. Phil.) Reiche

Arbusto. Endémico.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.

Rango altitudinal: 200-2000 m.

Nombre vulgar: Corcolén, aroma, chin-chin.

Azara lanceolata Hook.f.

Sinónimos: *Azara chiloensis* Hook.f., *Azara serrata* Ruiz & Pav. var. *chiloensis* (Hook.f.) Reiche, *Azara brumalis* Gand., *Azara lanceolata* Hook.f. var. *chiloensis* (Hook.f.) Reiche

Arbusto o árbol pequeño. Nativo.

Distribución: NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Azara microphylla Hook.f.

Sinónimos: *Azara borealis* F. Phil., *Azara valdiviae* Lechl. ex Steud., *Myrtophyllum chilense* Turcz.

Arbusto o árbol pequeño. Nativo.

Distribución: COQ, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 0-1500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Chinchín.

Azara petiolaris (D. Don) I.M. Johnst.

Sinónimos: *Azara gilliesii* Hook. & Arn., *Quillaja petiolaris* D. Don, *Azara crassifolia* Hort., *Azara gilliesii* Hook. & Arn. var. *minor* Reiche

Arbusto o árbol pequeño. Endémico.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB.

Rango altitudinal: 600-1500 m.

Nombre vulgar: Maqui blanco, maquicillo, lilén, corcolén.

Azara serrata Ruiz & Pav. var. *fernandeziana*

(Gay) Reiche

Sinónimos: *Azara fernandeziana* Gay

Arbusto. Endémico.

Distribución: JFE.

Rango altitudinal: 300-400 m.

Azara serrata Ruiz & Pav. var. *serrata*

Sinónimos: *Azara umbellata* Phil., *Azara dubia* Steud., *Azara bergii* Phil., *Azara subandina* Phil., *Azara serrata* Ruiz & Pav. var. *bergii* (Phil.) Reiche

Arbusto o árbol pequeño. Endémico.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 200-2000 m.

Nombre vulgar: Corcolén, aroma de castilla.

Populus

***Populus nigra* L.**

Árbol. Introducido.

Distribución: RME, LBO, BIO.

Rango altitudinal: 0-1500 m.

Salix

***Salix alba* L.**

Árbol. Introducido.

Distribución: BIO.

***Salix babylonica* L.**

Árbol. Introducido.

Distribución: COQ, RME, NUB, BIO, ARA, JFE.

***Salix caprea* L.**

Arbusto. Introducido.

Distribución: NUB, BIO.

***Salix humboldtiana* Willd.**

Sinónimos: *Salix chilensis* Molina, *Salix magellanica* Lam.

Árbol. Nativo.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 0-3900 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Sauce amargo, sauce chileno.

Nota: Existen híbridos naturales de *Salix humboldtiana* y *S. babylonica*.

***Salix viminalis* L.**

Arbusto o árbol pequeño. Introducido.

Distribución: RME, LBO, NUB, BIO, ARA, LRI, AIS, MAG.

Lepidoceras

***Lepidoceras chilense* (Molina) Kuijt**

Sinónimos: *Lepidoceras kingii* Hook.f., *Lepidoceras dombei* Hook.f., *Lepidoceras squamifer* Clos, *Myrtobium microphyllum* Miq., *Viscum chilense* Molina. Arbusto parásito. Endémico.

Distribución: VAL, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 0-2000 m.

Nombre vulgar: Chiuchi, quintral del temu.

Myoschilos

***Myoschilos oblongum* Ruiz & Pav.**

Sinónimos: *Myoschilos angusta* Phil., *Myoschilos oblongum* Ruiz & Pav. var. *angusta* (Phil.) Macloskie. Arbusto. Nativo.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 2-2360 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Orocoi, orocoipo.

Nanodea

***Nanodea muscosa* Banks ex C.F. Gaertn.**

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Santalum

***Santalum fernandezianum* F. Phil.**

Árbol. Endémico.

Distribución: JFE.

Nombre vulgar: Sándalo de Juan Fernández.

Nota: Extinta.

SANTALACEAE

Antidaphne

***Antidaphne punctulata* (Clos) Kuijt**

Sinónimos: *Eremolepis punctulata* (Clos) Griseb., *Lepidoceras punctulatum* Clos, *Eremolepis verrucosa* Griseb.

Arbusto parásito. Endémico.

Distribución: BIO, ARA, LRI, LLA.

SAPINDACEAE

Bridgesia

***Bridgesia incisifolia* Bertero ex Cambess.**

Sinónimos: *Bridgesia incisifolia* Bertero ex Cambess.
var. *parvifolia* Barnéoud
Arbusto. Endémico.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME.
Rango altitudinal: 0-1000 m.
Nombre vulgar: Rumpiata, rumpaito, rumpe-ato.

Dodonaea

***Dodonaea viscosa* Jacq.**

Arbusto. Introducido.
Distribución: COQ, IPA.

Guindilia

***Guindilia trinervis* Gillies ex Hook. & Arn.**

Sinónimos: *Valenzuela trinervis* Bertero ex Cambess.
Arbusto. Nativo.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU.
Rango altitudinal: 200-3000 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Guindillo.

Llagunoa

***Llagunoa glandulosa* (Hook. & Arn.) G. Don**

Sinónimos: *Amirola glandulosa* Hook. & Arn., *Orbignya trifolia* Bertero
Arbusto. Endémico.
Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO.
Rango altitudinal: 0-1500 m.
Nombre vulgar: Arbol de cuentas, atutemo.

Sapindus

***Sapindus saponaria* L.**

Árbol. Introducido.
Distribución: AYP, IPA.
Nombre vulgar: Marikuru (Rapa Nui).
Nota: Los Rapanui la consideran como nativa.

SAPOTACEAE

Pouteria

***Pouteria lucuma* (Ruiz & Pav.) Kuntze**

Sinónimos: *Achras lucuma* Ruiz & Pav., *Richardella lucuma* (Ruiz & Pav.) Aubrév.
Árbol. Nativo.
Distribución: ATA.
Países limítrofes: Bolivia y Perú.
Nota: Sólo hay un ejemplar que respalda la distribución natural en Chile (ATA). Aún es dudoso su origen.

***Pouteria splendens* (A. DC.) Kuntze**

Sinónimos: *Lucuma valparadisea* Molina, *Lucuma splendens* A. DC., *Gayella valparadisaea* (Molina) Pierre, *Vitellaria valparadisaea* (Molina) Radlk. ex Dubard, *Gayella splendens* (A. DC.) Aubrév.
Arbusto o árbol pequeño. Endémico.
Distribución: COQ, VAL.
Rango altitudinal: 0-500 m.
Nombre vulgar: Palo colorado, lúcumo silvestre.

SAXIFRAGACEAE

Chrysosplenium

***Chrysosplenium macranthum* Hook.**

Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAG.
Rango altitudinal: 0-100 m.
Países limítrofes: Argentina.

***Chrysosplenium valdivicum* Hook.**

Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ARA, LRI, LLA.
Rango altitudinal: 0-1600 m.
Países limítrofes: Argentina.

Saxifraga

***Saxifraga magellanica* Poir.**

Sinónimos: *Saxifraga cordillerana* C. Presl var. *magellanica* (Poir.) Dusén, *Saxifraga cordillerana* C. Presl
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-3000 m.
Países limítrofes: Argentina y Perú.

Saxifraga umbrosa L.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: MAG.

Saxifragella

Saxifragella bicuspidata (Hook.f.) Engl.

Sinónimos: *Saxifraga bicuspidata* Hook.f.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: LLA, MAG.

Rango altitudinal: 500-1500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Saxifragodes

Saxifragodes albowiana (Kurtz ex Albov) D.M.

Moore

Sinónimos: *Saxifraga albowiana* Kurtz ex Albov,
Saxifragella albowiana (Kurtz ex Albov) Engl.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

SCHOEPIACEAE

Arjona

Arjona patagonica Hombr. & Jacq. ex Decne.

Sinónimos: *Arjona andina* Phil., *Arjona rigida* Miers,
Arjona ruscifolia Poepp., *Arjona tuberosa* Cav. var.
patagonica DC.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, LBO, NUB, ARA, MAG.

Rango altitudinal: 5-3200 m.

Países limítrofes: Argentina.

Arjona pusilla Hook.f.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AIS, MAG.

Rango altitudinal: 115-1000 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Arjona tuberosa Cav.

Sinónimos: *Arjona apressa* Phil., *Arjona pungens* Phil.,

Arjona tuberosa Cav. var. *lanata* Macloskie

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AIS, MAG.

Rango altitudinal: 20-740 m.

Países limítrofes: Argentina.

Quinchamalium

Quinchamalium chilense Molina

Sinónimos: *Quinchamalium procumbens* Ruiz & Pav.,
Quinchamalium chilense Molina var. *gracile* Hook. &
Arn., *Quinchamalium gracile* (Hook. & Arn.) Brongn.,
Quinchamalium chilense Molina var. *robustior* Hook. &
Arn., *Quinchamalium majus* Brongn., *Quinchamalium ericoides* Brongn. ex Gay, *Quinchamalium elegans* C.
Presl, *Quinchamalium brevifolium* C. Presl,
Quinchamalium andinum Phil., *Quinchamalium platense*
Phil., *Quinchamalium excrescens* Phil., *Quinchamalium purpureum* Phil., *Quinchamalium linarioides* Phil.,
Quinchamalium berteroanum Phil., *Quinchamalium bracteosum* Phil., *Quinchamalium carnosum* Phil.,
Quinchamalium parviflorum Phil., *Quinchamalium chilense* Molina var. *parviflorum* (Phil.) L.E. Navas,
Quinchamalium thesioides Phil., *Quinchamalium thesioides* Phil. var. *flaccidum* Phil., *Quinchamalium minutum* Phil., *Quinchamalium rugosum* Phil.,
Quinchamalium litorale Phil., *Quinchamalium tarapacanum* Phil., *Quinchamalium araucanum* F.
Meigen

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL,
RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 10-3800 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Quinchamalí.

SCROPHULARIACEAE

Alonsoa

Alonsoa honoraria Grau

Subarbusto. Endémico.

Distribución: COQ.

Rango altitudinal: 300-400 m.

Alonsoa meridionalis (L.f.) Kuntze

Sinónimos: *Scrophularia meridionalis* L.f., *Alonsoa urticifolia* Steud., *Alonsoa incisifolia* Ruiz & Pav.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO.

Rango altitudinal: 2-1700 m.

Países limítrofes: Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Flor del soldado, ajicillo.

Buddleja

Buddleja araucana Phil.

Sinónimos: *Buddleja globosa* Hope var. *araucana* (Phil.)

Reiche

Arbusto. Nativo.

Distribución: ATA, COQ, VAL, BIO.

Rango altitudinal: 300-1600 m.

Países limítrofes: Argentina.

Buddleja globosa Hope

Sinónimos: *Buddleja capitata* Jacq., *Buddleja connata*

Ruiz & Pav.

Arbusto. Nativo.

Distribución: AYP, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 0-2000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Matico, pañil, palquil, palguín.

Buddleja suaveolens Kunth & Bouché

Sinónimos: *Buddleja gayana* Benth.

Arbusto. Endémico.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL.

Rango altitudinal: 500-2900 m.

Nombre vulgar: Acerillo.

Myoporum

Myoporum laetum G. Forst.

Arbusto o árbol pequeño. Introducido.

Distribución: COQ, VAL, MAU.

Scrophularia

Scrophularia auriculata L.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: RME, MAU, ARA.

Verbascum

Verbascum densiflorum Bertol.

Hierba. Bienal. Introducida.

Distribución: ARA.

Verbascum thapsus L.

Hierba. Bienal. Introducida.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, JFE.

Verbascum virgatum Stokes

Hierba. Bienal. Introducida.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, JFE, IPA.

SIMAROUBACEAE

Ailanthis

Ailanthis altissima (Mill.) Swingle

Árbol. Introducido.

Distribución: RME, BIO, JFE.

SOLANACEAE

Benthamiella

Benthamiella azorella (Skottsb.) A.Soriano

Sinónimos: *Saccardophyton azorella* Skottsb.

Subarbusto. Nativo.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 500-1200 m.

Países limítrofes: Argentina.

Benthamiella lanata A. Soriano

Subarbusto. Nativo.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Benthamiella nordenskioldii Dusén ex N.E. Br.

Subarbusto. Nativo.
Distribución: MAG.
Rango altitudinal: 0-1000 m.
Países limítrofes: Argentina.

***Benthamiella patagonica* Speg.**

Sinónimos: *Benthamiella aurea* Skottsb., *Benthamiella intermedia* Skottsb., *Benthamiella abietina* Skottsb.
Subarbusto. Nativo.
Distribución: MAG.
Rango altitudinal: 500-1500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Calibrachoa

***Calibrachoa parviflora* (Juss.) D'Arcy**

Sinónimos: *Nicotiana parviflora* (Juss.) Lehm., *Petunia parviflora* Juss.
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: VAL.
Rango altitudinal: 0-300 m.
Países limítrofes: Argentina.

Cestrum

***Cestrum parqui* L'Hér.**

Sinónimos: *Cestrum campestre* Griseb., *Cestrum parqui* L'Hér. var. *glabriuscum* Kuntze, *Cestrum parqui* L'Hér. var. *longiflorum* Francey, *Cestrum parqui* L'Hér. var. *poepigii* Dunal, *Cestrum virgatum* Ruiz & Pav.
Arbusto. Nativo.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, JFE.
Rango altitudinal: 0-2500 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.
Nombre vulgar: Palqui, parqui, hediondilla.
Nota: Introducida en el Archipiélago de Juan Fernández.

Combera

***Combera minima* (Phil.) Sandwith**

Sinónimos: *Nicotiana minima* Phil., *Petunia minima* (Phil.) Reiche
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: LLA.
Rango altitudinal: 1800 m.

***Combera paradoxa* Sandwith**
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: NUB, AIS.
Rango altitudinal: 1800-3200 m.
Países limítrofes: Argentina.

Datura

***Datura ferox* L.**

Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: ATA, COQ, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, LLA.

***Datura inoxia* Mill.**

Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: ANT, ATA.

***Datura stramonium* L.**

Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, JFE.

Dunalia

***Dunalia spinosa* (Meyen) Dammer**

Sinónimos: *Dunalia lycioides* Miers, *Atropa spinosa* Meyen, *Dierbachia lycioides* (Miers) Kuntze
Arbusto. Nativo.
Distribución: AYP, TAR.
Rango altitudinal: 3500 m.
Países limítrofes: Bolivia y Perú.
Nombre vulgar: Chañar silvestre, chilka.

Exodeconus

***Exodeconus flavus* (I.M. Johnst.) Axelius & D'Arcy**

Sinónimos: *Cacabus flavus* I.M. Johnst.
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: AYP, TAR.
Rango altitudinal: 2000-2500 m.
Países limítrofes: Perú.

***Exodeconus integrifolius* (Phil.) Axelius**

Sinónimos: *Cacabus integrifolius* Phil.
Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA.

Rango altitudinal: 2300-4000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Oreja de ratón.

***Exodeconus pusillus* (Bitter) Axelius**

Sinónimos: *Cacabus pusillus* Bitter

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: AYP, TAR.

Rango altitudinal: 2500-3000 m.

Países limítrofes: Perú.

Fabiana

***Fabiana bryoides* Phil.**

Arbusto. Nativo.

Distribución: AYP, ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 2900-4900 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Nombre vulgar: Pata de perdiz, pata de pizaca.

***Fabiana densa* J. Remy**

Sinónimos: *Fabiana clarenii* Dammer

Arbusto. Nativo.

Distribución: AYP, TAR, ATA.

Rango altitudinal: 2700-4500 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Khachukipa.

***Fabiana denudata* Miers**

Sinónimos: *Fabiana hieronymi* Niederl.

Arbusto. Nativo.

Distribución: AYP, TAR, ANT.

Rango altitudinal: 300-3700 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Tolilla, alma tola.

***Fabiana imbricata* Ruiz & Pav.**

Sinónimos: *Fabiana araucana* Phil., *Fabiana biflora* J.

Remy, *Fabiana imbricata* Ruiz & Pav. var. *biflora* (J.

Remy) Reiche, *Fabiana lutescens* Phil.

Arbusto. Nativo.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.

Rango altitudinal: 2600-3200 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Pichi, peta, romero.

***Fabiana ramulosa* (Wedd.) Hunz. & Barboza**

Sinónimos: *Fabiana densa* J. Remy var. *ramulosa*

Wedd., *Fabiana deserticola* Reiche

Arbusto. Endémico.

Distribución: AYP, TAR, ANT.

Rango altitudinal: 3200-4000 m.

Nombre vulgar: Kipa, tara macho.

***Fabiana squamata* Phil.**

Arbusto. Nativo.

Distribución: TAR, ANT.

Rango altitudinal: 3000-4400 m.

Países limítrofes: Bolivia.

Nombre vulgar: Koba.

***Fabiana stephani* Hunz. & Barboza**

Arbusto. Nativo.

Distribución: AYP, TAR.

Rango altitudinal: 3000-3900 m.

Países limítrofes: Perú.

***Fabiana viscosa* Hook. & Arn.**

Sinónimos: *Fabiana coridifolia* Dunal, *Fabiana ericoides* Dunal, *Fabiana barriosi* Phil.

Arbusto. Endémico.

Distribución: ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 100-2200 m.

Nombre vulgar: Pichinilla, copatola, husillo, pichanilla.

Jaborosa

***Jaborosa caulescens* Gillies & Hook. var.**

***bipinnatifida* (Dunal) Reiche**

Sinónimos: *Lonchestigma caulescens* (Gillies & Hook.)

Dunal var. *bipinnatifidum* Dunal, *Jaborosa bipinnatifida* (Dunal) Meigen, *Lonchestigma bipinnatifidum* (Dunal)

Phil., *Trechonaetes bipinnatifida* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ANT, ATA, COQ, RME.

Rango altitudinal: 3000-4500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Jaborosa caulescens* Gillies & Hook. var.**

caulescens

Sinónimos: *Dorystigma caulescens* (Gillies & Hook.) Miers, *Lonchestigma caulescens* (Gillies & Hook.) Dunal
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ATA, COQ, VAL, RME, MAU.
Rango altitudinal: 2000-4000 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Tequerere.

Jaborosa laciniata (Miers) Hunz. & Barboza
Sinónimos: *Trechonaetes laciniata* Miers, *Trechonaetes bridgesii* Dunal
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, MAU.
Rango altitudinal: 2500-4000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Jaborosa magellanica (Griseb.) Dusén
Sinónimos: *Himeranthus magellanicus* Griseb., *Jaborosa magellanica* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Jaborosa parviflora (Phil.) Hunz. & Barboza
Sinónimos: *Trechonaetes parviflora* Phil., *Lonchestigma parviflorum* (Phil.) Cabrera, *Jaborosa crispa* auct. non Benth. & Hook., *Trechonaetes machucana* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA.
Rango altitudinal: 3700-4500 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.
Nombre vulgar: Psike.

Jaborosa pinnata Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: RME, LBO, MAU.

Jaborosa reflexa Phil.
Sinónimos: *Jaborosa araucana* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 200-2000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Jaborosa riojana Hunz. & Barboza
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ANT.
Rango altitudinal: 3000-4300 m.
Países limítrofes: Argentina.

Jaborosa squarrosa (Miers) Hunz. & Barboza
Sinónimos: *Dorystigma squarrosum* Miers, *Lonchestigma squarrosum* (Miers) Dunal
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ATA.
Rango altitudinal: 3000-4700 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Jaborosa volkmannii (Phil.) Reiche
Sinónimos: *Dolichosiphon volkmanni* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: BIO, ARA.
Rango altitudinal: 1500-2000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Latua

Latua pubiflora (Griseb.) Baill.
Sinónimos: *Lycioplesium pubiflorum* Griseb., *Latua venenosa* Phil.
Arbusto o árbol pequeño. Endémico.
Distribución: LRI, LLA.
Rango altitudinal: 300-900 m.
Nombre vulgar: Latúe, palo de los brujos, latué, palo mato.

Lycium

Lycium boerhaviaefolium L.f.
Sinónimos: *Grabowskia boerhaviifolia* (L.f.) Schldl., *Grabowskia glauca* (Phil.) I.M. Johnst., *Lycium glaucum* Phil.
Arbusto. Nativo.
Distribución: TAR, ANT.
Rango altitudinal: 300-2500 m.
Países limítrofes: Argentina y Perú.

Lycium bridgesii (Miers) R.A. Levin, Jill S. Mill. & G. Bernardello
Sinónimos: *Phrodus bridgesii* Miers, *Phrodus microphyllus* (Miers) Miers, *Phrodus pendulus* (Phil.)

Phil., *Alona microphylla* Miers, *Phrodus nodosus* Miers, *Phrodus breviflorus* Phil., *Phrodus thymifolius* (Phil.) Phil.

Arbusto. Endémico.

Distribución: ATA, COQ.

Rango altitudinal: 500-2900 m.

Lycium carolinianum Walter var. *sandwicense* (A. Gray) C.L. Hitchc.

Arbusto. Nativo.

Distribución: IPA.

Nombre vulgar: Pua nako nako (Rapa Nui).

Lycium chilense Miers ex Bertero var. *chilense*

Sinónimos: *Lycium chilense* Miers ex Bertero var. *petiolatum* Phil., *Lycium scoparium* Miers, *Lycium chilense* Miers ex Bertero subsp. *normale* Reiche, *Lycium chilense* Miers ex Bertero var. *tomentosulum* Phil., *Lycium salsum* Ruiz & Pav. var. *chilense* (Bertero) Kuntze, *Lycium chilense* Miers ex Bertero var. *ovatum* Phil.

Arbusto. Nativo.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 0-4500 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Nombre vulgar: Coralillo.

Lycium chilense Miers ex Bertero var. *confertifolium* (Miers) F.A. Barkley

Sinónimos: *Lycium scoparium* Miers var. *confertifolium* Miers

Arbusto. Nativo.

Distribución: COQ, VAL, RME.

Rango altitudinal: 0-1500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Lycium chilense Miers ex Bertero var. *filifolium* (Gillies ex Miers) Bernardello

Sinónimos: *Lycium filifolium* Gillies ex Miers, *Lycium chilense* Miers ex Bertero var. *capillare* (Miers) A. Terracc.

Arbusto. Nativo.

Distribución: ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-1500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Lycium chilense Miers ex Bertero var. *glaberrimum* Phil.

Sinónimos: *Lycium chilense* Miers ex Bertero subsp. *gracile* (Meyen) Reiche, *Lycium sessiliflorum* Phil., *Lycium rhadinum* Phil., *Lycium gracile* Meyen, *Lycium venosum* Phil., *Lycium chilense* Miers ex Bertero fma. *glaberrimum* (Phil.) A. Terracc., *Lycium chilense* Miers ex Bertero var. *gracile* (Meyen) A. Terracc., *Lycium chilense* Miers ex Bertero var. *glabriusculum* Phil., *Lycium salsum* Ruiz & Pav. var. *gracile* (Meyen) Kuntze, *Lycium chilense* Miers ex Bertero var. *venosum* (Phil.) Reiche, *Lycium chilense* Miers ex Bertero var. *rhadinum* (Phil.) Reiche

Arbusto. Nativo.

Distribución: ATA, COQ, VAL.

Rango altitudinal: 500-2000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Lycium chilense Miers ex Bertero var. *minutifolium* (Miers) F.A. Barkley

Sinónimos: *Lycium filifolium* Gillies ex Miers var. *minutifolium* Miers, *Lycium minutifolium* Phil., *Lycium chilense* Miers ex Bertero fma. *minutifolium* (Miers) A. Terracc.

Arbusto. Nativo.

Distribución: ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-2500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Lycium chilense Miers ex Bertero var. *vergarae* (Phil.) Bernardello

Sinónimos: *Lycium vergarae* Phil.

Arbusto. Nativo.

Distribución: TAR, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 2000-4000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Lycium deserti Phil.

Sinónimos: *Lycium breanum* Phil., *Lycium pachyclados* Phil.

Arbusto. Endémico.

Distribución: TAR, ANT, ATA.

Rango altitudinal: 500-3200 m.

Lycium distichum Meyen

Sinónimos: *Grabowskia disticha* (Meyen) Nees ex Dunal

Arbusto. Nativo.

Distribución: TAR.

Rango altitudinal: 2000 m.

Países limítrofes: Perú.

***Lycium humile* Phil.**

Sinónimos: *Lycium chilense* Miers ex Bertero var. *deserticum* A. Terracc.

Arbusto. Nativo.

Distribución: TAR, ANT, ATA, RME.

Rango altitudinal: 2000-4000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Jume, june, wicha.

***Lycium leiostemum* Wedd.**

Sinónimos: *Lycium bieseii* F.A. Barkley

Arbusto. Nativo.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA.

Rango altitudinal: 1000 m.

Países limítrofes: Perú.

***Lycium minutifolium* J. Remy**

Sinónimos: *Lycium implexum* Miers, *Lycium horridum* Phil., *Lycium rhudolphii* Speg., *Lycium chilense* Miers ex Bertero var. *deserticum* A. Terracc., *Lycium chilense* Miers ex Bertero var. *implexum* (Miers) A. Terracc.

Arbusto. Endémico.

Distribución: ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 1000-3200 m.

Nombre vulgar: Calpiche, coralillo.

***Lycium rachidocladum* Dunal**

Sinónimos: *Lycium chilense* Miers ex Bertero var. *rachidocladum* (Dunal) A. Terracc., *Lycium chilense* Miers ex Bertero subsp. *rachidocladum* (Dunal) Reiche

Arbusto. Endémico.

Distribución: ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-3500 m.

***Lycium stenophyllum* J. Remy**

Sinónimos: *Lycium fragosum* Miers

Arbusto. Nativo.

Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-2500 m.

Países limítrofes: Perú.

Lycium tenuispinosum* Miers var. *calycinum

(Griseb.) Bernardello

Sinónimos: *Lycium scoparium* Miers var. *calycinum* Griseb., *Lycium ovalilobum* C.L. Hitchc.

Arbusto. Nativo.

Distribución: LLA.

Rango altitudinal: 0-2000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nicandra

***Nicandra physalodes* (L.) Gaertn.**

Sinónimos: *Atropa physalodes* L.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, COQ, VAL, RME.

Rango altitudinal: 0-2500 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nicotiana

Nicotiana acuminata* (Graham) Hook. var. *acuminata

Sinónimos: *Petunia acuminata* Graham, *Nicotiana longiflora* Cav. var. *oligantha* (Phil.) Millán, *Nicotiana uspallatensis* Phil., *Nicotiana oligantha* Phil., *Nicotiana copiapina* Phil., *Nicotiana modesta* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO.

Rango altitudinal: 100-3400 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Tabaco del campo, tabaco cimarrón.

***Nicotiana acuminata* (Graham) Hook. var. *compacta* Goodsp.**

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: COQ.

Rango altitudinal: 2700-3500 m.

***Nicotiana acuminata* (Graham) Hook. var. *multiflora* (Phil.) Reiche**

Sinónimos: *Nicotiana angustifolia* Ruiz & Pav., *Nicotiana heterophylla* Phil., *Nicotiana multiflora* Phil.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.

Rango altitudinal: 100-3100 m.

Nicotiana cordifolia* Phil. subsp. *cordifolia

Arbusto. Endémico.

Distribución: JFE.

Rango altitudinal: 0-200 m.

Nicotiana cordifolia Phil. subsp. *sanctaclarae*
Danton
Arbusto. Endémico.
Distribución: JFE.

Nicotiana corymbosa J. Remy
Sinónimos: *Nicotiana monticola* Dunal, *Nicotiana scapigera* Phil., *Nicotiana oulophylla* Dunal
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, MAG.
Rango altitudinal: 700-3700 m.
Países limítrofes: Argentina.

Nicotiana glauca Graham
Arbusto o subarbusto. Nativo.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME.
Rango altitudinal: 0-3000 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.
Nombre vulgar: Palqui inglés, palqui extranjero, belén-belén.

Nicotiana linearis Phil.
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: COQ, MAU.
Rango altitudinal: 200-2100 m.
Países limítrofes: Argentina.

Nicotiana longibracteata Phil.
Sinónimos: *Nicotiana frigida* Phil.
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: TAR, ANT, ATA.
Rango altitudinal: 3400-3700 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Palpalpalpa.

Nicotiana miersii J. Remy var. *lychnoides* (J. Remy) Goodsp.
Sinónimos: *Nicotiana floribunda* (Phil.) Reiche,
Nicotiana lychnoides J. Remy, *Waddingtonia floribunda* Phil.
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: ATA, COQ.
Rango altitudinal: 0-1400 m.

Nicotiana miersii J. Remy var. *miersii*
Sinónimos: *Nicotiana collae* Phil., *Nicotiana coquimbana* Phil.
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME.
Rango altitudinal: 0-1400 m.

Nicotiana paa Mart. Crov.
Sinónimos: *Nicotiana noctiflora* Hook. var. *albiflora* Comes, *Nicotiana cavanillesii* Dunal var. *albiflora* (Comes) Millán
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ATA.
Rango altitudinal: 100-1600 m.
Países limítrofes: Argentina.

Nicotiana pauciflora J. Remy
Sinónimos: *Nicotiana longiflora* Cav. var. *pauciflora* (J. Remy) Comes, *Nicotiana caudigera* Phil.
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: ATA, COQ.
Rango altitudinal: 500-2500 m.

Nicotiana petunioides (Griseb.) Millán
Sinónimos: *Fabiana petunioides* Griseb., *Nicotiana pampasana* Kuntze, *Nicotiana philippii* Millán
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: ANT, ATA.
Rango altitudinal: 3700-4600 m.
Países limítrofes: Argentina.

Nicotiana solanifolia Walp.
Sinónimos: *Nicotiana breviloba* Phil., *Nicotiana cardiophylla* Phil.
Subarbusto. Endémico.
Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ.
Rango altitudinal: 0-1000 m.

Nicotiana tabacum L.
Hierba. Anual o perenne. Introducida.
Distribución: JFE, IPA.
Nombre vulgar: Tabaco, aba aba (Rapa Nui).

Nicotiana undulata Ruiz & Pav.
Sinónimos: *Nicotiana chilensis* Millán nom. illeg., *Nicotiana brachysolen* Phil.

Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT.
Rango altitudinal: 2700-4200 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.
Nombre vulgar: Lipelipe.

Nierembergia

Nierembergia repens Ruiz & Pav.

Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.
Rango altitudinal: 0-500 m.
Países limítrofes: Perú.
Nota: Presente también en Ecuador.

Nolana

Nolana acuminata (Miers) Miers ex Dunal
Sinónimos: *Sorema lanceolata* Miers, *Sorema acuminata* Miers, *Sorema longifolia* auct. non (Lindl.) Miers, *Nolana lanceolata* (Miers) Miers ex Dunal, *Nolana angustifolia* Phil., *Nolana navarri* Phil., *Nolana rupestris* Phil.
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL.
Rango altitudinal: 0-900 m.

Nolana adansonii (Roem. & Schult.) I.M. Johnst.
Sinónimos: *Tula adansonii* Roem. & Schult.
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: TAR.
Rango altitudinal: 0-800 m.
Países limítrofes: Perú.

Nolana albescens (Phil.) I.M. Johnst.
Sinónimos: *Dolia albescens* Phil. ex Wettst., *Bargemontia albescens* (Phil.) I.M. Johnst., *Dolia albescens* Phil.
Arbusto. Endémico.
Distribución: ANT, ATA, COQ.
Rango altitudinal: 0-1300 m.

Nolana aplocaryoides (Gaudich.) I.M. Johnst.
Sinónimos: *Nolana sedifolia* Poepp. var. *aplocaryoides* (Gaudich.) Mesa, *Leloutrea aplocaryoides* Gaudich., *Bargemontia aplocaryoides* (Gaudich.) I.M. Johnst., *Alona pusilla* Phil.

Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA.
Rango altitudinal: 0-1300 m.
Países limítrofes: Perú.

Nolana arenicola I.M. Johnst.

Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: TAR.
Rango altitudinal: 200-700 m.
Países limítrofes: Perú.

Nolana baccata (Lindl.) Dunal

Sinónimos: *Alona baccata* Lindl., *Sorema linearis* Miers, *Gubleria baccata* Gaudich., *Nolana linearis* (Miers) Miers ex Dunal, *Nolana stans* Phil., *Nolana carrera* Phil., *Nolana leucantha* Phil., *Nolana carrera* Phil. var. *leucantha* (Phil.) Reiche, *Periloba stans* (Phil.) I.M. Johnst., *Nolana alba* Phil.
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: ANT, ATA, COQ.
Rango altitudinal: 0-800 m.

Nolana balsamiflua (Gaudich.) Mesa

Sinónimos: *Alona balsamiflua* Gaudich.
Subarbusto. Endémico.
Distribución: ANT.
Rango altitudinal: 500 m.

Nolana carnososa (Lindl.) Miers ex Dunal

Sinónimos: *Alona carnosa* Lindl., *Nolana rostrata* (Lindl.) Miers ex Dunal var. *carnosa* (Lindl.) Mesa, *Alona vernicosa* Phil., *Alona sedifolia* Phil., *Osteocarpus lepidophyllus* Phil., *Alona lepidophylla* (Phil.) Reiche
Subarbusto. Endémico.
Distribución: TAR, ATA.
Rango altitudinal: 0-200 m.

Nolana clivicola (I.M. Johnst.) I.M. Johnst.

Sinónimos: *Bargemontia clivicola* I.M. Johnst.
Arbusto. Endémico.
Distribución: ANT, ATA.
Rango altitudinal: 0-800 m.

Nolana coelestis (Lindl.) Miers ex Dunal

Sinónimos: *Alona coelestis* Lindl., *Alona ericifolia* Miers, *Nolana ericifolia* (Miers) Miers ex Dunal, *Alona*

floribunda Phil., *Alona coelestis* Lindl. var. *ericifolia* (Miers) F.H. Brandt
Subarbusto. Endémico.
Distribución: ATA, COQ.
Rango altitudinal: 100-800 m.

Nolana crassulifolia Poepp.
Sinónimos: *Alona tomentosa* Lindl., *Alibrexia rupicola* Miers, *Nolana grossulifolia* Kunze ex Gay, *Dolia clavata* auct. non Miers, *Alona micrantha* Phil., *Dolia tomentosa* (Lindl.) Benth., *Dolia rupicola* (Miers) Benth. & Hook. ex Wettst., *Dolia canescens* Phil., *Dolia eremobia* Phil., *Dolia grandiflora* Phil., *Dolia crassifolia* Kuntze, *Bargemontia crassulifolia* (Poepp.) I.M. Johnst., *Bargemontia micrantha* (Phil.) I.M. Johnst., *Bargemontia eremobia* (Phil.) I.M. Johnst., *Dolia philippi* (Braun) F.H. Brandt, *Dolia atacamensis* F.H. Brandt, *Alibrexia philippii* A. Braun
Arbusto o subarbusto. Endémico.
Distribución: ATA, COQ, VAL.
Rango altitudinal: 0-1500 m.

Nolana deflexa (I.M. Johnst.) I.M. Johnst.
Sinónimos: *Bargemontia deflexa* I.M. Johnst.
Arbusto. Endémico.
Distribución: ANT, ATA.
Rango altitudinal: 110-400 m.

Nolana dianae M.O. Dillon
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: ANT.
Rango altitudinal: 300-600 m.

Nolana diffusa I.M. Johnst.
Arbusto. Endémico.
Distribución: ANT.
Rango altitudinal: 0-500 m.

Nolana divaricata (Lindl.) I.M. Johnst.
Sinónimos: *Nolana peruviana* (Gaudich.) I.M. Johnst. subsp. *divaricata* (Lindl.) Mesa, *Aplocarya divaricata* Lindl., *Dolia clavata* Miers, *Alona xerophila* Phil., *Dolia divaricata* (Lindl.) Hook. & Arn. ex W. Brandt, *Alona rigida* Phil., *Dolia puberula* Phil., *Dolia hirsutula* Phil., *Dolia clavata* Miers var. *puberula* (Phil.) Reiche, *Bargemontia divaricata* (Lindl.) I.M. Johnst., *Bargemontia clavata* (Miers) I.M. Johnst., *Osteocarpus clavatus* Phil.

Subarbusto. Endémico.
Distribución: ANT, ATA, COQ.
Rango altitudinal: 0-4100 m.

Nolana elegans (Phil.) Reiche
Sinónimos: *Sorema elegans* Phil.
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: ANT, ATA, VAL.
Rango altitudinal: 0-600 m.

Nolana filifolia (Hook. & Arn.) I.M. Johnst.
Sinónimos: *Alona filifolia* (Hook. & Arn.) I.M. Johnst., *Convolvulus filifolius* Hook. & Arn., *Nolana chasteayana* Gaudich., *Alona glandulosa* Lindl., *Ipomoea cruckshanskii* Choisy, *Fabiana grandiflora* Dunal, *Nolana glandulosa* (Lindl.) Miers ex Dunal, *Osteocarpus foliolosus* Phil., *Alona chasteayana* (Gaudich.) Gaudich. ex Wettst.
Subarbusto. Endémico.
Distribución: ATA, COQ.
Rango altitudinal: 0-1300 m.

Nolana foliosa (Phil.) I.M. Johnst.
Sinónimos: *Dolia foliosa* Phil., *Bargemontia foliosa* (Phil.) I.M. Johnst.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: TAR.
Rango altitudinal: 2080-2370 m.

Nolana glauca (I.M. Johnst.) I.M. Johnst.
Sinónimos: *Bargemontia glauca* I.M. Johnst., *Nolana peruviana* (Gaudich.) I.M. Johnst. var. *glauca* (I.M. Johnst.) Mesa
Subarbusto. Endémico.
Distribución: ANT, ATA, COQ.
Rango altitudinal: 0-1000 m.

Nolana gracillima (I.M. Johnst.) I.M. Johnst.
Sinónimos: *Nolana sedifolia* Poepp. subsp. *confinis* (I.M. Johnst.) Mesa, *Bargemontia gracillima* I.M. Johnst.
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT.
Rango altitudinal: 0-2400 m.
Países limítrofes: Perú.

Nolana incana (Phil.) I.M. Johnst.

Sinónimos: *Alibrexia incana* Phil., *Dolia incana* (Phil.) Wettst., *Dolia incana* (Phil.) Benth. & Hook. ex F.H. Brandt
Arbusto. Endémico.
Distribución: ANT, ATA.
Rango altitudinal: 0-800 m.

Nolana inconspicua (I.M. Johnst.) I.M. Johnst.
Sinónimos: *Bargemontia inconspicua* I.M. Johnst.
Arbusto. Endémico.
Distribución: ANT.
Rango altitudinal: 0-1000 m.

Nolana intonsa I.M. Johnst.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: TAR.
Rango altitudinal: 200-800 m.

Nolana jaffuelii I.M. Johnst.
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: TAR, ANT.
Rango altitudinal: 0-1000 m.
Países limítrofes: Perú.

Nolana lachimbensis M.O. Dillon & Luebert
Arbusto. Endémico.
Distribución: ANT.
Rango altitudinal: 500 m.

Nolana leptophylla (Miers) I.M. Johnst.
Sinónimos: *Dolia leptophylla* Miers, *Velpeaulia alibrexioides* Gaudich., *Alona deserticola* Phil., *Alona dubia* Phil., *Bargemontia leptophylla* (Miers) I.M. Johnst., *Bargemontia deserticola* (Phil.) I.M. Johnst., *Dolia deserticola* (Phil.) W. Brandt
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: TAR, ANT, ATA.
Rango altitudinal: 0-4200 m.

Nolana linearifolia Phil.
Sinónimos: *Nolana decemloba* Herzog, *Bargemontia linearifolia* (Phil.) I.M. Johnst.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ANT, ATA.
Rango altitudinal: 0-1000 m.

Nolana lycooides I.M. Johnst.

Sinónimos: *Nolana sedifolia* Poepp. subsp. *confinis* (I.M. Johnst.) Mesa
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT.
Rango altitudinal: 200-2100 m.
Países limítrofes: Perú.

Nolana mollis (Phil.) I.M. Johnst.
Sinónimos: *Nolana leptophylla* (Miers) I.M. Johnst. subsp. *mollis* (Phil.) Mesa, *Alona mollis* Phil., *Dolia macrocalyx* Phil., *Bargemontia mollis* (Phil.) I.M. Johnst.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ANT, ATA.
Rango altitudinal: 0-700 m.

Nolana onoana M.O. Dillon & M. Nakaz.
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: ANT.
Rango altitudinal: 100-600 m.

Nolana paradoxa Lindl.
Sinónimos: *Nolana paradoxa* Lindl. subsp. *atriciplicifolia* (D. Don) Mesa, *Periloba paradoxa* (Lindl.) Raf., *Sorema paradoxa* (Lindl.) Lindl., *Sorema litoralis* Miers, *Nolana litoralis* (Miers) Dunal, *Nolana paradoxa* Lindl. var. *glaberrima* Dunal, *Nolana atriplicifolia* D. Don var. *cuneifolia* Dunal, *Nolana paradoxa* Lindl. var. *violacea* Van Houtte, *Sorema petiolata* Phil., *Nolana ochrocarpa* Phil. ex Wettst., *Nolana geminiflora* Phil., *Nolana petiolata* (Phil.) Reiche, *Nolana atriplicifolia* D. Don, *Nolana grandiflora* Lehm. ex G. Don, *Sorema atriplicifolia* (D. Don) Lindl., *Sorema paradoxa* (Lindl.) Lindl. var. *atriciplicifolia* (D. Don) Miers, *Nolana napiformis* Phil., *Nolana grandiflora* Herzog
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: ATA, COQ, VAL, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.
Rango altitudinal: 0-300 m.
Nombre vulgar: Suspiro del campo.

Nolana parviflora (Phil.) Phil.
Sinónimos: *Sorema parviflora* Phil., *Periloba parviflora* (Phil.) I.M. Johnst.
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: ANT, ATA.
Rango altitudinal: 0-800 m.

Nolana patula (Phil.) Mesa ex M.O. Dillon
Sinónimos: *Alona patula* Phil., *Nolana patula* (Phil.)
Mesa, comb. illeg.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ATA.
Rango altitudinal: 600-900 m.

Nolana peruviana (Gaudich.) I.M. Johnst.
Sinónimos: *Bargemontia peruviana* Gaudich., *Dolia macrocalyx* Phil. ex Herzog
Subarbusto. Endémico.
Distribución: TAR, ANT, ATA.
Rango altitudinal: 0-1000 m.
Nombre vulgar: Suspiro.

Nolana philippiana M.O. Dillon & Luebert
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: ANT.
Rango altitudinal: 700-1600 m.

Nolana pterocarpa Phil. ex Wettst.
Sinónimos: *Nolana pterosperma* Phil., *Nolana debilis* Phil., *Nolana pulchella* Phil. ex Reiche, *Periloba pterosperma* (Phil.) I.M. Johnst.
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: TAR, ATA.
Rango altitudinal: 0-800 m.

Nolana ramosissima I.M. Johnst.
Sinónimos: *Dolia salsolooides* auct. non Lindl.
Arbusto. Endémico.
Distribución: ANT.
Rango altitudinal: 0-700 m.

Nolana reichei M.O. Dillon & Arancio
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ.
Rango altitudinal: 0-100 m.

Nolana rhombifolia Martic. & Quezada
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: AYP.
Rango altitudinal: 1800-1900 m.

Nolana rostrata (Lindl.) Miers ex Dunal
Sinónimos: *Alona rostrata* Lindl., *Alona obtusa* Lindl.,
Nolana obtusa (Lindl.) Miers ex Dunal, *Alona miersii*

Phil., *Alona phylicifolia* Phil., *Alona fonckii* Phil.,
Rayera teretifolia Gaudich., *Osteocarpus brevifolius* Phil., *Nolana lepidophylla* (Phil.) I.M. Johnst.,
Osteocarpus rostratus (Lindl.) Phil.
Subarbusto. Endémico.
Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ.
Rango altitudinal: 500-4100 m.

Nolana rupicola Gaudich.
Sinónimos: *Alona longifolia* Lindl., *Sorema longifolia* (Lindl.) Miers, *Nolana longifolia* (Lindl.) Miers ex Dunal, *Nolana triquetra* Koch & Bouché, *Sorema glutinosa* Phil., *Sorema bracteosa* Phil., *Nolana lanceolata* auct. non (Miers) Miers ex Dunal, *Nolana glutinosa* (Phil.) Reiche, *Nolana bracteosa* (Phil.) Reiche, *Periloba longifolia* (Lindl.) I.M. Johnst.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL.
Rango altitudinal: 0-900 m.
Nombre vulgar: Suspiro.

Nolana salsolooides (Lindl.) I.M. Johnst.
Sinónimos: *Dolia salsolooides* Lindl., *Osteocarpus spathulatus* Phil., *Dolia micrantha* (Phil.) Reiche
Arbusto. Endémico.
Distribución: ANT, ATA, COQ.
Rango altitudinal: 0-900 m.

Nolana sedifolia Poepp.
Sinónimos: *Fabiana lanuginosa* Hook. & Arn., *Salsola glomerulata* Meyen, *Dolia vermiculata* Lindl., *Alibrexia brevifolia* Phil., *Dolia brevifolia* (Phil.) Phil. ex Wettst., *Bargemontia sedifolia* (Poepp.) I.M. Johnst.
Subarbusto. Endémico.
Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ, VAL.
Rango altitudinal: 0-1000 m.

Nolana sessiliflora Phil.
Sinónimos: *Nolana sessilifolia* Phil. ex I.M. Johnst.,
Periloba sessiliflora (Phil.) I.M. Johnst.
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: ANT, ATA.
Rango altitudinal: 2000-2100 m.

Nolana sphaerophylla (Phil.) Mesa ex M.O. Dillon
Sinónimos: *Nolana flaccida* (Phil.) I.M. Johnst., *Alona sphaerophylla* Phil., *Bargemontia sphaerophylla* (Phil.)

I.M. Johnst., *Alona flaccida* Phil., *Bargemontia flaccida* (Phil.) I.M. Johnst.

Subarbusto. Endémico.

Distribución: ANT, ATA.

Rango altitudinal: 0-800 m.

***Nolana stenophylla* I.M. Johnst.**

Sinónimos: *Alona stenophylla* (I.M. Johnst.) I.M. Johnst.

Arbusto. Endémico.

Distribución: ANT, ATA.

Rango altitudinal: 0-600 m.

***Nolana tarapacana* (Phil.) I.M. Johnst.**

Sinónimos: *Dolia tarapacana* Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA.

Rango altitudinal: 1000-3000 m.

Nombre vulgar: Deditos.

***Nolana tocopillensis* (I.M. Johnst.) I.M. Johnst.**

Sinónimos: *Bargemontia tocopillensis* I.M. Johnst.

Arbusto. Endémico.

Distribución: ANT.

Rango altitudinal: 0-300 m.

***Nolana villosa* (Phil.) I.M. Johnst.**

Sinónimos: *Alibrexia villosa* Phil., *Dolia villosa* (Phil.)

Reiche

Arbusto. Endémico.

Distribución: ANT, ATA.

Rango altitudinal: 0-1700 m.

***Nolana werdermannii* I.M. Johnst.**

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ATA, COQ.

Rango altitudinal: 800 m.

Physalis

***Physalis peruviana* L.**

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, COQ, VAL, RME, LBO, JFE.

Rango altitudinal: 30-2400 m.

Países limítrofes: Perú.

Nombre vulgar: Capulí, amor en bolsa, bolsa de amor.

Nota: Introducida en el Archipiélago de Juan Fernández.

***Physalis viscosa* L.**

Sinónimos: *Physalis mendocina* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: TAR, ATA, COQ, VAL, RME, BIO, ARA, IPA.

Rango altitudinal: 0-2000 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nota: Introducida en Rapa Nui (Isla de Pascua).

Probablemente introducida en regiones del centro y sur.

Reyesia

***Reyesia cactorum* (I.M. Johnst.) D'Arcy**

Sinónimos: *Salpiglossis cactorum* I.M. Johnst.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ANT, ATA.

Rango altitudinal: 2900-3500 m.

***Reyesia chilensis* Gay**

Sinónimos: *Pteroglossis laxa* Miers, *Salpiglossis chilensis* (Gay) Wetst., *Salpiglossis brachysiphon* I.M. Johnst., *Reyesia laxa* (Miers) D'Arcy

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

***Reyesia juniperoides* (Werderm.) D'Arcy**

Sinónimos: *Salpiglossis juniperoides* Werderm.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: AYP, TAR.

Rango altitudinal: 2500 m.

Nombre vulgar: Canchanlahua.

***Reyesia parviflora* (Phil.) Hunz.**

Sinónimos: *Salpiglossis parviflora* Phil.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ, RME.

Rango altitudinal: 2900-3500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Salpichroa

***Salpichroa origanifolia* (Lam.) Baill.**

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: VAL, BIO.

Rango altitudinal: 900-1000 m.

***Salpichroa scandens* Dammer**

Arbusto. Nativo.

Distribución: AYP.

Rango altitudinal: 2000-3600 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

***Salpichroa tristis* Miers var. *lehmanni* (Dammer)**

Keel

Arbusto o árbol pequeño. Nativo.

Distribución: TAR.

Rango altitudinal: 3500-4500 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Salpiglossis

***Salpiglossis sinuata* Ruiz & Pav.**

Sinónimos: *Salpiglossis purpurea* Miers, *Salpiglossis fulva* Courtois, *Salpiglossis picta* Sweet, *Salpiglossis purpurea* Miers var. *atropurpurea* (Graham) Miers, *Salpiglossis straminea* Hook., *Salpiglossis straminea* Hook. var. *picta* (Sweet) Hook.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.

Rango altitudinal: 500-2000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Panza de burro.

***Salpiglossis spinescens* Clos**

Arbusto. Endémico.

Distribución: ATA, COQ.

Rango altitudinal: 700-2800 m.

Nombre vulgar: Panza de burro.

Schizanthus

***Schizanthus alpestris* Poepp.**

Sinónimos: *Schizanthus angustifolius* Phil., *Schizanthus glanduliferus* Phil., *Schizanthus alpestris* Poepp. var. *glandulifera* Phil.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME.

Rango altitudinal: 900-2900 m.

***Schizanthus candidus* Lindl.**

Sinónimos: *Schizanthus albiflorus* Phil.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Nombre vulgar: Mariposa blanca, cacatúa.

***Schizanthus coccineus* (Phil.) J.M. Watson**

Sinónimos: *Schizanthus grahamii* Gill. var. *coccinea* Phil.

Hierba. Anual o bienal. Endémica.

Distribución: RME.

Rango altitudinal: 2600-2800 m.

Nombre vulgar: Mariposita roja.

***Schizanthus grahamii* Gillies ex Hook.**

Sinónimos: *Schizanthus retusus* Hook., *Schizanthus incanus* Hort. ex C. Morr., *Schizanthus gilliesii* Phil., *Schizanthus araucanus* Phil., *Schizanthus diazii* Phil.

Hierba. Anual o bienal. Nativa.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, BIO.

Rango altitudinal: 1200-2500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Schizanthus hookeri* Gillies ex Graham**

Sinónimos: *Schizanthus calycosus* Phil.

Hierba. Anual o bienal. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 1300-3000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Schizanthus integrifolius* Phil.**

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: ATA, COQ.

Rango altitudinal: 700-1500 m.

Nombre vulgar: Palito.

***Schizanthus lacteus* Phil.**

Sinónimos: *Schizanthus sanromanii* Phil.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: ANT, ATA.

Rango altitudinal: 0-700 m.

***Schizanthus laetus* Phil.**

Sinónimos: *Schizanthus fallax* I.M. Johnst.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA.

Rango altitudinal: 0-500 m.

***Schizanthus litoralis* Phil.**

Sinónimos: *Schizanthus splendens* Sudzuki

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL.

Rango altitudinal: 100-800 m.

***Schizanthus parvulus* Sudzuki**

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: COQ.

Rango altitudinal: 300-600 m.

***Schizanthus pinnatus* Ruiz & Pav.**

Sinónimos: *Schizanthus gayanus* Phil., *Schizanthus gracilis* Clos, *Schizanthus humilis* Phil., *Schizanthus laciniosus* Phil., *Schizanthus latifolius* Phil., *Schizanthus lilacinus* Kunze, *Schizanthus heterophyllus* Phil., *Schizanthus tenuifolius* Phil., *Schizanthus tenuis* Phil. Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.

Rango altitudinal: 100-1500 m.

Nombre vulgar: Pajarito.

***Schizanthus porrigens* Graham**

Sinónimos: *Schizanthus floribundus* Phil.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO.

Rango altitudinal: 0-500 m.

***Schizanthus tricolor* Grau & Gronbach**

Sinónimos: *Schizanthus pinnatus* Ruiz & Pav. var. *humilis* Lindl.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: VAL, RME.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Solanum

***Solanum alphonsei* Dunal**

Sinónimos: *Solanum alphonsei* Dunal var. *taguatagua* Dunal, *Solanum germainii* Phil., *Solanum tenuicaule* Phil.

Arbusto. Endémico.

Distribución: LBO, MAU.

Rango altitudinal: 0-3000 m.

***Solanum americanum* Mill.**

Sinónimos: *Solanum nigrum* L. var. *americanum* (Mill.)

O.E. Schulz

Subarbusto. Nativo.

Distribución: ANT, COQ, VAL, RME, LBO.

Rango altitudinal: 0-1200 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Hierba mora.

***Solanum argenteum* Dunal**

Arbusto. Introducido.

Distribución: JFE.

***Solanum brachyantherum* Phil.**

Sinónimos: *Solanum geissei* Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, IDE.

Rango altitudinal: 100-700 m.

***Solanum chilense* (Dunal) Reiche**

Sinónimos: *Lycopersicon chilense* Dunal, *Lycopersicon atacamense* Phil., *Lycopersicon bipinnatifidum* Phil., *Lycopersicon puberulum* Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: TAR, ANT.

Rango altitudinal: 0-1500 m.

Nombre vulgar: Tomatillo, tomate silvestre.

***Solanum coquimbense* J.R. Benn.**

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ.

Rango altitudinal: 5-300 m.

***Solanum crispum* Ruiz & Pav.**

Sinónimos: *Solanum ligustrinum* Lodd., *Solanum congestiflorum* Dunal, *Solanum gayanum* (J. Remy) F. Phil., *Solanum pannosum* Phil., *Solanum pyrrhocarpum* Phil., *Witheringia crispa* (Ruiz & Pav.) J. Remy, *Witheringia tomatillo* J. Remy, *Solanum crispum* Ruiz & Pav. var. *ligustrinum* (Lodd.) Dunal, *Solanum tomatillo* (J. Remy) F. Phil., *Solanum concavum* Lindl., *Solanum syringaeifolium* Kunth & Bouché, *Witheringia berteroana* J. Remy, *Witheringia gayana* J. Remy, *Solanum congestiflorum* Dunal var. *longifolium* Dunal, *Solanum crispum* Ruiz & Pav. var. *elaeagnifolium* Dunal, *Solanum sadae* Phil., *Solanum landbeckii* Phil., *Solanum angustifolium* Lam. var. *brevifolium* Dunal,

Solanum congestiflorum Dunal var. *pannosum* (Phil.) Reiche, *Solanum congestiflorum* Dunal var. *syringaeifolium* (Kunth & Bouché) Reiche, *Solanum izquierdii* Phil., *Solanum pugae* Phil., *Solanum tagua* Kuntze
Arbusto. Nativo.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.
Rango altitudinal: 0-2500 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Hierba del chabalongo, huevil, natri.

Solanum echevarayi Hieron.
Sinónimos: *Solanum juncalense* Reiche, *Solanum juncalense* Reiche subsp. *aconcaguae* Bitter
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: VAL, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.
Rango altitudinal: 2000-3000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Solanum elaeagnifolium Cav.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME.
Rango altitudinal: 200-3300 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Tomatillo.

Solanum etuberosum Lindl.
Sinónimos: *Solanum bustillosii* Phil., *Solanum subandinum* F. Meigen, *Solanum looseri* Juz., *Solanum tuberosum* L. var. *polemoniifolium* Hook.f., *Solanum kunzei* Phil., *Solanum etuberosum* Lindl. var. *antucense* Bitter, *Solanum etuberosum* Lindl. var. *bustillosii* (Phil.) Witasek, *Solanum etuberosum* Lindl. var. *chillanense* Bitter
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 400-3000 m.

Solanum fernandezianum Phil.
Sinónimos: *Solanum brevistylum* Wittm., nom. nud., *Solanum tuberosum* L. var. *fernandezianum* (Phil.) Reiche
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: JFE.
Rango altitudinal: 100-1700 m.

Solanum fragile Wedd.
Sinónimos: *Solanum grandidentatum* Phil., *Solanum tarapacanum* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR.
Rango altitudinal: 3500-4000 m.
Países limítrofes: Bolivia y Perú.
Nombre vulgar: Ñuñumaya.

Solanum furcatum Dunal
Sinónimos: *Solanum tredecimgranum* Bitter, *Solanum andinum* Reiche, *Solanum crenato-dentatum* Dunal, *Solanum furcatum* Dunal var. *acutedentatum* Nees, *Solanum furcatum* Dunal var. *obtusedentatum* Nees, *Solanum furcatum* Dunal var. *subintegerrimum* Nees, *Solanum rancaguense* Dunal, *Solanum robinsonianum* Bitter, *Witheringia furcata* (Dunal) J. Rémy, *Solanum coxii* Phil., *Solanum bridgesii* Phil., *Solanum bridgesii* Phil. var. *ocellatum* (Phil.) Witasek ex Reiche, *Solanum ocellatum* Phil.
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, JFE.
Rango altitudinal: 200-1900 m.
Países limítrofes: Argentina y Perú.
Nombre vulgar: Hierba mora.
Nota: Introducida en el Archipiélago de Juan Fernández.

Solanum gaudichaudii Dunal
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: COQ, VAL.
Rango altitudinal: 0-600 m.

Solanum herba-bona Reiche
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: ATA.
Rango altitudinal: 900 m.
Nombre vulgar: Hierba mora.

Solanum heterantherum Witasek ex Reiche
Sinónimos: *Solanum tomentosum* (J. Remy) F. Phil., *Witheringia tomentosa* J. Remy
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: ATA, COQ, VAL.
Rango altitudinal: 0-100 m.

Solanum indivisum Witasek ex J.R. Benn.

Hierba. Anual o perenne. Endémica.
Distribución: VAL.
Rango altitudinal: 5 m.

***Solanum infundibuliforme* Phil.**

Sinónimos: *Solanum infundibuliforme* Phil. var. *angustepinnatum* Bitter, *Solanum infundibuliforme* Phil. var. *albiflorum* Ochoa
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: TAR.
Rango altitudinal: 2500-4000 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.
Nombre vulgar: Aparuma.

***Solanum lycopersicoides* Dunal**

Arbusto. Nativo.
Distribución: AYP, TAR.
Rango altitudinal: 1500-3600 m.
Países limítrofes: Perú.

***Solanum maglia* Schltdl.**

Sinónimos: *Solanum collinum* Dunal, *Solanum maglia* Schltdl. var. *collinum* (Dunal) Bitter, *Solanum maglia* Schltdl. var. *witasekianum* Bitter, *Solanum maglia* Molina, nom. nud., *Solanum tuberosum* L. var. *maglia* (Schltdl.) A. DC., *Solanum maglia* Schltdl. var. *brevifrons* Bitter
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ, VAL, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.
Rango altitudinal: 0-1800 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Papa cimarrona, papa de zorro.

***Solanum marginatum* L.f.**

Arbusto. Introducido.
Distribución: VAL, MAU, BIO, JFE.
Rango altitudinal: 5-450 m.

***Solanum medians* Bitter**

Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT.
Rango altitudinal: 3100-3600 m.
Países limítrofes: Perú.

***Solanum montanum* L.**

Sinónimos: *Solanum phyllanthum* Cav. var. *crassipes* (Phil.) Witasek ex Reiche, *Solanum crassipes* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ANT.
Rango altitudinal: 100-550 m.
Países limítrofes: Perú.

***Solanum nigrum* L.**

Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.

***Solanum nitidibaccatum* Bitter**

Sinónimos: *Solanum physalifolium* Rusby var. *nitidibaccatum* (Bitter) Edmonds
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: MAG.
Rango altitudinal: 0-2500 m.
Países limítrofes: Argentina.

***Solanum nitidum* Ruiz & Pav.**

Arbusto. Nativo.
Distribución: AYP, TAR.
Rango altitudinal: 3000-3500 m.
Países limítrofes: Bolivia y Perú.
Nombre vulgar: Ñuñumaya.

***Solanum opacum* A. Braun & C.D. Bouché**

Sinónimos: *Solanum forsteri* Seem.
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa.
Distribución: IPA.
Nombre vulgar: Poporo (Rapa Nui).

***Solanum palustre* Schltdl.**

Sinónimos: *Solanum brevidens* Phil., *Solanum palustre* Schltdl. var. *glabrescens* Walp., *Solanum brevidens* Phil. var. *glabrescens* (Dunal) Hawkes, *Solanum tuberosum* L. var. *brevidens* (Phil.) Reiche, *Solanum tuberosum* L. var. *pearcei* (Phil.) Reiche
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: VAL, LBO, BIO, ARA, LLA.
Rango altitudinal: 0-1200 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Papa de monte.

***Solanum paposanum* Phil.**

Sinónimos: *Solanum aberrans* Phil., *Solanum crassipes* Phil. var. *aberrans* (Phil.) Bitter, *Solanum phyllanthum* Cav. var. *aberrans* (Phil.) Witasek ex Reiche

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: AYP, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 1000-3750 m.

***Solanum pennellii* Correll var. *elachistus* Martic. & Quezada**

Arbusto. Endémico.

Distribución: AYP, TAR.

Rango altitudinal: 1500 m.

***Solanum pentlandii* Dunal subsp. *interandinum* (Bitter) Edmonds**

Sinónimos: *Solanum masafueranum* Bitter & Scottsb., *Solanum interandinum* Bitter

Subarbusto. Nativo.

Distribución: JFE.

Nota: Presente también en Ecuador.

Solanum pentlandii* Dunal subsp. *pentlandii

Subarbusto. Nativo.

Distribución: TAR.

Países limítrofes: Bolivia y Perú.

***Solanum peruvianum* L.**

Sinónimos: *Lycopersicon peruvianum* (L.) Mill.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR.

Rango altitudinal: 0-400 m.

Países limítrofes: Perú.

***Solanum pimpinellifolium* L.**

Sinónimos: *Lycopersicon pimpinellifolium* (L.) Mill., *Lycopersicon pissisi* Phil., *Solanum pissisi* (Phil.) Reiche
Arbusto. Nativo.

Distribución: ATA.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Países limítrofes: Perú.

***Solanum pinnatum* Cav.**

Sinónimos: *Solanum maritimum* Meyen ex Nees, *Solanum albiflorum* Phil., *Solanum feuillei* Dunal, *Solanum novemlobum* Dunal, *Solanum novemlobum* Dunal var. *pauciflorum* Dunal, *Solanum pinnatum* Cav. var. *subintegritolium* (Dunal) Reiche, nom. illeg.,

Solanum pinnatum Cav. var. *tomentosum* Reiche, *Solanum runcinatum* Ruiz & Pav., *Solanum cavanillesii* Dunal var. *subintegritolium* Dunal, *Solanum gaudichaudiana* (J. Remy) Phil., *Witheringia gaudichaudiana* J. Remy, *Solanum gaudichaudii* Dunal var. *viride* Dunal, *Witheringia pinnata* (Cav.) J. Remy Subarbusto. Endémico.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, JFE.

Rango altitudinal: 100-800 m.

Nombre vulgar: Hierba del chabalongo, serilla.

***Solanum polyphyllum* Phil.**

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: TAR.

Rango altitudinal: 1800-2500 m.

***Solanum pseudocapsicum* L.**

Subarbusto. Nativo.

Distribución: ANT, COQ, VAL, RME, BIO, JFE.

Rango altitudinal: 0-2600 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Solanum radicans* L.f.**

Sinónimos: *Solanum ruderale* (J. Remy) F. Phil., *Witheringia ruderalis* J. Remy

Subarbusto. Nativo.

Distribución: AYP, TAR, ATA, COQ, LBO.

Rango altitudinal: 500-2800 m.

Países limítrofes: Bolivia y Perú.

***Solanum remyanum* Phil.**

Sinónimos: *Solanum flexuosum* (J. Remy) Phil., *Witheringia flexuosa* J. Remy

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-700 m.

***Solanum sanfurgoi* Phil.**

Arbusto. Endémico.

Distribución: MAU.

Rango altitudinal: 5-20 m.

***Solanum sarrachoides* Sendtn.**

Sinónimos: *Solanum styleanum* Dunal

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: VAL, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 200-2300 m.
Países limítrofes: Argentina y Perú.
Nombre vulgar: Mora.

Solanum sinuatirecurvum Bitter
Sinónimos: *Solanum metarsium* C.V. Morton
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ANT.
Rango altitudinal: 3000-4500 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Solanum sisymbriifolium Lam.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: VAL, NUB.
Rango altitudinal: 0-1700 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Solanum sitiens I.M. Johnst.
Sinónimos: *Solanum rickii* Correll
Arbusto. Endémico.
Distribución: ANT.
Rango altitudinal: 2500-3400 m.

Solanum trinominum J.R. Benn.
Arbusto. Endémico.
Distribución: ATA, COQ, VAL.
Rango altitudinal: 70-780 m.

Solanum tuberosum L.
Sinónimos: *Solanum chiloense* (A. DC.) Berthault,
Solanum molinae Juz., *Solanum oceanicum* Brücher,
Solanum tuberosum L. var. *chiloense* A.DC., *Solanum tuberosum* L. var. *cultum* A. DC., *Solanum tuberosum* L. var. *vulgare* Hook.f., *Solanum fonckii* Phil. ex Reiche, nom. nud., nom. nud., *Solanum chilotanum* Hawkes, nom. nud., *Solanum zykinii* Lechn.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ANT, VAL, RME, LBO, BIO, ARA, LLA, AIS.
Rango altitudinal: 500-3000 m.
Países limítrofes: Perú.
Nombre vulgar: Papa, poñi.

Solanum tweedianum Hook.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: VAL.
Rango altitudinal: 0-2500 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Solanum valdiviense Dunal
Sinónimos: *Solanum cyrtopodium* Dunal, *Solanum krauseanum* Phil., *Solanum puberulum* Phil., *Solanum poeppigianum* Dunal, nom. nud., *Solanum sembarto* Kuntze, *Solanum sembarto* Kuntze var. *pubescens* Kuntze, *Solanum sembarto* Kuntze var. *varians* Kuntze, *Solanum spiraeoides* Dunal, *Solanum subenervium* Dunal
Arbusto. Nativo.
Distribución: RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.
Rango altitudinal: 100-2000 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Huevil, llaguecillo.

Solanum weddellii Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: TAR, ANT.
Rango altitudinal: 4000-4200 m.

Vestia

Vestia foetida Hoffmanns.
Sinónimos: *Vestia lycioides* Willd.
Arbusto. Endémico.
Distribución: VAL, LBO, NUB, BIO, ARA, LRI.
Rango altitudinal: 200 m.
Nombre vulgar: Chuplín, echuelcúb, huevil.

STYLIDIACEAE

Donatia

Donatia fascicularis J.R. Forst. & G. Forst.
Sinónimos: *Donatia magellanica* Lam., *Polycarpon magellanicum* L.f.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-1000 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Hierba de Donati, donacia.

Phyllachne

Phyllachne uliginosa J.R. Forst. & G. Forst.
Sinónimos: *Forstera muscifolia* Willd., *Forstera uliginosa* (J.R. Forst. & G. Forst.) Hombr. & Jacquinot
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-700 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Musguillo.

TETRACHONDRACEAE

Tetrachondra

Tetrachondra patagonica Skottsb.
Sinónimos: *Tetrachondra patagonica* Skottsb. subsp. *fuegiana* D.M. Moore
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAG.
Rango altitudinal: 0-1000 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Tetracondra.

THYMELAEACEAE

Drapetes

Drapetes muscosus Lam.
Sinónimos: *Drapetes muscoides* Lam.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-1000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Ovidia

Ovidia andina (Poepp. & Endl.) Meisn.
Sinónimos: *Daphne andina* Poepp. & Endl., *Daphne tenera* Phil., *Ovidia tenera* (Phil.) Macloskie
Arbusto. Nativo.
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.
Rango altitudinal: 700-2300 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Traro-voqui.

Ovidia pilo-pillo (Gay) Meisn.
Sinónimos: *Daphne pilo-pillo* Gay, *Ovidia parviflora* Meisn.
Arbusto. Endémico.
Distribución: BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.
Rango altitudinal: 10-1350 m.
Nombre vulgar: Lloime, palo hediondo, pillopillo.

TROPAEOLACEAE

Tropaeolum

Tropaeolum albiflorum Lem.
Sinónimos: *Tropaeolum popelari* Drapiez, nom. illeg.,
Trophaeum popelari (Drapiez) Kuntze, nom illeg.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: MAU.
Rango altitudinal: 1500-1800 m.

Tropaeolum austropurpureum (J.M. Watson & A.R. Flores) J.M. Watson & A.R. Flores
Sinónimos: *Tropaeolum hookerianum* Barnéoud subsp. *austropurpureum* J.M. Watson & A.R. Flores
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ.
Rango altitudinal: 0-600 m.

Tropaeolum azureum Bertero ex Colla
Sinónimos: *Rixa azurea* (Colla) Morren, *Tropaeolum azureum* Bertero ex Colla var. *oblongilobum* Buchenau,
Tropaeolum violaeflorum A. Dietr., *Tropaeolum azureum* Bertero ex Colla var. *angustilobum* Buchenau,
Tropaeolum azureum Bertero ex Colla var. *grandiflorum* Van Houtte, *Trophaeum azureum* (Bertero ex Colla)
Kuntze, *Trophaeum violaeflorum* (A. Dietr.) Kuntze,
Tropaeolum lepidum Phil. ex Buchenau
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME.
Rango altitudinal: 0-2500 m.
Nombre vulgar: Pajarito azul, arguenita azul, violetita del campo.

Tropaeolum beuthii Klotzsch

Sinónimos: *Tropaeolum leptoceras* I.M. Johnst.,
Tropaeolum benthamii Van Houtte, *Trophaeum beuthii*
(Klotzsch) Kuntze
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: AYP, TAR, ANT.
Rango altitudinal: 300-1000 m.

Tropaeolum brachyceras Hook. & Arn.
Sinónimos: *Tropaeolum chilense* Bertero ex Colla,
Chymocarpus brachyceras (Hook. & Arn.) Heynh.,
Tropaeolum brachyceras Hook. & Arn. var. *genuinum*
Buchenau, *Tropaeolum minimum* Miers, nom. nud.,
Tropaeolum brachyceras Hook. & Arn. var.
grandiflorum Reinecke ex Walp., *Tropaeolum*
brachyceras Hook. & Arn. var. *sulphureum* Walp.,
Tropaeolum tenellum G. Don, *Trophaeum brachyceras*
(Hook. & Arn.) Kuntze, *Trophaeum chilense* (Bertero ex
Colla) Kuntze, *Trophaeum tenellum* (G. Don) Kuntze
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU.
Rango altitudinal: 0-1400 m.
Nombre vulgar: Malla, pajarito.

Tropaeolum ciliatum Ruiz & Pav. subsp. *ciliatum*
Sinónimos: *Trophaeum ciliatum* (Ruiz & Pav.) Kuntze,
Tropaeolum venosum Phil. ex Buchenau
Hierba trepadora. Perenne. Endémica.
Distribución: VAL, RME, MAU, NUB, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 400-1000 m.

Tropaeolum ciliatum Ruiz & Pav. subsp.
septentrionale Sparre
Hierba trepadora. Perenne. Endémica.
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB.
Rango altitudinal: 400-2000 m.

Tropaeolum hookerianum Barnéoud subsp.
hookerianum
Sinónimos: *Tropaeolum brachyceras* Hook. & Arn. var.
hookerianum (Barnéoud) Buchenau, *Trophaeum*
hookerianum (Barnéoud) Kuntze
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ.
Rango altitudinal: 0-700 m.
Nombre vulgar: Mastuerzo.

Tropaeolum hookerianum Barnéoud subsp.
pilosum J.M. Watson & A.R. Flores

Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ.
Rango altitudinal: 0-500 m.

Tropaeolum incisum (Speg.) Sparre
Sinónimos: *Tropaeolum polyphyllum* Cav. var. *incisum*
Speg., *Tropaeolum polyphyllum* Cav. fma.
schizophyllum H. Ross ex Neger, nom. nud.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.
Rango altitudinal: 1000-3000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Tropaeolum kingii Phil.
Sinónimos: *Tropaeolum buchenaui* Phil., *Trophaeum*
kingii (Phil.) Kuntze
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ATA, COQ.
Rango altitudinal: 900-1500 m.

Tropaeolum leptophyllum G. Don subsp. *gracile*
(Hook. & Arn.) Sparre
Sinónimos: *Tropaeolum gracile* (Hook. & Arn.) Sparre,
Tropaeolum polyphyllum Cav. var. *gracile* Hook. & Arn.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 0-1900 m.

Tropaeolum leptophyllum G. Don subsp.
leptophyllum
Sinónimos: *Tropaeolum chilense* Bertero ex Colla var.
eximium Steud., *Tropaeolum edule* Bridges, *Tropaeolum*
bridgesii Field & Gardner, *Tropaeolum linearifolium*
Steud., *Trophaeum bridgesii* (Field & Gardner) Kuntze,
Trophaeum edule (Bridges) Kuntze, *Trophaeum*
leptophyllum (G. Don) Kuntze, *Trophaeum linearifolium*
(Steud.) Kuntze
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO,
ARA.
Rango altitudinal: 1000-2500 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Púa.

Tropaeolum looseri Sparre
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ, VAL.
Rango altitudinal: 800-2400 m.

***Tropaeolum majus* L.**

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: COQ, VAL, RME, BIO, JFE.

***Tropaeolum myriophyllum* (Poepp. & Endl.)**

Sparre

Sinónimos: *Tropaeolum polyphyllum* Cav. var. *myriophyllum* Poepp. & Endl.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: VAL, RME, LBO, NUB.

Rango altitudinal: 650-3300 m.

***Tropaeolum nubigenum* Phil.**

Sinónimos: *Trophaeum nubigenum* (Phil.) Kuntze, *Tropaeolum polyphyllum* pro parte, auct. non Cav.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: RME, VAL.

Rango altitudinal: 3000-4000 m.

***Tropaeolum nuptae-jucundae* Sparre**

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 0-300 m.

***Tropaeolum polyphyllum* Cav.**

Sinónimos: *Chymocarpus polyphyllus* (Cav.) Heynh., *Tropaeolum prostratum* Miers, nom. nud., *Tropaeolum paniculatum* Meyen, *Tropaeolum floribundum* Turcz., *Trophaeum floribundum* (Turcz.) Kuntze, *Trophaeum polyphyllum* (Cav.) Kuntze

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 2000-3700 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Tropaeolum porifolium* (Cav.) L. Andersson & S. Andersson**

Sinónimos: *Magallana porrifolia* Pers., *Magallana cavanillesii* Scala, *Magallana porifolia* Cav.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AIS.

Rango altitudinal: 0-2000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Tropaeolum reicheanum* Buchenau ex Reiche**

Sinónimos: *Tropaeolum aureum* C.A. Muell., *Trophaeum aureum* (C.A. Muell.) Kuntze, *Tropaeolum lepidum* Phil. ex Buchenau var. *luteum* Reiche, *Tropaeolum luteum* (Reiche) Buchenau

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ.

Rango altitudinal: 1000-1500 m.

***Tropaeolum rhomboideum* Lem.**

Sinónimos: *Tropaeolum tenuirostre* Steud. var. *majus* Buchenau, *Trophaeum rhomboideum* (Lem.) Kuntze

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: RME.

Rango altitudinal: 1000-2000 m.

***Tropaeolum sessilifolium* Poepp. & Endl.**

Sinónimos: *Trophaeum sessilifolium* (Poepp. & Endl.) Kuntze

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO.

Rango altitudinal: 1500-3400 m.

***Tropaeolum speciosum* Poepp. & Endl.**

Sinónimos: *Chymocarpus speciosus* (Poepp. & Endl.) Walp., *Tropaeolum lechleri* Steud., *Anisocentra cardiopetala* Turcz., *Trophaeum lechleri* (Steud.) Kuntze, *Trophaeum speciosum* (Poepp. & Endl.) Kuntze

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 0-1500 m.

Nombre vulgar: Martillo del carpintero, pajarito, voqui, quintralito.

***Tropaeolum tricolor* Sweet**

Sinónimos: *Chymocarpus tricolor* (Sweet) Heynh., *Tropaeolum coccineum* Miers, nom. nud., *Tropaeolum elegans* G. Don, *Tropaeolum tricolor* Sweet var. *majus* Marnock, *Tropaeolum jarrattii* Youell ex Paxton, *Tropaeolum tricolor* Sweet var. *jarrattii* (Youell ex Paxton) Lem., *Tropaeolum subincrassatum* Steud., nom. nud., *Tropaeolum incrassatum* Steud., *Tropaeolum tricolor* Sweet var. *grandiflorum* Reinecke ex Walp., *Tropaeolum tricolor* Sweet var. *splendens* Reinecke ex Walp., *Tropaeolum tricolor* Sweet var. *pallescens* Barnéoud, *Tropaeolum tricolor* Sweet var. *aurantiacum* Morren, *Tropaeolum tricolor* Sweet var. *grandiflorum* Morren, *Tropaeolum tricolor* Sweet var. *versicolor* Morren, *Tropaeolum tricolor* Sweet var. *venustum* Paxton ex Otto, *Tropaeolum violaceum* Steud., nom.

nud., *Tropaeolum tricolor* Sweet var. *regelianum* Möhring ex Regel, *Tropaeolum tricolor* Sweet var. *schultzii* Regel, *Trophaeum elegans* (G. Don) Kuntze, *Trophaeum incrassatum* (Steud.) Kuntze, *Trophaeum jarrattii* (Youell ex Paxton) Kuntze, *Trophaeum tricolor* (Sweet) Kuntze
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.
Rango altitudinal: 0-2800 m.
Nombre vulgar: Relicario, soldadillo, chupa-chupa, gargantilla, arguenita, espuela de Turpín.

Tropaeolum x jilesii Sparre
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ, VAL.
Rango altitudinal: 2000-2500 m.

Tropaeolum x tenuirostre Steud.
Sinónimos: *Tropaeolum chilense* auct. non Bertero ex Colla, *Tropaeolum tricolori-brachyceras* Walpers, *Trophaeum tenuirostre* (Steud.) Kuntze, *Tropaeolum tenuirostre* Steud. var. *minus* Buchenau
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: VAL, RME, MAU.
Rango altitudinal: 400-840 m.

ULMACEAE

Ulmus

Ulmus minor Mill.
Árbol. Introducido.
Distribución: RME.

URTICACEAE

Boehmeria

Boehmeria excelsa (Bertero ex Steud.) Wedd.
Sinónimos: *Splitgerbera denudata* Gay, *Procris excelsa* Bertero ex Steud.
Árbol. Endémico.
Distribución: JFE.
Rango altitudinal: 0-400 m.

Nombre vulgar: Manzano.

Parietaria

Parietaria debilis G. Forst.
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, JFE.
Rango altitudinal: 10-2600 m.

Parietaria feliciana Phil.
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: IDE.

Parietaria judaica L.
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: VAL, RME.

Pilea

Pilea elegans Gay
Sinónimos: *Pilea elliptica* Hook.f. var. *gayana* Wedd.
Subarbusto. Endémico.
Distribución: BIO, ARA, LRI.
Rango altitudinal: 0-700 m.
Nombre vulgar: Coyanlahuén, mellahuivilu.

Pilea elliptica Hook.f.
Sinónimos: *Pilea chilensis* Wedd., *Pilea pedunculata* Blume, *Pilea uliginosa* Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ARA, LRI, LLA, AIS.
Rango altitudinal: 0-1100 m.

Pilea hyalina Fenzl
Sinónimos: *Pilea hyalina* Fenzl var. *longipes* Miq.
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: LBO.
Rango altitudinal: 0-1500 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Soleirolia

Soleirolia soleirolii (Req.) Dandy
Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: COQ, VAL, RME, BIO, ARA, LRI.

Urtica

***Urtica berteroana* Phil.**

Sinónimos: *Urtica echinata* Benth. var. *berteroana* (Phil.) Wedd.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, RME.

Rango altitudinal: 0-600 m.

***Urtica buchtienii* H. Ross**

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO.

Rango altitudinal: 2200-3100 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Urtica dioica* L.**

Arbusto. Introducido.

Distribución: BIO, ARA, LLA.

***Urtica echinata* Benth.**

Sinónimos: *Urtica echinata* Benth. var. *punctulata* Hauman, *Urtica andicola* Wedd.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT.

Rango altitudinal: 3600-4500 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Urtica flabellata* Kunth**

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: AYP.

Rango altitudinal: 4000-4500 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Urtica glomeruliflora* Steud.**

Sinónimos: *Urtica fernandeziana* (Gay) H. Ross ex Skottsb., comb. illeg., *Boehmeria fernandeziana* Gay
Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: JFE.

Rango altitudinal: 200-1300 m.

***Urtica gracilis* Aiton subsp. *mollis* (Steud.)**

Weigend

Sinónimos: *Urtica buchtienii* R. Ross, *Urtica mollis* Steud., *Urtica dioica* L. var. *mollis* (Steud.) Wedd., *Urtica diplotricha* Phil., *Urtica dioica* L. var. *diplotricha* (Phil.) Wedd.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, ARA, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-3500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Urtica magellanica* Poir.**

Sinónimos: *Urtica darwinii* Hook.f., *Urtica magellanica* Poir. subsp. *bracteata* (Steud.) Geltman, *Urtica pseudodioica* Steud., *Urtica bracteata* Steud., *Urtica magellanica* Poir. var. *bracteata* (Steud.) Wedd.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-1300 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Ortiga caballuna.

***Urtica masafuerae* Phil.**

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: JFE.

Rango altitudinal: 0-500 m.

***Urtica trichantha* (Wedd.) Acevedo & L.E. Navas**

Sinónimos: *Urtica echinata* Benth. var. *trichantha* Wedd.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT.

Rango altitudinal: 3400-4500 m.

Países limítrofes: Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Itapilla.

***Urtica urens* L.**

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: AYP, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.

VERBENACEAE

Aloysia

***Aloysia deserticola* (Phil.) Lu-Irving & O'Leary**

Sinónimos: *Acantholippia deserticola* (Phil.) Moldenke, *Acantholippia punensis* Botta, nom. illeg., *Lippia deserticola* Phil., *Lippia microphylla* Phil., nom. illeg.

Arbusto. Nativo.
Distribución: AYP, TAR, ANT.
Rango altitudinal: 2300-3500 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.
Nombre vulgar: Kore.

Aloysia gratissima (Gillies & Hook. ex Hook.)
Tronc.
Sinónimos: *Verbena gratissima* Gillies & Hook.
Arbusto. Nativo.
Distribución: VAL.
Rango altitudinal: 70-90 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.
Nota: Moroni et al. 2016 sólo cita un ejemplar para Chile en Valparaíso, Limache recolectado por Garaventa 7092 (SI). No existen otros materiales.

Aloysia salviifolia (Hook. & Arn.) Moldenke
Sinónimos: *Aloysia chilensis* (Schauer) Moldenke,
Verbena salviifolia Hook. & Arn., *Lippia chilensis*
Schauer
Arbusto. Endémico.
Distribución: ATA, COQ.
Rango altitudinal: 0-1600 m.
Nombre vulgar: Salvia blanca, salvia.

Aloysia tarapacana (Botta) Lu-Irving & O'Leary
Sinónimos: *Acantholippia tarapacana* Botta
Arbusto. Endémico.
Distribución: AYP.
Rango altitudinal: 2800-3300 m.

Aloysia trifida (Gay) Lu-Irving & O'Leary
Sinónimos: *Aloysia fonckii* (Phil.) Moldenke, *Aloysia reichei* Moldenke var. *reichei*, *Aloysia reichei* Moldenke var. *trilobata* Moldenke, *Acantholippia trifida* (Gay) Moldenke, *Lippia trifida* Gay, *Aloysia gracilis* (Phil.) Acevedo, comb. illeg., *Lippia trifida* Gay var. *gracilis* (Phil.) Reiche, *Lippia fonckii* Phil., *Acantholippia trifida* (Gay) Moldenke var. *reichei* Moldenke
Arbusto. Nativo.
Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ.
Rango altitudinal: 1500-2500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Diostea

Diostea juncea (Gillies & Hook.) Miers
Sinónimos: *Verbena juncea* Gillies & Hook., *Lippia juncea* (Gillies & Hook.) Schauer, *Baillonia juncea* Benth. & Hook.f., *Dipyrena spartoides* Ravenna, *Dipyrena juncea* (Gillies & Hook.) Ravenna, *Dipyrena valdiviana* Phil., *Diostea valdiviana* (Phil.) Miers, *Dipyrena dentata* Phil., *Diostea infuscata* Miers, *Dipyrena infuscata* (Miers) Ravenna, *Citharexylum germaini* Briq., *Diostea chamaedryfolia* Hort ex Hook.f., nom. illeg.
Arbusto. Nativo.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.
Rango altitudinal: 0-2500 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Retama.

Glandularia

Glandularia araucana (Phil.) Botta
Sinónimos: *Verbena araucana* Phil., *Verbena chilensis* Moldenke, *Verbena glabrata* Phil., nom. illeg.
Subarbusto. Nativo.
Distribución: RME, MAU, NUB, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 900-3000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Glandularia atacamensis (Reiche) J.M. Watson & A. Hoffm.
Sinónimos: *Verbena atacamensis* Reiche, *Verbena trifida* Kunth var. *deserticola* Moldenke
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: TAR, ANT, ATA.
Rango altitudinal: 0-700 m.

Glandularia berteroii (Schauer) Muñoz-Schick
Sinónimos: *Glandularia reichei* (Acevedo) L.E. Navas, *Verbena berteroii* Schauer fma. *albiflora* Moldenke, *Verbena reichei* Acevedo, *Shuttleworthia berteroii* Meisn., *Verbena berteroii* Schauer
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.
Rango altitudinal: 100-3400 m.

Glandularia corymbosa (Ruiz & Pav.) N. O'Leary & P. Peralta
Sinónimos: *Verbena corymbosa* Ruiz & Pav.

Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: LBO, BIO, ARA, LLA.
Rango altitudinal: 0-700 m.
Nombre vulgar: Corre-caballito, verbena.
Nota: Se encuentra también en Brasil y Uruguay.

Glandularia gynobasis (Wedd.) N. O'Leary & P. Peralta
Sinónimos: *Verbena bella* Phil., *Verbena gynobasis* Wedd. var. *strigosa* Phil., *Verbena gynobasis* Wedd.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: AYP, TAR.
Rango altitudinal: 1900-4000 m.

Glandularia laciniata (L.) Schnack & Covas
Sinónimos: *Verbena laciniata* (L.) Briq., *Verbena trachea* Phil., *Eriinus laciniatus* L., *Verbena odorata* Meyen
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 0-2100 m.
Países limítrofes: Bolivia y Perú.

Glandularia landbeckii (Phil.) P. Peralta
Sinónimos: *Verbena landbeckii* Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ, VAL.
Rango altitudinal: 300-1500 m.

Glandularia lipozygioides (Walp.) L.E. Navas
Sinónimos: *Verbena lipozygioides* Walp., *Verbena lipozygioides* Walp. var. *minima* Walp.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ, RME.
Rango altitudinal: 1200-1400 m.

Glandularia macrosperma (Speg.) Tronc.
Sinónimos: *Glandularia sulphurea* (D. Don) Schnack & Covas var. *intermedia* (Kuntze) L.E. Navas, *Verbena sulphurea* D. Don var. *intermedia* Kuntze, *Verbena macrosperma* Speg.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ, VAL.
Rango altitudinal: 2800-3100 m.
Países limítrofes: Argentina.

Glandularia multiglandulosa (Moldenke) P. Peralta
Sinónimos: *Verbena multiglandulosa* Moldenke
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ.
Rango altitudinal: 1300 m.

Glandularia porrigens (Phil.) J.M. Watson & A. Hoffm.
Sinónimos: *Verbena cumingii* Moldenke, *Verbena paulsenii* Phil., *Verbena porrigens* Phil.
Subarbusto. Endémico.
Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME.
Rango altitudinal: 0-1000 m.

Glandularia ribifolia (Walp.) P. Peralta
Sinónimos: *Verbena ribifolia* Walp., *Verbena ribifolia* Walp. var. *foetida* (Phil.) Acevedo, *Verbena ribifolia* Walp. fma. *alba* Acevedo, *Verbena ribifolia* Walp. fma. *longavina* (Phil.) Acevedo, *Verbena foetida* Phil., *Verbena longavina* Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: RME, LBO, MAU.
Rango altitudinal: 500-2500 m.

Glandularia sulphurea (D. Don) Schnack & Covas var. *pedunculata* (Clos) L.E. Navas
Sinónimos: *Verbena sulphurea* D. Don var. *fuscorubra* Skottsb., *Verbena sulphurea* D. Don var. *pedunculata* Clos, *Verbena sulphurea* D. Don fma. *alba* Moldenke ex Skottsb.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME.
Rango altitudinal: 0-1000 m.

Glandularia sulphurea (D. Don) Schnack & Covas var. *sulphurea*
Sinónimos: *Verbena sulphurea* D. Don var. *taltalensis* Moldenke, *Verbena sulphurea* D. Don, *Verbena sulphurea* D. Don var. *longituba* Kuntze, *Verbena sulphurea* D. Don var. *scabra* Acevedo, *Shuttleworthia sulphurea* (D. Don) Meisn., *Uwarowia sulphurea* (D. Don) Meisn.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, ARA.
Rango altitudinal: 2600-3300 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Hierba del incordio.

Junellia

***Junellia aretioides* (R.E. Fr.) Moldenke**

Sinónimos: *Verbena aretioides* R.E. Fr.

Arbusto. Nativo.

Distribución: AYP, TAR.

Rango altitudinal: 2700-4400 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

***Junellia bryoides* (Phil.) Moldenke**

Sinónimos: *Verbena bryoides* Phil.

Arbusto. Endémico.

Distribución: AYP, TAR.

Rango altitudinal: 3100-3900 m.

Nombre vulgar: Culesoro, pata de perdiz.

***Junellia caespitosa* (Gillies & Hook.) Moldenke**

Sinónimos: *Verbena caespitosa* Gillies & Hook.

Arbusto. Nativo.

Distribución: ATA, COQ.

Rango altitudinal: 1400-3600 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Junellia crithmifolia* (Gillies & Hook.) N. O'Leary & P. Peralta**

Sinónimos: *Verbena crithmifolia* Gillies & Hook.,

Glandularia crithmifolia (Gillies & Hook.) Schnack & Covas

Arbusto. Nativo.

Distribución: COQ.

Rango altitudinal: 0-2500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Junellia digitata* (Phil.) Moldenke var. *digitata

Sinónimos: *Verbena trternata* Phil., *Junellia tridactyla*

(Phil.) Moldenke, *Junellia punctulata* Hieron. ex

Moldenke, *Verbena digitata* Phil., *Verbena tridactyla* Phil.

Arbusto. Nativo.

Distribución: AYP, TAR, ANT.

Rango altitudinal: 3500-4700 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Altea.

***Junellia digitata* (Phil.) Moldenke var. *integerrima* (Botta) Botta**

Sinónimos: *Verbena digitata* Phil. var. *integerrima* Botta

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: TAR, ANT.

Rango altitudinal: 3200-4500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Junellia juniperina* (Lag.) Moldenke**

Sinónimos: *Verbena juniperina* Lag.

Arbusto. Nativo.

Distribución: AYP, TAR, RME.

Rango altitudinal: 1900-3600 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Tola.

***Junellia lavandulifolia* (Phil.) Moldenke**

Sinónimos: *Junellia lavandulifolia* (Phil.) Moldenke var. *colchaguensis* (Phil.) Moldenke, *Verbena lavandulifolia* Phil., *Verbena colchaguensis* Phil., *Verbena*

lavandulifolia Phil. var. *colchaguensis* (Phil.) Reiche

Arbusto. Endémico.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 1000-3200 m.

***Junellia micrantha* (Phil.) Múlgura**

Sinónimos: *Junellia micrantha* (Phil.) Moldenke, nom. illeg., *Verbena ramulosa* Phil., *Verbena micrantha* Phil.

Arbusto. Nativo.

Distribución: RME, LBO.

Rango altitudinal: 0-3500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Junellia minima* (Meyen) Moldenke**

Sinónimos: *Junellia minima* (Meyen) Moldenke var. *strigosa* Moldenke, *Junellia stragulosoides* Moldenke,

Verbena minima Meyen, *Verbena straguloides*

(Moldenke)

Arbusto. Nativo.

Distribución: AYP, TAR.

Rango altitudinal: 4050-4600 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Junellia odonellii* Moldenke**

Sinónimos: *Verbena o'donelli* (Moldenke) Tronc., comb. illeg.

Arbusto. Nativo.

Distribución: AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Junellia origenes (Phil.) N. O'Leary & P. Peralta
Sinónimos: *Verbena origenes* Phil., *Verbena origenes* Phil. var. *glabriflora* Moldenke, *Verbena deserticola* Phil., *Verbena origenes* Phil. var. *semperi* Moldenke, *Verbena palmata* Reiche, *Glandularia origenes* (Phil.) Schnack & Covas
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ANT, ATA, COQ.
Rango altitudinal: 0-4000 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Rica-rica, core, costilla.

Junellia pappigera (Phil.) N. O'Leary & P. Peralta
Sinónimos: *Urbania egañoides* Phil., *Urbania pappigera* Phil.
Arbusto. Nativo.
Distribución: TAR, ANT, ATA.
Rango altitudinal: 3100-4800 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Junellia pseudojuncea (Gay) Moldenke
Sinónimos: *Verbena pseudojuncea* Gay, *Verbena spathulata* Gillies & Hook. var. *pseudojuncea* (Gay) Reiche, *Thryothamnus junciformis* Phil., *Verbena junciformis* (Phil.) Reiche
Arbusto. Endémico.
Distribución: ATA, COQ.
Rango altitudinal: 2000-2500 m.

Junellia selaginoides (Kunth ex Walp.) Moldenke
var. *illapelina* (Phil.) Botta
Sinónimos: *Junellia illapelina* (Phil.) Moldenke, *Verbena illapelina* Phil., *Verbena selaginoides* Kunth ex Walp. var. *illapelina* (Phil.) Reiche
Arbusto. Endémico.
Distribución: ANT, ATA, COQ.
Rango altitudinal: 600-1500 m.

Junellia selaginoides (Kunth ex Walp.) Moldenke
var. *selaginoides*
Sinónimos: *Verbena polycephala* Turcz., *Verbena selaginoides* Kunth ex Walp., *Verbena alternifolia* Hort ex Schauer
Arbusto. Endémico.
Distribución: ANT, COQ.
Rango altitudinal: 0-500 m.

Junellia seriphiooides (Gillies & Hook.) Moldenke
Sinónimos: *Verbena echinata* Phil., *Verbena seriphiooides* Gillies & Hook.
Arbusto. Nativo.
Distribución: AYP, TAR, ANT.
Rango altitudinal: 1300-4200 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.
Nombre vulgar: Rosa de la cordillera, kaylla.

Junellia silvestrii (Speg.) Moldenke
Sinónimos: *Verbena silvestrii* Speg.
Arbusto. Nativo.
Distribución: MAG.
Rango altitudinal: 0-200 m.
Países limítrofes: Argentina.

Junellia spathulata (Gillies & Hook.) Moldenke
var. *glauca* (Gillies & Hook.) Botta
Sinónimos: *Junellia glauca* (Gillies & Hook.) Moldenke, *Verbena glauca* Gillies & Hook.
Arbusto. Nativo.
Distribución: COQ, VAL, RME, MAU.
Rango altitudinal: 500-2700 m.
Países limítrofes: Argentina.

Junellia spathulata (Gillies & Hook.) Moldenke
var. *spathulata*
Sinónimos: *Verbena spathulata* Gillies & Hook.
Arbusto. Nativo.
Distribución: COQ, RME, LBO, MAU.
Rango altitudinal: 1900-2200 m.
Países limítrofes: Argentina.

Junellia thymifolia (Lag.) Moldenke
Sinónimos: *Verbena thymifolia* Lag.
Arbusto. Nativo.
Distribución: MAG.
Rango altitudinal: 0-500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Junellia tridactylites (Lag.) Moldenke
Sinónimos: *Junellia minutifolia* (Phil.) Moldenke, *Verbena minutifolia* Phil., *Verbena philippiana* Kuntze, nom. illeg., *Verbena tridactylites* Lag.
Arbusto. Nativo.
Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 2300-2400 m.
Países limítrofes: Argentina.

Junellia trifurcata (Phil.) Moldenke
Sinónimos: *Verbena trifurcata* Phil.
Subarbusto. Endémico.
Distribución: RME.
Rango altitudinal: 2300-3400 m.

Junellia ulicina (Phil.) Moldenke
Sinónimos: *Verbena ulicina* Phil.
Arbusto. Nativo.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO.
Rango altitudinal: 0-1800 m.
Países limítrofes: Argentina.

Junellia uniflora (Phil.) Moldenke
Sinónimos: *Verbena uniflora* Phil., *Lycium nanum* Phil.
Arbusto. Nativo.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, MAU.
Rango altitudinal: 2500-4000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Lampayo

Lampayo hieronymi K. Schum. ex Moldenke
Arbusto. Nativo.
Distribución: ANT.
Rango altitudinal: 2500-4000 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Lampaya macho.
Nota: El nombre de género *Lampaya* es considerado inválido.

Lampayo medicinalis Phil.
Arbusto. Nativo.
Distribución: AYP, TAR, ANT.
Rango altitudinal: 2000-4500 m.
Países limítrofes: Bolivia.
Nombre vulgar: Lampaya hembra.
Nota: El nombre de género *Lampaya* es considerado inválido.

Lantana

Lantana camara L.

Arbusto. Introducido.
Distribución: AYP, IPA.

Lippia

Lippia fragrans Turcz.
Sinónimos: *Lippia geisseana* (Phil.) Soler., *Buddleja geisseana* Phil.
Arbusto. Endémico.
Distribución: ANT, ATA, COQ.
Rango altitudinal: 0-1400 m.
Nombre vulgar: Orégano.

Lippia turbinata Griseb.
Sinónimos: *Lippia aprica* Phil., *Lippia disepala* Phil.
Arbusto. Nativo.
Distribución: ATA.
Rango altitudinal: 0-1500 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Mulguraea

Mulguraea arequipensis (Botta) N. O'Leary & P. Peralta
Sinónimos: *Verbena arequipense* Botta, *Junellia arequipense* (Botta) Botta, *Dipyrena arequipensis* (Botta) Ravenna
Arbusto. Nativo.
Distribución: AYP, TAR.
Rango altitudinal: 2200-4300 m.
Países limítrofes: Perú.

Mulguraea asparagoides (Gillies & Hook.) N. O'Leary & P. Peralta
Sinónimos: *Verbena asparagoides* Gillies & Hook., *Junellia asparagoides* (Gillies & Hook.) Moldenke
Arbusto. Nativo.
Distribución: ATA, COQ, VAL.
Rango altitudinal: 2000-2800 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Mulguraea cinerascens (Schauer) N. O'Leary & P. Peralta
Sinónimos: *Diostea cinerascens* (Schauer) Moldenke, *Verbena cinerascens* Schauer, *Junellia cinerascens* (Schauer) Botta, *Dipyrena cinerascens* (Schauer) Ravenna

Arbusto. Endémico.

Distribución: COQ, VAL.

Rango altitudinal: 1000-1500 m.

***Mulguraea hystrix* (Phil.) N. O'Leary & P. Peralta**

Sinónimos: *Verbena hystrix* Phil., *Junellia hystrix* (Phil.)

Moldenke

Arbusto. Nativo.

Distribución: ANT, ATA.

Rango altitudinal: 2600-3700 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Mulguraea scoparia* (Gillies & Hook.) N. O'Leary & P. Peralta**

Sinónimos: *Verbena scoparia* Gillies & Hook., *Diostea scoparia* (Gillies & Hook.) Miers, *Diostea scirpea* (Phil.) Miers,

Lippia aphylla Phil., *Lippia scirpea* Phil., *Verbena scoparia* Gillies & Hook. var. *aphylla* (Phil.) Acevedo, comb. illeg., *Junellia scoparia* (Gillies &

Hook.) Botta, *Dipyrena scoparia* (Hook.) Ravenna

Arbusto. Nativo.

Distribución: COQ, VAL, RME.

Rango altitudinal: 1800-3000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Mulguraea tridens* (Lag.) N. O'Leary & P. Peralta**

Sinónimos: *Verbena tridens* Lag., *Junellia tridens* (Lag.)

Moldenke

Arbusto. Nativo.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 0-800 m.

Países limítrofes: Argentina.

Phyla

***Phyla nodiflora* (L.) Greene var. *minor* (Gillies & Hook.) N. O'Leary & P. Peralta**

Sinónimos: *Phyla canescens* (Kunth) Greene, *Lippia canescens* Kunth, *Lippia nodiflora* (L.) Michx. var. *minor* Gillies & Hook., *Lippia litoralis* Phil., *Phyla nodiflora* (L.) Greene fma. *copiapina* Acevedo

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 0-1100 m.

Países limítrofes: Argentina.

Phyla nodiflora* (L.) Greene var. *nodiflora

Sinónimos: *Lippia nodiflora* (L.) Michx., *Verbena nodiflora* L.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: TAR, ATA.

Rango altitudinal: 10-860 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Hierba de la virgen María, tiqui-tiqui, tiquil-tiquil.

Pitraea

***Pitraea cuneato-ovata* (Cav.) Caro**

Sinónimos: *Castelia cuneato-ovata* Cav., *Pitraea chilensis* Turcz., *Priva cuneato-ovata* (Cav.) Rusby, *Bouchea copiapensis* Gay

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME.

Rango altitudinal: 0-3000 m.

Países limítrofes: Argentina y Perú.

Nombre vulgar: Chámen.

Rhaphithamnus

***Rhaphithamnus spinosus* (Juss.) Moldenke**

Sinónimos: *Volkameria spinosa* Juss., *Duranta umbilicata* Miers, *Duranta umbellata* Miers, *Citharexylum cyanocarpum* Hook. & Arn., *Citharexylum ovatum* Turcz., *Rhaphithamnus cyanocarpum* (Hook. & Arn.) Miers, *Rhaphithamnus amoenus* Miers, *Rhaphithamnus buxifolius* Miers, *Rhaphithamnus parvifolius* Miers, *Rhaphithamnus macranthus* Gand., *Rhaphithamnus spinosus* (Juss.) Moldenke fma. *albiflorus* G. Kunkel, *Rhaphithamnus spinosus* (Juss.) Moldenke var. *inermis* G. Kunkel, *Rhaphithamnus spinosus* (Juss.) Moldenke fma. *microphyllus* G. Kunkel

Arbusto. Nativo.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Arrayán macho, espino negro, arrayán de espino, huayún, espino blanco, hayún, repu, arrayancillo.

***Rhaphithamnus venustus* (Phil.) B.L. Rob.**

Sinónimos: *Citharexylum venustum* Phil.,
Rhaphithamnus longiflorus Miers, *Rhaphithamnus serratifolius* Miers, *Rhaphithamnus venustus* (Phil.) Skottsb., comb. illeg.
Árbol. Endémico.
Distribución: JFE.
Rango altitudinal: 0-1000 m.
Nombre vulgar: Juan bueno.

Verbena

Verbena bonariensis L.

Hierba. Anual o bienal. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.
Rango altitudinal: 0-2100 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.
Nombre vulgar: Verbena.

Verbena cuneifolia Ruiz & Pav.

Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: RME.
Rango altitudinal: 2000-4000 m.
Países limítrofes: Perú.

Verbena hispida Ruiz & Pav.

Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, VAL, RME, LBO, NUB, BIO.
Rango altitudinal: 0-3500 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Verbena litoralis Kunth

Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE, IPA.
Rango altitudinal: 0-2000 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.
Nombre vulgar: Verbena.
Nota: Introducida en el Archipiélago de Juan Fernández y en Rapa Nui (Isla de Pascua).

Verbena officinalis L.

Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: COQ, MAU, BIO, ARA, LRI.

Verbena rigida Speg.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: COQ, VAL, LRI.

VIOLACEAE

Pombalia

Pombalia parviflora (Mutis ex L.f.) Paula-Souza

Sinónimos: *Viola parviflora* Mutis ex L.f., *Ionidium glutinosum* Vent. var. *glutinosum*, *Ionidium parviflorum* (Mutis ex L.f.) Vent., *Viola glutinosa* (Vent.) Poir., *Viola microphylla* Willd. ex Roem. & Schult., *Viola parvifolia* Willd. ex Roem. & Schult., *Ionidium microphyllum* (Willd. ex Roem. & Schult.) Kunth, *Solea parviflora* (Mutis ex L.f.) Spreng., *Solea glutinosa* (Vent.) Spreng., *Ionidium chamaedrifolium* C. Presl, *Ionidium chamaedryfolium* Poepp. ex Walp., *Ionidium glutinosum* Vent. var. *angustifolium* Eichler, *Ionidium glutinosum* Vent. var. *latifolium* Eichler, *Ionidium glutinosum* Vent. var. *parviflorum* (Mutis ex L.f.) Eichler, *Hybanthus maytencillo* Baill., *Hybanthus microphyllus* (Willd. ex Roem. & Schult.) Baill., *Hybanthus parviflorus* (Mutis ex L.f.) Baill. var. *parviflorus*, *Calceolaria bangii* Rusby, *Hybanthus glutinosus* (Vent.) Taub, *Hybanthus parviflorus* (Mutis ex L.f.) Baill. var. *glutinosus* (Vent.) Hassl., *Hybanthus parviflorus* (Mutis ex L.f.) Baill. var. *latifolius* (Eichler) Hassl., *Hybanthus parviflorus* (Mutis ex L.f.) Baill. var. *typicus* Hassl., nom. illeg. et superfl., *Hybanthus parviflorus* (Mutis ex L.f.) Baill. fma. *membranaceus* Schulze-Menz, *Hybanthus parviflorus* (Mutis ex L.f.) Baill. fma. *microphyllus* (Willd. ex Roem. & Schult.) Schulze-Menz, *Hybanthus parviflorus* (Mutis ex L.f.) Baill. var. *argentinensis* Sparre, *Hybanthus parviflorus* (Mutis ex L.f.) Baill. var. *bangii* (Rusby) Sparre, *Hybanthus parviflorus* (Mutis ex L.f.) Baill. var. *chamaedryfolius* (C. Presl) Sparre Subarbusto. Nativo.
Distribución: LBO, BIO.
Rango altitudinal: 0-1000 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Viola

Viola acanthophylla Leyb. ex Reiche

Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: RME.
Rango altitudinal: 1600-2000 m.

Viola aizoon Reiche

Sinónimos: *Viola cyathiformis* W. Becker
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: NUB, ARA.
Rango altitudinal: 1800-1900 m.

Viola araucaniae W. Becker
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: ARA.
Rango altitudinal: 1200-1500 m.

Viola arvensis Murray
Hierba. Anual o bienal. Introducida.
Distribución: NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.
Rango altitudinal: 0-1100 m.

Viola atropurpurea Leyb.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: VAL, RME.
Rango altitudinal: 2200-3750 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Escarapela, carabello.

Viola aurantiaca Leyb.
Sinónimos: *Viola curicoensis* W. Becker
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: RME, MAU.
Rango altitudinal: 2000-3000 m.

Viola aurata Phil.
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: ATA, COQ.
Rango altitudinal: 900-1100 m.
Nombre vulgar: Estrellita.

Viola auricolor Skottsb.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AIS.
Rango altitudinal: 780-1200 m.
Países limítrofes: Argentina.

Viola auricula Leyb.
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: RME.
Rango altitudinal: 2200-2500 m.

Viola brachypetala Gay

Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: VAL.
Rango altitudinal: 1000-1200 m.

Viola bustillosia Gay
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: LBO.
Rango altitudinal: 2100-2400 m.

Viola capillaris Pers. var. *araucana* (Phil.) Reiche
Sinónimos: *Viola dumetorum* Phil. var. *araucana* Phil.
Subarbusto. Endémico.
Distribución: NUB, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 900-1000 m.

Viola capillaris Pers. var. *capillaris*
Sinónimos: *Viola stipularis* Cav., *Viola frutescens* Phil.
Subarbusto. Endémico.
Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.
Rango altitudinal: 0-300 m.

Viola capillaris Pers. var. *dumetorum* (Phil.)
Reiche
Sinónimos: *Viola dumetorum* Phil. var. *dumetorum*
Subarbusto. Endémico.
Distribución: BIO.
Rango altitudinal: 200-300 m.

Viola chamaedrys Leyb.
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: VAL, RME.
Rango altitudinal: 1300-1900 m.

Viola chillanensis Phil.
Sinónimos: *Viola volcanica* auct. non Gillies ex Hook. & Arn. var. *chillanensis* (Phil.) Reiche
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: NUB.
Rango altitudinal: 1300-1400 m.

Viola columnaris Skottsb.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AIS.
Rango altitudinal: 800-1000 m.
Países limítrofes: Argentina.

***Viola commersonii* DC. ex Ging.**

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-700 m.

Países limítrofes: Argentina.

Países limítrofes: Argentina.

***Viola congesta* Gillies ex Hook. & Arn.**

Sinónimos: *Viola volcanica* auct. non Gillies ex Hook. & Arn.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAU.

Rango altitudinal: 2000-2500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Viola decipiens* Reiche**

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, RME, NUB.

Rango altitudinal: 2700-3500 m.

***Viola corralensis* Phil.**

Subarbusto. Endémico.

Distribución: LRI.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Nombre vulgar: Úllahuén.

***Viola domeykoana* Gay**

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO.

Rango altitudinal: 3000-4100 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Viola escarapela* J.M. Watson & A.R. Flores**

Sinónimos: *Viola pulchella* Leyb. ex Reiche, non Salisb., hom. illeg.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: ATA, COQ.

Rango altitudinal: 1500-4050 m.

***Viola cotyledon* Ging.**

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 900-3300 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Hierba del corazón.

***Viola exilis* Phil.**

Sinónimos: *Viola volcanica* auct. non Gillies ex Hook. & Arn. var. *exilis* (Phil.) Reiche

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: RME.

Rango altitudinal: 2400-2500 m.

***Viola curicoensis* W. Becker**

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: MAU.

Rango altitudinal: 2000-2500 m.

***Viola farkasiana* J.M. Watson & A.R. Flores**

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: BIO.

Rango altitudinal: 1400-1500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Viola cyathiformis* W. Becker**

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: NUB.

Rango altitudinal: 600-700 m.

***Viola flühmannii* Phil.**

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: BIO, ARA, LRI.

Rango altitudinal: 1500-2500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Viola dandoisiorum* J.M. Watson & A.R. Flores**

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: ATA.

Rango altitudinal: 680-1200 m.

***Viola friderici* W. Becker**

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: RME.

Rango altitudinal: 2500-2600 m.

***Viola dasypylla* W. Becker**

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ARA.

Rango altitudinal: 1500-2500 m.

***Viola frigida* Phil.**

Sinónimos: *Viola frigida* Phil. var. *borchersii* (Phil.) Reiche, *Viola borchersii* Phil., *Viola molfiniana* W. Becker

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL.

Rango altitudinal: 3000-4100 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Viola gelida* J.M. Watson, M.P. Cárdenas & A.R.**

Flores

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ATA.

Rango altitudinal: 4850-4850 m.

***Viola germainii* Sparre**

Sinónimos: *Viola nivalis* Phil., non Vest. ex Roem. & Schult., hom. Illeg.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: RME.

Rango altitudinal: 3000 m.

***Viola glechomoides* Leyb.**

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: RME.

Rango altitudinal: 2200-2800 m.

***Viola godoyae* Phil.**

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: ATA.

Rango altitudinal: 1000 m.

***Viola granulosa* Wedd.**

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP.

Rango altitudinal: 4000-4500 m.

Países limítrofes: Bolivia y Perú.

***Viola huesoensis* Martic.**

Sinónimos: *Viola litoralis* Phil., non Spreng., hom. illeg.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: ANT.

Rango altitudinal: 0-500 m.

***Viola huidobrii* Gay**

Sinónimos: *Viola lechlerii* Griseb.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: BIO, ARA, LLA.

Rango altitudinal: 100-2500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Viola johnstonii* W. Becker**

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ANT.

Rango altitudinal: 300-500 m.

***Viola lanifera* W. Becker**

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ.

Rango altitudinal: 3000-3200 m.

***Viola leyboldiana* Phil.**

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: MAU.

Rango altitudinal: 2750-3050 m.

***Viola llullaillacoensis* W. Becker**

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: ANT, ATA.

Rango altitudinal: 4000-4200 m.

Viola maculata* Cav. var. *maculata

Sinónimos: *Viola buchtienii* Gand., *Viola glandulosa* Dombey ex Ging., *Viola maculata* Cav. fma. *chilensis*

Weibel, *Viola maculata* Cav. fma. *chillanensis* Sparre,

Viola maculata Cav. fma. *constitucionensis* Sparre,

Viola maculata Cav. fma. *munozii* Sparre, *Viola*

maculata Cav. fma. *valdiviana* (Kalela) Weibel, *Viola*

maculata Cav. var. *buchtienii* (Gand.) Weibel, *Viola*

maculata Cav. var. *pubescens* Reiche, *Viola maculata*

Cav. var. *popetae* Sparre, *Viola valdiviana* Kalela

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-2000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Pilludén, piludén o piludeu, violeta del monte.

***Viola maculata* Cav. var. *microphyllus* (Poir.) DC. ex Ging.**

Sinónimos: *Viola microphyllus* Poir., *Viola maculata* Cav. subsp. *microphyllus* (Poir.) Weibel

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-2000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Viola magellanica G. Forst.
Sinónimos: *Viola magniflora* Molina
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: LLA, MAG.
Rango altitudinal: 0-700 m.
Países limítrofes: Argentina.

Viola marcelorosasii J.M. Watson & A.R. Flores
Sinónimos: *Viola rhombifolia* auct. non Leyb.
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: ATA.
Rango altitudinal: 1600-2280 m.

Viola minutiflora Phil.
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: BIO, ARA.
Rango altitudinal: 300-1100 m.

Viola montagnei Gay
Sinónimos: *Viola montagnei* Gay var. *glandulosa* Phil.,
Viola flos-mariae Hieron. s.l., *Viola karlreichiana*
Sanso, Seo & Xifreda
Hierba. Anual o perenne. Nativa.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU.
Rango altitudinal: 2900-4200 m.
Países limítrofes: Argentina.

Viola muscoides Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: AIS.
Rango altitudinal: 700 m.

Viola nassauviooides Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Nota: Sólo se conoce de la muestra tipo, cuya localidad
es Andes, cordilleras centrales de centro o sur de Chile.

Viola nubigena Leyb.
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: RME.
Rango altitudinal: 2500-3000 m.

Viola odorata L.

Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: VAL, LBO, BIO.
Rango altitudinal: 0-2000 m.

Viola ovaleana Phil.
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: COQ.
Rango altitudinal: 1000-2600 m.

Viola philippiana Greene
Sinónimos: *Viola chrysantha* Phil., non Hook., hom.
illeg, *Viola toroensis* Martic. nom. illeg. & superfl.
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: COQ.
Rango altitudinal: 3400-4200 m.

Viola philippii Leyb.
Sinónimos: *Viola microphylla* Phil., non Willd. ex
Roem. & Schult., hom. illeg., *Viola philippii* Leyb. var.
arbuscula (Phil.) Reiche
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU.
Rango altitudinal: 2000-4000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Viola polypoda Turcz.
Sinónimos: *Viola asterias* Hook. & Arn. var. *glaberrima*
Phil., *Viola psammophila* Phil., *Viola asterias* Hook. &
Arn. var. *atacamensis* Phil., *Viola pseudasterias* Reiche,
Viola pseudasterias Reiche var. *psammophila* (Phil.)
Reiche, *Viola calderensis* W. Becker, *Viola*
werdermannii W. Becker var. *werdermannii*, *Viola*
werdermannii W. Becker var. *glaberrima* W. Becker
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: TAR, ANT, ATA.
Rango altitudinal: 0-1000 m.

Viola portalesia Gay var. *integerrima* (Phil.)
Reiche
Sinónimos: *Viola integerrima* Phil.
Subarbusto. Endémico.
Distribución: COQ, VAL, LBO, MAU.
Rango altitudinal: 0-2000 m.

Viola portalesia Gay var. *portalesia*
Sinónimos: *Viola rubella* auct. non Cav.
Subarbusto. Endémico.

Distribución: VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.
Rango altitudinal: 0-1800 m.

Viola portulacea Leyb.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: RME.
Rango altitudinal: 1600 m.

Viola pulvinata Reiche
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: RME.
Rango altitudinal: 1900 m.

Viola pusilla Poepp.
Sinónimos: *Viola stellata* Miers, nom. nud., *Viola asterias* Hook. & Arn., *Viola miersii* Bertero ex Steud., *Viola asterias* Hook. & Arn. var. *caulescens* Phil., *Viola asterias* Hook. & Arn. var. *depauperata* Phil., *Viola asterias* Hook. & Arn. var. *glabra* Phil. ex Reiche, *Viola asterias* Hook. & Arn. var. *genuina* Reiche
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO.
Rango altitudinal: 0-1500 m.

Viola reichei Skottsb.
Sinónimos: *Viola maculata* Cav. subsp. *reichei* (Skottsb.) Weibel, *Viola reichei* Skottsb. fma. *gunckelii* Sparre
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-2000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Viola rhombifolia Leyb.
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: RME.
Rango altitudinal: 2000 m.

Viola rosulata Poepp. & Endl.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: LBO, MAU, NUB.
Rango altitudinal: 1550-2800 m.
Países limítrofes: Argentina.

Viola rubella Cav.
Sinónimos: *Viola rubella* Cav. var. *angustifolia* Ging., *Viola rubella* Cav. var. *latifolia* Ging.
Subarbusto. Endémico.
Distribución: BIO, ARA, LRI, LLA.
Rango altitudinal: 0-300 m.

Viola rudolphii Sparre
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: LRI, LLA.
Rango altitudinal: 1100 m.

Viola rugosa Phil. ex W. Becker
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: MAU.
Rango altitudinal: 1500-1700 m.

Viola sacculus Skottsb.
Sinónimos: *Viola auritella* W. Becker, *Viola patagonica* W. Becker, *Viola squamulosa* W. Becker
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AIS.
Rango altitudinal: 1000-2000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Viola santiagonensis W. Becker
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: RME.
Rango altitudinal: 2500-2600 m.

Viola sempervivum Gay
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ, RME.
Rango altitudinal: 2850 m.

Viola skottbergiana W. Becker
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: LBO, MAU.
Rango altitudinal: 2000-2900 m.

Viola subandina J.M. Watson
Sinónimos: *Viola pusilla* Hook. & Arn. ex Hook., non Poepp., hom. illeg.
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU.
Rango altitudinal: 1100-2400 m.
Países limítrofes: Argentina.

***Viola taltalensis* W. Becker**

Sinónimos: *Viola taltalensis* W. Becker var. *glaberrima* W. Becker
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: ANT.
Rango altitudinal: 0-500 m.

***Viola tricolor* L.**

Hierba. Anual o bienal. Introducida.
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.
Rango altitudinal: 0-2000 m.

***Viola tridentata* Menzies ex Ging.**

Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-1000 m.
Países limítrofes: Argentina.

***Viola truncata* Meyen var. *glandulifera* W. Becker**

Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAU.
Rango altitudinal: 1900-2200 m.
Países limítrofes: Argentina.

Viola truncata* Meyen var. *truncata

Sinónimos: *Viola glacialis* Poepp. & Endl., *Viola truncata* Meyen var. *laberrima* W. Becker
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: RME, LBO, BIO.
Rango altitudinal: 1500-2300 m.

***Viola vallenarensis* W. Becker**

Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: ATA, COQ.
Rango altitudinal: 4000-4030 m.

***Viola volcanica* Gillies ex Hook. & Arn.**

Sinónimos: *Viola congesta* auct. non Gillies ex Hook. & Arn.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: BIO.
Rango altitudinal: 1200-2000 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Marmo.

VITACEAE

Cissus

***Cissus striata* Ruiz & Pav.**

Sinónimos: *Cissus deficiens* Hook. & Arn., *Adenopetalum palmatum* Turcz., *Cissus striata* Ruiz & Pav. var. *chilensis* Suess., *Cissa striata* Ruiz & Pav. var. *deficiens* (Hook. & Arn.) Reiche, *Cissus striata* Bertero ex Steud., *Cissus stricta* Bertero ex Steud., *Cissus violacea* Meyen, *Vitis straita* E.G. Baker, *Cissus bonariensis* Hook & Arn.

Arbusto trepador. Nativo.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-1700 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Pilpilvoqui, voqui colorado.

Vitis

***Vitis vinifera* L.**

Arbusto trepador. Introducido.
Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, JFE.
Nombre vulgar: Vid, parra.

WINTERACEAE

Drimys

***Drimys andina* (Reiche) R. A. Rodr. & Quezada**
Sinónimos: *Drimys winteri* J.R. Forst. & G. Forst. var. *andina* Reiche, *Drimys winteri* J.R. Forst. & G. Forst. var. *chilensis* (DC.) A. Gray fma. *andina* (Reiche) Hauman, *Drimys winteri* J.R. Forst. & G. Forst. var. *quinoensis* Kuntze

Arbusto. Endémico.
Distribución: BIO, ARA, LRI, LLA.
Rango altitudinal: 800-1500 m.
Nombre vulgar: Canelo enano.

***Drimys confertifolia* Phil.**

Sinónimos: *Drimys fernandeziana* Steud., *Drimys fernandezianus* Miers, *Drimys winteri* J.R. Forst. & G. Forst. var. *fernandeziana* (Steud.) Reiche, *Drimys*

winteri J.R. Forst. & G. Forst. var. *confertifolia* (Phil.) Johow
Árbol. Endémico.
Distribución: JFE.
Rango altitudinal: 100-1200 m.
Nombre vulgar: Canelo de Juan Fernández.

***Drimys winteri* J.R. Forst. & G. Forst. var. *chilensis* (DC.) A. Gray**

Sinónimos: *Drimys paniculata* Steud., *Drimys chilensis* DC. var. *latifolia* Miers, *Drimys winteri* J.R. Forst. & G. Forst. fma. *chilensis* Eichler, *Drimys chilensis* DC.
Árbol. Endémico.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-1700 m.
Nombre vulgar: Canelo.

Drimys winteri* J.R. Forst. & G. Forst. var. *winteri

Sinónimos: *Wintera aromatica* Sol. ex Foth, *Drimys punctata* Lam., *Drimys winteri* J.R. Forst. & G. Forst. var. *punctata* (Lam.) DC., *Drimys winteri* J.R. Forst. & G. Forst. fma. *magellanica* Eichler, *Drimys winteri* J.R. Forst. & G. Forst. var. *morenonis* Kuntze, *Drimys wintera* Thell., *Drimys aromatique* Descourt. ex Baill.
Árbol. Nativo.
Distribución: COQ, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-2500 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Canelo, foye.

ZYGOPHYLLACEAE

Bulnesia

***Bulnesia chilensis* Gay**
Sinónimos: *Gonoptera chilensis* Turcz.
Arbusto. Endémico.
Distribución: ATA, COQ.
Rango altitudinal: 100-4000 m.
Nombre vulgar: Retama, retama del cerro.

Fagonia

***Fagonia chilensis* Hook. & Arn.**

Sinónimos: *Fagonia chilensis* Hook. & Arn. var. *aspera* (Gay) I.M. Johnst., *Fagonia subaphylla* Phil., *Fagonia aspera* Gay
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ.
Rango altitudinal: 0-4000 m.
Países limítrofes: Perú.
Nombre vulgar: Hualputilla, rosita.

Larrea

***Larrea divaricata* Cav.**

Sinónimos: *Covillea divaricata* (Cav.) Vail, *Neoschroetera divaricata* (Cav.) Briq., *Schroeterella divaricata* (Cav.) Briq.
Arbusto. Nativo.
Distribución: ATA, VAL, RME, BIO.
Rango altitudinal: 0-3000 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.
Nombre vulgar: Jarrilla.

***Larrea nitida* Cav.**

Sinónimos: *Larrea balsamica* I.M. Johnst., *Covillea nitida* (Cav.) Vail
Arbusto. Nativo.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME.
Rango altitudinal: 0-3400 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Jarrilla.

Metharme

***Metharme lanata* Phil. ex Engl.**
Sinónimos: *Metharme lanata* Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: AYP, TAR.
Rango altitudinal: 2100-2200 m.

Pintoa

***Pintoa chilensis* Gay**
Arbusto. Endémico.
Distribución: ATA.
Rango altitudinal: 200-1500 m.

Porlieria

Porlieria chilensis I.M. Johnst.

Arbusto o árbol pequeño. Endémico.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO.

Rango altitudinal: 0-1400 m.

Nombre vulgar: Guayacán, palo santo.

Tribulus

Tribulus terrestris L.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: TAR, ANT, ATA, RME.